



STHIRI BALA SIGITCHAI

ஸ்திரீபால சிகிச்சை.

இஃது

ஸ்திரீகளுக்கும், பாலர்களுக்கும் தனிப்பட சம்பனிக்கும்

ரோகங்களையும் அவற்றிற்கான செய்முறை,

கைமுறை, ஆங்கிலமுறை, ஆகிய

மும்முறைகளிலும்

சிகிச்சைகளை

விளக்கி

டாக்டர் S. A. சின்னப்பா M. D. (ஹோமியோ)

அவர்களாரியற்றப் பெற்றது



B. இரத்தின நாயகர் ஸன்ஸ் அவர்களால்

வெளியிட் டது

சென்னை-1.

பதிப்புரிமை]

1955.

PRINTED AT THE THIRUMAGAL VILASAM PRESS
G. T. MADRAS - 1.

மு க வு ளை

PREFACE



மக்கட் பிறப்பிலும் மாதர் பிறப்பு மாண்பு மிக்கது. மாநர் பிறப்பிலும் பல மக்களை பெற்றாற்குச் சிறப்பு மிக்கது. பல மக்களைப் பெறுதற்கு உடல் நலன் தேடுதல் யாவர்க்கு முற்றது. உடல் நலன் தேடா தொழியின் உயிர்வாழ்த வரிது. அஃதினைப்பற்றியே, உயிர் வாழ்கற்கும், மாணத்திற்கு மிடையே சம்பவிக்கும் பிணியாகிய கூற்றுவினை யகற்றுவதற்கு முன்னிருத்த முனிவர்களும், மகரிஷி களும் உற்றுணர்ந்து, கற்று தேர்ந்து உலகில் மக்களை உய்விக்கு முபாயமாகிய உத்தம வைத்திய முறைகளை உணர்த்தி மறைந்தனர்.

பிற்காலத்தினர் அம் முறைகளைக் கைநழுவ விட்டு மேலை நாட்டு முறையில் மையல் கொண்டு, தாய் தேச சாஸ்திரங்களை புறக்கணித் தனர். அதன் பயனாய் இன்றைக்கு நம் தம் பூர்விக வைத்திய சாஸ்திர கலையானது க்ஷீணித்துவிட்டதெனின் மிகைப்படாது, மேலை நாட்டு வைத்திய முறையும், சுயதேச சிகிச்சா முறையும் ஒன்றென்பதை அறிவாளிக ளறியாதிலர்.

எவ்வாறாயினும், நம் சுயதேச பாஷையில் சுவிஸ்தாரமான வைத்திய நூற்கள் இல்லை யென்பதை மறுப்பாரு மிலர். அதனி லும், ஸ்திரீ ஜாதிக் கேற்பட்ட தனித்தனி விபாதிகளுக்கும், பாலர் களுக்குற்ற பல பிணிகளுக்கும் சிகிச்சை செய்முறைகளைக் கூறும் நூற்கள் ஒன்றுமில்லை யெனின் அது மிகையாகாது, ஆதலால்,

அப் பெருங் குறையை நீக்குவான் வேண்டி, என்னின் சிற்றறிவுக் கேற்ற முறையில், அற்ப அநுபவத்திற் கண்ட உண்மைகளை விளக்கி, திரட்டி ஸ்திரீ பால சிகிச்சை என்ற இந்நூலை உலகார்த்த மாக வெளியிடத் துணிந்தோம்.

ஸ்திரீ பால சிகிச்சையாய் இந்நூலில் மாதர்களுக்குண்டா யிருக்கும் ஜனநேந்திரிய விகல்பத்தினு லேற்படும் பல பிணிகளையும், பாலர்களின் திரேக வங்கஸ்திர மின்மையா லேற்படும் பல ரோகங் களையும் விளக்க அவற்றிற்கான ஆங்கில தமிழ் சிகிச்சைகளை சம்பூரணமாகவும், யாவரு மெளிதில் கையாண்டு இலகுவான வித மாகவும் வரையப்பட்டிருக்கிறது.

இயல்பாகவே மாதர்கள் நாணமுடையவர்கள். அன்னார்களுக் கேற்படும் ரோகங்களை சுவஸ்தரமாக பிற ஆடவ மருத்துவரிடம் கூற சங்கடமுற்று வருந்துகின்றன ரென்பதை யறியாதாரில்லை. ஆதலால், கற்றறிந்த மாதர்க ளொவ்வொருவரும் தாங்களே பிறர் சகாயமின்றி சிகிச்சை செய்துகொள்ளத் தக்கவிதமா யுபதேசிக்கும் நூல் “ஸ்திரீ பால சிகிச்சை” ஒன்றுதா னென்பதை அநுபவ வாயி லாகக் கண்டறியலாம்.

யாம் முதல் முதல் தொகுத்த நூல் இந்த ஸ்திரீ பால சிகிச் சையேயாகும்; இதற்குப்பின் மருத்துவர்களுக்கும், மருத்துவ மாண வர்களுக்கும் இன்றி யமையாதவிதமாக மேலை நாட்டு வயித்திய நுண் ணிய ஆராய்ச்சிக் கேற்றவிதமாகவும் ஆயுர் வேத, சித்த வயித்திய சாஸ்திரத்தின் உட்பொருட்களையும் ஒருங்கே திரட்டி, விளக்கி அறியாதவர்களையும் அனைத்துமறிந்த வயித்தியனுக்கும் ஆற்ற லளிக் கும் விதமாய் அரிய பெரிய மறை பொருள்களைக் கூறும். “சிகிச்சா சாரம்” என்ற நூலை வெளியிட எண்ணியுள்ளோம்.

இந்த ஸ்திரீ பால சிகிச்சையை விவரவில் முடிக்கவேண்டு மென்று துரிதமாக வேலைகள் நடத்தப்பட்டதால், சிற்சில விடங்

களில் ஆங்கில தமிழ் எழுத்துப் பிழைக ளேற்பட்டுவிட்டதற்கு வருந்துகின்றேம். எனினும், அவைகள் அதிகமின்மையால் தனித்த தொரு “பிழைத் திருத்தம்” சேர்த்தல் அவசியமின் நென்றெண்ணி விடுத்தேம். பெரும் பொருளிலும் களங்கமுண்டெனில், என் சிற்றறிவால் தொகுக்கப்பட்ட இந்நூலில் சிற்சில குறைக ளிருப்பி னும், அவைகளைக் கழுவி நன்கமைத்துக்கொள்ளுதல் அறிவாளி கள் கடனும்.

கடைசியாக யாம் எந்த நோக்கத்துடன் இந்நூலை வெளியிடத் துணிந்தோமோ அந்த உன்னத பயனை இந்நூலினு லனைவரு மடைந்து இன்புற்று வாழ்ந்து யாரும் இதுபோன்ற பலபிரயோசன முள்ள உயரிய நூற்களை தமிழுகிற்குதவும் வண்ணம் பெயர்க்கு ணக்கமளித் தாசீர்வதிக்ஞம்படியாகவும் பிரார்த்திக்கின்றேன்.

ஆக்கியோன்.

மு த ற் ப ா க ம்

FRIST PART

ஸ்திரீ பால சிகிச்சை

TREATMENT FOR DISEASE OF WOMEN AND CHILDREN

ஜனநேந்திரிய புற அவயவங்கள் (EXTERNAL ORGANS OF GENERATIONS)

ரோகம் என்பது மக்களில் ஆண் பெண் என்ற இரு வகுப்பிற்கும்பொது வானதாகும். ஆனால் ஆண்களினின்றும் பெண்களுக்கு அவர்களின், கர்ப்பாசய சம்பந்தமாகவும்; ஜனநேந்திரிய விகல்பத்தின் சம்பந்தமாகவும், பலத்தனிப்பட்ட ரோகங்கள் சம்பவிக்கின்றன. அவ்விதமாக ஸ்திரீகளுக்குண்டாகும் ரோகங்களைக் கூறுமுன் அவர்கள் ஜனநேந்திரிய அமைப்பைப்பற்றிக் கொஞ்சம் சொல்லவேண்டியது அவசியமென்று எண்ணுகிறேன்.

ஸ்திரீ ஜனநேந்திரியங்களில் கடிதடம் (Mons Veneris) என்பது மாதர் இரு துடைகளும், அடிவயிறும் சந்திக்கும் பாகத்தில் பிதுக்கமாக, மயிரடர்ந்திருப்பதுதான். இக் கடிதடமானது மர்மஸ்தான எலும்பு(Pubis)பின் மேல் எடுப்பாக நிணம் நிறைந்து சற்று மேடாகக் காணப்படும். இந்த மேட்டின் நடுவில் பள்ளமாகவும், பிளவாகவும் காணப்படுவதே அல்தல், உபஸ்தம், தூய்யம் அல்லது யோனித்துவாரம் (Canal of vagina-Vulva) என்று சொல்லப்படும். இதுதான் மற்றெல்லா ஜனநேந்திரிய உருப்புகளிலும் பிரதானமானதாகும். சம்போகத்திற்கு; புணர்ச்சிக்கு; சிறிறின்பசுத்திற்கு; மூலப்பொருளாகவும், சிசு உற்பத்திச்செய்வதற்கு, விந்துவை கருக்குழியில் கொண்டுசேர்க்கும் மூலவழியாகவு மிருக்கிறது. இந்த யோனித்துவாரமானது ரப்பர் போன்று விரிந்து சுருங்கும் பிரக்கிருதி வாய்ந்ததாய் பல நரம்புக் கூட்டங்களினால் பின்னப்பட்டதாய் இருக்கிறது. ஸ்திரீகள் பிரசவிக்கும் சமயம், அதிகமாக விரிந்து கொடுத்துப் பழையடிச் சுருங்கி விடுகிறது.

யோனித்துவாரத்தின் பக்கத்திற் கொன்றாக மடிந்து நீண்டு எழும்பியுள்ள சருமங்களை உதடுகள், நிதம்பங்கள் (Labia Majora) என்று சொல்லப்படும் இவ்வகளில் நிணம் நிறைந்திருப்பதினால் ரோமங்கள் முளைத்திருக்கும். நிதம்பங்களின் உட்புறத்தில் யோனிலிங்கத்தின் தொடர்பாக விடபம் வரையில் இரண்டாக மடிந்த ஒரு ஜவ்வுமடிப்பு, அது உள்ளுந்டு என்று சொல்லும், (Labia Minora) உள் நிதம்பங்களுக்கும் கன்னியழியாதப் பெண்

சளுக்கும், சம்போகமின்றி யிருக்கும் பெண்களுக்கும், இந்த உள்நுதலிகள் மேல் நிதம்பங்களால் மறைக்கப்பட்டிருக்கும். பின்னை பெற்றவர்களுக்கும், வயது சென்றவர்களுக்கும் வெளியில் மடிந்து தெரியும். இவ் வுத்களானவை ஆசனத்தின் துவாரத்தின் பக்கமாகக் கீழ் இறங்கி ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும். இதுவே விடபம் (Fourchette) என்று சொல்லப்படும். பிரசவிக்கும் சமயம் சிசுவின் சிரசு உதயத்தினால், இவ் வடிபாகம் கிழிந்து போகும். அதற்கே விடபக்கீழ்வு (Laceration of Perineum) என்பர். இதனைக் கவனமாய்ப் பார்க்காதுபோனால் புண்ணாகிப் பல ஹிம்ஸைகள் உண்டாகலாம்.

யோனிக்கும் கருப்பையிக்குமிடையே மிக நுண்ணிதமான ஓர் சவ்வு, (Hymen) அது யோனிப்படலமென்றுக் கூறுவர். இதன் மத்தியிலுள்ள துளையின் வழியாகவே மாதாந்திர சூதகம் வெளிப்படும். இத்துவாரமில்லா திருப்பின் கிரமமாய் வெளியாகவேண்டிய சூதகம் தடைப்பட்டு, இன்னலை விளைவிக்கும். இந் நுண்ணிதச் சவ்வானது முதல் சம்போகக் காலத்தில் கிழிவு பட்டு விடுகிறது. அப்போதுதான் புதிதாகச் சம்போகிக்கும் பெண்களுக்கு வலியுண்டாகிறது. இந்த யோனிப்படலமானது சிலருக்குத் தடிப்பதாகவும், சிலருக்கு மெல்லியதாகவுமிருக்கும். இதனால் புணர்ச்சிக்கும் சிசு உற்பத்திக்கும் இடையூறு ஏற்படலாம். சிலருக்கு இயற்கையிலேயேனும், வியாதியினாலேனும் இப்படலமானதில்லாதிருக்கலாம். இந்தயோனிப்படலம் மூன்றுவிதமாக விரும்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது. சிலருக்கு துளையில்லாமலும் (Imperforate) சிலருக்குப் பல துளைகளையுடையதாக (Criferiform)வும், மற்றும் சிலருக்கு (Annular) சவ்வின் மத்தியில் ஒரே சிறுதுளை உள்ளதாகவும் இருக்குமென்று சொல்லப்படுகிறது. யோனித்துவாரமானது சாதாரணமாகத் திரேக பிரக்கிருதிக்குத் தக்கபடி நீளமாகவும் குறுகலாகவும் இருக்கலாம். இதையே புழக்கை என்பர். இப்புழக்கையானது முன்பக்கத்திலிருந்து சினைப்பையின் கடைசி வரையில் ஏறக்குறைய ஆறு அங்குலத்திற்குக் குறையாமலும், பன்னிரண்டங்குலத்திற்கு அதிகமாகாமலும் இருக்கும்.

கடிதடத்திற்குக்கீழ் உள்நிதம்பங்களுக்கு மேலாக, தாமரை மொட்டுப் போன்று இருக்கின்ற உருப்பை யோனிவிங்கம் (Clitoris) சுழிமுனை, மொக் துள், என்று கூறுவர். ஸ்திரீகளுக்குப் போக காலங்களில் இன்பத்தைத் தரும் இடம் இதுவே. ஆடவர்களுக்கு ஆண்குறியில் எவ்வாறு நரம்புகள் கூட்டங் கூட்டமாய் பின்னிக்கொண் டிருக்கின்றனவோ, அவ்வாறே மாதர்களுக்கு யோனிவிங்கத்தில் நரம்புகள் கூட்டமாகப் பின்னிக்கொண் டிருப்பதினால் அவ்விடத்தில் அதிகமான கூச்சம் ஏற்படுகிறது. இதற்கேதாவது கெடுதல் நேர்ந்துவிட்டால் மாதர்களுக்குப் போக இச்சையே அற்றுப் போகும், ஆனால் ஆண்களுக்கு மூத்திரம் வருவதுபோல் பெண்களுக்கு

யோனித் துவாரத்திலிருந்து சிறுநீரானது வராமல் தனிப்பட்ட வழியாக வருகிறது.

யோனிலிங்கத்தின் கீழும் மேலும் உள்ள பள்ளங்களில் மூத்திரதாரையின் துவாரம் காணப்படும். இதன் வழியாகத்தான் மூத்திரம் வெளிப்பட்டு யோனித் துவாரத்தின் வழியே வந்து விழுகிறது. இதற்குத்தான் ழந்திராதிதூரை (Urethra) என்று சொல்லப்படும். இந்த நீர் தாரையானது மூத்திரப்பையிலிருந்து 1½-அங்குல நீளமுள்ளதாய் யோனிலிங்கத்திற்கு ½-அங்குல தூரத்தில் அமைந்திருக்கிறது.

ஜனநேந்திரிய உட்புற அவயவங்கள் (INTERNAL ORGANS OF GENERATIONS)

யோனித்துவாரத்திலிருந்து கர்ப்பாசயம் வரையில் செல்லும் பாதைக்குக் கர்ப்பக்குழல் (vagina) எனப்படும். இதன் வெளிப்புற அடைப்பானது (Posterior Wall) விடபத்துடன் சம்பந்தப்பட்டு, ஆசனவாய்க்கு 1½-அங்குலத்திற்குமேல் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் நீளம் சற்றேறக்குறைய நான்கு அங்குலங்களாக இருக்கலாம். கர்ப்பக்குழலின் உட்புற அடைப்பானது சற்றேறக்குறைய 1½-அங்குல நீளமுள்ளதாய், நீர்த்தாரையுடனும் மூத்திரப்பையுடனும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும். இதற்கு (Anterior Wall) உட்புற கர்ப்பக்குழல் என்பர். தொய்வாகச்செல்லும் கர்ப்பக்குழல் பெருங்குடல் உட்புற சுவற்றோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கர்ப்பக்குழலின் தலைப்பை கர்ப்பப்பாதை வளைவு (Vault of vagina) என்பர். கர்ப்பக்குழல் மூன்றுவித சதைப்பொருளால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. முதலாவது, மெல்லிய சவ்வுகளினால் வெளிப்பக்கம் மூடப்பட்டும்; இரண்டாவது, கனதியில்லாத சதைப்பொருளால் மூடப்பட்டும், மூன்றாவது, பொடிநரம்புகளாலும், பசைப்போன்ற வஸ்துக்களாலும் மூடப்பட்டு யிருக்கின்றன. கர்ப்பமுண்டாயிருக்கும் சமயங்களில் இரண்டாவதான சதைப்பொருள் விருத்தி யடைந்து கர்ப்பக்குழலை வலுசெய்கின்றது.

கருப்பையானது (Uterus - Womb) அடிவயிற்றுக்குள் மலக்குடலுக்கும், மூத்திரப்பைக்கும், மத்தியில் தொங்கிக்கொண்டிருக்கும். இதற்குக் கருக்கிழி, கர்ப்பாஸயம் எனப் பல பெயருண்டு. இப்படி மலக்குடலுக்கும், மூத்திரப்பைக்கும் மத்தியில் அமையப்பெற்றிருப்பதினால், கருக்குழியிலுண்டாகும் கர்ப்பத்துக்கு, வெளியில்படும் அடிக்குத்துகளினால் சேதமுண்டாகாது. கருப்பையானது விரியவும், சுருங்கவும் யேதுவாக யிருப்பதினால், கர்ப்பாஸயத்தில் பிண்டம் பெருக்கப் பெருக்க கர்ப்பாஸயமும் விரிந்து இடம் கொடுக்கின்றது. கர்ப்பாஸயமானது கூண்டுபோல் ஏறக்குறைய மூன்று அங்குல நீளமும் இரண்டு அங்குல அகலமும்; கனத்தில் ஒரு அங்குலமுமாக

அமைந்திருக்கும். கன்னிப்பருவத்தில் 1½-ராத்தல் எடையுள்ளதாகவிரும்பும். இக் கர்ப்பக் கோளறையானது பிரசவித்த ஸ்திரீகளுக்கு 2-ராத்தல் நிறையுள்ளதாகி விடுகிறது. முக்கியமாகக் கர்ப்பப்பையை மூன்று பாகமாகப் பிரிக்கப்படும். (1) அடிபாகம் (Fundus) இது கர்ப்பப்பையின் அகன்ற பாகத்திற்குச் சொல்லப்படும். இந்த பாகத்தையே சினைப்பாதையின் தலை பாகத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. (2) உடல் (Body) இந்தப்பாகம், மத்தியபாகமாகவுள்ளது. (3) கழுத்து (Cervix), இதுவே சிறுத்திருக்கும் கீழ்பாகமாகும். இது உருண்டையாக ஒரு அங்குல நீளத்திலுள்ளது. இது மூலை வாட்டமாகக் கர்ப்பக்குழலுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இதுவாறுள்ள துவாரத்திற்கு கருப்பைவாய் (Osuteri) எனப்படும். குழந்தைகள் பெற்றவர்களுக்கு இந்தக் கருப்பை வாயானது நீளவட்டமாகவும், பிரசவியாத கன்னிகைகளுக்கு நல்ல வட்டமாகவு யிருக்கும். கருப்பையின் பிரதான தொழில், மாதாந்திர ருதுவை சுரப்பிக்கிறது, கரு உற்பத்தியானபோது வளர்ப்பதுமான சுபாவப்பிரக்கிருதி யுடையதாக விருக்கிறது. கருப்பைக்கும், இரைப்பைக்கும் சம்பந்தமிருக்கிறதென்று தெரிந்து கொள்ளுவதும் முக்கியமானதாகும். இதனால்தான் கருப்பகாலத்தில் ஸ்திரீகளுக்குக் காலே வார்தி, ஓக்காளம், அன்னத்துவேஷம் முதலியவைகள் உண்டாகின்றன.

சினைப்பை:—(Ovaries) கருப்பையின் பக்கத்திற் கொன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும், இலுப்பைக் கொட்டைப்போன்று திரண்டு வெண்மையாக வெவ்வேறு பைகளில் இருக்கும் இரண்டு பீஜங்களேயாகும். இதை நாதாசயங்கள், கருக்கூடுகள், ஸ்திரீபீஜங்கள், முட்டைப்பைகள், சினைப்பைகள் எனக் கூறுவர். ஆடவர்களுக்குப் பீஜம் யெவ்வாறு சுக்கிலம் உற்பத்தி செய்ய உதவுகின்றனவோ, அவ்வாறே சுரோணிதம் உண்டுபண்ண இந்த இரண்டும் உபயோகமாகுகின்றன. இவைகள் நீளத்தில் 1½-அங்குலமுள்ளதாகவும், அகலத்தில் ஒரு அங்குல முள்ளதாகவும் அமைந்திருக்கின்றன. சினைப்பையின் எடை 1½-அல்லது 2-டிராம் இருக்கலாம். இவைகளின் உருவங்கள் பிரஷ்டைக்காலங்களிலும், கருப்பற்றியிருக்கும் காலங்களிலும், பெரிதாகி மற்றைப்போது சுபாவருபத்தை யடைகின்றன. ஒவ்வொரு சினைப்பையிலும், ஏறக்குறைய ஐம்பதினாயிரம் முட்டைகள் அதாவது நாதகீதும்பிகள் (Graafian Vesicles) காணப்படு மென்றாலும், நன்றாகப் பக்குவப்பட்டவைகள் பத்து முதல் முப்பது வரையில் தான் யிருக்கும். இவைகள் முத்துக்கள் போன்றிருக்கும். அளவில் ஒரு அங்குலத்தை 180-பாகமாக வகுத்தால் எவ்வளவு சிறிதாயிருக்குமோ அவ்வளவு பொடியாக விருக்கும். அணுதரிசினியினால் பார்த்தால் நாதகக்குமிழிலுள்ள நாதமானது (Ovum) குமிழ்போன்று தோன்றும். அந்தக் குமிழினுள் மங்கலாக விருக்கும் புள்ளிக்குக் கூரு (Yolk) என்பர். மாதாந்திர ருது காலங்களில் இந்த நாதக்குமிழ் முற்றி வெடித்து, நாதவாகியின் குஞ்சம்

போன்ற முனையானது, கருப்பையைப் பிடித்துக்கொள்ளும். அக்காலங்களில் வெளிப்படும் நாதமானது, நாதவாயிலின் வழியேயிறங்கிக் கருக்குழியில் விழுந்து ஸ்ரோணித்ததோடு சேர்ந்து, யோனித்துவாரத்தின் வழியாக வெளிப்பட்டுவிடும்.

சினைப்பாதை :—(Fallopian Tubes) இது கருப்பையின் பக்கத்திற்கொன்றாக நீண்டு, ஒரு முனை கருப்பையின்மேல் முனையோடும், மற்றொன்று குஞ்சம்போல் விரிந்து அந்தராமாயு மிருக்கும். இவற்றை நாதவாகி, நாதக் குழல் அல்லது சினைப்பாதை என்றெல்லாம் கூறுவர். இது மூன்று நான்கு அங்குல நீளமுள்ளதாய், சிறு உட்துவாரமுமுள்ளதாய்க் கருக்குழியோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கும்.

சூதகம் (MENSES)

கர்ப்பக்கோளறையின் உட்புற அமைப்புகள் எண்ணிறந்த நுண்ணிய இரத்த நரம்புகளால் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. அவ்விதமான பொருத்து நரம்புகளில் உண்டாகும் ஓர்வித கழிப்பொருளே சூதகமென்று கூறப்படும். இதைப் பெண்கள் பரிபக்குவமடைந்த அறிகுறியாக முதல் முதல் காணப்பட்டு, பிறகு 28-நாட்களுக் கொருமுறை வழக்கமாக முதல் சூதகம் கண்டதிலிருந்து 30-வருஷங்கள் வரையில் வெளியாகிவரும். பெண்கள் பக்குவமடைந்தார்களென்றால், சிசு உற்பத்தியாவதற்கு தகுதியானார்கள் என்று தான் அருத்தம். அப்போதுதான் அவர்களின் கருக்குழி வலிமையடைந்து, சினைப் பைகளின் நாதக்குமிழ்கள் முற்றிக் கற்பமடைவதற்குச் சீரரசத்தியை அடைந்திருப்பதாக அறியலாம். அந்தச் சமயம் பெண்கள் பெரும் சீர மாருதல்களை யடைகின்றனர். தங்கள் சிறுவயதில் அறியாத நாணமான உணர்ச்சிகளையும், திரேகத்தில் அதிக கூச்சத்தையும் அடைகின்றனர். மார்பானது திரண்டு புதிய தோற்றத்தைத் தருவதோடு, மர்மஸ்தானங்களில் மயிர்முளைத்துப் பக்குவவதிகளாக ஆகுகின்றனர்.

முதல் சூதகம் கண்டதிலிருந்து மூன்றாண்டுகள்வரை பெண்கள் கர்ப்பகோளங்கள் வலுவை அடைவதில்லை. கரு பற்ற தகுதியுடையவர்களாகிறார்களே தவிர, கருப்பையின் வலிமை குறைவாகவும், கருவை வளர்க்கும் சத்து குறைந்தும், பிரசவிக்கப் போதுமான தைரியம் இல்லாமலுமிருக்கிறார்கள். பக்குவமடைந்த மூன்றாண்டுகளுக்குள் கருத்தரிப்பது கஷ்டம்தான். ஒருக்கால் கருத்தரித்தாலும் அகாலப்பிரசவமாக முடியும். அப்படியின்றி பூரண கர்ப்பமாகி சிசு ஜனித்தாலும் போதிய பலத்துடனின்றி, அகால மரணத்தை யடையும். சிறுவயதில் கர்ப்பவதிகளாவதினால் தாய்மார்களும், பலயீனம் படுவதோடன்றி, வாஸிப மரணத்திற்கும் ஆளாகிறார்கள்.

உண்ணதேசமாகிய நம் இந்து தேசத்தில் பெண்கள் ஒன்பது முதல் 12-வயதுக்குள் நுதுவாவார்கள். சரீரசௌக்கியமுள்ள பெண்களுக்கு வெளிப்படும் சூதகமானது நல்ல சிகப்பு நிறமாகவாகிலும், சூசம்பா வர்ணமாகவாகிலுமிருக்கும். சூதகமானது சிலநுடைய திரேக பிரகிருதிக்குத் தக்கவாறு மூன்று தினங்களுக்குள் நின்றுவிடும்; மற்றும் சிலருக்கு மூன்று தினங்களுக்கதிகமாகவு மிஞ்ந்து நிற்கும். பொதுவாக சூதகம் 4-முதல் 7-நாள்வரை படுமென்று சொல்லலாம். முதல் நுதுவான பெண்களுக்கு 9-நாள் வரையும், 16-நாள் வரையும் இருப்பதுண்டு. பொதுவாக மாதாந்திர தீட்டானது 28-நாளைக்கொருதரம் அவசியம் காணவேண்டியதென்றாலும், திரேகப்பிரகிருதியின் காரணமாக ஒன்றல்லது இரண்டுநாள் முன்பின்னாகக் காணலாம். அது குற்றமாகாது. தீண்டலாகி, கட்டோடு சூதகம் நின்று மறுபடி 15-தினத்திற்குள் சூதகம் படுமானால் ரோகம் என்றுதான் சொல்லவேண்டும். சூதகமானது, கிராமாய் வெளிப்படுவதினால் ஸ்திரீ ஜாதிக் தே திரேக நன்மையைத் தருவதோடு, கருவுற்றிருக்கும் காலத்தில் கருவை வளர்க்கவும், குழந்தை பெற்றபின், சிசு ஆகாரமாகிய பாலாகவும் மாறி உதவிசெய்கிறது. கருவுற்றிருக்கும் ஸ்திரீகளுக்கும், சிசுக்களுக்குப் பால் கொடுக்கும் மாதர்களுக்கும், நுதுவாகாத சிறுவர்களுக்கும், சூதகத்தை விருத்திசெய்து வெளிப்படுத்தும். நுதுவர்த்தனகார- (எம்மனகாக் Emmenagogue) குணமுள்ள மருந்துகளைக் கொடுக்கக்கூடாது.

கர்ப்பம் (PREGNANCY)

மாதர்கள் வீட்டு விலக்கமாவதற்கு சில தினங்களுக்கு முன்னாவது பின்னாவது கருப்பையிலுள்ள நாதக்குமிழ்கள் ஒன்றிரண்டு முற்றி வெடித்து வெளிப்படுகிற நாதமானது, சினைப்பையில் இருந்து இறங்கி கருக்குழியில் விழுந்திருக்கும். அந்தச்சமயம் சம்போகம் செய்வதால், ஆணின் விந்துக்கிருமிகள் நாதத்தோடு சேர்ந்து கருத்தரிக்கும். இக் காலங்களில் சூதகமானது வெளிப்படாது. கருவுற்றிருக்கும் ஸ்திரீகளுக்கு, இயற்கையைவிட திரேகம் பூரிப்படையும்; நாடிப் பெருத்துப் படபடப்புடன் நடக்கும்; காலையில் வார்த்தியுண்டாகும்; கண்கள் மஞ்சளாகவேணும் நீலநிறமாகவேணும் இருக்கும்; மயக்கம் காணும்; எச்சில் பெருகும்; ஸ்தனம் விம்மி பெருக்கும்; ஸ்தனத்தின் மத்தியில் காணும் விருத்தமானது கருத்திருக்கும்; ஸ்தனங்களில் முடிச்சுகள் போற்றேன்றும்; வயிறு படிப்படியாய்ப் பெரிதாகும்; மூன்றாம் மாதம் பிண்டத்தின் சலனம் தாய்க்குத் தெரியும்; ஆனால், கர்ப்பமுண்டாயிருக்கும் விவரம் ஒன்றும் தெரியாமலே சில மாதர்களுக்குக் கர்ப்பம் வளர்வதுண்டு. எப்படியிருப்பினும், புருஷனுடன் வாழ்க்கையிலிருக்கும் சுகதேகியான ஒரு பெண்ணின் தீட்டானது நின்றுவிட்டால் கர்ப்பமென்றுதான் நிச்சயிக்கவேண்டும்.

பொய்க் கர்ப்பம், மெய்க் கர்ப்பம் (MOLE PREGNENCY AND PREGNENCY)

பொய்க் கர்ப்பமானது, நாதவிர்துக் கிருமிகளால் ஏற்பட்டதேபோல் சகல அறிகுறிகளையிருந்தாலும் வயித்திய முறையில் அதனை சோதிப்பதனால் தெரிந்துகொள்ளலாம். மாதாந்தர வீட்டு விலக்கக் காலங்களில் கிராமமாய் வெளியாகவேண்டிய சூதகமானது அதிகமான வாயுவைக்கொண்டு, சூத கத்தை வெளிவிடாது கட்டிப்போலாக்கிவிடும். இக் கட்டிடமும் சிசுவைப் போலவே அசைவதுமுண்டு. தக்க மருந்துகள் உண்பதினால் கட்டி கரைந்து வெளிப்பட்டிவிடும். சிலருக்குப் பிரசவ வேதனைபோன்றே இடுப்பு வலியும் கண்டு கட்டி விழுந்துவிடுவது முண்டு. இதைக் கவனித்துச் சிகிச்சை செய் யப்படாவிட்டால் அசம்பாவிதமாக மாறிவிடும். கர்ப்பமானது மூன்று மாதங் களுக்கு முன் அசையாது. பொய்க் கர்ப்பம் பிரதமத்திலேயே சலனத்துட னிருக்கும். கர்ப்பமானால், அடிவயிறு சிறுகச்சிறுகப் பெருகும். பொய்க்கர்ப்ப மானால், ஆரம்பத்திலேயே வயிற்றைப் பெரிதாக்கிவிடும். கர்ப்பமானால், அடி வயிற்றை அழுத்திப்பார்க்க, கல்போல் அழுந்தாதிருக்கும். அழுந்தினாலும், மெது மெதுவாகவே பழைய ஸ்திதிபையடையும்; ஆனால், பொய்க்கர்ப்பம் ஒரு விரலால் அழுத்த அழுத்தி, விரலை யெடுத்த உடனே பள்ளம் மறைந்து விடும். இன்னும் பொய்க் கர்ப்பம், மெய்க்கர்ப்பம் என்றறிய, கர்ப்பவதியின் மூத்திரத்தை அசையாமல் ஒரு பாத்திரத்தில் பிடித்து, நான்கு நாள் வரை வைத்திருந்து அதை வடிகட்டிப் பார்த்தால், நுண்ணிய கிருமிகள் காணப் படும். பொய்க் கர்ப்பமாகில் கிருமிகள் காணப்படா.

இரவில் கர்ப்பஸ்திரீ படுக்கைக்குப்போகு முன், மேற்றோல் நீக்கிய வெள்ளைப்பூண்டின் ஒரு பல்லை யோனித் துவாரத்தில் உட்செலுத்தி வைத் திருந்து வீடிந்தவுடன் எடுத்துப்பார்க்க, வாசனையின்றி இருக்குமானால் கர்ப்ப மெஸ் தறியலாம். பொய்க் கர்ப்பமானால், வெள்ளைப்பூண்டின் மணம் மாறா திருக்கும். இப் பொய்க் கர்ப்பத்தையே சூதகவாயு; சூதக்கட்டி; பொய்க்கர்ப்பம்; சூதக்குன்மம்; இரத்தவாத குன்மக்கட்டி என்று சொல்லுவர். இதற்கு ஏற்ற சிகிச்சையை இரத்தவாதகுன்மக்கட்டி என்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

கர்ப்பம் ஒருக்காலும் 11 மாதங்களுக்குமேல் இருப்பதில்லை; ஆனால், பொய்க் கர்ப்பமானால் வருட கணக்கிலுமிருக்கும்.

பிண்டோற்பத்தி (DEVELOPMENT OF FOETUS)

முதல் மாதத்தில்: கருவானது யாதொரு பருமனையும் அடையாமல் ஒரு அங்குலத்தில் மூன்றில் ஒரு பாகமுள்ள அளவாகப் புழுப்போன்றிருக்கும்.

இதை மூடிக்கொண்டிருக்கும் சவ்வுக்குப் (Amnion) பனிகீத உட்புற சவ்வு என்று கூறுவர். இதனுள் பனி நீர் என்ற தண்ணீர் இருக்கும். இதன் மேல் புறத்திற்குச் சோரியன் (Chorion) மேல்புற சவ்வு என்றும் கூறுவர். இம் மாதக் கடைசியில் கருவின் அளவானது முக்கால் அங்குலமாக வளர்ந்து முப்பத்தைந்து கிரான்ஸ் எடையுள்ளதாக விருக்கும். முதல்மாதக் கடைசியில் ஸ்திரீகளுக்கு வாயில் எச்சில் அதிகமாக ஊறி, வாந்தியை உண்டுபண்ணும். ஆகாரத்தின்மேல் வெறுப்படையச் செய்யும். அடிவயிற்றில் சிறு வலியாக விருக்கும்.

இரண்டாம் மாதத்தில்: கருவானது ஒன்றரை அங்குல நீளமுள்ளதாக விருக்குமென்றாலும், உருவம் ஒன்றும் தோன்றாது உருண்டையாகவிருக்கும். இப்போது இதன் எடை 3 டிராமாகும். கொஞ்சின் மேல் எலும்பும், தாடையெலும்பும் உற்பத்தியாயிருக்கும். சிரசானது உடலைவிட பெரியதாக இருக்கும். இம் மாதக் கடைசியில் முதல் மாதத்தில் உண்டாகிய குறிப்புக்களோடு, முலைக்காம்பைச் சுற்றி கருப்பு வட்டமாகவிருக்கும். ஸ்தனங்கள் விம்பி வலியுண்டாகும். ஸ்தனத்தை அழுத்திப்பார்க்க முடிச்சிபோன்ற கழலைகள் தோன்றும், பச்சை நரம்புகள் தடித்திருக்கும். மசக்கை என்று சொல்லும் தலைசுற்று உண்டாகும். சில ஸ்திரீகளுக்கு வயிற்று வலி அதிகமாக விருக்கும்.

மூன்றாம் மாதத்தில்: பிண்டமானது ஒரு சுண்டெலியின் பருமனாகவும், இரண்டவன்ஸ் எடையளவுள்ளதாகவு் விருக்கும். கைகால் விரல்கள் தோன்றும். ஆயினும், மலத்தவாரமும் வாயும் திறக்கப்படாதிருக்கும். ஆண் பெண் குறிகள் தோன்றும். இம்மாத கடைசிக்குள் நுரையீரல், கல்லீரல், மண்ணீரல், இரப்பை, குடல் முதலியவைகள் உற்பத்தியாகிவிடும். காதும் மூக்கும் தோன்றும். இருதயகோசத்தின் அறைகள் திறக்கப்பட்டு இரத்த ஓட்டமுண்டாகும். கர்ப்பத்தில் தாய்க்குச் சலனம் தெரியும். இப்போது பிண்டத்தின் நீளம் 4½ அங்குலங்களுக்குக் குறையாமலிருக்கும். கர்ப்ப வதிக்கு வயிறும் ஸ்தனங்களும் பெருகும். முலைக்காம்பை நசுக்கினால் பால் போன்ற ஒரு பதார்த்தம் வெளியாகும். சப்த வேணுவை (Stethoscope) அடி வயிற்றில் வைத்து உற்றுக் கேட்டால் இரத்தம் ஓடுவது நன்றாகத் தெரியும். சில கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கு இந்த மாதத்தில் வயிற்றை முறுக்கி வலிக்கும் சிலருக்கு இரத்தப்பேதி உண்டாவதுமுண்டு.

நான்காமாதத்தில்: பிண்டமானது ஒரு எலியின் அளவாகப் பெருத்துவிடும். குறியின் வித்தியாசங்கள் தெளிவாயிருக்கும். வாயும் ஆசனமும் திறக்கப்பட்டுவிடும். கைகால் விரல்களில் நகங்கள் தோன்றும். பித்தப்பையுண்டாகி மேற்குடலில் மலமிருக்கும். சதைபிடித்து வளர்ந்து, சருமம் சிவந்த நிறமாக விருக்கும். தலைவில் ரோமம் காணப்படும். இக்காலத்தில் சிசு ஜனித்தால் சற்று நேரம் உயிரோடிருந்து இறந்துவிடும். சிசு ஆறு அங்குல நீளமுள்ளதாயும்,

4 முதல் 6 அவுன்ஸ் எடையுள்ளதாய் மிருக்கும். சிசு அசைவது கர்ப்ப ஸ்திரீகளுக்கு நன்றாகத் தெரியும். சப்தவேணுவை (Stethoscope) தொப்புள் சமீபத்தில் வைத்துக்கேட்டால், இருதய நடை நன்றாகப் புலப்படும். இப்போது சிசுவின் இருதய நடையானது ஒரு நிமிஷத்திற்கு 130 முதல் 150 வரையிருக்கும். இப்போது சில ஸ்திரீகளுக்கு அடிவயிறு வலித்து, யோனித்துவாரத்தின் வழியாக இரத்தம் காணப்படுவதுண்டு.

ஐந்தாம் மாதத்தில்: சிசுவிற்கு நகமும், தலைமயிரும் நன்றாகத் தெரியும். தோல் மிருதுவாயிருக்கும்; இருதயம் குண்டிக்காய் பெரிதாகியிருக்கும். தலை பெரிதாகி சரீரத்திற்குத் தகுந்தாப்போல் ஆகியிடும். பித்தப்பை நன்றாக விரும்பும். மூளையின் வெள்ளை வஸ்து உண்டாகியிருக்கும். ஐந்தாம் மாதக் கடைசியில் சிசுவின் அங்கங்கள் எல்லாம் பூரணமாயிருக்கும். சிசுவானது 7 முதல் 11 அவுன்ஸ் எடையோடும், 10 முதல் 11 அங்குல நீளத்தோடும் மிருக்கும். இப்போது கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கு அடிவயிறு பெரிதாகி முன்னுக்கு வந்திருக்கும். மர்மஸ்தானத்தில் விரலையிட்டு தூக்கினால் உதய ஜலத்தில் சிசு மேல் கிளம்புவது நன்றாகத் தெரியும். இக்காலத்தில் சில ஸ்திரீகளுக்கு வயிறு அதிகமாய் வலிக்கும். சிலருக்குப் படுத்திருந்தும் உட்கார்ந்திருந்தும் எழுந்திருக்கும்போது, கைகால்களைச் சுண்டியிழுத்து பிடித்துக்கொள்ளும். சிலருக்குக் கால் பாதங்களில் வெடிப்புக் கண்டு எரிச்சல் உண்டாகும்.

ஆறாம் மாதத்தில்: கண்ணிமைகள் தெரியும்; ஆனால், ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். கால் விரல் சிவந்து பெரிதாகவிரும்பும் பித்தப்பையில் பித்தம் சேர்ந்திருக்கும்; ஆனால், கசப்பிராது. பீஜங்கள் குண்டிக்காய்க்குச் சமீபித்திருக்கும். பெருங்குடவில் மலமிருக்கும். சிசுவின்பேரில் மாவு (Vernix Caseosa) பாசிபோன்ற வழுவுழுப்பான வஸ்து படிந்திருக்கும். ஆறு மாதத்தில் சிசுவானது 12 முதல் 13 அங்குல நீளமுள்ளதாய் இரண்டு ராத்தல் எடையுடையதாயிருக்கும். கர்ப்ப ஸ்திரீகளின் அடிவயிறு பெருந்து தொப்புள் உயரத்திற்கு வந்திருக்கும். இக்காலத்தில் குழந்தை பிறந்தால் இரண்டு மணி நேரங்களுக்குமேலிராது. இக் காலங்களில் சில கர்ப்ப ஸ்திரீகளுக்குக் குடல் அழற்சி கண்டு சுற்றி வலிக்கும். சிலருக்கு வயிறு முறுமுறுக்கி வலிக்கும். சிலருக்கு நீர் சுருக்குக் காணும்.

ஏழாமாதத்தில்: சிரசில் மூளை அழுத்தமாகிவிடும். கண்ணிமைகள் திறந்து கொள்ளும்; மூத்திரக் குண்டிக்காய் கெட்டிப்பட்டுவிடும். பீஜம் கீழ் இறங்கியிருக்கும். எலும்புகள் வலுபெற்றிருக்கும். சிசு 14 அங்குல நீளமுள்ளதாயும், 3 ராத்தல் எடையுள்ளதாயிருக்கும். இக் காலத்தில் குழந்தைப் பிறந்தால் பிழைத்துக்கொள்ளும்; ஆனால், வெகு ஜாக்கிரதையாக வளர்க்கப்படவேண்டும். கர்ப்ப ஸ்திரீகளுக்கு அடிவயிறு பெறுத்துத் தொப்புளுக்கு இரண்டங்

குலம் முன் வந்திருக்கும். இக்காலங்களில் சில கர்ப்ப ஸ்திரீகளுக்கு வயிறு வலி அதிகமாகும், சிலருக்குப் பொய்ப் பிரசவ வேதனையும் தோன்றும்.

எட்டாமாதத்தில்: சிசுவின் சிரசில் மூளை வலுவடைந்து, அதில் செந்நிற நரம்பு ரேகைகள் காணப்படும். திரோகம் சிவந்து ரோமத்துவாரங்களும், ரோமக் குருத்துகளும் நுண்ணிதமாகத் தோன்றும். மேனி முழுவதும் மாவு அதிகமாய் படர்ந்திருக்கும். பீஜங்கள் சற்று கீழிறங்கியிருக்கும். இப்போது சிசு 16 அங்குலம் நீளத்தோடு 4 ராத்தல் எடையுள்ளதாயிருக்கும். மர்ம ஸ்தானத்தில் விரலைவிட்டுப் பார்க்க, சிசுவின் தலை தென்படும். இப்போது சில ஸ்திரீகளுக்குப் பசி மந்திக்கும். சிலருக்குக் கைக்காலசளி ஏற்படும்.

ஒன்பதாம் மாதத்தில்: சிசு பூரண அமைப்பை அடைந்து விடுகிறது. பெண்சிசுவைப் பார்க்கிலும் ஆண் சிசு கொஞ்சம் எடை அதிகமாகவேயிருக்கும். மூளை வெண்மையாகவும், சாம்பல் வர்ணமாகவும் ஆகியிருக்கும். மலம் ஆசனத்தில் இருக்கும். ரோமங்கள் நன்றாய் வளர்ந்திருக்கும். ஆண் குழந்தையுடைய பீஜமானது, எட்டா மாதத்திலிருந்த விடத்திலிருந்து மெதுவாகக் கீழிறங்கி, பீஜ கொடித்துவாரங்கள் வழியாக வந்து, அண்டப்பையில் சேர்ந்துவிடும். பெண் சிசுக்களுக்குக் குறிகள் தெளிவாகத் திறந்து, யோனி உள் உதடுகளை மேலுதடுகள் மூடிக்கொண்டிருக்கும். இப்போது சிசுவின் நீளம் 18 அங்குலமாக விருக்கும். எடையில் 6½ ராத்தல் இருக்கும். கர்ப்ப ஸ்திரீகளின் வயிறு நெஞ்சுக்குழி வரையில் பெருத்திருக்கும். சில ஸ்திரீகளுக்குக் கர்ப்பம் வலியாகத் தோன்றும்.

பத்தாமாதம்: இதன் ஆரம்பத்திலோ, அல்லது மாத நடுவிலோ பிரசவம் ஏற்படும். இம் மாதமுதலில் சிசு ஏறக்குறைய 22 அங்குல நீளமுள்ளதாகவும் 7½ ராத்தல் எடையுள்ளதாகவுமிருக்கும். இக்காலத்தில் கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கு யோனியிலிருந்து பிசின் போன்ற வெள்ளைநிற திரவம் கசிந்துகொண்டிருக்கும். இது பிரசவத்திற்கு ஆரம்பம் என்று காட்டும்படியாகவிருக்கிறது. இம் மாதங்களில் சில கர்ப்ப ஸ்திரீகளுக்கு தீதேதி காண்பதுண்டு.

ஆண் பெண் சிசுக் குறிகள் (DIAGNOSIS OF SEX IN WOMB)

கருப்பையிலிருப்பது ஆண் சிசுவா, பெண் சிசுவா என்பதைச் சற்றேறக்குறைய வெளித்தோற்றங்களிலிருந்தே நிதானிக்க முடியும். அது அநேகமாக சரியான குறியாகத்தான் அறிவிக்கிறது.

கர்ப்பிணிக்கு நிதானமான பசி, வலதுபக்கமூலே அதிகமாய் வீம்மியிருத்தல், முலையை நசுக்கினால் கலங்கலும் வெண்மையுமான பதார்த்தம் வெளிப்படல், மூத்திரம் பலவாற்றையிருத்தல், சிசுவானது வலதுபக்கத்தில் இருப்

பதாகத் தோன்றுதல், எழுந்திருக்கும்போதும், உட்காரும்போதும், வேலைகள் செய்யும்போதும், வலது கையையே ஊன்றிக்கொள்ளுதல், முதலிய கர்ப்பினியின் வெளித்தோற்றக் குறிகளால், வயிற்றிலிருப்பது ஆண்சிசுவென்றும்; கர்ப்ப ஸ்திரீக்கு அதிக சோம்பலேற்படுதல், இடது முலை விய்முதல், அற்ப ஆகாரங்களில் விருப்பம், கள்ளப்பசி, முகம் நிறமங்கல், எழுந்திருக்கும்போதும், உட்காரும்போதும், வேலைகள்செய்யும்போதும், இடது கையையே ஊன்றிக்கொள்ளுதல், முதலிய குறிகளினால் வயிற்றிலிருப்பது பெண் சிசுவென்றும் நிதானிக்க முடியும்.

பிரசவ காலங்கள் (DURATION OF DELIVERY)

இள வயதுடைய ஆண் பெண் சம்பந்தத்தால், லேற்படும் கர்ப்பமானது, பிரசவகாலத்தின் அளவு குறைவாகவும், வயது சென்றவர்களால் ஏற்படும் கர்ப்பங்களுக்குப் பிரசவ காலமானது சற்று நீடிக்கும் என்றும் டாக்டர் சார் லஸ்கிளே (Dr. Charlesclay) அபிப்பிராயப்படுகிறார். எவ்வாறிருந்தாலும், கர்ப்பம் தரித்த 280-நாட்களுக்குள்ளும், 300-நாட்களுக்கு மேலும் பிரசவங்களாவதில்லை. அதாவது:—நாற்பது வாரத்தில் சிசு ஜனனமாகும். ஏதோ நூற்றில் ஒரு பிரசவம் இங்கு குறிப்பிட்ட காலங்களுக்கதிகப்படலாம். எப்படி இருந்தாலும் பதினேழு மாதத்திற்கு அதிகப்படாதென்றே கூறலாம்.

பிரசவ வகைகள் (KINDS OF PARTURATION)

(1) கருத்தரித்துச் சம்பூரணமாக ஒன்பதுமாதம் முடிந்தபின் கர்ப்பவதிக்கு இடுப்பு வலி கண்டு யாதொருவித கஷ்டமுமின்றி சிரசு உதயமாகி, 24-மணி நேரத்திற்குள் தாயும் பிள்ளையும் வேறுபட்டு விடுவதற்கு கிரமப் பிரசவம், சுகப்பிரசவம் (Natural Labour) என்று கூறப்படும்.

(2) கிரமப் பிரசவத்திலிருந்து இது சற்று வித்தியாசமாகி வெகுநேரம் கர்ப்பஸ்திரீ தாங்கமுடியாத வாதனைப்பட்டுச் சிசு ஆயுத உதவியினால்லாமல் தானே வெளிப்படுவதற்குத் தாமதப்பிரசவம், அசமந்தப்பிரசவம் (Tediouslabour) என்று கூறுவார்.

(3) கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கு ஒன்பது மாதம் சென்ற பிறகு, இடுப்பு வலியினால் 24-மணி நேரத்திற்கு அதிகமாக கஷ்டப்பட்டும், சிரசு உதயமாகாமலும், உதயமானாலும், சிசுவை வெளிதள்ளக் கஷ்டப்பட்டும், ஆயுதங்களினால் வெளிப்படுத்தும்படியாக நேர்ந்தாலும், கஷ்டப்பிரசவம், அசாத்நியப் பிரசவம் (Difficult Labour) என்றும் கூறப்படும்.

(4) கர்ப்பவதிகளுக்கு இடுப்பு வலி கண்டு, 24-மணி கோரத்திற்குள் சிரசு உதயமாவதற்குப்பதிலாக, நஞ்சுக்கொடி முதலில் வெளி வருவதற்கும், ஆசனம், கால், கை, உதயமாவதற்கும் கிராமாதீதப் பிரசவம், நிஷ்கிராமப் பிரசவம் (Preternatural Labour) என்றும் கூறுவர்.

(5) கர்ப்பவதிகளுக்கு ஒன்பது மாதத்திற்குப் பிறகு கால் வலிப்பு, பெரும்பாடு, ஜன்னிப்போன்ற பயங்கர பற் கடிப்புகள், ஓர் நிலையில்லாது பிரக்கை மறந்து உருளல், இவற்றுடன் ஏற்படும் பிரசவத்திற்கும், இரட்டைபிள்ளை பெறுவதற்கும், விபரீதப் பிரசவம், துவைதப் பிரசவம் (Complex Labour) என்றும் கூறுவர்.

பிரசவ சமயங்கள் (STAGES OF LABOUR)

(1) கர்ப்ப ஸ்திரீகளுக்கு இடுப்பு வலி கண்டு, கர்ப்பப்பையின் கழுத்து, (Cervix) கொஞ்சம் விரிந்திருக்கும் சமயம் முதற்பாத (First stage) மென்று சொல்லப்படும்.

(2) கர்ப்பப்பையின் கழுத்து, (Cervix) பூராவும் விரிந்தது முதல் குழந்தை வெளிப்படும் வரை, இரண்டாம்பாத (Second stage) மென்று சொல்லப்படும்.

(3) பிரசவமானபின்பு, நஞ்சுக்கொடி, அழுக்கு, சவ்வு முதலியவைகள் வெளியாகிவரையில் முன்றும்பாத (Third stage) மென்றும் சொல்லப்படும்.

இடுப்பு வலி (PAINS OF LABOUR)

(1) பொய் வலி, (False Pain) இந் கோயானது சிலருக்குப் பிரசவ மாதங்களில் காணப்படுவதுண்டு. இது சிறுகுடல், பெருங்குடல் இவைகளில் உண்டாயிருக்கும் புண்களினாலாவது, (Intestinal Irritations-Enteritis) பிரசவகாலங்களில் உண்டாகும் பலயீனத்தினாலாகிலும், பசி மந்தம் மலபந்தம் இவைகளினாலாவது, கர்ப்பப்பையில் குளிர்ச்சிச் சேருவதினாலாவது இந் நோய் உண்டாகலாம்.

பொய் வலி, பிரசவ வலியைப்போலல்லாமல், வயிற்றின் பல விடங்களிலும் வலிக்கும் சிலசமயம் சுருக்கென்று குத்தியும் வலிக்கும். யோனியிலிருந்து வெளிப்படும் பிசிபிசிப்பான சளிபோன்ற திரவம் வெளிப்படாது. நினைத்து நினைத்து இத்த வலியேற்படும். கர்ப்பாயசம் சுருங்கும் சக்தி வாய்ந்திருக்காது. கர்ப்பாயசத்தின் முகம் விரியாதிருக்கும். பணிக்குடம் ஏற்பட்டிருக்காது.

(2) நிசவலி, (True Pain) பிரசவ நோயானது முதலில் நடுமுதுகில் ஆரம்பிக்கும். பிறகு இடுப்பைச் சுற்றி வலிக்கும். பின் வயிற்றில் வலி உண்டாகி, துடை நரம்புகளைப் பற்றி யழுத்துவலிக்கும். கருப்பையின் வாயை பெரிதாக்கிப் பணிக்குடத்தை வெளிக்குத் தள்ளுவதற்காகக் கருப்பை சுருங்கும் சமயம் இந்நோய் உண்டாகிறது. இந்நோய் விட்டுவிட்டு வந்தாலும், வெகுநேரம் வலித்துக்கொண்டிருப்பதுண்டு. சிலருக்கு வலியுண்டாகும் சமயம் வார்தியாவதுண்டு. இது நல்லதென்றே கொள்ளவேண்டும். நாடிப்படடப்பாக அடித்துக்கொள்ளும். முகம் சிவந்துத் தோணும். திரேகாதி யந்தமும் வியர்த்து, கால்கள் திமிர்த்துக்கொள்ளும். கருப்பையின் வாய் விரியும் சமயம், உடம்பு பதஷ்டமுண்டாகும். கருப்பையின் கழுத்துப் போதியபடி விரிந்த பிறகும், பணிக்குடம் உடைந்தி, உதயஜலம் வெளிப்பட ஒரு பெரிய வலி உண்டாகும்.

பிரசவகாலங்களில் கவனிக்க வேண்டியவைகள் (NOTES ON CONDUCTING LABOURS)

கர்ப்ப ஸ்திரீகளுக்கு இடுப்பு வலி கண்டால் முதலில், அதை பிரசவ வலியா அல்லது பொய்வலியா என்பதை கண்டுகொள்ளவேண்டும். பிரசவத் திற்காக அழைக்கப்பட்டவுடன், யோனிக்குள் விரைவிட்டு பரீக்ஷிக்க முயல்க்கூடாது. நாடி நடைவையும், கர்ப்பினியின் திரேகம் தழிந்தி கொடுத்திருக்கிறதா வென்பதையும் கவனிக்கவேண்டும். மலபிரவர்த்தி சரிவர ஆகி இருக்கிறதா வென்பதையும் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். பின்னர் பிரசவ வலிதான் என்று தீர்மானித்த பின்பு, வலதகையின் ஆள்காட்டி விரலில் கொஞ்சம் விளக்கெண்ணெயைத் தடவிக்கொண்டு, யோனி வழியேவிட்டு, கர்ப்பாசயத்தின் வாய் விரிந்திருக்கும் நிலைமையும், உதயமாகும் உருப்பு இன்னதென்பதையும், தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

பின்னர் மலக்கட் டிருப்பதாகத் தெரிந்துகொண்டால், ஆசனக் குழி லால் (Enema) தண்ணீரை உட்செலுத்தி மலத்தை வெளியாக்கவேண்டும். முதல் பாதத்தில் கர்ப்பினி சற்று உலாவிக்கொண்டிருந்தால் நன்மையாகும். ஆயாசம், பசிமயக்கம் யேதேனும் உண்டானால், இலேசாக ஜீரணிக்கும், மாமிச சத்த, (Soup) பால் அதிகம் கலந்த தேத்தண்ணீர்; காச்சினபால்; நன்றாய் கனிந்தப் பழங்கள்; முதலிய சிற்றுகாரங்களைக் கொடுத்து உற்சாகத்துடனிருக்கும்படி செய்யவேண்டும். படுத்துக்கொள்ளுவது சவுகரியமாயிருந்தால் படுத்துக்கொள்ளலாம்.

பிரசவ வலியை யுண்டுபண்ணவேண்டுமென்று, மூடத்தனமாக முக்கிக் கொண்டிருக்கும்படி செய்தால், சரியானகாலத்தில் குழந்தையை வெளிப் படுத்த போதிய சக்தியில்லாமல்கூடாது துப்போய்விடும். சிலருக்கு இடுப்பு வலி கண்டு முக்கும்போதெல்லாம், மலம் வருவதைப்போல் தோன்றும்.

இதனால் கர்ப்பிணி கஷ்டப்படுவதாய் தெரிந்தால், 15-துளி அபிணி பாவன திரவத்தை (Tincture Opium) கொஞ்சம் தண்ணீரில் சேர்த்து, ஆசனத்தில் பிச்சங்குழலால் (Syringe) அடிக்கவேண்டும். பிரசவத்திற்காகத் தயார் செய்யப்பட்டிருக்கும் அறை காற்றோட்டமுள்ளதாக விருக்கவேண்டும். பிரசவிக்கும் ஸ்திரீயும், மருத்துவச்சியும் தவிர மற்றவர்கள் எவரும் இருக்கக்கூடாது.

இரண்டாம்பாதம், அதாவது பணிக்குடம் உடைந்து சிரசு உதயமாகிற போது வஸ்திரங்களை களைந்து நிர்வாணப்படுத்தவேண்டியது. கர்ப்பிணியை ஓர் கட்டிலின்பேரில் பிட்டங்கள் ஓரத்தில் இருக்கும்படியாகப் படுக்கச் செய்து முழங்கால் இரண்டையும் வயிற்றோடு அணைத்து வைத்துக்கொள்ளும்படி செய்யவேண்டும்; ஆனால், கால் இரண்டையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது. இதற்கு இரண்டு கால்களுக்கும்மிடையில் ஒரு தலையணையை வைத்துக்கொள்ளச் செய்யலாம். பின்னர் கட்டிலுக்குமேல் கோய்வரும் சுமயம் பிடித்துக்கொள்ள வசதியாய் ஒரு துணியையாவது, வலுவான கயிற்றையாவது கட்டித் தொக்கவிடப்பட்டிருக்கவேண்டும். இரண்டாம் பாதத்தில் கர்பவதிக்குப் பசி, ஆயாசம், உண்டானால் உணவு ஒன்றும் கொடுக்கக்கூடாது; ஆனால், தேத்தண்ணீர் கொடுத்து உற்சாகமாக்கிக் கொள்ளலாம். தாகத்திற்கு வெந்நீர் கொடுக்கலாம்.

கொடுகோமாகப் பிரசவவேதனைப் பட்டுக்கொண்டிருந்தும், கருப்பையின் கழுத்து சரியானவிதமாக விரிந்துவிட்டபிறகும், பணிக்குடம் உடையாமல் பிரசவம் தாமதப்படும் பகுத்தில், வஸ்துகையின் ஆள்காட்டி விரலை, யோனிக்குட் செலுத்தி, பணிக்குடத்தை விரலால் குத்தி, உதயிரை வெளியாக்விட வேண்டியது. இப்படிக்கில்லாமல் இடுப்பு வலி கண்டவுடன் சிகிரமாய் பிரசவிக்கும்படியாய் பணிக்குடத்தை உடைத்துவிடுவதால், ஸ்திரீகளுக்கு வாழ்காமைல்லாம் துன்பப்படும்படியான வியாதிகளேதேனும் உண்டாகிக்கொண்டே யிருக்கும்.

சிரசு உதயமானபிறகு உடல் சீக்கிரம் வெளிப்பட்டாலும்படியாக சிரசைப் பிடித்திழுப்பது கொடிய செய்கையாகும். கருப்பையின் இயற்கை சுருக்கத்தினாலேயே சிசு வெளிப்படும்படியாக விட்டுவிடவேண்டியது. சிரசு வெளிப்படும்போது விடபக்கிழி வேற்படாதிருக்க, சிசுவின் சிரசை விடபத்தின்மேல் விடாமல் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டியது. சிரசு வெளியாகும்போது சிரசை வஸ்துகையால் யேந்தி, தானாகத் திரும்பும்படியாக விட்டுக் கொடுத்துக்கொண்டிருக்க வேண்டியது.

சிரசு வெளியாகும்போது, சிசுவின் கழுத்தை காய்க்கொடி சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறதா வென்பதை கையால் தடவிப்பார்க்கவேண்டியது. அப்

படிச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் பகலத்தில், மெதுவாக அந்நாபிக்கொடியை தோளின்மேல் தள்ளிவிடவேண்டும்.

சிரசு உதயமாகி சற்றுநேரம் வலியின்றியிருந்து மறுபடியும் வலிகண்டு உடல் வெளிப்பட்டுவிடும். சிரசு உதயமாகி சற்று அதிகநேரமாகியும், உடல் வெளிப்படாமலும், சிசுவுக்கு ஆபத்து வரலாமென்று தோன்றினாலும் பிரசவிக்கும் ஸ்திரீயின் வயிற்றின்மேல் உள்ளங்கையை வைத்து சூடுபறக்கத் தேய்க்கவேண்டும். இப்படிச் சூடுபறக்கத் தேய்த்தும் வலிகண்டு சிசு வெளிப்படவில்லையானால், ஒரு ஆளை கருப்பை நழுவாமல் பிடித்துக்கொள்ளும்படியாக செய்து, இடதுகையினால் சிசுவின் தலையைப் பிடித்துக்கொண்டு, வலது கைவிரலையோடு யோனிக்குள் செலுத்தி உடலை பிடித்துக்கொண்டு மெதுவாக இழுத்து வெளியாக்கவும். முரட்டுத்தனமாக பிடித்திருந்தால் கருப்பை சுருங்க அதிகநேரம் பிடிப்பதோடு, இரத்தமும் அதிகமாய் வெளிப்படும்.

பிரசவித்த ஸ்திரீகள் இரண்டுமணிநேரத்திற் கொருதரமாவது நீர் கழிக்கவேண்டும். அசையாமல் படுத்திருக்க திட்டம் செய்திருக்கும் காலங்களில் படுத்துக்கொண்டே நீர் விடலாம். நீரிறங்கத் தடைப்பட்டால் கம்பளியை வெந்நீரில் னனைத்து பிழிந்து அடிவயிறு, மர்மஸ்தானம் முதலிய விடங்களில் ஒத்திடம் கொடுக்கவேண்டும். அப்படிக்கில்லையானால், நீர்த் தாரைக்குள் சிலாக்கை (Catheter) விட்டு நீரை வெளியாக்கவேண்டும்.

பிரசவித்த ஸ்திரீகளுக்கு 24-மணி நேரத்தில் ஒருதடவையாகிலும் மலம் கழியவேண்டும். அப்படி யில்லாவிட்டால் இலகுவான விசேசனகாரிகள் (Cathartics) கொடுக்கலாம் அல்லது வெந்நீரைப் பீச்சங்குழவால் (Enema) ஆசனத்தின் வழியே செலுத்தி மலசுத்தி செய்யும்படி செய்யவேண்டும்.

பிரசவம்

(DELIVERY - PARTURATION)

தலைப்பிள்ளைப்பேறு எப்போதும் கொஞ்சம் கஷ்டமாகவேயிருக்கும் பிரசவமாவதற்குச் சிலநாள்களுக்கு முன்பே, கர்ப்பஸ்திரீயினுடைய யோனியிலிருந்தும், கர்ப்பாசயத்தின் வாயினின்றும் சளிபோன்ற ஒருவிதமான மினுமினுப்பான திரவம் கசிந்துகொண்டே யிருக்கும். இதில் இரத்தக் கோடுகள் காணப்படும். இக்காலங்களில் கருப்பை கீழிறங்கி வயிறு தளர்ச்சியடையும். மலசலம் எப்போதும் போலல்லாமல் அடிக்கடி கழியும். இவ்வித குறிகளெல்லாம் பிரசவநோய் காணுவதற்குமுன் அறிகுறிகளாகும். சிலருக்கு இக் குறிகள் முற்றிலும் காணாமலே இடுப்பு வலி காண்பதுமுண்டு.

இடுப்பு வலி ஆரம்பித்துக் கருப்பையின் வாய் சரியானவிதமாக விரிந்த பிறகு ஒரு பெரும் வலி கண்டு பனிக்குடம் உடைந்து உதயஜலம் வெளிப்

படும். இது இரண்டாம் பாதத்தின் ஆரம்பம். பின் அதிக வேதனையோடு ஒரு முக்கல்கண்டு சிசு உதயமாகும். பின்னர் வலி விட்டுவிட்டுக் கண்டு குழந்தை பிரவசமாகும்.

மூன்றாம் பாதத்தில் நோய் நின்றவிடும். இந்தச் சமயம் கருப்பையின் மேல் கையை வைத்துப் பார்த்தால் அது துவண்டு சுருங்குவது நன்றாகத் தெரியும். கருப்பையானது சுருங்காமல் முன்னிருந்ததுபோலவே யிருக்குமானால் சப்தவேணுவை (Stethoscope) வைத்து உற்றுக்கேட்க வேண்டும். இரட்டைப் பிரசவமாயிருந்தால் இதனால் அறிந்துகொள்ள முடியும். சிசு ஜனிக்க சிறிதுநேரம் வலி யில்லாதிருக்கும். சீக்கிரத்தில் மறுபடியும் வலி கண்டு ரஞ்சக்கொடுகள் (Placenta) வெளியாகி விடும். சிசு வெளியான 20-30-நிமிஷங்களில் வயிற்றில் வலி கண்டு ரஞ்சு, அழுக்கு முதலியவைகள் வெளிப்படும். எப்படியானாலும் ஒருமணி நேரத்திற்குமேலும் ரஞ்சக்கொடி வெளிப்படாதிருந்தால், நஞ்சுப்பிடித்தம் (Retention of Placenta) என்ற தலைப்பின் கீழுள்ள சிகிச்சையைச் செய்யவேண்டும். ஏகதேசங்களில் ரஞ்சம் சிசுவுடனே வெளிப்பட்டிவிடும். இவ்வித சுகப் பிரசவங்களில் நாம் அதிகமாய் ஒன்றும் செய்ய வேண்டில்லை. இதில் நாம் ஏதேனும் செய்தால் தீங்குதான் நேரிடும்.

தாமதப் பிரசவம் (TEDIOUS LABOUR)

சிலருக்கு இயற்கையிலேயாயினும் வியாதியினாலாயினும் யோனி சிறுத்துப்போயிருப்பினும், யோனிக்குள்ளிருக்கும் யோனித்திரை; யோனிப்படலம்; (பக்கம் 2-பார்க்கவும்) (Hymen) என்ற சவ்வு தடித்துப்போய் தக்க சமயம் அகன்றுபோகா திருப்பினும், பனிக்குடத்தின் சவ்வு கனத்து அழுத்தமாயிருப்பினும், பனிநீர் இயற்கைக்கு அதிகப்பட்டு இருப்பினும், பனிக்குடமேயின்றி இருப்பினும், பிரசவகாலத்திற்கு முன்பே பனிநீர் வெளிப்பட்டிப் போயிருப்பினும், கருப்பை அதிக நேரம் சென்று சுருங்கும் இயல்புடையதாக இருப்பினும், கருப்பையின் வாய் விரிபும் தன்மையில்லா திருப்பினும், கருப்பை இடமாறிப்போயிருப்பினும், வெகு பால்யம், வெகு விருதாப்பியம், வெகு பலயீனம் முதலிய காரணங்களாக விருப்பினும், கர்ப்ப காலத்தில் திரேகம் அதிக உஷ்ணமாக வைத்திருப்பினும், ஜன்னியினால் சுயபுத்தியற்றிருப்பினும், இடப்புவலி போதிய அளவாக யேற்படாது போவதாயிருப்பினும், பிரசவிப்பதற்குத் தாமதங்களின் காரணமாகும்.

பதஷ்டயின்றி தாமதத்தின் காரணத்தைக் கண்டுபிடித்துத் தக்க சிகிச்சை செய்யவேண்டும். மலபந்த யிருந்தால் ஆசனத்தின் வழியாய் (Enema) பீச்சாங்குமல் அடித்து மலசுத்தி செய்விக்க வேண்டியது. பசி

யிருந்தால் காரமற்ற சிற்றுகாரங்கள் கொடுத்துக் கொள்ளலாம். அளவுக் கதிகமாக பனிநீர் இருப்பதாகத் தெரிந்தால், நகத்தால் குத்தி பனிநீரை வெளிப்படுத்தலாம். கருப்பையின் வாய் விரியக்கூடாம லிருந்தால், வாயில் விரலைவிட்டு வார்தி பண்ணும்படிச் செய்யலாம். அல்லது ஒரு அவுன்ஸ் சுத்த ஜலத்தில் மூன்று கிரான்ஸ் வமன உப்பு (Tartar ematic) கலந்து கொடுத்து வார்திபண்ணச் செய்யலாம். கருப்பை இடமாறியிருந்தால், கர்ப் பிணியைத் திரும்பிப் படுக்கும்படிச் செய்யலாம். முன்பக்கம் சாய்ந்திருந் தால் மல்லாக்காய்ப் படுக்கவைக்கலாம். இப்படிச் செய்யும்போது வயிற்றின் மேல் துணிசுற்றி இருக்கவேண்டும். பிரசவகாலத்திற்குமுன் பனிநீர் வெளிப் பட்டுப் போய்விட்டால் சிகிச்சை செய்யும் வழியில்லை. அதனால் கெடுதலு மில்லை. சற்றுத் தாமதித்தாலும் சிசு பிறந்துவிடும். அதுவரை கார்த் திருக்கவேண்டுவதுதான். பலயினத்தால் இடுப்புவலி அதிகமாய் யேற்படாம லிருந்தால், இடுப்பு அடிவயிறு முதலியவற்றைக் கையினால் அழுத்தித் தேய்க் கலாம். நித்திரை செய்தாலும், ஆகாரம் சாப்பிட்டாலும் இடுப்புவலி அதி கரிக்கும். இவ்வித உபாயங்களினால் வலி காணாதிருந்தால், பொடிசெய்த எக்ஸ்டிராக்ட் எர்காக்ட் (Extract Ergot) என்னும் மருந்தில் 20-கிரான்ஸை ஒரு அவுன்ஸ் வெந்நீரில் கரைத்து முடிவைத்திருந்து குளிர்ந்தபின் கொடுக் கலாம். அரைமணி நேரத்திற்கொருதரம் இந்த மருந்தை 2-3 தரம் கொடுத் தால் இடுப்புவலி அதிகரித்துவிடும். கருப்பையின் வாய் நன்றாக விரிந்திருக் கும்போது இந்த மருந்தைக் கொடுக்கக்கூடாது. கருப்பையின் வாய் விரிந் திருந்தும், மற்றைய உபாயங்களினாலும் நன்மை ஏற்படாவிட்டால் ஆயுதப் பிரயோகத்தினால் குழந்தையை வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

கஷ்டப் பிரசவம் (DIFFICULT LABOUR)

கர்ப்பிணியின் இடை சிறுத்துப்போ யிருப்பதினாலும், மரம் ஸ்தான எலும்பு அதிகமாய் நெறுங்கியிருப்பதினாலும், மூத்திரம் கிரமமா யிறங்காமல் மூத்திரப்பையில் நீர் நிறைந்து, சிசு வெளிப்படும் மார்க்கங்களை அடைத்துக் கொண்டிருப்பதினாலும், சிசுவின் சிரசு இயற்கைக்கு அதிகமாய் பெருத் திருப்பதினாலும், சிசுவின் அங்க எலும்புகள் கனத்துப்போயிருப்பதினாலும் சிசுவின் தலை திரும்பி யிருப்பதினாலும், நாபிக்கொடியானது சிசுவைச் சுற்றிக்கொண்டிருப்பதினாலும், சிசுவின் வயிறு பெருத்துப்போ யிருப்பதி னாலும், சிசுவின் முகம் உதயமாவதினாலும் கஷ்டப்பிரசவத்திற்குக் காரணங் களாக வேற்படலாம். இக் காரணங்கள் எதினாலாவது பிரசவிக்கக் கஷ்டப் பட்டால், சிசுவை ஆயுதப் பிரயோகத்தினால்ல்லாமல் உபாயமான சிகிச்சை களினால் வெளிப்படுத்த முயன்றால் யாதொரு பிரயோஜனமும் கிடைக்காது.

கிரமாதீதப் பிரசவம், விபரீதப் பிரசவம் (PRETERNATURAL LABOUR, COMPLEX LABOUR)

இவைகள் என்னவென்பதை 11-பக்கம் பிரசவ வகைகள் என்ற தலைப் பின்னீழ் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவைகளை சாதாரணமாக எவரும் எளிதில் தெரிந்துசெய்ய முடியாதென்பதாலும், சித்திரப்படமின்றி விளக்குவது அசாத்தியமென்பதாலும், இந்நூல் சிகிச்சை முறையைமட்டும் கூறும்படியாகத் தொகுக்கப்பட்டமையாலும், இதில் அவைகளை விளக்குவது சரியல்லவாதலாலும் இதில் குறிக்காமல் விடப்பட்டிருக்கிறது.

பிரசவித்தவுடன் செய்யவேண்டியவைகள் (MANAGEMENT IMMEDIATE AFTER PARTURATION)

சிகு வெளிப்பட்டபின், தாயின் வயிற்றைப் பரிசோதித்து, இரட்டை பிள்ளைகள் இருப்பதும் இல்லாததும் தெரிந்துகொண்டு, துணியை 1½-அடி அகலத்தில்மடித்து பிரசவித்த ஸ்திரீயின் வயிற்றை நான்கு சுற்றுச் சுற்றிக் கட்டிவிடவேண்டும். நஞ்சுக்கொடி, அழுக்கு முதலியவைகள் முற்றிலும் வெளிப்பட்டவுடன், சுற்றியிருக்கும் துணியை நன்றாய் அழுத்திக் கட்ட வேண்டும். இந்தச் சமயம் களைப்பாயிருந்தால் விரைவில் ஜீரணிக்கத்தகுந்த ஆகாரங்களை ஆரவைத்துக் கொடுக்கலாம். பிரசவித்தபின் ஸ்திரீ 3 மணி நேரம் அசையாமல் படுத்திருக்கவேண்டும். அப்படிப் படுக்காமலும், படுத்து புரண்டு யெழுந்திருந்தும் உட்கார்ந்துகொண்டு மிருந்தால், இரத்தப்பெருக்கு உண்டாகிவிடும். அல்லது கர்ப்பாயசம் வெளியில் பிதுக்கிவிடும். இவ்விதமாக மூன்று நாட்களுக்குக் குறையாமல் படுக்கையில் இருக்கவேண்டும், 15-நாட்களுக்குப் பின்னால்தான் நடமாடச் செய்யவேண்டும்.

பிரசவித்த பின் தோஷகுணங்கள் ஏதேனுமிருக்குமாகில் தகுந்த சிகிச்சைகள் செய்யவேண்டும். பிரசவித்த ஸ்திரீக்குக் குளிர்ச்சிக்கொண்டுவிடாத படி ஒரு அவுன்ஸ் பிராந்தி (Brandy) கொடுக்கலாம். பிராந்தியை பிரசவித்த 3-4-நாட்களுக்குமட்டும் காலை மாலை கொடுக்கலாம். நீடித்துச் சாப்பிட்டால் பல பிணிகளை உண்டாக்கிவிடும். அபினிப் பாவன திரவம் (Tincture Opium) 5-துளி ஒரு அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து கொடுத்தால், நாடிநடை மிதானப்படுத்தியும், மேல்மூச்சை சமரசப்படுத்தியும், சித்திரையைபுண்டு பண்ணியும்பிரசவித்ததினாலான களைப்புகளையும் மாற்றிவிடும். பரிமள ரவாச் சார சாராயம் (Spirit Ammonia Aromatic) 10-துளியை ஒரு அவுன்ஸ் சுத்த தண்ணீரில் கலந்துகொடுக்கலாம். அல்லது கஸ்தூரிப் பாவன திரவத்தில் (Tincture Musk) ஒரு அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 10-துளி கலந்து கொடுப்பது மிகவும் சிரோஷ்டமானதாகும். அடிவயிற்றில் வலிவேதனைகள் இருக்கு

மானூல் அபினிப் பாவன திரவத்தில் (Tincture Opium) 10-துளி ஒரு அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து கொடுக்கவேண்டும். அதிகமான இரத்தப் பெருக்கிருக்குமானால், எர்சாட் ஜலசத்து (Liquid Extract Ergot) என்னும் மருந்தில் 30-துளி ஒரு அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து கொடுக்க வேண்டும்.

பிரசவித்த ஸ்திரீகளின் பராமரிப்பு (MANAGEMENT AFTER BRITH)

பிரசவித்ததிலிருந்து நாலுநாள் வரையில், கோதுமைக்கஞ்சி, சவ்வரி சிக்கஞ்சி, அரோரூட் மாவு (Arrowroot flour) கஞ்சி, சுட்ட ரொட்டி (Roast Bread) பிஸ்கோத்துகள் (Biscuits), காய்ச்சிய பால், காப்பி முதலியவைகளையே ஆகாரமாகக் கொடுத்துவரவேண்டும். ஜீரணிக்க சஷ்டப் படும் ஆகாரங்களாகிய சோறு, உப்புமா, இட்டலி, தோசை முதலியவைகளைக் கண்டிப்பாகக் கொடுக்கக்கூடாது. அவ்வித கடின ஆகாரங்களைக் கொடுப்பதினால்தான், அதிகாரம் கண்டு விபீதமுண்டாக்கி விடுகிறது. நாலுநாளைக்குப் பின் உஷ்ணம் தணிந்தபின் பழைய அரிசியைக் குழையக் குழைய வடித்து, மிளகுரசம் (Pepper Water) பருப்பு ரசம், (Doll Soup) மாமிச ரசம் (Soup) இவைகளில் ஏதேனும் வீட்டு பிசைத்து கொடுக்க வேண்டும். சோற்றை ஆகாரமாகக் கொடுக்குமுன் மலக்கட்டிருந்தால் மலத்தை வெளியாக்கிய பிறகுதான் கொடுக்கவேண்டும். பிரசவித்த ஸ்திரீகளுக்குத் தேகாரோக்கியம் சரியானவிதமாக இருக்கும் படித்தில் குளிக்கும் படியாகச் செய்யவேண்டியது. நெய் சேர்த்த பலகார வகைகளையும், கொழுப்பு அதிகமான பதார்த்தங்களையும் பிரசவித்த கொஞ்சநாள் வரையில் கொடுப்பது கெடுதலை விளைவிக்கும்; ஆனால், முட்டைகளைக் கொடுப்பது அவ்வளவு கெடுதலைச் செய்யாமல் திரேகத்தைப் போஷிக்கும் பத்தியமான மரக்கறிகளை எதேஷ்டமாக அருந்தலாம். சிசுவுக்குப் பால் கொடுப்பதனால் கரப்பான் நீரைப்பெருக்கும் பூசணிக்காய்போன்ற மரக்கறிகளை உண்ணக் கூடாது. பிரசவித்த ஸ்திரீகளுக்கு வழக்கமாகவேனும், உத்வேகத்தைக் கொடுக்கவேனும் சாராய வகைகளைக் கொடுப்பது மிகவும் கெடுதலாகும். பின்னர் அதுவே வழக்கமாக முடிந்து, சதாராலம் சாராயபானம் செய்ய நேர்ந்து ஆயுளைக் குன்றச் செய்துவிடும்.

கருப்பையில் சிசு மரித்திருக்கும் குறிகள் (SIGN OF DEATH THE FOETUS IN WOMB)

கர்ப்பவதிகள் திடீரென்று பயந்து விடுவதிலேயும், கர்ப்பத்தோடிருக்கும்போது அடிவயிற்றில் பலமான அடிபட்டு விடுவதிலேயும், சுவாசபந்தன் ரோகங்கள் சம்பவித்திருப்பதிலேயும், கர்ப்பகாலங்களில் அதி உயரத்திலிருந்து குதிப்பதிலேயும், கர்ப்பவதியின் சரீரத்தில் இயற்கையாகத்

தக்கியிருந்த மேகவியாதிகளினாலேயும், வாதபித்த சிலேத்பன விகல்பத்தினாலேயும், கர்ப்பகாலத்தில் அதிக குளிர்ச்சிபுடனும், அதிக சூட்டுடனும் ஆகாரங்களைப் புசிப்பதினாலேயும் கருப்பையில் சிசு மரித்துப் போகலாம்.

சில சமயம் கருப்பையில் சிசு மரிக்கும்போது விருந்தால், கர்ப்பஸ்திரீக்கு மலசலம் கட்டுப்படும், திரேகம் நீலநிறமடையும்; கைகால் அதிகமாகக் கறுத்திருக்கும்; வாய் கெட்ட நாற்றமடிக்கும்; தலை முகம் முதலியவைகள் வீங்கும்; அடிக்கடி களைப்பு முதலியன உண்டாகும். இப்படி எல்லாம் அறிகுறிகள் காணப்படுமானால், கருப்பையில் சிசு மரித்துப்போகும் என்று தீர்மானிக்கலாம்.

ஏற்கெனவே கருப்பையில் சிசு மரித்திருந்தால், தொப்புளைச்சுற்றியேனும், வயிறு முழுவதேனும், திரேகாதியந்தமேனும் சில்விட்டிருக்கும். வயிற்றுள் பிண்டம் அசையாது; வயிற்றுப்பிசம் காணும்; சுவாசபந்தனப்படும், விடும் சுவாசம் எலி செத்த நாற்றமடிக்கும், ஆயாசம் உண்டாகும், மூத்திரம் தூநாற்றத்துடன் தடித்திருக்கும். கர்ப்பஸ்திரீ புரண்டு படுக்கும் போது வயிற்றுள் இரண்டு பக்கங்களிலும் ஏதோ ஒன்று கற்போலுருளுவதாகத் தெரியும். பிரசவநோய்கண்டிருந்தாலும் நின்றுவிடும், கண் சொறும், தொப்புளைச் சுற்றி பசு வெண்ணையைத் தடவினால் அது உருகாதிருக்கும்.

வெநீரில் கையை ஆவிப்பிடித்துக் கர்ப்பஸ்திரீயின் அடிவயிற்றின் பேரில் வைத்தால் கர்ப்பம் அசையாமலிருக்கும். ஒரு அவுன்ஸ் ஓயினில் (Wine) 4 டிராம் லவங்கப்பட்டைத் தூளைக்கலந்து உள்ளுக்குகொடுத்தால் பிரசவ வேதனைபோன்று வலி காணுமானால் சிசு மரித்திருக்கிறதாய்த் தீர்மானிக்கலாம்.

சிகிச்சைகள் (TREATMENTS)

கீழ்க்கண்ட மருந்துகளைக் கொடுப்பதனால், இடுப்பு வலி கண்டு மரித்த சிசு வெளிப்பட்டுவிடும்.

(1) சண்மபுவினையைத் தண்ணீர்விட்டரைத்து அடிவயிற்றில் பூசிக் கழற்சிக்காய்ப் பிரமாணம் உள்ளுக்கும் கொடுக்கலாம்.

(2) உகாயிலையைக் கறுக வறுத்து ஒருபடி தண்ணீர்விட்டு கால்படியாக வற்றவைத்து, அதில் மிளகு, பூண்டு, ஒமம், பெருங்காயம் சமமாகப் பொடித்துப் போட்டுக்காய்ச்சி, 4 அவுன்சுக்குக் குறையாமல் கொடுக்கலாம்.

(3) இந்தப்புர், சங்கன்வேரும் சமமாயரைத்துக் காடி தெளிவில் கலந்து கொடுக்கலாம்.

(4) சிலக்குமிழ்ப்பட்டையைத் தண்ணீரில் அரைத்துக் கொடுக்கலாம்.

(5) பிராண்டாவேரும், குருஞ்சாவேரும் சமனாக அரைத்து அடிவயிற்றில் தடவலாம்.

(6) பெருங்காயமும், உப்புச் சமமாய் பழங்காடியில் அரைத்துக் கொடுக்கலாம்.

(7) உத்தாமணிவேரை கழற்சிக்காய்ப் பிரமாணம் பசும்பாலில் அரைத்துப் பாலில் கலக்கிக் கொடுக்கலாம்.

(8) துளசிச்சாறு 3-அவுன்சும், எள்ளெண்ணை 1½-அவுன்சும், புகை யூரல் ½-அவுன்சும் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

(9) பிராந்தி (Brandy) ஒரு அவுன்சில் 4 டிராம் லவங்கப்பட்டைத் தூள் சேர்த்துக் கொடுத்தால் இடுப்பு வலி கண்டு பிள்ளை விழும்.

(10) ஒரு ரூபாயிடை நாயுருவிவேரைப் பச்சைத் தண்ணீரில் அரைத்துக் கொடுக்கலாம்.

(11) அரைபலம் சங்கன்வேரை வெந்நீரில் அரைத்துக் கொடுக்கலாம்.

(12) ஒரு ரூபாயிடை குங்குமப்பூவை பசையாக அரைத்து உருட்டிக் கொடுக்கலாம்.

(13) இரண்டு வெள்ளைப்பூண்டும், ஒரு முருங்கைப் பிஞ்சும் நசுக்கிப் போட்டுக் கஷாயமிட்டு, 4-அவுன்சு கஷாயத்தில் 3-கிரான்ஸ் அபினியைக் கரைத்துக் கொடுக்கலாம்.

(14) ஒரு அவுன்சு தண்ணீரில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எர்காட் லிக்குட் (Lipuid Extract Ergot) 2-டிராம் கலந்து கொடுக்கலாம்.

(15) மாமூதாபிசினை சந்தனக்கல்லில் தண்ணீர்விட்டிழைத்துத் துணியில் தடவி யோனிக்குள் செலுத்தி வைக்கலாம்.

(16) இவைகளினால் பயனில்லையானால், ஆபுத பிரயோகத்தினால் மட்டும் தான் துண்டித்தியாவது, முழுதாகவாவது எடுக்க முடியும்.

நஞ்சுப்பிடித்தம்

RETENTION OF PLACENTA

பிரசவித்த அம்மணி நேரத்திற்குள் நஞ்சுக்கொடி விழாவிட்டால் நஞ்சு பிடித்தம் எனப்படும். கருப்பையின் பலவீனத்தினால் நஞ்சுக்கொடியை வெளிப்படுத்தி சுருங்கச் சக்தியற்றுப்போயிருப்பதினாலேயும், கருப்பை இயற்கைக்கு விரோதமாக சுருங்க ஆரம்பிப்பதினாலேயும், வியாதியினாலேயும், கருப்பையில் நஞ்சு பிடித்துக்கொள்ளும். பிரசவித்த ஒருமணி நேரத்திற்குள்ளாக நஞ்சுக்கொடி வெளிப்படாவிட்டால் பிரசவித்த ஸ்திரீக்குப் பிராணமோசமான வியாதிகள் கண்டுவிடும்.

இவ்வித சமயங்களில் கையினால் நஞ்சுக்கொடியைப் பற்றி இழுத்து வெளிப்படுத்தினால் கர்ப்பாயசம் சுருங்காமல் உதிரப்பெருக்கை உண்டாக்கி

வீடும். சில சமயம் போராபத்தம் நேரலாம்: நஞ்சுப்பிடித்தம் யேற்பட்டால், வயிற்றை யழுக்கித் தேய்த்து வலி உண்டுபண்ண வேண்டும். அதில் ஒன்றும் பயன்படாவிட்டால், கீழ்கண்ட சிகிச்சைகள் பயனுள்ளதாக விருக்கும்.

(1) குழைப்பாலாவேரை வெந்நீர்விட்டு அரைத்து எலுமிச்சக்காய் பருமன் யெடுத்து எருமை வெண்ணை கொஞ்சம் சேர்த்து நன்றாய்க் குழப்பிக் கொடுக்கலாம்.

(2) வட்டதுத்திவேர், சீரகம், பழம்புளி இம் மூன்றையும் சமனாகச் சேர்த்து கஷாயம் வைத்துக் கொடுக்கலாம்.

(3) வேப்பங்கொழுந்து, முருங்கைக்கொழுந்து, கறிவேப்பிலைக் கொழுந்து இவை மூன்றும் வகைக்கு ஒரு பிடியும், நல்ல முற்றின கடுக்காய் ஒன்றையும் தட்டிப்போட்டு ஒரு படி தண்ணீர்விட்டு எட்டொன்றாகச் சுண்டக் காய்ச்சி வடிகட்டிக் கொடுக்கலாம்.

(4) எர்காட் ஜலசத்து (Liquid Extract Ergot) ஒரு அவுன்ஸ் தண்ணீரில் ஒரு டிராம்விட்டுக் கொடுக்கலாம்.

இவைகளினால் பிரதி பிரயோஜனம் ஏற்படாவிட்டால் கீழ்கண்டபடி நஞ்சுக்கொடியை வெளிப்படுத்த வேண்டும். பிரசவித்த ஸ்திரீக்கு ஆயாசம் தீர்ந்ததும், இடது கையால் நஞ்சுக்கொடியைப் பிடித்துக்கொண்டு, வலது கை விரல்களை கூர்மையாக சேர்த்துக்கொண்டு, நஞ்சுக்கொடி வழியாக கருப்பைக்குள் கொண்டுபோய், எங்கெங்குப் பிடித்திருக்கிறதோ, அதை மிகவும் கவனத்துடன் தடவிப் பார்த்து, ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் நஞ்சுக் கொடிகளைக் கருப்பையின் மத்தியில் தள்ளிவிட்டு கருப்பைக்குக் காயம் உண்டாகாமல், விரல்களால் பெயர்க்கச் சுருட்டி, நஞ்சுக்கொடி முழுவதையும் வெளிப்படுத்திவிட வேண்டும். இப்படிச் செய்யும்போது வெகு ஜாக் கிரதையாகவும், பதஷ்டமின்றியும் செய்யவேண்டும்.

நஞ்சுக்கொடியானது இயற்கையாக வெளிப்படாமல் உபகர்னங்களினால் வெளிப்படும் பகூத்தில் கருப்பையில் சேஷம் தங்கியிருக்கலாமென்று நினைக்க இடமுண்டு. அவ்விதமாக சேஷம் (அழுக்கு) தங்கியிருக்குமானால் அந்த இடம் புண்பட்டு, விஷமாக மாறி திரோகத்திலூறி காச்சல், ஜன்னி, வீப்புருதி முதலியவைகளையும், அஜீரணத்தையும் உண்டாக்குமாதலால், கருப்பையை காண்டிஷ் லோஷன் (Condys Lotion) என்ற கூட்டுக்கழுவு நீரால், பீச்சாங்குழல்கொண்டு சுத்திச்செய்ய வேண்டும். பின்னர் ஆளி விரையைக் களிக்கிண்டி அடிவயிற்றின்மேல் வைத்துக் கட்டவேண்டும். நஞ்சு முழுமையும் வெளிப்பட்ட பின்பு முன் 18-பக்கத்தில் பிரசவித்த உடன் செய்யவேண்டியவைகள் என்ற தலைப்பின்கீழுள்ளபடி பிரசவித்த ஸ்திரீயின் அடிவயிற்றைக் கையினால் தேய்த்து இடுப்பைச்சுற்றி துணிக் கொண்டு கட்டிவிடவேண்டும்.

தொங்கிக்கொண்டிருந்த நாபிக்கொடியைக் கையால்பற்றி இழுத்ததினால் கிழிந்தது, எர்காட் என்ற மருந்தை பிரயோகித்ததினாலாகிலும், சில சமயம் கருப்பை சுருங்கி, நஞ்சுக்கொடி வெளிப்படாமல் மூடிக்கொள்ளலாம். இக் காரணங்களால் நஞ்சுக்கொடி வெளியாகவில்லை என்று தீர்க்கமாய் தெரிந்தால், உடனே அபினிப் பாவன திரவம் (Tincture Opium) 20-துளியை ஒரு அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து கொடுக்க அரைமணி நேரத்தில் கருப்பையின் வாய்திறந்து கொள்ளும். இந்தச் சமயம் மேல் சொல்லி வந்தபடி சையை உட்செலுத்தி நஞ்சுக்கொடியை அப்புறப்படுத்தி முன் சொல்லியதுபோல் சிகிச்சைகள் செய்யவும். பிரசவித்த பின் சில ஸ்திரீகளுக்கு நஞ்சு தங்கியிருக்கும்போதும், நஞ்சு வெளிப்பட்டபின்பும் இரத்தப் பிரவாகம் காண்பதுண்டு. அதற்குத் தக்க சிகிச்சைகள் “பிரசவத்திற்குப்பின் பெரும்பாடு” என்ற தலைப்பின்கீழ் கண்டு தெரிந்துகொள்ளவும்.

வயிறு பழுத்தல் (SUPPURATION OF UTERUS AFTER BIRTH)

பிரசவத்திற்குப் பின் கிரமமாக வெளிப்பட்டுவிடவேண்டிய நஞ்சுக் கொடியானது வெளிப்படாமல், சிரமப்பட்டு எடுப்பதாலும், நஞ்சுக்கொடி வெளிப்படுவதற்குமுன் கருப்பையின் வாய்மூடிக்கொள்ளுவதினாலும், கருப்பையில் நஞ்சு சிறிது தங்கிவிடுகிறது. நஞ்சு தங்கிய இடத்தில் ரணம் உண்டாகி சீழ் பிடித்துவிடும். அப்போது அடிவயிறு புண்பட்டு வலிக்கும். இலேசான ஆகாரம் உட்கொண்டாலும், உண்டவுடன் வயிற்றுவலி அதிகரிக்கும். யோனியின் வழியாக வந்துகொண்டிருக்கும் அழுக்குத் துர்நாற்றமுடனிருக்கும். அந்த அழுக்குடன் சில சமயம் சீழ்போன்ற வஸ்தும் வெளியாகும். காச்சல் இலேசாக அடிக்கும். அடிவயிறு வீங்கியிருக்கும். இதை அலகியஞ் செய்தால் ரணசன்னி (Septicaemia) கண்டு மரணம்தான் சம்பவிக்கும்.

இதற்கு எவ்வளவுதான் மருந்துகள் கொடுத்தாலும், கருப்பையைச் சுத்தம் செய்யாதவரையில் நன்மை ஒன்றும் எதிர்பார்க்க முடியாது. காண்டிஸ் லோஷனைக் (Condys Lotion) கொண்டு தினம் இரண்டுமுறை கருப்பையைச் சுத்தம் செய்யலாம்.

- | | | | | |
|--|--------|----------------------|--------|--|
| (1) வேலிப்பருத்தி இலை | பலம் 2 | மிளகு | பலம் 2 | |
| சுக்கு | ,, 2 | வெள்ளைப்பூண்டு | ,, 2 | |
| பொடித்துப்போட்டு கஷாயமிட்டு, மூன்றுநாள்களுக்குக் கொடுத்துவரலாம். | | | | |
| (2) மாலிவிங்கப்பட்டை | பலம் 1 | மஞ்சள் | பலம் 1 | |
| சிற்பரத்தை | ,, 1 | பனைவெல்லம் (கருப்பை) | | |
| அரிசித்திப்பிலி | ,, 1 | கட்டி | ,, 1 | |

பொடித்துப்போட்டு கஷாயமிட்டு, மூன்றுநாள்களுக்குக் கொடுத்துவரலாம்.

(3)- பொரித்த எள்ளு பலம் 1 பனைவெல்லம் (கருப்பங்கட்டி) பலம் 1

மெழுகுபோலிடித்து, மூன்றுகாளிக்குத் தடவை ஒன்றுக்கு எலுமிச்சுக்காய்ப் பிரமாணமாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(4) கோவைத்தண்டை இடித்துக் காடியில் ஊறப்போட்டு, வடித்தகாடி
அவுன்ஸ் 12-ல் :—

சுக்கு	பலம் 1	வெள்ளைப்பூண்டு	பலம் 1
மிளகு	„ 1	அடுப்புக்கரி	„ 1

அரைத்துக் கலக்கி ஒரு சட்டியில் 6 அவுன்ஸ் நல்லெண்ணெய்விட்டு, அதில் ஒரு வெள்ளைப்பூண்டை தட்டிப்போட்டு, பூண்டு சிவந்தவுடன் காடியில் கலக்கி வைத்திருப்பதை விட்டுத் தாளிதம் செய்து மூன்றுகாளிக்குக் காலை மாலை இந்தவிதம் செய்துகொடுத்து வரலாம்.

(5) சிங் சல்பஸ் (Zinc Sulphus)	15 கிரான்ஸ்
படிகாரம் (Alum)	2 டிராம்
சுடுதண்ணீர்	20 அவுன்ஸ்

ஒன்று சேர்த்து, பீச்சாங்குழலால் கருப்பையிலடித்துச் சுத்திசெய்து வரலாம்.

(6) பிளம்பி அவிடஸ் (Plumbi Acetas)	30 கிரான்ஸ்
தண்ணீர்	40 அவுன்ஸ்

ஒன்றுசேர்த்துக் கலக்கி பீச்சாங்குழலால் கருப்பையைச் சுத்திசெய்து வரலாம்.

(7) கிளிசிரைன் (Glycerine)	1 அவுன்ஸ்
கார்பாலிக் ஆசிட் (Acid Carbolie)	1 டிராம்
சுடுதண்ணீர்	40 அவுன்ஸ்

ஒன்றுசேர்த்துக் கலக்கி, பீச்சாங்குழலால் கருப்பைக்குள் அடித்துச் சுத்தி செய்து வரலாம்.

(8) கிளிசிரைன் (Glycerine)	1 அவுன்ஸ்
டானிக் ஆசிட் (Tannic Acid)	3 டிராம்
சுடுதண்ணீர்	40 அவுன்ஸ்

ஒன்றுசேர்த்துக் கலக்கி பீச்சாங்குழலால் கருப்பைக்குள் அடித்துச் சுத்தி செய்யலாம்.

(9) குளோரல் ஹைட்ரஸ் (Chloral Hydras)	40 கிரான்ஸ்
சுடுதண்ணீர்	40

ஒன்றுசேர்த்துக் கரைத்து பீச்சங்குழலால் கருப்பைக்குள் அடித்துச் சுத்தி செய்யலாம்

பின்னர் ஆளிலிரைமாவைக் களிக்கிண்டி ஒரு துணியில் தடவி, சுட சுட அடிவயிற்றில் கொஞ்சநேரம் போட்டு வைக்கலாம்.

அழுக்கு (LOCHIA)

பிரசவித்ததிலிருந்து ஒரு வாரம்வரையில், கருப்பையிலுள்ள இரத்த மானது யோனியின் வழியாகக் கசிந்துகொண்டிருப்பதற்கு “அழுக்கு” என்று சொல்லப்படும். சிலருக்கு இரண்டு வாரம் வரையிலும், மற்றும் சிலருக்கு மூன்று வாரம் வரையிலும் திரேக பிரக்கிருதிக்குத் தக்கவாறு கசிந்துகொண்டிருப்பதுமுண்டு.

பிரசவப் பெரும்பாடு கண்டவர்களுக்கு அழுக்குக் கொஞ்சமாகவே வெளிப்படும். சிலருக்குச் சிகிச்சை செய்யும்படியாக அதிகரித்துக்கொண்டே யிருக்கும். முதலில் சிதப்பாக வடிந்துக்கொண்டிருக்கும். அழுக்கானது நாட்டென்ற பிறகு பச்சையாகவேனும், மஞ்சளாகவேனும் மாறி கடைசியில் தண்ணீர்போல் வடிந்து நின்றுவிடும்.

கருப்பைக்குள் ஏதேனும் இரத்தம் தங்கி கெட்டிருந்தால், வடியும் அழுக்கும் துர்நாற்றமுள்ளதாக விருக்கும். அப்படி அழுக்குத் துர்நாற்றத் துட னிருந்தால், காண்டிஷ் லோஷனை (Gondys Lotion) பீச்சங் குழலுக்கொண்டு கருப்பையில் அடித்துச் சுத்தி செய்யவேண்டும்.

அழுக்கு வடிவது பிரசவித்த ஸ்திரீக்கு ஆரோக்கியத்திற்கும், கருப்பை வலுவு உண்டாவதற்கு மென்றாலும், அதே அழுக்கு அதிக அளவில் வெளிப்படுமானால், திரேகம் க்ஷீணித்துப் போவதும் தவிர, சிலருக்கு பெரும்பாடும் கண்டுவிடும். ஆதலால், அழுக்கு அதிக அளவில் படுவதை சம்பந்தித்தக்கூடிய அலுஷ்சிகிச்சை செய்யவேண்டும். அதுபோலவே அழுக்கு சரிவரபடவில்லையானாலும், தகுந்த சிகிச்சை செய்யப்படாவிட்டால் கெடுதலே சம்பவிற்கும்.

அழுக்கு அதிக அளவில் பட்டுக்கொண்டிருக்கும்போது ஏற்படும் களைப்பை மாற்ற கொஞ்சம் பிராந்தி (Brandy) கொடுக்கலாம்.

அழுக்கு அதிகமான அளவில் வடிகிறதைச் சமனப்படுத்தி கீழ்க்கண்ட சிகிச்சை முறைகளைக் கையாளலாம்.

- (1) ஆவாரம்பவேர் ரூபாயிடை $1\frac{1}{2}$ ஆவாரம்பட்டை ரூபாயிடை $1\frac{1}{2}$
 ஆவரம்பு ,, $1\frac{1}{2}$ ஆலம்பேர் ,, $1\frac{1}{2}$
 ஆலம்பீமுது ,, $1\frac{1}{2}$ ஆலங்கொழுந்த ,, $1\frac{1}{2}$

ஒன்றுசேர்த்துப் பசும்பாலால் மைபோல் அரைத்துக் காலையில் மட்டும் கொடுத்து வரலாம்.

(2) கருவேலம்பட்டை கஷாயத்தை பீச்சங்குழலால் யோனிக்குள் அடித்து வரலாம்.

(3) கடுக்காய் கஷாயத்தை யோனிக்குள் அடித்து வரலாம்.

(4) படிகாரத்தைக் குளிர்ந்த தண்ணீரில் கரைத்து யோனிக்குள் அடித்து வரலாம்.

- (5) ஆவிரிச் சல்பியூரிக் அிட் (Acid Sulphuric Dil) 30 துளி
 டிஞ்சர்ஜென்ஷன் கோ (Tincture Gentian Co) $1\frac{1}{2}$ டிராம்
 தண்ணீர் 3 அவுன்ஸ்

ஒன்றுசேர்த்துத் தடவை ஒன்றுக்கு ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு 3-தடவை கொடுத்து வரலாம்.

அழுக்குச் சரியான அளவில் படவிலையானால் கீழ்க்கண்ட மருந்தைக் கொடுக்கலாம்.

பெருங்காயம்	ரூபாயிடை	$\frac{1}{2}$	கருஞ்சீரகம்	ரூபாயிடை	$\frac{1}{2}$
கோரைக்கிழங்கு	,,	$\frac{1}{2}$	சடாமாஞ்சில்	,,	$\frac{1}{2}$
ஒமம்	,,	$\frac{1}{2}$	சுக்கு	,,	$\frac{1}{2}$
மிளகு	,,	$\frac{1}{2}$	வாலேந்திரபோளம்	,,	$\frac{1}{2}$

பொடித்து 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 6-அவுன்ஸாக சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் அரைக்கால் ரூபாயிடை குங்குமப்பூவை அரைத்துக் கலக்கி காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

கருப்பை அகப்புறமாறுதல் (INVERSION OF THE UTERUS)

கருப்பை தானாகச் சுருங்கி நஞ்சிக்கொடியை வெளி தள்ளுவதற்கு முன், கையினால் பலவந்தமாய் கஞ்சக்கொடியை இழுப்பது முதலிய கெடுதல்களினால் கருப்பையின் உட்புறமானது வெளிப்பக்கமாக திரும்பிவிடுகிறது. இதற்கு வைத்திய முறையில் சிகிச்சை ஒன்றுமில்லை. கையைக் கொண்டு முன்னிருந்ததுபோலவே திரும்பச் செய்யவேண்டும். கருப்பையை தள்ளிவிட்ட கூண்டே, கையை குளிர்ந்த தண்ணீரில் களைத்துக்கொண்டு, மறுபடியும் கருப்பைக்குள் கையை செலுத்தி கொஞ்சசேரம் வைத்திருக்க வேண்டும். கருப்பை சுருங்குவதற்குமுன் கையை எடுத்துவிட்டால் மறுபடியும் திரும்பிக்கொள்ளலாம்.

விடபக் கிழிவு (LACERATION OF THE PERINEUM)

தலை பிரசவமானால் பிரசவித்த ஸ்திரீகளுக்கு 2-ம் பக்கத்தில் சொல்லி யிருப்பதுபோல் யோனித்துவாரத்து பிளவின் அடிபாகம் சற்று கிழியத் தான் செய்யும். சிலருக்கு விடபம் (Perineum) பூராவும் கிழிவுபட்டு ஆசன வாய் வரையில் திறந்து போவதுமுண்டு. சிசுவின் தலை பெருத்திருப்பதினாலும், கஷ்டப்பிரசவங்களில் அஜாக்ரதையாக குறடுகளை (Forceps) போட்டு சிசுவை வெளிப்படுத்துவதினாலும் விடபக் கிழிவு உண்டாகின்றது.

சாதாரணமாக அரை அங்குலம் கால் அங்குலம் கிழிவுபட்டிருந்தால், பிரசவித்த ஸ்திரீயின் முழங்கால் இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டிருந்தாலே தானாக இரத்த ஓட்டம் உண்டாகி ஒட்டிக்கொள்ளும். அப்படி ஒட்டிக்கொண்டும் சிறு புண் இருந்தால் வேப்பெண்ணையைத் தொட்டுத் தடவுவதினால் நன்மையுண்டு.

விடபமானது அதிகமாகக் கிழிவுபட்டுப்போனால் கண்டிப்பாகத் தையல் (Stritching) போடவேண்டியது.

பால் சுரக்கச் செய்தல் (LACTESCENT)

சில பிரசவித்த ஸ்திரீகளுக்குக் குழந்தைக்குப் போதிய பாலில்லாம லிருக்கலாம். பால் சுரப்பதற்காகத் தயிர், மோர், பால் அதிகப்பட்ட கஞ்சி வகைகள், கோகோ, பால், முட்டை முதலிய ஆகாரங்களைக் கொடுக்கலாம்.

(1) வெள்ளாட்டின் எலும்புகளை காயவைத்துக் குழம்பாகவேனும், மாமிச ரசமாக (Soup) வேனும் செய்துகொடுக்கலாம்.

(2) ஆமணக்கிலையை வதக்கி முலையின்பேரில் வைத்துக் கட்டலாம்.

(3) பூநாகத்தை (நாக்குப்பூச்சியை)க் கொஞ்சநேரம் பாலில் போட்டிருந்தால் மண்ணைக் கக்கிவிடும். பிறகு அதை பாலில் அறைத்து எலுமிச்சங்காய் பிரமாணம் மூன்றுநாள் பாலில் கலக்கிக் கொடுக்கலாம்.

(4) கற்றாளி யிலையை யிளஞ்ஞடான தண்ணீரில் போட்டு பிசைந்து சக்கையை வடிக்கட்டிவிட்டு தண்ணீரை மூன்று நாளைக்குக் கொடுக்கலாம்.

(5) பாதிரிவேரை பசும்பாலில் அரைத்துக் கொடுக்கலாம்.

(6) கீழ்க்காய் ரெல்விவேரை பசும்பாலில் அரைத்துக் கொடுக்கலாம்.

(7) ஒரிலைத் தாமரையை எலுமிச்சம்பழம் பருமனில் அரைத்துப் பசுமோரில் கலக்கி ஒருவாரம் கொடுக்கலாம்.

(8) தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கை ஞாணித்து வேண்டிய அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

(9) பார்லி (Barley) அரிசிக்கஞ்சியை அதிக அளவில் கொடுத்து வரலாம்.

(10) 1½-தோலா தோல் நீக்கிய வெள்ளைப்பூண்டை 40-அவுன்ஸ் பசும்பாலில் நன்றாக வேகவைத்துக் கடைத்து, கால் தோலா ஏலரிசித் தூளும், 1½-தோலா மாவு சீனியும் சேர்த்து நன்றாகக் கடைத்து, காலையில் தூக்கி விழித்தவுடன் கொடுத்து, 9, 10-மணிக்குமேல் ஆகாரம் கொடுக்கலாம்.

(11) கெப்ளர்ஸ் மால்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் (Kepler's Malt Extract) என்ற மருந்தைக் கொடுக்கலாம்.

பால் வற்றச் செய்தல் (LACTIFUGA)

குழந்தைகளுக்குப் பால் நிறுத்தியபின் சில ஸ்திரீகளுக்குப் பால் அதிகமாகச் சுரந்து கட்டிக்கொண்டு வேதனை செய்வதுண்டு. அச்சமயங்களில் பாலை வற்றச்செய்யும்படியான சிகிச்சை செய்யாவிடில், பால் கட்டி ஸ்தனம் வீங்கி கரம்புகள் வெடித்துப் புண்ணாகும்; பால் காய்ச்சல் காணும்; இச்சமயங்களில் வேறு குழந்தைகளை முலையுண்ணும்படியாவது, பாலை வெளிப்படும்படி பீச்சுவாவது கூடாது. அப்படிச் செய்தால், பால் சுரப்பு அதிகப்பட்டு, பின்னும் உபத்திரவம் அதிகமாகும். பால் சுரக்காமலிருக்கச் செய்தே சிறந்த முறையாகும்.

(1) மல்லிகைப்பூவை வதக்கி வைத்துக் கட்டலாம்.

(2) முட்டைகோஸ் கீரையை வதக்கிவைத்துக் கட்டலாம்.

(3) வெற்றிலையை வதக்கிவைத்துக் கட்டலாம்.

(4) ஜஸ் ஒத்திடம் கொடுக்கலாம்.

(5) கர்ப்பூர எண்ணையை (Oleum Camphor) ஒரு துணியில் தடவி ஸ்தனத்தின்பேரில் போட்டு வைக்கலாம்.

(6) கரியபோளத்தை அரைத்துப் பூசலாம்.

(7) பெலடோனா பிளாஸ்திரியை (Emplastrum Belladonae) ஒரு துணியில் ஸ்தனக்காம்பு வெளியில் வரும்படியாகத் துளைசெய்து அதில் தடவி ஸ்தனத்தின்பேரில் ஒட்டி வைக்கலாம்.

(8) செம்மரத்தைத் தண்ணீர்விட்டு உரைத்துப் பூசலாம்.

(9) தவரம்பருப்பை உரைத்துப் பூசலாம்.

(10) பெலடோனாசுத்தம் (Extract Belladonae) கிளிசரினு (Glycerine) ம் சமனாகக் கலந்து துணியில் தடவி, ஸ்தனக்காம்புக்குத் துவாரமிட்டு ஸ்தனத்தின்பேரில் போடலாம்.

சுக சம்ரக்ஷண முறைகள் (GENERAL HINDS ON MANAGEMENT OF NEWLY BORN INFANTS)

சுகங்களின் சாதாரண வியாதிகளைப்பற்றி கூறுமுன் சுக சம்ரக்ஷணையைப் பற்றிச் சில வார்த்தைகள் கூறுவது மிகவும் அவசியம் என்று கருதியே அதனையும் சிறிது விளக்க விரும்புகிறேன்.

பிறந்த குழந்தை (NEWLY BORN CHILD)

பிரசவத்தைப்பற்றி நாம் முன்னமேகூறி வந்திருக்கிறோம். சுகபிரசவமாகக் குழந்தை பிறந்தவுடன் அதனை கவனிக்கவேண்டியது. எவ்விதமென்றால், சுக ஜெனித்தவுடன் உக்ரமாகக் கத்துகிறதா என்பதே. சுக சரீரத்துடனும், வலிமையான தேக அமைப்புடனும் பிறந்த குழந்தையானது பிறந்தவுடன் வீரிட்டமும், 98-டிகிரி உஷ்ணத்திலும், தாயின் கர்ப்பப்பையிலும் அடைப்பட்டிருக்கின்றது, வெளிச்சத்தில் வெளிப்பட்டவுடன் குளிர்ச்சியாலும், பிரகாசத்தினாலும் குழந்தை அழும்படியாயிருக்கிறது.

சுக பிறந்தவுடன் அழுவதினால் நுரையீரல் இயற்கையாக நிறைய வேண்டிய காற்று நிறைந்து, சுவாசம் விடவும் இரத்தாசயம் விரிந்து கொடுத்து இருதய நடையை ஒழுங்குபண்ணவும் செய்கிறது. இருதய நடை ஒழுங்காக நடக்க வாரம்பித்ததும், தாய் வயிற்றினின்றும் வேறுபட்டதற்கு அடையாளமாக நாபிக்கொடி (தொப்புள்கொடியின்) நடையானது நின்றவீதும் அந்தச் சமயம் பார்த்து, தொப்புளிவிருந்து இரண்டங்குலம் விட்டு தொப்புள்கொடியில் ஒரு துணி நாடாளைக் கட்டவேண்டும். அந்த நாடாகட்டிலிருந்து முன்றற்குல நூரத்திற்குப்பால் மற்றொரு கட்டு (முடிச்சு) போட்டு இரண்டு கட்டுக்கிடையில் கூரிய கத்தியினாலாவது, கத்திரிக்கோவினாலாவது தரையையும், சேயையும், வேறுபடுத்தவேண்டும்.

இதில் முக்கியமான விஷயம் நாபிக்கொடியைக் கட்டும் நாடாவும், கத்தியும் முன்னதாகவே கொதிக்கிற தண்ணீரில் போட்டெடுத்து வெகு சுத்தம் செய்து வைத்திருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் தொத்துவியாதி கிருமிகளும், ரணத்தை உண்டுபண்ணும். கிருமிகளும் அவைகளில் தொத்தியிருக்குமானால் பிராணபத்தான வியாதிகளை உண்டுபண்ணலாம்.

இவ்விதமாக நாபிக்கொடியைக் கட்டித் துண்டுபடுத்தப்படாவிட்டால், ஒரு சமயம் இரத்தம் பெருகி குழந்தை இறந்துபோகலாம். குழந்தை

பிறந்த 20-நிமிஷத்தில் தொப்புள்கொடியில் நாடி ஒட்டம் தானாகவே நின்று விடும். அதன் பிறகும் துண்டித்துவிடலாம். எக்காரணத்தை முன்னிட்டும், அவசரப்பட்டுக் குழந்தை பிறந்தவுடன் நாபிக்கொடியைத் துண்டித்து விட்டால் சிலசமயம் சிசு மரிக்கலாம். இதை மருத்துவத் தொழில் செய்வோர் முக்கியமாகக் கவனிக்கவேண்டியது. துண்டிக்கப்பட்ட தொப்புள் கொடியின் நுணியை ஈரமில்லாத வெண்ணெய்த் துணியினால் அழுத்தாமல் சுத்திக் கட்டித் தொங்கவிடவேண்டும். இப்படிச் சுட்டியிருக்கும் நாபிக்கொடியானது ஒருவாரத்துக்குள் தானாகவே விழுந்துவிடும். அப்படி விழுந்தாலும் தொப்புளில் சிலசமயம் புண் இருக்கலாம். இதை சாதாரண மெழுகு களிம்பைக் (Simple Ointment) கொண்டு ஆற்றவேண்டும். இரத்தப் புண் இருக்கும்வரை குழந்தைகளைக் குளிப்பாட்டும்போதெல்லாம் இப்படிச் களிம்பைத் தடவிவரவேண்டும்.

சிசு பிறந்தவுடன் அதன் திரேகமெல்லாம் வழுவுழுப்பான ஒரு பணியினால் பூசப்பட்டிருக்கும். ஆதலால் நாபிக்கொடியைத் துண்டித்தவுடன் குழந்தையைச் சுத்தஞ்செய்யும் பொருட்டாகக் கழுவி யெடுத்துக் கம்பளித் துணிகளால் மூடிவைக்கவேண்டும். குளிப்பாட்டுவதென்று குழந்தையை நெடுநேரம் தண்ணீர் படுக்கையாக வைத்திருக்கக்கூடாது. இந்த வேலையை எவ்வளவு சுறுசுறுப்பாகச் செய்யமுடியுமோ, அவ்வளவு விரைவில் செய்து முடிக்கவேண்டும். குழந்தையைச் சுத்தமாகக் கழுவாதினாலும், துரிதமாகவும், சாமர்த்தியமாகவும் குளிப்பாட்டும் தொழிலைச் செய்யாதினாலும், தாயின் பக்கத்தில் கிடத்திய குழந்தையின் நிறம் கைமரக மரணியிடும்படிச் செய்கிறது.

சிசு பிறந்தவுடன் வாயில் விரலைவிட்டுக் கோழையை எடுத்துவிட்டு சுவாசிக்கச் சலிப்பாயிருக்கும்படி மல்லாத்திப் படுக்கவைக்கவேண்டியது. குழந்தையைக் குளிப்பாட்டுவதற்கு முன்னதாக, வெந்நீரில் ஈனைத்துப் பிழிந்த வெண்ணெய்த் துணியினால் கண் இரப்பைகளாக் கவனத்துடன் துடைத்துச் சுத்திச் செய்யவேண்டும். வெதவெதப்பான தண்ணீரில் ஈனைத்துப் பிழிந்த கடல் பஞ்சியினாலாவது, சுத்தமான துணியினாலாவது துடைத்தாலும் போதுமானதாகும். அப்படித் துடைத்தவுடனே ஈரமில்லாத சுத்தமான துணியினால் துடைத்துவிடவேண்டும். சில குழந்தைகள் கர்ப்பத்தில் இருக்குப்போது தாயானவன், மண், சாம்பல் முதலிய மாவு பதார்த்தங்களை உண்பதனால் சிசுவின் பேரில் அடையாத அழுக்குப் படித்திருக்கும். அப்படியானால் கையில் கொஞ்சம் நெய்யோ, அல்லது பன்றிக் கொழுப்போ (Lard) தடவிக்கொண்டு குழந்தை உடம்பில் தேய்த்துப் பின்னர் சோப்பினால் அவம்பி துடைத்துவிடவேண்டும். இவ்விதமாகவெல்லாம், சிசுவை சுத்திசெய்த பின்னர், புட்டாமாவை (Toilet Powder) மூட்டுகளிலும், மூட்டு உப்புறம் குவிந்த பரகங்களிலும் பஞ்சியினால் தொட்டு

பூசவேண்டும். பிறகு குழந்தையை மிருதுவான மெத்தையில் படுக்கவைக்க வேண்டியது. பின்னும் குழந்தை வெதுவெதுப்பாக விருக்கும்படி கம்பளி யினால் போர்த்துவைக்கவேண்டும்.

சுவாச மடங்கிபிறக்கும் குழந்தைகள் (STILL BORN INFANTS)

சில சிசு பிறந்தவுடன் சுவாசமின்றி யிருப்பதுண்டு. இப்படி உள்ள நில மையிலிருந்து விரைவில் சுவாசம் வரும்படியான உதவிகள் செய்யாவிட்டால் மாணமே சம்பவிக்கலாம்; ஆனால், இருதயம் மட்டும் துடித்துக்கொண்டிருக்கிறவரையில் உயிர்ப்பிக்க முடியுமென்று நம்பவிடமுண்டு. சிசு சுவாசபந்தன மூடன் பிறப்பதற்கு முக்கியகாரண மென்னவென்றால் கஷ்டப் பிரசவமென்றாலும், சிரசு உதயமாகி நெடுநேரம் குழந்தை பிரசவியாததினாலென்கிலும், நஞ்சு சிக்கிரத்தில் பிரிந்துபோவதினாலென்கிலும், உதிரப்பெருக்கினாலென்கிலும், கர்ப்பத்திலுள்ள கரலத்தில் தாய் சரியானவிதமாக போஷிக்கப்படாததினாலென்கிலும், கபாலம் நாபிக்கொடியை அழுத்திக்கொண்டு வெளிப்பட்டதினாலென்கிலும், சுவாசக் கருவிகளுக்குக் காற்று நுழையும் மார்க்கங்களாகிய வாய், தொண்டை, மூக்கு முதலிய துவாரங்களில் அதிகரித்த கோழைகள் அடைத்துக்கொண்டிருப்பதினாலென்கிலுமென்றே சொல்லலாம்.

இப்பேர்ப்பட்ட சமயங்களில் தொடர்புக்கொடியை முன்சொன்னவிதமாக இருகட்டிகள்போட்டு தாமதமின்றி துண்டித்துவிடவும். சுவாசத் தடையாக நிற்கும் கோழைகளை நீக்கும்பொருட்டு கோழி இறகைக்கொண்டு மூக்கு, தொண்டை முதலியவைகளில் குடைந்து எடுத்து கூச்சம் உண்டுபண்ண வேண்டியது. சிசுவை நல்ல காற்றுவீசும்படியான இடத்திலவைத்து சுவாசிக் கும்படியாக குளிர்ந்த தண்ணீரைக்கொண்டு மெதுவாக முகத்திலும், மார்பிலும் அடிக்கவேண்டியது. அல்லது வெந்நீரினாலும், குளிர்ந்த நீரினாலும் மாற்றிமாற்றி அடித்துச் சுவாசம் உண்டுபண்ண பிரயத்தனப்படவேண்டும். அல்லது, ஓர் துவாலையின் நுனியில் குளிர்ந்த தண்ணீரைவிட்டு அதைக் கொண்டு, பிட்டத்திலும், நெஞ்சிலும், முதுகிலும் மாறிமாறி அடிக்க குணமுண்டாகும். முகத்தில் காற்று நன்றாக வீசும்படியாகச்செய்து, கம்பளியைக் கொண்டு திரேகாகியந்தமும் சூடு உண்டுபண்ணக்கூடியவிதமாய் தேய்க்க வேண்டியது. பின்னும் குழந்தையின் உள்ளங்கால்களிலும், பிட்டத்திலும் விரல்களால் சுரண்டி நோயுண்டாக்கி அழுப்படி செய்யவேண்டும்.

சுவாசமடங்கி பிறக்கும் குழந்தைகளுக்குக் கீழ்க்கண்ட உபசரண முறை நன்மை பயக்குமென்று டாக்டர் ஹாரீஸ் ரூடாக் (Dr. H. Ruddock) கூறுகிறார். சிசுவின் மூக்குத்தளைகளை கைவிரலால் சிறிது அழுத்திப்பிடித்து சுவாச குழலே மேல்நோக்கி அழுக்கிவிட்டு, நுரையீரலுக்குக் காற்று செல்லும்படியாக

கையை பொத்தி அடிக்கவேண்டும். பின்னர் இடையை (இடுப்பு-Ribs) மேல் நோக்கி அழுத்தி நுரையீரல் காற்றை அபகரிக்கும்படியாகச் செய்யவேண்டியது. இப்படி இந்த முறையை நிமிஷத்துக்கு 15-முறை வேகமாக செய்ய வேண்டும். இதனால் வெகு சீக்கிரத்தில் நன்மையுண்டாகலாம். அல்லது, சிசுவை மட்டமாக படுக்கவைத்து கம்பளியால் உஷ்ணமாகும்படி தேய்க்கவும். இப்படிச் செய்யும்போது சிரசு நெஞ்சில்சாய்ந்து சுவாசம்விட தடங்கலாகாதபடி நெஞ்சு சற்று உயரமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது. இதிலும் பயனில்லையானால் 98-டிகிரி உஷ்ணமுள்ள தண்ணீரை ஒரு தொட்டியில்விட்டு குழந்தையை திடீரென்று அழுக்கி எடுக்கவும். இந்த முறையிலும் சுவாசம் வெளிவரவில்லையானால், இரண்டு நிமிஷத்துக் கதிகமாக இந்த உஷ்ணஜல சிகிச்சையால் பயன் ஏற்படாது.

டாக்டர் மார்ஷல் ஹால்ஸ் (Dr. Marshall Halls) கீழ்க்கண்ட முறை மிகுந்த நன்மை அளிப்பதாக கூறியிருக்கிறார். சிசுவை குப்புற படுக்கவைத்து ஏக காலத்தில் சீரம் முழுவதுமே விலாபக்கம் ஒருபுறம் சாய்ந்தமாதிரி திருப்பியும், மறுபடியும் குப்புற திருப்பியும், இந்தவிதமாக நிமிஷத்திற்கு 15-முறை நிதானமாகவும், திறமையாகவும் செய்யவேண்டும் என்கிறார்.

எவ்வாறாக இருப்பினும், சுவாசமடங்கி பிறக்கும் சிசுவை, வெளியானவுடன் வழக்கம்போல் விரலைவிட்டு கோழையை வழித்துவிட்டு, கோழி இறகால் நாசித்துவாரங்களையும் தொண்டையையும் குடைந்து கோழையை சுத்தி செய்து சுடுதண்ணீரையும், குளிர்ந்த தண்ணீரையும் மாறிமாறி முகத்திலும் நெஞ்சிலும் அடிப்பதினால் நன்மை உண்டு என்பதே நாம் அறிந்ததாகும்.

சிறிதநேரம் உயிர்ப்பிக்கும் முயற்சிகளைசெய்தும் சுவாசம் வெளிப்பட்டு குழந்தை அழவில்லையானால் அசாதத்தியமென்றே தீர்மானிக்கலாம். குழந்தை பிறந்து இரண்டாமணி நேரத்திற்குப் பிறகும், பல சிகிச்சைகளினால் பயன் உண்டாயிருப்பதற்கு தக்க ஆதாரங்கள் உண்டு. என்றாலும் சலிப்பில்லாமல் குறைந்தது அரைமணி நேரமாகிலும் சுவாசிக்கச் செய்யும், சிகிச்சைகளை விடாது செய்து பார்க்கவேண்டியது முக்கிய கடமையாகும்.

புணுகையும், கோரோசனையையும் சமமாக மத்தித்து நாக்கில் தடவலாம். இந்த முறை சற்றே குணமான அறிகுறிகள் இருக்கும் சமயத்தில் செய்யப் படுமானால் கன்மையை உண்டு பண்ணும்.

முதல்நாள் முலையில் பால் (MILK IN THE BREASTS THE FIRST DAY)

பிரசவித்த முதல்நாள் தாய்மார்களுக்குப் பால் உண்டாவதில்லை என்றும் மூன்றுநாள்க்குப் பிறகே-பால் ஊறுவதாகவும் நம்நாட்டுப் பாமரமக்கள் கூறு

கிரார்கள். அதனால் சிசுவின் ஆகாரமாகப் பிரதி பால்களை ஊட்டவும் செய்கிறார்கள். இது நம்புவதற்கிடமாகவில்லை. அநேக பிரசவித்த ஸ்திரீகளுக்கு முதல் நாளிலேயே குழந்தைக்குப் போதுமான பால் இருக்கிறதென்பதை அநேகர் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றனர். சிசுபிறந்தவுடன் முலைக்காம்புகளிலுள்ள அழுக்குகளைச் சுத்தம் செய்துவிட்டு, ஸ்தனத்தைக் கசக்கிப் பீச்சினால் சீழ் போன்ற பதார்த்தம் வெளிவரும். உடனே முலைக்காம்புகளைச் சிசுவின்வாயில் வைத்து, மெதுவாக பீச்சவிட குழந்தைக் குடித்துப் பசியாற்றிக்கொள்ள முடியும். முதலில் முலையைப் பீச்சாமல் பால் கொடுத்தால் முலைக்காம்பு கண்களில் அடைபட்டிருக்கும் அழுக்கு, குழந்தைக்கு வியாதியை உண்டாக்கும்.

முதல் நாளில் பிரசவித்த ஸ்திரீகளுக்குப் பால் இல்லை என்று வேறு பால்களைக் கொடுப்பது மிகவும் தவறுதலானதாகும். பிரசவித்தவுடன் சிசுவுக்குக் கொடுக்கும் முலைப்பாலில் அதிகமான கிண்சத்து இருப்பதினால், சிசுவின் மலக்குடலிலிருக்கும் காட்டு மலமானது சுலபமாக வெளிப்பட்டு விடுகிறது. இந்த முறையை மருத்துவத் தொழில்செய்வோர் கையாளாமல், குழந்தையின் காட்டுமலம் வெளிப்பட, சர்க்கரை செவ்வற்பொடி, வெண்ணை, வெற்றிலைச்சாறு, கள்ளிச்சாறு முதலியவற்றை ஈவிரக்கமின்றி கொடுக்கின்றனர். இயற்கையாக உள்ள முலைப்பாலேவிட வேறு நன்மையானது இல்லை என்பதைக் கண்டிப்பாக அறியவேண்டும். முக்கியமாய் தேவையானால்மட்டும் அவித்த ஊற்றிய விளக்கெண்ணெய் (Castor Oil) அரைத்தேக்கரண்டி கொடுக்கலாம். முதலில் பால் இல்லையானாலும், குழந்தையை உருஞ்சும் படிச் செய்வதினால் இயற்கையாகவே முலையில் பால் சுரந்துவிடுகிறது. அப்படிச் குழந்தையைப் பால் குடிக்கச் செய்யாததினாலேயே பால் கட்டிப் போய், பால் காச்சல் (Milk Fever) ஏற்பட்டுவிடுகிறது.

குழந்தைக்குப் பால் கொடுக்கும்போது, ஸ்திரீகள் சுலபத்தில் ஜீரணமாகும்படியான மெல்லிய சர்தாரண உணவையே உட்கொள்ள வேண்டும். மனோவேதனையினாலும், பால் சுரப்புக் குறைந்துபோவதோடு பாலும் கேடுறியேதவாகும். இவ்விதம் கேடுற்ற பாலினால் குழந்தைகளுக்கு அஜீரணம், மாந்தம், பேதி, சுரம், வலிப்புகள் முதலிய வியாதிகள் உண்டாகி விபத்துண்டாக்கலாம். ஆதலால் குழந்தைக்குப் பால் கொடுக்கும் சமயம் தாயானவள், சஞ்சலமின்றியும், மனோவேதனையின்றியும், இருத்தல் மிகவும் அவசியமாகும். குழந்தைக்கு புசுட்டப்படும், வேறெந்த ஆகாரமும் எவ்வளவு உயர்வாயிருப்பினும் தாய்ப்பாலுக்கு சமமாகாதென்பது அதுபவத்தில் கண்டதாகும்.

பெற்ற குழந்தைக்குப் பால் கொடுப்பதினாலேயே, தாய்மார்கள் மற்றெந்த வியாதிகளிலிருந்தும் தப்பித்துக்கொள்ள முடியும். நோஞ்சலாகவும், ஸ்ரீண ஸ்திதிபிலுமுள்ள ஸ்திரீகளும், குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுப்பதின

லேயே திரேகம் பலப்பட்டு, மற்ற நோய்கள் அணுகாமல் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும். அதிபலயினை ஸ்திரீகளும், மெல்லிய சரீரிகளான ஸ்திரீகளும் குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுத்தால், மிகுதியும் பலயினைமடைவார்கள் என்று சொல்லுவது பொருத்தமான விஷயமல்ல.

பெற்ற குழந்தைக்குப் பால் கொடுக்காமலிருக்கும் ஸ்திரீகள், விரைவில் கர்ப்பமுண்டாகி, அடிக்கடி குழந்தைகள் பெற்று சரீரணை மடைவார்கள். இதனால் சரீரம் தளர்ந்து, இளம்பிராயத்திலேயே கிழப்பருவம் பெற்று விடுவதோடு கூட, உலகத்தையே வெறுக்கும்படியான பிணியும், அவர்களைத் துடர்ந்துகொண்டே யிருக்கும். குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுத்துக்கொண்டிருக்கும் ஸ்திரீகள், பிரசவித்த 20-மாதங்களுக்கு முன்கர்ப்பம் அடைவதில்லை.

குழந்தைகளுக்குப் பால்கொடுக்கும் ஸ்திரீகளுக்குப் பால் காம்பு வெடிப்போ, பால் சுரமோ, முலைச்சிலந்தியோ உண்டாவதில்லை. பால் கொடுக்க முற்றிலும் அசகத்தர்களாக விருந்தாலும், நெடுநாள் குழந்தைக்குப் பால் கொடுக்க சாத்தியப்படாவிட்டாலும், குறைந்தது ஒரு மாதமாவது குழந்தைக்குப் பால் கொடுத்தே தீரவேண்டும். பாலானது ஸ்தனத்தில் 12-மணி நேரத்திற் கதிகமாய்த் தங்கியிருந்தால், பால் செட்டு நஞ்சாக மாறி விடும். அந்தப் பாலை சிசுக்களுக்குக் கொடுத்தால், வாந்தியையோ, பேதியையோ உண்டுபண்ணும். நெடுநேரம் பால் கொடுக்காமலிருந்து குழந்தைக்குப் பால் கொடுக்கவேண்டி வந்தால் முதலில் அந்தப் பாலை பீச்சவிட்டுத் தான் கொடுக்கவேண்டும். சாதாரணமாக குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுக்கும்போதெல்லாம், முலையைக் கழுவி சுத்திசெய்துவிட்டு, கொஞ்சம் பாலைப் பீசியபின்னரே குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுப்பதே சிறந்த முறையாகும்.

முதல் நாளில் நாலுமணி நேரத்திற் கொருதரம் குழந்தை முலையுண்ணும்படி செய்யவேண்டும். அடுத்த நாள் பால் அதிகமாக ஊறுமரூல் குழந்தைக்கு அடிக்கடி முலைக்கொடுக்கலாம்; ஆனால், சிசுவுக்கு போதுமான பாலில்லை என்று தெரிந்தால்மட்டும் கொதி தண்ணீரில் கொஞ்சம் இனிப்பு சேர்த்துப் புகட்டலாம். தாய்ப்பால் இல்லை என்று தீர்மானித்த பிறகேதான் இவ்விதம் செய்யலாம். முலையில் பால் சுரப்பு அதிகமாயிருந்தால் மூன்று மணி நேரத்திற் கொருமுறை பால் உண்ணும்படி செய்யலாம். முதல் இரண்டு மூன்று நாட்களில் குழந்தைக்கு 101-டிகிரி உஷ்ணமும், திரேக அசெனக்கியமும் தோன்றுமானால், “முதல் ஆறுமாத ஆகாரவிதி” என்ற தலைப்பின் கீழ் கவனித்து ஆகாரம் கொடுக்கவேண்டியது.

சில குழந்தைகள் பிறக்கும்போதே மார்பு மச்சம் (முலைக்குறி) பெருந்திருப்பதுண்டு. இதனைச் சிலர் கசக்கி நீரை எடுத்துவிடுவதுண்டு. இதை

விட கெட்ட செய்கை வேறொன்றில்லை. நூற்றில் ஒரு குழந்தைக்குக்கூட இவ்விதம் பெருத்திருப்பதில்லை. ஆனால் மருத்துவச்சிகள் எல்லாக் குழந்தைகளுக்கும் இப்படிச் செய்துவிடுகிறார்கள். மார் சிறிது பெருத்திருக்குமேயானால், மாவு கிண்டிவைத்து (Poultice) கட்டுவதே ஏற்ற சிகிச்சையாகும்.

சிகவைப்பற்றி சில குறிப்புகள் (FEW POINTS ON NEWLY BORN CHILD)

சமசுகதேக குழந்தைகளின் தேகரீதியை கீழ்க்கண்டவிதமாக அறுபவத்திலறிந்திருக்கிறது. குழந்தையின் உச்சிக்குழி (Anterior Fontanelle) ஒன்றை ஆண்டுக்குமேல் இரண்டாண்டுக்குள் மறைபட்டுவிடும். அதற்குப் பின்னும், உச்சுக்குழி காணப்படுமானால், ரோகதேகியான குழந்தை என்றும், வியாதிகள் சதா பற்றத்தகுந்த தேகி என்றும் தீர்மானிக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு மூன்று நான்கு மாதத்திற்குள் கழுத்து நின்றாவிடும். குழந்தைகள் ஒரு வருஷத்திலிருந்து இரண்டு வருஷத்துக்குள் நடக்க ஆரம்பித்துவிடும். பால் பற்கள் (Milk Teeth) ஆறுமாதத்திலாரம்பித்து மூன்று வருடத்துக்குள் பூர்த்தியாக முளைத்துவிடும். ஆறுவயதில்-பல் விழுந்து முளைக்க ஆரம்பிக்கும். சமதேக குழந்தைகள், பிறந்த சமயம் 7-ராத்தலும், நாலுமாதத்தில் 14-ராத்தலும், பனிரெண்டு மாதத்தில் 21-ராத்தலும், ஆறுவயதில் 42-ராத்தலும், பன்னிரெண்டு வயதில் 84-ராத்தலும் இருக்கலாமென்று டாக்டர் ஹுச்சின்ஸன் (Dr. Hutchinson) குறிப்பிடுகிறார்.

கழுவுதலும், குளிப்பாட்டலும் (WASHING AND BATHING)

சுகரமாய்வைத்துக்கொள்வது, குழந்தைகளுடைய சுகத்திற்கும், வளர்ச்சிக்கும் மிக இன்றியமையாததாகும். சுகத்துடனிருக்கும் ஒரு குழந்தையை 24-மணிநேரத்திற்கு இரண்டுதரம் அதாவது, காலையும், மாலையும் இளவெந்நீரினால் குளிப்பாட்டவேண்டும். ஒரு தொட்டியில் சம உஷ்ண தண்ணீர் விட்டு, சிசுவின் தலையை கையால் அணைத்துக்கொண்டு, கழுத்துவரையில் நீனைத்து எடுத்து, கிளிசரின் சத்து அதிகமாயுள்ள உயர்ந்த சோப்புக்களினாலாவது, வெள்ளைத் துணியினாலாவது தேய்த்து, மறுபடியும் தண்ணீரில் நீனைத்து உடனே காய்ந்த துவாலையினால் ஈரமில்லாது துடைத்துவிடவேண்டும். இப்படி குளிக்கச்செய்யும் முறையை கைக்கொள்ளுபவர்கள், வெகு சுறுசுறுப்பாகச் செய்துமுடிக்கக் கூடியவர்களாக இருக்கவேண்டும். உஷ்ணகாலங்களில் பிறந்து ஒன்றல்லது இரண்டுமாதமானபிறகு சுடுதண்ணீர் ஸ்நானம் தேவையில்லை. படிப்படியாக குளிர்ந்த தண்ணீர் ஸ்நானமே ஆரோக்கியமுடையதாக

விருக்கும். பலயீனமான குழந்தைகளுக்குச் சுடுதண்ணீர் ஸ்நானம் நெடுநாள் வரையில் நன்மையைத் தரும். குளிக்காலத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு அடுத்த வேளிக்காலம்வரை உஷ்ண ஸ்நானமே முக்கியமாக வேண்டப்படும். பின்னர் குளிர் ஸ்நானம் செய்விக்கலாம். குளிர் ஸ்நானமே பெரும்பாலும் குழந்தைகளுக்கு நன்மை பயப்பதாக விருப்பினும், ஒரு நாளையில் அதாவது 24-மணி நேரத்தில் ஒருதரமே குளிர் ஸ்நானம் செய்விக்கவேண்டும். உஷ்ண ஸ்நானத்தைப்போன்று இரண்டுதரம் குளிர்ஸ்நானம் செய்தல்கூடாது.

பிறந்த குழந்தைகளின் கண்களைப்பற்றிய விஷயமானது, மிகமுக்கியமும் பிரதானமுமானதினால் ஒவ்வொருவரும் அதில் மிக ஜாக்கிரதையாக விருக்க வேண்டும். டாக்டர் ஜான் எச். கிளார்க்கி (Dr. John H. Clarke) சொல்லு மாப்போலே, குழந்தை பிறந்தவுடன் மருத்துவச்சி, குழந்தையின் கண்களை எவ்வளவு ஜாக்கிரதையுடன் சுத்திசெய்யமுடியுமோ, அவ்வளவுஜாக்கிரதையுடன் கண்ணில் படிந்திருக்கும் கோழைகளை நீக்க, சுத்தமான வெள்ளைத் துணியின் துணியை தண்ணீரில் நனைத்துப் பிழிந்து கண் உள் இமைமயிலும் கடைக் கண்ணிலும் இருக்கும் கோழைகளை ஜாக்கிரதையாகச் சுத்திசெய்ய வேண்டியது. இதனால் கண்ணிமைகள் கோழையின்றி சுத்தம்செய்யப்பட்டு, கண்மணி களுக்குக் கோளாறு வராமல் காப்பாற்றப்படுகிறது. கண்ணைச் சுத்தம் செய்யும்பொருட்டு ஒருபோதும் கடற்பஞ்சுகளை உபயோகிக்கக்கூடாது.

குழந்தையின் கண்களைச் சுத்தம்செய்து, வெள்ளிய சுத்தமான துணியினால் காய்ச்செய்தபின், மருத்துவச்சி தன் கைகளை கார்பாலிக் (Carbolic Lotion) கழுவுநீர் முதலிய சுத்தித் தண்ணீரில் கையை நன்றாக அலம்பி விடவேண்டும்.

குழந்தை பிறந்தமுதல் இரண்டுநாட்களில், கண் சிவந்தும், வீங்கியும் இமைகள் ஒன்றோடொன்று ஒட்டியும்கொள்ளுமானால் அதிக ஜாக்கிரதையாக பக்குவம் செய்யவேண்டும். வெகுசுத்தமான வெள்ளை மிருதுவான துணியை வெந்நீரில் நனைத்துப்பிழிந்து, மெதுவாக அந்த அழுக்கு அதாவது பூழையைச் சுத்தம் செய்யவும். சுத்தம்செய்யும்பொருட்டுத் துணியை அழுத்தித் தேய்த்தலும், நகத்தால் சுரண்டுவதும் தீமையாகும். இதில் கண் குழிகளில் முக்கிய கவனம் செலுத்தவேண்டும் ஏனென்றால் கண்குழியில்தான் பூழை அளிக்கமாக இருந்து உலர்ந்துபோயிருக்கலாம். அடிக்கடி துணியை சுடுதண்ணீரில் நனைத்துப் பிழிந்துகொள்ளவேண்டும். பின்னர் சுடுதண்ணீரில் நனைத்துப்பிழிந்த துணியினால் கண் விழியையும் சுத்தம் செய்வவேண்டும். இதற்கு இடதுகை விரல்களினால் இரப்பைகளை நீக்கிப் பிடிப்பதென்று பல்லைக்கடித்துக்கொண்டு சிசுவுக்கு இம்சை ஏற்படும்படியாக அழுத்திப்பிடிக்கக்கூடாது. கண் இமைகள் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக்கொண்டிருக்குமானால், கையினால் அதை வலுவந்த மாகப் பிரித்துவிடாமல், சுத்தமான துணியைச் சுடுதண்ணீரில் நனைத்து

இரண்டொரு துளி தண்ணீரை கண்ணில் பிழிந்து, சற்றுநேரம் பொறுத்த நீக்கினால் தானாகவே நீங்கிவிடும் பின்னர் சுத்தம்செய்யலாம். சுத்தஞ்செய்யும் பொருட்டாக ஒருபோதும், சோப்பாவது (Soap) மற்ற எதையாவது கலந்த தண்ணீரினால் கண்களைக் கழுவக்கூடாது. கண்ணிமைகள் தினம் ஒட்டிக் கொண்டு பூழையும் அதிகமாகப் படிந்திருந்தால் மேற்சொல்லியபடி தினம் இரண்டுவேளை சுத்தஞ்செய்து பின்னர் இரண்டொரு துளி, சுத்தமான பன்னீர் விடுவதினால் நன்மையுண்டாகும்.

வஸ்திரம் போர்த்துதல் (CLOTHING)

தேச சீதோஷ்ண நிலைமைக்குத் தக்கபடியும், காலத்திற்குத் தக்கபடியும் துணிபோர்த்தல் வேண்டும். நம் நாடு எப்போதும் உஷ்ணமுள்ளதாகவே யிருப்பதால், சிசுக்களுக்குப் போர்வையாக கனத்த துணியோ, கம்பளியோ தேவையில்லை மெல்லிய வெள்ளைத் துணியே போதுமானதாகும். முகத்தை மூடி விடாமலும், பல துணிகளைப் பொதிந்து, குழந்தையைக் கஷ்டப்படுத்தப் படாமலும் மிருக்கக்கூடிய விதமாகவே போர்த்தல் வேண்டும். அதிகமான பழந்துணிகளைப் போர்த்துவதினால், குழந்தைகள் கைகால்களை உதறிக் கொள்வதிலிருந்து அவைகள் கட்டுப்படுத்தி இம்சைசெய்யும். சிசுவின் பேரில் துணி போர்த்தாமலிருந்தால் தொப்புளில் இருக்கும் புண்ணின்மேல் ஈக்கள் உட்கார்த்து ரணம் உண்டாகச்செய்துவிடும். ஆதலால், மெல்லியதாகவும், வெள்ளையாகவும் சுத்தமாகவுமுள்ள ஒரு துணியைக் கழுத்திலிருந்து கால்கள்வரை மூடும்படியாகப் போர்த்த வேண்டியது.

குழந்தைகளுக்கு வயிற்றுவலியும், வயிற்றோட்டமும் ஏற்பட்டிருக்கும் சமயம் அடிவயிறு, துடையின்பேரிலும் ஈரமில்லாத சுத்தமான துணியைப் போர்த்தி வைக்கவேண்டும். குழந்தைகள் சம உஷ்ணத்தோ டிருக்கவேண்டியது மிகவும் முக்கியமானதாகும். அதிலும் பிறந்த குழந்தைகள் விஷயத்தில் இது அதிமுக்கியமானதாகும். சிசுக்களுக்கு வரும் வாதரோகத்தில் அதி குளிர்ச்சி தாக்காமல் கம்பிளியைக்கொண்டு போர்த்துவது நலம். போர்த்தும் துணிகள் எப்போதும் ஈரமில்லாமலே யிருக்கவேண்டியது பிரதானமானதாகும். சிசு சிறுநீர்விட்டு துணியை நனைத்துவிட்டால் சோம்ப வில்லாமல் வேறு துணி மாற்றிவிடவேண்டும். தலையில் உச்சுக்குழியை மூடும்படியாக ஒரு குல்லாய் உபயோகிப்பது நல்லது. பகலில் குழந்தைகளுக்குப் போட்டிருக்கும் துணிகளைவிட இரவில் குறைச்சலாகவே யிருக்க வேண்டும். முக்கியமாகக் குழந்தைகளுக்குப் போர்த்தும் துணியினால், பூட்டிகளின் அசைவிற்கு தடங்கலில்லாமலும், ஜீரண கருவிகள் அடங்கியிருக்கும் வயிறு நசுங்காமலும், சுவாச உருப்புகள் தங்கள் தொழிலை செய்யத் தடங்கலில்லாமலும் மிருக்கவேண்டியது.

நூக்கம் (SLEEPING)

செவின் நித்திரைக்கு யாதொரு பங்கமும் நேராதபடி காற்றோட்டமுள்ள இடத்தில் மிருதுவான படுக்கையின்மேல் படுக்கவைக்கவேண்டும். குளிர் காற்று வீசும் இடங்களில் குழந்தையைப் படுக்கவைக்கக் கூடாது. அதிகமான துணிகளைப் போர்த்துவதினாலும், செவிற்கு நித்திரைபங்க மேற்படலாம். குழந்தைகளுக்கு ஆகாரம் எவ்வளவு முக்கியமானதோ அவ்வளவு முக்கியமானதாகும் நித்திரையும். ஒரே அறையில் பல குழந்தைகள் தூங்கும்படி செய்வது திரேக ஆசோக்கியத்திற்கு ஏற்றதல்ல, சிறு குழந்தையாயினும், பெரிய குழந்தைகளாயினும் தனித்தத் தூங்கும் முறையே சிறந்ததாகும். பிறந்து ஒரு மாதவயதுவரையில் சுகந்தேக குழந்தைகள் ஒருநாளின் முக்கியமான பாகங்களை நித்திரையில் கழிக்கவேண்டும். பிறந்து ஓராண்டுவரை குழந்தைகள் பாதிநேர நித்திரையில் செலவிடுதல் உத்தமமாகும். மூன்று வயதுவரையில் குழந்தைகள் மதியத்தில் நித்திரை கொள்வது நன்மை பயக்கக் கூடியதாகும்.

குழந்தை நித்திரை செய்யவேண்டியநேரம் வந்ததும் தாமதமின்றி குழந்தை விழித்திருக்கும்போதே படுக்கையில் போடவேண்டியது. குழந்தை தூங்கும் பொருட்டாக, மடியில் கிடத்தி ஆட்டுவதோ, மேலே தட்டிக் கொடுப்பதோ, தாலாட்டுதலோ முதலிய பழக்கங்கள் ஒன்றுமில்லாமலே அந்தந்த நேரங்களில் குழந்தை தூங்கும்படியாக பழக்கத்தில் கொண்டுவர வேண்டியது. தாலாட்டுதல், தட்டிக்கொடுத்தல், ஆட்டுதல் முதலியவைகள் அவ்வளவு நல்லமுறைகள் அல்லவென்று டாக்டர் ரூடாக் (Dr. Ruddock) என்பவர் கூறுகிறார். குழந்தைகள் தூக்கவேண்டியநேரம் தப்பாது படுக்கையில் போடுவதினால் வழக்கமாய் குழந்தை நித்திரைசெய்ய பழகிவிடுகிறது தென்பதே அவர் கூறுவதற்கு ஆதாரமுளதாகும்.

தூங்கும்பொருட்டாக குழந்தைகளுக்குத் தூக்கமருந்துகளைக் கொடுப்பது எப்போதும் தவிர்க்கவேண்டியதொன்று. தூக்க மருந்துகளில் போதைக் குரிய அபிச்சத்துக்கள் சேர்ந்திருப்பதினால், செக்களின் மூளையையும், நரம்புகளையும் பழுதுபட செய்துவிடுகிறது. ஒருமுறை தூக்க மருந்துகளினால் தூங்கும்படி செய்தால், பின் என்ருமே அம்மருந்து பிரயோகத்தினால் மட்டும் தான் குழந்தை நித்திரைசெய்யும். இது எப்போதும் கெடுதலான பழக்கத்தை உண்டுபண்ணி, மூளை பலவீனத்தையடைப செய்துகிறது. நித்திராகாரிகளான பானங்கள்; (Soothing syrups) மதுவர்க்கங்கள் (Cordials) சாராயங்கள் (Spirits) இவைகளைக் குழந்தைகளுக்குப் பருகக்கொடுத்து நித்திரையை

வருவிப்பதினால், பரிதாபமான சிசு ஹத்திகள் நேர்த்துவிடக்கூடும். எந்தக் காரணத்தை முன்னிட்டும் குழந்தைகளுக்கு நித்திராகாரிகளை கொடுப்பது கெடுதல் என்று தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். தவிர்க்கமுடியாத அவசியம் ஏற்பட்டால் “தூக்கமின்மை” என்ற தலைப்பின்கீழுள்ள மருந்துகளை மட்டும் உபயோகிக்கலாம். குழந்தைகள் அழாம விருக்கும்பொருட்டு ரப்பர் முலைக்காம்புகளை (Dummy Tests and rubber Nipples) வாயில் வைப்பது சுகாதார குறைவானது தவிர, தாடைகளை முன்னுக்கிழுத்து முகத்தை விகாரப்படுத்திவிடும். சில குழந்தைகளுக்கு விரல் சப்பக் கற்றுக் கொடுப்பதும் உண்டு. இது மிகவும் கெடுதலான பழக்கமும் தவிர முலைக்கும் பல்லானது முன்னுக்கு இழுக்கப்பட்டு அவலக்ஷணமாக்கிவிடும்.

குழந்தைகள் நித்திரை செய்யும்போது சுத்தமான காற்று எதேவ்ந்த மாக இருக்கவேண்டும். படுக்கை யறைகளின் கதவுகளையும், ஜன்னல்களையும் சாற்றி விடுவதினால் காற்று பிரவேசியாமல் மிகவும் தீங்கை விளைவிக்கும்.

திறந்தவெளி வியாயமம் (OPEN AIR EXERCISES)

தாவர வர்க்கங்களுக்கு எவ்விதமாக சூரிய வெளிச்சமும் காற்றும் வேண்டப் படுகின்றனவோ, அவ்விதமாகவே மனிதரும் கூட தேகத்துடனிருக்க சூரிய வெளிச்சமும், நல்ல காற்றும் இன்றியமையாதனவாக இருக்கின்றன. அதிலும் குழந்தைகளுக்கு திறந்தவெளி வெளிச்சமும், காற்றும் மிக முக்கியமானதாகும். சூரிய பிரகாசத்தினின்றும் தடுக்கப்பட்டு கூரைகளுக்கடியில் வளர்க்கப்படும் பூஞ்செடிகளானது இயற்கையாக சூரியப்பிரகாசத்திலிருக்கும் பூஞ்செடிகளினின்று எப்படி வேருத்துப் போகின்றனவோ, அதேபோல சூரிய வெளிச்சங்களில் உலர்த்திக்கொண்டு வராத குழந்தைகளும் இரத்தம் குறைந்து வெளுந் தோலாகவே யிருக்கும்.

சுகமாகக் காற்றுவீசும் சமயங்களில் ஒரு மாதத்திற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளை ஒருநாளாக கிரண்டுதரமாவது சூரியவெளிச்சத்தில் நல்ல காற்று சுவாசிக்கும்படியாக வெளியே கொண்டுபோக வேண்டியது. அப்படிக்கொண்டுபோகும் சமயங்களில் முக்கியமாக கவனிக்கவேண்டிய தொன்றுண்டு. அதாவது சரியானவிதமாக துணியினால் போர்த்தப்பட்டிருக்கிறதாவென்பதே. தோடைகாலங்களில் குழந்தைகளை வெளிச்சத்தில் வைத்திருப்பது நல்லதாகும். ஆனால், சூரியனுடைய கிரகணங்கள் சிரசில் படாதவிதமாக, குல்லாயினாலாவது, வேறு எதனாலாவது மறைக்கப்பட்டிருக்கவேண்டாம். பொதுவாக வெளிக்காற்றில் உலாவி வருவதினால் திரேகாரோக்கியம்

அடைவதமல்லாமல், பூட்டுகளுக்கும் நல்ல பலம் யேற்படுகிறது. குழந்தைகள் நடக்கும் காலங்களில் திறந்தவெளியில் தேகாப்பியாசங்கள் செய்யும்படியான முதல் பாடத்தை தாதிக்களால் போதிக்கும்படி செய்யவேண்டியது.

வேறுபட்ட வயதிற்குத் தகுந்த ஆகார முறைகள் (DIETARY FOR HEALTHY INFANTS AT DIFFERENT AGES)

குழந்தையின் வளர்த்திக்கும், ஆரோக்கியத்திற்கும் ஜீவசத்துவாகிய ஆகாரம் மிகவும் முக்கியமானதல்லவா? இதன்கீழ் சுகதேக குழந்தைகளுக்கு மாத்திரம்தான் ஆகாரவிதிகளைச் சொல்லப்படுகிறது. ரோகநிலையுள்ள குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கவேண்டிய ஆகாரவிதிகளை ரோகத்தின்கீழ் குறித்திருக்கிறோம்.

குழந்தை நாளொருமேனியும், பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து வருவதற்கு தாய்ப்பாலே மிக சிறந்ததாகும். தாய்ப்பால் குடிப்பதினால் குழந்தை ஆரோக்கியமாயும், ஆரந்தமாயும், திடகாத்திரத்துடனும் இருந்து வரும். குழந்தைக்குப் போதுமானபடியாகத் தாயினுடைய பால்சார்து கொண்டு இருக்குமானால் வேறு வகையான பால் குழந்தைக்குத் தேவைப்படாது. குழந்தை பிறந்தது முதல் ஆறு வாரங்களில் இரண்டரைமணினேரத்திற் கொருதரம் குழந்தையை முலையுண்ணும்படிச் செய்யவேண்டும். அதன் பிறகு மூன்றுமணினேரத்திற் கொருதரமோ, நான்குமணினேரத்திற் கொருதரமோ பால் கொடுக்கவேண்டும்; ஆனால், இரவில் குழந்தைகள் நித்திரையை விட்டு பாலுக்காக எழுந்திருக்காதபடி, குழந்தைகள் நித்திரைசெய்யும் முன்பு பால் கொடுத்து விடவேண்டும். ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு குழந்தை அழுப்போதெல்லாம் பால் கொடுக்கவேண்டுமென்பது அவ்வளவு உசிதமானதாகாது. ஒரு மாதத்திற்குப்பின் குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளில் மூன்று முறையே பால் உண்ணக்கொடுப்பது முறையாகும். அதாவது காலைில் ஆறுமணிக்குப் பால் உண்ணச் செய்தால் பின் பதினொருமணிக்குத்தான் பால் கொடுக்கவேண்டும். ஆரம்பத்திலேயே சிசுக்களுக்கு இவ்வித ஒழுங்குக் கிரமங்களை நாம் படிப்படியாக செய்துகொண்டு வந்துவிட்டால், ஆகார முறைகள் ஒழுங்கும், குழந்தைகளின் நித்திரையிலோ, ஆரந்தமான விளையாட்டிலோ பங்கம் வராமலும், தாய்க்கும் சேய்க்கும் உடல் நலன் கேடுறாமலுமிருக்கும். குழந்தையானது, இரண்டு மாரிலும் மாற்றி மாற்றி உண்ண வேண்டுமென்பது பிரதானமானதாகும். மேற்கூறிய ஆகார வழியிலிருந்து சிசுக்கள் கிரம ஆகாரமுறையைக் கைக்கொள்ளுகின்றன. அதனால் எப்போதும் கிரமமான ஆகாரம் உட்கொள்ளும் முறையே அதுபவத்தில் வந்துவிடும். குழந்தைகள், குளிர், வலி, தூக்கம், கனவு இவைகளினால் அடிக்க

கடி அழும். குழந்தை அழும் நேரங்களிலெல்லாம் ஸ்தனத்தில் வாயை வைத்துக்கொள்ளும்படிச் செய்வதானது கெடுதியை விளைவிப்பதோடு, வயிற்றுவலியும், வயிற்றோட்டத்தையும் உண்டுபண்ணலாம். குழந்தைகள் வயிறு நிறையப் பால் அருந்தி, அயர்ந்து நித்திராசெய்யும்படியாகச் செய்ய வேண்டும். அப்படி நித்திரா செய்யும்படிச் செய்யாவிடில் வயிற்றில் வாயு அதிகரித்து, வயிற்றுப்பிசம், வயிற்றுவலி இவைகளை உண்டாக்கும்.

குழந்தைக்குப் போதுமான பால் தாயினிடம் இல்லை என்பதைச் சூதி யில் தீர்மானித்துவிடலாகாது. தாயானவன் பால் சுரக்கும்படியான விதமாகப் போஷிக்கப்பட்டால் பால் சாதாரணமாகச் சுரக்கும். சில ஸ்திரீகளுக் குக் குழந்தைக்குத் தேவையானதைவிட அதிகமான பால் சுரப்பு இருக்கும். அதிகமான பால் அருந்துவதனால் குழந்தை அஜீரணத்தையடையும். அவ் விதமான ஸ்திரீகளின் ஆசாரத்தை நிர்ணயம் செய்வதோடும், தகுந்த தேகாப் பியாசம் எடுத்துக்கொள்ளவும் வேண்டும். இதிலும் பால் அதிகமாகச் சுரப் பதாயிருந்தால். எண்ணெய் அல்லது உப்பு விரேசன்காரிகளைக் கொடுத்து வருவதினால் குழந்தைக்குப் போதுமான பால்மட்டும் சுரக்கும்படியாகச் செய்துவிடும். இதற்குப் பின்னும் பால் அதிகமாகச் சுரப்பதாயிருந்தால், பாலில்லாத குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுத்தல்வேண்டும். குழந்தைகளுக் குப் பால் கொடுக்கும் தாய்மார்கள் ஆகாரவிஷயத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குழந்தைக்குப் பால் கொடுக்குந்தையும், தாய்மார்கள், சீக்கிரம் ஜீரணிக்காத வஸ்துக்களையும், உயர்ந்த ஆகாரவகைகளையும் தவிர்க்கவேண் டியது. கிரமமான நேரங்களில் ஆகாரம் உட்கொள்ளவேண்டியது. பசு யெடுத்த நேரங்களில் எல்லாம் சாப்பிடுவதோ அல்லது நெடுநேரம் பசியா யிருப்பதோ கெடுதலை உண்டாக்கும். பால் கொடுக்கும் ஸ்திரீகள் தாகத் துக்கு; உத்வேககாரிகளான; (Stimulants) நரம்பு படபடப்பைக் கொடுக் கும்படியான; காப்பி, தேயிலை இவைகளின் பாணங்களை அறவே ஒழிக்க வேண்டும். தாகத்திற்குப் பாற்கலந்த நீரும். பார்லி தண்ணீர் முதலியவை களும் தகுதியானதாகும்.

பால்காரிகளைப்பற்றி சில வார்த்தை (FEW WORDS ON WETNURSES)

பிரசவித்த ஸ்திரீக்குப் போதுமான அளவாக பாலிருக்குமானால், குழந் தைக்குப் பல் முளைக்குந்தையும் பால் புகட்டவேண்டியது கிரமமாகும். தாய்க்குப் பால் குறைவாயிருந்தால், பால் கொடுக்கும்படியாக தாதிகளை நிய மிக்கவேண்டும். அப்படி நியமிக்கும் தாதியானவன்; குழந்தையை பெற்றவ னுடைய சரீர பிரக்கிருதியிலும்- வயதிலும் ஒத்தவனாகவும்; அப்போது தானே பிள்ளை பெற்றவனாயும் இருக்கவேண்டியது தவிர்க்கக்கூடாத விஷய

மாகும். முதிர்ந்த வயதுடையவர்கள் பாலால் குழந்தைக்குப் பல பிணிகள் சம்பவிக்கலாம். குழந்தைக்குப் பால் கொடுக்கும்படியாக நேமித்திருக்கும் தாதியானவன், அப்பிள்ளையையும் தன் பிள்ளையைப்போல் பாவித்து, ஆகார முறையிலும் சரீரத்தை பேணுவதிலும் தாய்க்குச் சமமானவளாக இருக்க வேண்டும். சூலகொண்டிருப்பவள் பாலும், ரோகமுள்ள ஸ்திரீயின் பாலும் குழந்தைகளுக்குப் பிணியை உண்டுபண்ணும்.

தாய்ப்பாலற்ற குழந்தைகள் (INFANTS HAVING ON MOTHER'S MILK)

குழந்தையைப் பெற்ற ஸ்திரீக்குப் பாலில்லையானாலும், பால் கொடுக்கும் தாதிகள் கிடைக்காவிட்டாலும், குழந்தைக்குப் பசும்பாலையே ஆகாரமாகக் கொடுத்துவரலாம். பசும்பாலானால் இளங்கன்றுடையதும், நோய்களொன்று மில்லாததும், சார்தருணமுடையதும், நாலு வருஷத்திற்கு முறையாததும், பத்து வருஷத்திற்குமேல் படாததுமான பசுவாகவிருக்கவேண்டும். பசுவின்பால் இல்லையானாலும், வெள்ளாட்டின் பாலையும் கீழ்க்கண்ட முறைப்படி காய்ச்சிக் கொடுக்கலாம். குழந்தைக்குக் கொடுக்கும் பசும்பாலானது ஒரே மாட்டினுடையதாக இருக்கவேண்டும். பாலில் அதிகேக்கிரமாக கிருமிகள் சேர்ந்து விஷமாக்கிவிடுமாதலால், வெகு ஜரக்கிரதையாகப் பால் மூடிவைக்கவேண்டும் பால்காக்கும் இடமும் அருகியாயில்லாமல் சுகாதார முறைக்கு ஒத்ததாக இருக்கவேண்டும். களிம்பு ஊறும்படியான பாத்திரங்களில் எப்போதும் பால் வைத்திருத்தல் கூடாது. பால் வாங்கி வைத்திருக்கும் பாத்திரங்கள் இரண்டாக வைத்துக்கொண்டு மாற்றி மாற்றிக் கழுவி சூரிய வெளிச்சத்தில் காயவைக்க வேண்டும்.

குழந்தைகளுக்குப் புகட்டும் பால் காயவைத்ததாகவே யிருக்கவேண்டும். ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணீர்விட்டு, பால் ஒரு சிறு பாத்திரத்தில் ஊற்றி, பெரிய பாத்திரத்தின் மத்தியில்வைத்து தீ எரிக்க, பெரிய பாத்திரத்திலுள்ள தண்ணீர் கொதித்துப் பாலும் சூடேறும். முதல் கொதி வந்தவுடன் பால் இறக்கிவிட வேண்டும். இதுவே பால் காய்ச்சும் தகுதிவாய்ந்த முறையாகும்.

16-அவுன்ஸ் சுடுதண்ணீரில் ஒன்றரை மேஜைக் காண்டி (Table Spoon) மரவு சர்க்கரை கரைத்து, எட்டு அவுன்ஸ் காய்ச்சின பால் சேர்த்து நன்றாக மிஸ்ரமித்துப் புகட்டுச் சோக்களின்மூலம் குழந்தைகளுக்குப் புகட்டவேண்டும். புகட்டுச் சோக்களை (Feeding Bottles) அப்போதைக்கப்போது கொதிக்கிற சுடுதண்ணீர்விட்டு சுத்தமாக அலம்பிவிடவேண்டும். அப்படியில்லையானால், புகட்டுச் சோக்களின்மீது வடிந்திருக்கும் பாலில் ஈ, ஏறும்பு

கள், மொய்த்து விஷக்கிருமிகளைப் பரப்பிவிடும். புகட்டுச் சீசாக்களுக்குப் போட்டிருக்கும் ரப்பர் முலைக்காம்பு, (Rubber nipple) பால் அதிகமாக வேணும், அதிகக் குறைவாகவேணும் வராமல் துளைகள் சரியாக விருக்கின் தனவா என்பதையும் கவனிக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு முறையும் பால் புகட்டு முன், புகட்டுச் சீசாவையும், ரப்பர் முலைக்காம்பையும் சுடுதண்ணீரால் கழுவவேண்டும். பின்னர் குளிர்த்த ஜலமுள்ள ஒரு பேவினில் (Basin) போட்டு வைப்பது நலம். குழந்தைகளுக்குப் பால் புகட்டியவுடன் சுத்தமான தண்ணீரால் வாயை கழுவ வேண்டும்.

மூன்று மாதத்திற் குட்டப்பட்ட குழந்தைகள் இரண்டரைமணி நேரத்திற் கொருதரம் 2½-அவுன்ஸ் தண்ணீரும் சீனியும் கலந்த பாலால் புகட்டப்பட வேண்டும். பிறகு மூன்று மாதத்தில் மூன்றுமணி நேரத்திற் கொருதடவை மூன்றவுன்ஸ் கலவைப் பாலால் புகட்டப்படவேண்டும்; ஆனால், ஒவ்வொரு மாதமும் கலவைப் பாலின் அளவைமட்டும் மாதம் ஒன்றுக்கு அவுன்ஸ் ஒன்று வீதம் அதிகப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். ஆறுமாதத்திற்குப் பிறகு முன் கூறிய வீதமாகக் காய்ச்சிய பாலும் சுடுதண்ணீரும் சமனாகக் கூட்டி புகட்டவேண்டும். குழந்தைகளுக்கு முலைப்பாலூட்டுவதைப் பார்த்துக் கிலும், சீசாவில் புகட்டுவது மிகவும் கஷ்டப்படும்.

ஆறுமாதத்திற்குப் பின் பாலும் தண்ணீரும் சமபங்காக கொடுப்பது குழந்தைக்கு யேற்றுக்கொள்ளாமல் அஜீரணப்பட்டால் ஒரு அவுன்ஸ் பாலில் ஒரு கிரைன்ஸ் சோடியம் ஸிட்ரேட் (Sodium Citrate) கலந்து பின்னர், முன்போல் சுடுதண்ணீர் சேர்த்துக் கலந்துகொடுக்கவும். பின்னரும் குழந்தைக்கு அஜீரணம் யேற்பட்டால், மூன்று மேஜக்கரண்டி (Table Spoon) சுடுதண்ணீரில் ஒரு மேஜக்கரண்டி நெஸ்டில்ஸ் கட்டிப்பாலை (Nestles condensedmilk) கரைத்துக் கொடுத்துப்பார்க்கவும். அப்படியும் யேற்றுக் கொள்ளாமல் அஜீரணமேற்படுமானால், சுண்ணாம்பு தெளிவுநீர் பாதியும் காய்ச்சியபால் பாதியுமாக சேர்த்துப் புகட்டவும். பசுவின் பாலும் நல்லதாகக் கிடைக்காவிட்டால், அரிசிக்கஞ்சி, பார்லி கஞ்சி, சவ்வருசிக் கஞ்சி முதலிய கஞ்சிகளில் எதையாவதொன்றின் தெளிவுநீரை கொடுத்துவரலாம்.

முலைப்பால் குடித்தாலும் சரி, பால் புகட்டப்பட்டாலும் சரி; குழந்தைகளுக்குப் பழச்சாறுகள் (Fruit Juice) கொடுப்பது மிகவும் சிரேஷ்டமாகும். ஆரஞ்சுப் பழச்சாறு, (Juice of Oranges) திராகுப் பழச்சாறு, (Juice of Grapes) இதுகளைப்போன்ற பழச்சாறுகளில் தண்ணீரும் சிறு இனிப்பும் கலந்து ஒருநாளில் இரண்டு மூன்று ஆவர்த்திக் கொடுப்பதினால் நன்மையுண்டாகும். இப் பழச்சாறுகள், ஜீரண உருப்பிற் சென்று, ஜீரணிகும்படியாக குடல்களுக்கு நல்ல உதவியை செய்வதற்கு, விட்டயின் (Vitamins) என்ற ஜீவதாது பொருளாக மாறிவிடுகின்றது.

பால் மறக்கச் செய்தல் (WEANING OF BREAST)

பால் மறக்கடிப்பது என்பதானது தாயின் பால் குடிப்பதிலிருந்து தடுக்கப்படுவது என்று பொருள்படும்.

சாதாரணமாக குழந்தைகளுக்கு ஒன்பதாமாத கடைசியில் பாலு நிறுத்தி விடுவது உசிதமாகும். தாயினுடைய திரோக்கூறு சரியாயில்லாதுபோனாலும், குழந்தைக்கு வேண்டிய பால் தாயினிடம் இல்லாமல்போனாலும், சற்று முன்னதாகப் பால் மறக்கச்செய்யலாம்; ஆனால், எந்தக் காரணத்தை முன்னிட்டும் ஏழு மாதத்திற்குமுன் பால் நிறுத்துவதும்; பத்துமாதத்திற்கு அதிகமாகக் குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுத்துக்கொண்டிருப்பதும் தகுதியானதாகாது. குழந்தைகளுக்குச் சிலர் மூன்றாண்டுவரை பால் கொடுக்க வேண்டுமென்று கூறுவது சரியல்ல. அதிகநான் குழந்தைக்கும் பால் கொடுப்பதினால், முதலில், தாய்க்குப் பலவித நோய்கள் சம்பவிக்கின்றன. குழந்தையும் அதிகநான் பால் அருந்தி வந்தால், மூலையின் சக்தி குறைந்து, புத்தி திசுண்யம் அற்று, சில சமயங்களில் புத்தி பேதமை அடைவதோடு கூட சரீரமும் க்ஷீணமடைந்துவிடுகிறது. இதுபோலவே, ஏழு மாதத்திற்கு முன், பால் மறக்கடித்தாலும், தேசதிடகாத்திரமும், போதுமான பலமு மில்லாது போய்விடும். பொதுவாக, தாயின் சரீர பிரகிருதிக்கும் சிசுவின் தேசசக்திக்கும் தக்கபடி சில மாதங்கள் முன்னாகவேனும், பின்னாகவேனும். பால் மறக்கடிப்பதால் யாதொரு கெடுதியும் கோர்துவிடாது. கோடை காலங்களில் பால் மறக்கச்செய்து மாவு சம்பந்தமான ஆகாரங்களை கொடுப்பதால் வயிற்றோட்டம் உண்டாகலாமென்றும், அதனால் ஒன்றிரண்டு மாதங்கள் முந்தியோ பிந்தியோ காலத்தை அனுசரித்துப் பால் நிறுத்தவேண்டுமென்றும், டாக்டர் ஹூட்சின்ஸன் (Dr. Hutchinson) கூறுகிறார். குழந்தைகளுக்குப் பால்பல் முளைக்கும்போதுதான் மாவும் ஜீரணமாகும். குழந்தைக்கு இரண்டு மூன்று பால்பற்கள் முளைத்தவுடன் அதன் பற்கள் கடினதையை அடைய, கடினமான ரொட்டித்துண்டையாவது, முழு ஆப்பில் பழத்தையாவது கடிக்கும்படியாகக் கொடுக்கவேண்டும். இதனால் தாடை சரியான நிலைமையில் உறுதி அடையும்.

தாய்ப்பாலில் மதுரமான ருசி இருப்பதினாலும், தாய் அன்பாகவே குழந்தைக்குப் பால்கொடுத்து வருவதினாலும், குழந்தைகளுக்குப் பால் மறக்கடிப்பது சாமான்யமான காரியமாக இருக்கமுடியாது. குழந்தைகளுக்குப் பால் மறக்கடிக்கப்போகும் காலங்களுக்கு முன்னதாகவே, குழந்தைகளைப் பராக் குக் காட்டியும், பிறரிடம் சினேகம் செய்யும்படியாகவும் பழக்கி வரவேண்டும். தாய்ப்பாலின் ரூபகத்தினால் குழந்தை தொக்திரவு செய்யுமானால், அந்த நேரத்தில் ஆகாரவியியில் சொல்லிய பிரகாரம், கஞ்சி வகைகளையோ

தண்ணீர் கலந்த பாலையோ, ரப்பர் காம்புள்ள (Rubber Nipples) புகட்டு சீசாக்களில் (Feeding Bottles) விட்டு பால் புகட்டி வரவேண்டும். குழந்தைகள் பாலுக்காக அழும் நேரத்திற்கு முன்னதாகவே, அவைகளுக்கு புகட்டு சீசாவின் மூலம் பாலையோ கஞ்சியையோ புகட்டிவிட்டால், முலைபுண்ணுவதில் நிர்ப்பந்தம் செய்யாது.

ஒவ்வொரு குழந்தைகள் எவ்வித ஆகாரங்களைப் புகட்டினாலும், முலைபுண்ணும் பிரீதியினால் தொந்திரவு செய்யலாம். அவ்விதமான குழந்தைகளுக்குப் பால் நிறுத்துவது கடினமென்றறிந்தால், முலைக்காம்புகளில் விஷமில்லாத கசப்பான வஸ்துக்களைத் தடவி, இரகசியமாக இரண்டொருமுறை முலைக்கொடுத்தால், பாலே கசப்பதாகக் கருதி, குழந்தைகள் தாய்ப்பால் குடிப்பதை விட்டுவிடும். இதற்கு முலைக்காம்புகளில் வேப்பிலையை அரைத்துத் தடவலாம்; வேப்பெண்ணையைத் தடவலாம்; அல்லது கரிய போளத்தை அரைத்துத் தடவலாம்.

இவைகளினால் குழந்தைகளுக்குப் பால் நிறுத்தியதன்பின், பால் அதிகம் சுரந்தால், பால் வற்றுவதற்குள்ள சிகிச்சைகளைச் செய்து பால் சுரக்காமல் செய்துகொள்ளவேண்டும். இல்லையானால், பால் கட்டி சுரம் முதலிய உபத்திரவங்களேற்படும்.

பால் மறக்கச்செய்ததற்குப் பின் குழந்தைகளின் ஆகாரம் (DIET OF CHILDREN AFTER WEANING)

பால் நிறுத்தப்பட்டக் குழந்தைகள் ஆகாரவிஷயத்தில் மிக எச்சரிக்கையாக இருக்கவேண்டும். பால்நிறுத்தியபின் குழந்தைகளுக்கு இரண்டாண்டு வரையில் கஞ்சி ஆகாரங்களே சிரேஷ்டமானதாகும். ஒருவயதுவரை குழந்தைகளுக்கு ஒருநாளில் ஐந்துமுறை கஞ்சிகொடுக்கவேண்டும். பின் இரண்டாண்டு வரையில் ஒரு நாளையில் நான்குமுறை கஞ்சியாகாரம் கொடுத்தல்வேண்டும்.

குழந்தைகளின் திரேகஸ்திதிக்குத் தகுந்தாப்போலும், பல் முளைத் திருப்பதற்குத் தக்கவாறும் குழந்தைகளுக்கு, அரிசிக்கஞ்சி, அரோரூட் கஞ்சி, (Arrowroot) காரன் புளோர் கஞ்சி, (Corn Flour) ரவைக்கஞ்சி, ஜவ்வரிசிக்கஞ்சி, பார்லி கஞ்சி (Barley) முதலிய கஞ்சிகளைக் கொடுக்கலாம்.

(1) அரோரூட் கஞ்சி (Arrow root Flour):—அரோரூட்மாவை வேண்டிய அளவு குளிரந்த தண்ணீரில் கரைத்துப் பிறகு போதுமான தண்ணீர் சேர்த்துக் கட்டி படாமல் கிண்டி கஞ்சி பதத்தில் இறக்கி, சீனிபோட்டுக் கொள்ளவும். இந்தக் கஞ்சி கெட்டியாகவில்லாமல் நீர் பாகமாகவே இருக்கவேண்டும்.

(2) காரன் புளோர் கஞ்சி (Corn Flour):—அரோரூட் கஞ்சிபோல் செய்துகொள்ளவும்.

(3) அரிசிக்கஞ்சி (Rice):—அதிகமான புழுங்கள் அரிசியைத் தண்ணீரில் ஊறவைத்து, பின்னர் வெயிலில் உலர்த்தி, இரண்டொன்றாக உடைத்துத் தண்ணீர்விட்டரைத்த ஓமத்தில் போட்டுப் பிசரிக் காயவைத்துச் சட்டியில் கொட்டிப் பொன்னிறமாக வறுத்து, நன்றாகத் தேய்த்து ஊதி, ஓமத்தைப் போக்கிவிட்டு, மாவாகத் திரித்துவைத்துக் கொள்ளவும். வேண்டும்போது கொஞ்சம் மரவுபோட்டுக் கஞ்சி பதமாகக் காய்ச்சி, பாலும் சீனியும் அல்லது வெறும் சீனியாகிலும் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

(4) பார்லிக்கஞ்சி (Barley):—பார்லி அரிசியை இளவறுப்பாக வறுத்து ஒன்றிரண்டாய் உடைத்ததில் இரண்டு தேக்கராண்டி 20-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 15-அவுன்ஸாக சுண்டக்காய்ச்சி, தண்ணீரைமட்டும் சீனி பால் சேர்த்தும் அல்லது சீனிமட்டும் சேர்த்தும் கொடுக்கலாம்.

(5) ரவைக்கஞ்சி (Wheat Semi Flour):—இதை கோதுமை நொய் என்றும் சொல்லுவர். புழுக்கிச் சுத்தம்செய்த ரவையை தண்ணீரில் கஞ்சி பதமாகக் காய்ச்சி, வடிகட்டி தெளிவுரைமட்டும் சீனி, பால் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

(6) ஜவ்வரிசிக்கஞ்சி (Sago):—இரண்டு கராண்டி ஜவ்வரிசியை 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு நன்றாக வேகவைத்து வடிகட்டிய தண்ணீருடன் பால், சீனி சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

இவ்விதமான கஞ்சி ஆகாரங்களினால் ஜீரணசக்தி படிப்படியாக யேற்படும். இரண்டாண்டுகளுக் குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு முழு அரிசி சாதத்தைப்போன்ற ஆகாரங்கள் பலவந்தமாகக் கொடுக்கக்கூடாது. இலகுவில் ஜீரணிக்காத தேங்காய், கறிகாய்கள், மரமிசம், கிழங்கு, பயறுவகைகள் கொடுப்பதால் குழந்தைகளுக்குக் கெடுதல் ஏற்படலாம். அதிக காரமான பேரஜன பதார்த்தங்களையும், அதி இனிப்பான தின்பண்டங்களையும் கொடுக்கவே கூடாது.

இரண்டு வயதிற்குமேல் குழந்தைகளுக்கென்றே சாதத்தைக் குழைய வடித்து பருப்புரசம், மிளகுரசம் சேர்த்து நன்றாக பிசைந்த அன்னங்களை பத்து மணிக்கும், மாலை 6-மணிக்கும் கொடுத்துவரலாம். இடைவேளைகளில் ஜீரணிக்கும் ரொட்டி வகைகளை தின்னக்கொடுக்கலாம். விடியற்கால நேரங்களில் குழந்தைகள் பசியினால் விழித்து அழுகுமானால் அந்த சமயம் கஞ்சி வகைகளில் எதையாவது கொடுக்கவேண்டும். மூன்றாண்டு கழியும் வரையில் குழந்தைகளுக்கு பெரியோர் உட்கொள்ளத்தகுந்த ஆகாரங்களைக் கொடுக்கவே கூடாது.

இரண்டாம் பாகம்

SECOND PART

ஸ்திரீ பால சிகிச்சை

இரண்டாம் பாகம்

பாலர் ரோகங்களும், பரிகாரங்களும்

(DISEASES OF INFANTS AND CHILDREN
AND TREATMENTS)

பெரியவர்களுக்கு அடிக்கடி வியாதிகள் வருவதுபோலவே பாலர்களுக்கும் வியாதிகள் வருகின்றன. ஆனால் பாலர்களுக்கேற்படும் ரோகங்கள் பெரியவர்களுக்குண்டாவதில்லை. பாலர்களுக்கு அங்க அபவயவங்கள் சரிவர பலனுறுதிருப்பதினாலேயே, அவர்கள் வியாதிகளும் தனிப்பட்டதாகவே யிருக்கின்றன. பாலர் ரோகங்கள், 12-வயது வரையில்தான் தனிப்பட்டதாகவிருக்கும். அதன்பின், அவயவங்களின் வலு சற்று அதிகரித்துப் போவதால் பெரியவர்கள் வியாதிகளே தாக்கக்கூடியதாக விருக்கிறது.

கிரந்தி, மாந்தம், தோஷம், கணை, வலிப்புள், கரப்பான்வியாதி முதலியவைகளும், பல் முளைக்கும்போதேற்படும் காச்சல், கழிச்சல், வலிப்பு முதலியவைகளும், கழிச்சலிலும் காச்சலிலும் சன்னி முதலியவைகளில் சிலதம் குழந்தைகளுக்குத் தனிப்பட்ட வியாதிகளாகவே இருக்கின்றன.

குழந்தைகளின் அழுகைக் குறிகளிலிருந்து, அவர்களின் வியாதிகளைச் சற்று நிதானிக்க முடிந்ததாயிருக்கும். குழந்தைக்கு வயிற்றுவலியுண்டாயிருந்தால், நீண்ட உரத்த சத்தமிட்டு அழுதுக் கண்ணீரைப் பெருக்கும். கொஞ்சம்விட்டு மறுபடியும் அழும். கால்களை மடக்கி வயிற்றுடனணைத்துக் கொள்ளும். நெஞ்சில் வலியாகிலும், வேறு கோளாறுகளாகிலுமிருந்தால், உரக்க அழாது; கண்ணீரும் வடியாது; இடைவிடையே பெருமூச்சுவிடும்; இலேசாக இருமும் தலையில் வலியாவது வியாதியாவது உண்டானால், கீச்சிட்டமும்; மெதுவாய் சிணுங்கும். சில சமயங்களில் மௌனமாயிருக்கும். பிள்ளைகளுக்குப் பல் முளைப்பதாலேற்படும் கோளாறுகளில், முகக் கடுகடுப்பையும், தலையிலும் திரேகத்திலுமுள்ள சூட்டின் மிகுதியையும், வாயிலிருந்து எச்சல் வடிவதையும், கைவிரல்களையாவது இதரப் பொருள்களையாவது வரையில் வைத்துக் கடிப்பதையும் கண்டு தெரிந்துகொள்ளலாம்.

சில தாய்மார்கள் குழந்தைகளை எப்போதும், மருந்தினாலேயே போஷித்து வருகிறார்கள். அவ்வித குழந்தைகள் எப்பொழுதும் கோளாளியாகவேயிருந்து வருகின்றன. காரணம்; சதா மருந்துகளைத் தின்றுத்தின்று, ஜீரண உருப்பு

கள் சக்தியற்றதாய் போவதேயாகும். ஆதலால், குழந்தைகளுக்கு முக்கிய மாய் தவிர்க்கக்கூடாத சந்தர்ப்பங்களில், சாதாரியமாய் மருந்து பிரயோகம் செய்யவேண்டுமே தவிர, அடிக்கடி மருந்துவரிடம் காண்பிப்பதும், மருந்துகளைக் கொடுப்பதும் தவறுதலேயாகும். இது குழந்தையின் வளர்ச்சியை தடைசெய்துவிடு மென்பதில் சந்தேகமில்லை.

குழந்தைகளை சாமர்த்தியமாய் கவனிப்பதிவிருந்து, அநேக வியாதிகள் வராமல் தடுக்கமுடியும். வந்தபின் சிகிச்சை செய்வதைவிட வியாதி வராமல் குழந்தைகளைக் காப்பாற்றும் உன்னதமுறைகளை தாய்மார்கள் நன்கறிந்திருக்க வேண்டும். குழந்தைகளை சுசீகரமாக வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். தினம் இரண்டுமுறை அல்லது ஒருமுறையாவது வெந்நீரில் குளிப்பாட்டி, வாசனை மாவு (Toilet Powder) பூசவேண்டும். குறித்தநேரங்களில் ஆகாரம்கொடுக்க வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு ஆகாரம் எவ்வளவு முக்கியமானதோ அவ்வளவு முக்கியமானது நித்திரையும், ஓய்வும் என்பதை மறந்துபோகக்கூடாது.

குழந்தைகளை, சூரியப்பிரகாசமும் நல்ல காற்றும் வீசக்கூடிய வீடங்களில் வைத்திருக்கவேண்டும்; அல்லது விளையாட விடவேண்டும். அருசியானதும் தூர்நாற்றமுமடிக்கும் இடங்களிலும், மண் புரண்ட இடங்களிலும் குழந்தைகளை விளையாட விடக்கூடாது. ஈரமான விடங்களிலும், இருட்டிலும் குழந்தைகளை விடக்கூடாது. குழந்தைகள் நித்திரை செய்யும்போதும், தனிமையாயிருக்கும்போதும் பயப்படும்படி சப்தமிடக்கூடாது. இவ்விதமான இன்னு மற்ற முறைகளை கையாடுவதும் தவிர, குழந்தைகளுக்கு மாதமொரு முறையாகிலும் விரேசன மருந்துகள் கொடுத்து, வயிற்றைச் சுத்திசெய்துக் கொண்டிருக்கவேண்டும். அதன்பின்னும், திரேக பிரகிருதியின் பயனாய் ரோய் ஏற்படுமானால் தாமதமின்றி சிகிச்சை செய்யவேண்டும்.

இதன்மீது குழந்தைகளுக்கான தனிப்பட்ட வியாதிகளுக்கு சிகிச்சைகள் கூறப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொருவரும், பிறர் சகாயமின்றி தாங்களாகவே வைத்திய சிகிச்சை செய்துக்கொள்ளும், சுலபமான முறைகளே இதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

குழந்தைகளுக்கு எப்போதும் அபின் கலவை மருந்துகளை கொடுப்பதில் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கவேண்டுவதும் தவிர, அவ்வித மருந்துகளை தவிர்ப்பதே நலமாகும்.

இந்நூலில் ஒரு வியாதிக்குப் பல சிகிச்சை முறைகள் கூறியிருப்பதால், ஒரு மருந்து கிடைக்காவிட்டாலும், மற்றொரு முறையை செய்துக்கொள்ளலாம்.

குறிப்பு:—பத்தியம் என்று குறித்திருக்கும் மருந்துகளுக்கு, பால்குடிக்கும் குழந்தைகளுக்கானால், தாய் பத்தியமிருக்கவேண்டும். பால் குடியாத குழந்தைகளானால், குழந்தைகளே பத்தியமிருக்க வேண்டுமென்பதை யறியவும்.

கிரந்தி (SYPHILLIS)

குழந்தைகள் பிறக்கும்போதே வியாதியுடன் பிறப்பதண்டு. அவ்வித வியாதியில் கிரந்தி இனம் ஒன்று. கிரந்திரோகம், செங்கிரந்தி, கருங்கிரந்தி யென இருவகைப்படும். கிரந்திரோகமானது தாய் தந்தையரின் காரணமாகவே கருவில் ஊறி வளர்வதாகும். தாய் தந்தையரிடமாக உள்ள மேக ரோகத்தினால் இது சம்பவிப்பதாயிருப்பதால், கருவுற்றிருக்கும்போதே தாய் தக்கவிதமாய் நடந்துக்கொள்ள வேண்டும். பிரமேக ரோகமுள்ள தாய் தந்தையர்களுக்குக் கருபற்றினால் மூன்றாமாதத்திலேயே தக்க அலுவதம் உட்கொண்டு கருப்பையிலிருக்கும் சிசுவுக்கு ரோகம் தாக்காதவாறு கவனிக் துக் கொள்ளவேண்டும். இது சர்மரோக இனத்தில் சேர்ந்ததென்றாலும், இதனால் விபத் தேற்படுவதுண்டு.

கருங்கிரந்தி—Black Syphillis

சிசுவுக்குக் கருங்கிரந்தி ரோகம் சார்ந்திருந்தால், குழந்தை பிறந்தவுடன் சீறி அலறி அழும்; திரோகம் உஷ்ணமாக விருக்கும்; கண்ணெத்திற வரது மயக்கம்கண்டு சுவர்ணையற்றிருக்கும்; உடலை முறுக்கி முறுக்கி அழும்; நாவறட்சி கண்டு குரல் நெரிந்து கத்தும்; முகம் சோர்வுறும்; பால் குடியாது; வயிறு ஊதியிருக்கும்; உள்ளங்கால், உள்ளங்கை இவற்றில் கருநிறம் ஏறும்.

கிகிச்சை

- (1) சிற்றாமணக்கெண்ணெய் அவுன்ஸ் 12 கழுதைலத்திச்சாறு அவுன்ஸ் 12
அவுரிஇலைச்சாறு ,, 12
இதில், வசம்பு ரூபாயெடை 3 1/2 வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை 3 1/2

தூள் செய்துபோட்டு எரித்து வடித்து ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் காலையில் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

- (2) சிற்றாமணக்கெண்ணெய் அவுன்ஸ் 12 கல்லெண்ணெய் அவுன்ஸ் 12
பசுவின்செய் ,, 12 சங்கனிலைச்சாறு ,, 12
சுக்கு ரூபாயெடை 3 1/2 மிளகு ரூபாயெடை 3 1/2
திப்பிலி ,, 3 1/2

சுக்கு மிளகு திப்பிலியைப் பொடித்து, எண்ணெய், சாறு இவற்றுடன் கலந்து கடுமையான வெயிலில் 4-மணிநேரம் வைத்திருந்து, காலை மாலை 5; 6 துளி வீதம் உள்ளுக்குக் கொடுத்தும், உடம்பு ஊதியந்தரும் பூசியிருத் தும் சாயந்திர நேரத்தில்:—

செம்முள்ளி, கிரந்திரோகம் இரண்டையும் சமமாகப்போட்டுக் காய்ச் சிய இளஞ்சூடான கஷாயத்தால் குளிப்பாட்ட வேண்டும். (பத்தியம்.)

மேற்சொல்லிய மருந்துகளை உள்நுக்குக் கொடுத்து அத்துடன் அங்கு வண்டம் ஐட்ராஜ்ஜரி (Unguentum Hydrargeri) அல்லது புளு ஆய்ண்ட் மென்ட் (Blue Ointment) இதில் சுண்டக்காயளவு எடுத்துப் போதிய வாசலீனோடு சேர்த்து அடிவயிற்றில் வெளிப்பிரயோகமாகத் தடவி துணியால் சுற்றி வைக்கலாம்.

சன்னிகள்

(COLLAPSE - INFANTILE DELIRIUM)

சன்னி காச்சல் ரோகத்துடன் சேர்ந்த ஒரு வியாதி. காச்சல் கடுமையாக அதாவது 105-106-டி கிரி இருக்கும்போது சன்னி ஆரம்பமாகி பின் திரோகத்தைக் குளிரச்செய்து மரணத்தை வருவிக்கும். சன்னி ஆரம்பத்திலேயே சன்னியாக வராதாகையால் காச்சல் குணங்கள் தோன்றும்போதே தக்க சிகிச்சை செய்தால்தான் சன்னி வராமலிருக்கும். சன்னி கண்டவுடன் சிகிச்சை செய்யக்கூடிய விதத்தினாலும்பட்டும் சுகம் ஏற்படும். சன்னியின் நிலைமை விருத்தி யடைந்துவிட்டால் பின்னர் சிகிச்சைக்கு வசப்படாது. சன்னியில் பலவகை உண்டு. அவைகளுக்குத் தமிழ் சிகிச்சை முறைகள் வேறுபட்டே யிருக்கின்றன.

ஆம சன்னி:—

திரோகோஷ்ணம் மிகுதியாகவே யிருக்கும். கண்ணைச் சூன் அகிகமாயிருப்பதால் கண்ணைத் திறக்கமுடியாமல், குழந்தைகள் அழுதுக்கொண்டே யிருக்கும். பால் குடிக்காது; குரல் கம்மல் உண்டாகும்; மலச்சிக்கல் ஏற்படும்; நெற்றியைச் சுழித்துக்கொண்டே யிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) கடுக்காய்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	கடுகுரோகணி	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
சிவதைவேர்	,, $\frac{1}{2}$	சுக்கு	,, $\frac{1}{2}$
மிளகு	,, $\frac{1}{2}$	திப்பிலி	,, $\frac{1}{2}$

இவற்றைப் பொடித்து 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 4-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) சாணைவேர்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	மூக்குரட்டைவேர்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
பொடுத்தலை	,, $\frac{1}{2}$	நாய்துளசி	,, $\frac{1}{2}$
சுக்கு	,, $\frac{1}{2}$	மிளகு	,, $\frac{1}{2}$
திப்பிலி	,, $\frac{1}{2}$	சோகம்	,, $\frac{1}{2}$

இவற்றைப் பொடித்து 16-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 4-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(8) நெற்றாமணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ்	6
இலுப்பெண்ணெய்	"	6
வேப்பெண்ணெய்	"	6
கவ்வெண்ணெய்	"	6
வெள்ளைப்பூண்டுச்சாறு	"	6
கொடிவேலிவேர்பட்டை	ரூபாயெடை	1
சங்கனவேர்பட்டை	"	1
எருக்கனவேர்பட்டை	"	1
முடக்கொத்தான்வேர்	"	1
■ முட்டைத்தலைம்	அவுன்ஸ்	2

வேரையும், வேர்ப்பட்டையையும் துள்செய்து எண்ணெயுடன் சூலந்து கொஞ்சேரம் வெயிலில் வைத்திருந்து திரேகாநியந்தமும் சூடுபறக்கத் தேய்க்கலாம்.

சன்னிப் பொது மருந்துகளிலொன்றாகக் கொடுத்துவரலாம்.

கோரமாதந்தச் சன்னி:—

கோராமச் சன்னி யென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

கோராமச் சன்னி:—

இதைக் கோரமாதந்தச் சன்னி யென்றும் சொல்லப்படும். திரேகோவ்ணம் மிகுதியா யிருக்கும். அவயவங்களின் சதைகள் தடித்துடக்கும். ■■■ கால்களைப் பதைத்த இழுக்கும். வரைய கோணல் கோணலாக இழுக்கும். உடம்பு வீங்கியதைப்போல் ஊதும்.

சிகிச்சை

சூம்மட்டிக்காய்ச்சாறு	அவுன்ஸ்	48
முற்றினவேப்பம்பட்டை கஷாயம்	"	48
நெற்றாமணக்கெண்ணெய்	"	48
வெந்தோன் நிக்கிழங்கு	ரூபாயெடை	6
நீர்முள்ளிவேர்	"	6
சிவனார்வேம்பு வேர்	"	6
முன்னுமுருங்கைவேர்	"	6
வெள்ளைச்சாரணவேர்	"	6
முடக்கொத்தான் வேர்	"	6
ஏலரிசி	"	6
சீரகம்	"	6

■ செய்முறை ஆரம்பமாகும் காண்க.

கருஞ்சீரகம்	”	6
கடுகுரோகிணி	”	8
பெருங்காயம்	”	6
முகுறுமுட்டை	”	3
கோழிமுட்டை மஞ்சள் கரு	”	8

தூள் செய்யவேண்டியதைத் தூள்செய்து, யாவற்றையும் ஒன்றாய்க் கலந்து மெழுகுபதமாய்க் காய்ச்சி வடித்து, $\frac{1}{2}$, 1-தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம். (மருந்து நிறுத்தியபின் மூன்றுநாள் கடும்பத்திய மிருக்க வேண்டும்.)

சன்னிப்பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

தூர்திரீக சன்னி:—

திரேகோஷ்டணம் அதிகமாயிருக்கும்; திரேகாதியந்தமும் தடிதடிக்கும்; இடுப்புக்குக் கீழ்பாகங்கள் குளிர்த்து. சில்விட்டிருக்கும்; அடிக்கடி மயக்கம் உண்டாகும்; பால் குடியாது.

சிகிச்சை

தைவேளைவேர்	ரூபாயெடை	$\frac{1}{2}$	வெள்ளைப்பூண்டு	ரூபாயெடை	$\frac{1}{2}$
ஊமத்தைவேர்	”	$\frac{1}{2}$	வசம்பு	”	$\frac{1}{2}$
முருங்கைவேர்	”	$\frac{1}{2}$	மயிலிறகு	”	$\frac{1}{2}$
சீந்தில்வேர்	”	1			

அரைகுறையாய்ப் பொடித்துக் கலந்து, ஒரு கம்பளியில் வைத்துத் திரிபோல் சுருட்டி, வேப்பபண்ணெயில் நனைத்துக் கொளுத்தி, அந்தப் புகையைச் சுவாசிக்கும்படிச் செய்தும், அந்தப் புகையால் உடலாதிவந்தத் திற்கும் தூபம் காண்பிக்கவும் செய்யலாம்.

சன்னி பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

மாந்தசன்னி:—Collapse Diphtheria.

சுரம் கடுமையாயிருக்கும்; குழந்தை ஒரு கண்ணை மூடிக்கொண்டு, ஒரு கண்ணைச் சிமிட்டாமல் உருட்டி உருட்டி விழிக்கும்; கைகால் கோண லாக வலிக்கும்; மூத்திரம் சிவந்திறங்கும்; பெருமூச்சு உண்டாகும்; தூக்கம் வராது; உடல் மஞ்சளாகவிருக்கும்; பால் குடியாது.

சிகிச்சை

(1) கஞ்சாவேர்	ரூபாயெடை	1	தூராவேர்	ரூபாயெடை	1
ஊமத்தைவேர்	”	1	கோரைக்கிழங்கு	”	1

தூள் செய்து வேப்பபண்ணெய் விட்டு வறுத்து அந்தத்தூளை நெருப் பில் தூவி குழந்தையின்பேரில் புகை படும்படி செய்யலாம்.

- (2) குட்டிவிளாயிலை ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
வசம்பு ,, $\frac{1}{2}$ ஒமம் ,, $\frac{1}{2}$

ஒன்று யிடித்துச் சாறு பிழிந்து ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை 3-நாள் கொடுத்து வரலாம்.

- (3) கஸ்தூரி ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ குங்குமப்பூ ரூபாயெடை 1
கோரோசனை ,, 1

மூலைப்பால் விட்டரைத்து மிளகவ்வளவு பெரிய மாத்திரைகளாக்கி தினம் மூன்றுவேளை மூலைப்பாலில் கொடுக்கலாம்.

- (4) நல்லெண்ணை அவுன்ஸ் 24 முருங்கைப்பட்டைச்சாறு அவுன்ஸ் 48
வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை 3 வசம்புக்கரி ரூபாயெடை 1

இடித்துச் சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து ஒரு தேக்காண்டிவீதம் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

- (5) கோரோசனை ரூபாயெடை 1 கோஷ்டம் ரூபாயெடை 1
திப்பிலி ,, 1 மாசக்காய் ,, 1
அக்காரம் ,, 1 கருஞ்சீரகம் ,, 1

மூலைப்பால்விட்டரைத்து மிளகவ்வளவு பெரிய மாத்திரைகள் செய்து தினம் 3-வேளை ஒரு மாத்திரை வீதம் மூலைப்பாலில் கொடுத்துவரலாம்.

- (6) மஞ்சள் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ சாதிக்காய் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
சுக்கு ,, $\frac{1}{2}$ திப்பிலி ,, $\frac{1}{2}$
மிளகு ,, $\frac{1}{2}$ கிராம்பு ,, $\frac{1}{2}$
கடுகுரோகணி ,, $\frac{1}{2}$ ஏலம் ,, $\frac{1}{2}$
நாபிக்கிழங்கு ,, $\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்து எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் 12-மணி நேரம் மைபேரல் இலைத்து உளுந்தவ்வளவு பெரிய மாத்திரைகள் செய்து, காலை மாலை ஒரு மாத்திரைவீதம் ஒரு அவுன்ஸ் மாசிபந்திரி கஷாயத்தில் கொடுத்துவரலாம்.

சன்னிக்குப் பொது மருந்துகள்:—

- (1) அதிமதுரம் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ தானிசபத்திரி ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
இலுப்பைப் பூ ,, $\frac{1}{2}$ திப்பிலி ,, $\frac{1}{2}$
ஏலரிசி ,, $\frac{1}{2}$ திராசைப்பழம் ,, $\frac{1}{2}$
கடுகுரோகணி ,, $\frac{1}{2}$ தேவதாரு ,, $\frac{1}{2}$
கோரோசனை ,, $\frac{1}{2}$ நன்னூரிவேர் ,, $\frac{1}{2}$
சடாமாஞ்சில் ,, $\frac{1}{2}$ நிலைப்பனைக்கிழங்கு ,, $\frac{1}{2}$
சந்தனம் ,, $\frac{1}{2}$ பேரிச்சம்பழம் ,, $\frac{1}{2}$
சுக்கு ,, $\frac{1}{2}$ விலாமிச்சைவேர் ,, $\frac{1}{2}$
வெட்டிவேர் ,, $\frac{1}{2}$

இதே மாத்திரையை முலைப்பாலில் கொடுத்தால் சுகல கிணைகோய்
கனம் தீரும்.

எல்லாவற்றையும் ஒன்றாகப் பொடித்து வேப்பெண்ணையில் போட்டு, ராய்க் காய்ச்சிவடித்து ½-1-தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

- | | | | |
|-----|---|-----------|----|
| (7) | பல்விஸ் காம்ப்ளர் (Pulvis Camphor) | *கிரைன்ஸ் | 48 |
| | ஆயில் ஒலிவா ரெவின்டிஸ் (Oil Olivae Recentis) ஆவுன்ஸ் | | 1 |
| | ஒன்று சேர்த்து, 5, 10-மினியம் ஊசிமூலம் இஞ்செக்ட் செய்யலாம். | | |

மாந்தம்
(DIPHTHERIA)

இது அற்பக் காய்ச்சலுடன் குழந்தைகளுக்குவரும் ஒரு பயங்கர வியாதி இது தொத்துவிஷக் கிருமிகளால் ஏற்படுவதென்று மேல்காட்டு வைத்திய சிந்தார்த்தம் கூறுகிறது; ஆனால், இது அஜீரணத்தா லாவதென்று. தமிழ் முறை நூற்கள் கூறுகின்றன. குழந்தை பிறந்ததுமுதல் மூன்றாண்டுமட்டும்

தான் இவ்வியாதி ஏற்படும். ஐந்தாண்டுக்குமேல் இவ்வியாதி ஏற்படுவதே யில்லை. முதலில் காய்ச்சல் 101, 102 டிகிரி யிருக்கும்.

தொண்டை புண்பட்ட மாதிரியாக சிவந்து வீங்கியிருக்கும்; வாயின் உட்பாகங்களில் வெளிரின பச்சைநிறமானத் தடிப்புகள் உண்டாகும். தொண்டை, வாய், உள்நாக்கு இவைகள் புண்பட்டு வீங்கிவிடுவதினால், குழந்தை பால் குடிக்க முடியாதபடி உபத்திரவப் படும்.

சுரத்துடன் வியர்வை காணும்; வார்தி வயிற்றோட்டம் ஏற்படும். சில சமயம் மலத்துடன் சீதம் கலந்தும், சில சமயம் மலம் தண்ணீராயும், பால் போலும், நுரையாயுமிருக்கும்; நாவு வறண்டும், தொண்டைக்கட்டியு மிருக்கும்; குழந்தை பால் குடிக்காது; கண் குழிவிழும்; கால் குளிரும்; வாய் நாற்றமடிக்கும்; வீழி சுற்றிக்கொண்டே யிருக்கும், கால் சேர்ந்துபோகும்.

மார்த்தம் எட்டுவகையென்று சொல்லப்படு மென்றாலும், ஒவ்வொருத் தனிப்பட்ட குணங்குறிகளைக் கொண்டு பலப்பெயரால் குறிக்கப்படுகிறது அவையாவன:—

அடைமார்த்தம்	சிலேத்மமார்த்தம்	பித்தமார்த்தம்
அட்சரமார்த்தம்	சுழிமார்த்தம்	பேதியக்கரமார்த்தம்
அள்ளுமார்த்தம்	செரியாமார்த்தம்	பேய்மார்த்தம்
உளை மார்த்தம்	சொருகுமார்த்தம்	போர்மார்த்தம்
ஊதுமார்த்தம்	தலைமார்த்தம்	மலடிகள்மார்த்தம்
கணைமார்த்தம்	துலைமார்த்தம்	மூக்குமார்த்தம்
கட்டுமார்த்தம்	நீர்மார்த்தம்	வாதமார்த்தம்
கழிமார்த்தம்	பால்மார்த்தம்	வான்மார்த்தம்
சூலமார்த்தம்	புளிமார்த்தம்	விஷமார்த்தம்
		வீக்கமார்த்தம்

இவைகளைத் தவிர:—சத்திமார்த்தம்; சன்னிபாதமார்த்தம்; இழுப்புமார்தம்; தோஷமார்த்தம் எனவும் பல மார்த்தங்களைக் கூறுவர்.

அடைமாந்தம்:—

குழந்தை வயிறு பொருமியிருக்கும்; சில சமயம் நுரையாகவும், சில சமயம் பலவிதமாகவும் கழியும்; மலம் புளிப்புவாடை அடிக்கும்; கை கால் களை முடக்கி வைத்துக்கொள்ளும்.

சிகிச்சை:—மார்தப் பொது மருந்துகளைக் கொடுத்துவரலாம்.

அட்சரமாந்தம்:—

எலும்புகளெல்லாம் அநி உஷ்ணம் கண்டிருக்கும்; சுரத்துடன் குளிர் இருக்கும்; வயிற்றோட்ட முண்டாகும்; குழந்தை உடல் மெலிந்துவிடும்; வாயும் உதடும் வெளுத்திருக்கும். ஒரு சமயம் வாயும், உதடும் புண்பட்டிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) துத்தியிலை	ரூபாயெடை	2
ஆடாதோடை யீர்க்கு	"	2
நுணுநர்க்கு (மஞ்சநெத்தி)	"	2
வெந்தயம்	"	2

இவற்றை 48-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 12-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில்,

பேய்க்கும்மட்டி இலைச்சாறு	வெங்காயச்சாறு	அவுன்ஸ்	48
அவுன்ஸ் 6	சிற்றமணக்கெண்ணெய்	"	48
நுணு யிலைச்சாறு	"	48	சிற்றாத்தை ரூபாயெடை 1
விலவ யிலைச்சாறு	"	48	கடுகுரோகினி "
தைவேளைச் சமூலச்சாறு	"	48	கடுக்காய் "
பொடுதிலைச்சாறு	"	48	அக்காரம் "
செம்முள்ளிச்சாறு	"	48	வெளுச்சிப்பிளின் "
ஆடாதோடை யிலைச்சாறு	"	48	கருஞ்சீரகம் "
அவுரியிலைச்சாறு	"	6	கஸ்தூரி மஞ்சள் "

தூள் செய்யவேண்டியதை தூள் செய்து ஒன்றாய் கலக்கி மெழுகுபத மாய்க் காய்ச்சி வடித்து, ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் 3-நாள்களுக்குக் கொடுத்து வரலாம். (உப்பு, புளிதள்ளி கடும் பத்தியம்.)

(2) மணித்தக்காளி இலைச்சாறு	அவுன்ஸ்	48
அகத்தி யிலைச்சாறு	"	48
சோற்றுக்கற்றழைச்சாறு	"	48
வெங்காயச்சாறு	"	48
சிற்றமணக்கெண்ணெய்	"	48
மதுக்காரைவேர்	ரூபாயெடை	3
வாட்பூலாவேர்	"	3
துத்திவேர்	"	3
இளவறுப்பாய் வறுத்த வெந்தயம்	"	3

தூள் செய்யவேண்டியதைத் தூள்செய்து கலந்து, காய்ச்சி வடித்து 3 தேக்கரண்டியளவாக உள்ளுக்கும் கொடுத்து 3 தட்டிலும் பூசலாம். (பத்தியம்)

மாந்தப் பொதுமருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

அள்ளுமாந்தம்—Pleurisy Fever

அள்ளுமாந்தமென்பது சகல குணங் குறிகளிலும், பால்மாந்தத்தை ஒத்த தாகவே யிருக்கும்; ஆனால், குழந்தை சுவாசிக்கும்போது நெஞ்சு உயர்ந்

■ சமூலம்=வேர், இலை, பூ, காய்.

தம், நெஞ்சக்குழி பள்ளமாயும், பக்கவிலாக்களில் பள்ளமாயுமிருக்கும். இதை சிலர் நாய்க்கணை என்றும் சொல்லுவர்.

சிகிச்சை :—பால்மாந்தத்திற் குண்டான சிகிச்சைகளையும், மாந்தப் பொதுவிற்கான சிகிச்சைகளையும் அபினியாசசன்னிசுரத்திற் குண்டான சிகிச்சைகளையும் செய்துவரலாம்.

உளைமாந்தம் :—

திரேகோஷ்ணம் ஏறக்குறைய அதிகமாகவே யிருக்கும்; மலச்சலம் இறங்காது; குழந்தை ஏங்கி யெங்கியும், திடீரென்று பயந்தும் அழும்; கண் விழிகளை சுழற்றி வெரிப்புடன் பார்க்கும்; பால் குடியாது.

சிகிச்சை.

(1) புல்லுருவி ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ பனைவெல்லம் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு அதில் அரைக்கால் ரூபாயெடையளவு எடுத்துக் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய்விட்டுக் குழப்பிக் கொடுக்கலாம்.

(2) சங்கனவேர் ரூபாயெடை 1 கொடிவேலிவேர் ரூபாயெடை 1
ஆடாதோடைவேர் ,, 1 கொன்றைவேர் ,, 1
புங்கமரத்துப்பட்டை ,, 1 இந்துப்பு ,, 1

இவற்றை 48-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 6-அவுன்ஸாக வற்றக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

(3) நாக்குப்பூச்சி ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ வேப்பம்பேர் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
வசம்பு ,, ,, வெள்ளைப்பூண்டு ,, ,,
பெருங்காயம் ,, ,, † நேர்வாளம் ,, ,,

பொடித்து 48-அவுன்ஸ் சிற்றமணக்கெண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து 10-20-துளிவீதம் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்)

(4) † நாக்குப்பூச்சி ரூபாயெடை $\frac{3}{4}$ நாரத்தைவேர் ரூபாயெடை $\frac{3}{4}$
நாசரமூலி ,, ,, $\frac{3}{4}$ வெள்ளைப்பூண்டு ,, $\frac{3}{4}$
வசம்பு ,, $\frac{3}{4}$ பெருங்காயம் ,, $\frac{3}{4}$
கருஞ்சீரகம் ,, $\frac{3}{4}$

† நாக்குப்பூச்சியைச் சற்றுநேரம் பாலில்போட்டிருந்து மண்ணைக்கக்கிய பின் தண்ணீரில் கழுவி எடுத்துக்கொள்ளவும்.

† நேர்வாளமுத்து ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியே எருமைச்சாணியில் புதைத்து நாரத்துடன் நெருப்பிலிட்டு வெந்தபின் எடுத்து, கொட்டையை உடைத்து பருப்பு மத்தியிலிருக்கும் குருத்தை எடுத்துவிட்டு மறுபடி பாலில் வேகவைத்து உபயோகிக்கவும்.

‡ 60-ம் பக்கம் பார்க்க.

இவற்றை மணத்தக்காளிச்சாறு விட்டரைத்து, 48-அவுன்ஸ் சிற்ற மணக்கண்ணெயில் கலக்கிக் காய்ச்சிவடித்து, 5, 1-தேக்கரண்டியளவாக மூன்றுநாள் கொடுத்து வரலாம். (உப்பு, புளி, தள்ளி கடும் பத்தியம்.)

மார்தப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

ஊதுமாந்தம்:—

திரேகோஷ்டணம் அதிகமாகவேயிருக்கும்; திரேகம் வீக்கம் கண்டிருக்கும்; வயிற்றோட்டம், வயிற்றிரைச்சல்; வார்தி முதலியவைகளிருக்கும். கழி யும் மலமானது; வெள்ளையாகவும், நுரையாகவுமிருக்கும்; தொண்டை சிவந்து வீங்கியிருக்கும்; தொண்டையில் கைபட்டால் வலி தாளாமல் குழித்தை கம்மிய குரலாயமும்; பால் குடியாது.

சிகிச்சை

(1) சீரகம் ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$ கடுகுரோகணி ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$

இதை வதக்கிப் பிழிந்த வேலிப்பருத்தி இலைச்சாறு வேண்டியவரை விட்டுக் குழம்பாக அரைத்து வடிசட்டிய சாற்றில் 5, 1-தேக்கரண்டியும், முலைப்பால் 2-தேக்கரண்டியும் சேர்த்துக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) கோரோசின ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ திப்பிலி ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
வெள்ளைப்பூண்டு ,, ,, அதிமதுரம் ,, ,,

இவற்றைக் கோழிமுட்டை வெள்ளைக்கருவை விட்டு மைபோலரைத்து, கால் ரூபா எடை அளவாக இரண்டவுன்ஸ் முலைப்பாலில் கலக்கி மூன்று தினம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

(3) வெங்காரம் ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$ கருஞ்சீரகம் ரூபாயெடை $\frac{3}{8}$
கடுகுரோகணி ,, $\frac{1}{8}$

இவற்றை முலைப்பால் விட்டரைத்து, மிளகவ்வளவு பெரியமாத்திரைகள் செய்து; ஒரு மாத்திரைவீதம் கடுதண்ணீரில் கரைத்துக் கொடுத்து வரலாம்.

(4) பொடுதலை ரூபாயெடை 1 புளியிலை ஈர்க்கு ரூபாயெடை 1
வேப்பம் ஈர்க்கு ,, 1 நுறு ஈர்க்கு ,, 1
மாயிலை ஈர்க்கு ,, 1 நொச்சி ஈர்க்கு ,, 1

நசுக்கி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாக சுண்டக்காய்ச்சி ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

(5) ரசமாத்திரை கொடுக்கலாம். செய்முறை கடைசீபாகம் காண்க.
மார்தப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

கணைமாந்தம்:—

திரேகோஷ்டணம் அதிகமாயிருந்தாலும், உள்ளங்கால்கள் மட்டும் குளிர்ந் திருக்கும்; உடல் மெலிவுறும்; வயிறு இரைந்து பாசிபோல் கழியும்;

நாவரண்டிருக்கும்; கண்ணில் நீர்வடியும்; நெஞ்சு உயர்ந்து உயர்ந்து அழுங்கும்; வார்த்தியாகும்; அடிக்கடி மயக்கம் உண்டாகும்; கண்விழி வட்டமாய் சுற்றும்.

சிகிச்சை

- (1) புள்ளடிச்சாறு அவுன்ஸ் 12 பழம்பாசிச்சாறு அவுன்ஸ் 12
பொடுதலைச்சாறு ,, 12 வெங்காயச்சாறு ,, 12
தகரையிலைச்சாறு ,, 12 சிற்றாமணக்கெண்ணெய் ,, 24
மணித்தக்காளியிலைச்சாறு ,, 12 வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை 3
கருநொச்சி யிலைச்சாறு ,, 12 வசம்பு ,, 3

ஒன்றாக சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து, காலையில் ஒரு தேக்கரண்டியளவு கொடுத்து மாலையில்:—

சுக்கு	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	ஏலரிசி	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
திப்பிலி	,,	$\frac{1}{2}$ பொன்முகட்டை இலை	,,
திப்பிலிமூலம்	,,	$\frac{1}{2}$ தூதுவேளை யிலை	,,
ஓமம்	,,	$\frac{1}{2}$	

ஒன்றாகத் தட்டி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரவும்.

- (2) நொச்சியிலை ஒருபிடி முசுமுசுக்கையிலை ஒருபிடி
துளசியிலை ,,

பிட்டவிப்பதைப்போல் இலையெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து, அவித்து சாறெடுத்துக் கொடுத்துவரலாம்.

- (3) புங்கியிலையீர்க்கு ஒருபிடி நாரத்தை யிலையீர்க்கு ஒருபிடி
புளியிலையீர்க்கு ,, சங்கியிலையீர்க்கு ,,
நொச்சியிலையீர்க்கு ,, அவுரியிலையீர்க்கு ,,
மாயிலையீர்க்கு ,, பொன்னுவரையிலையீர்க்கு ,,
வேப்பிலையீர்க்கு, ,, வேலிப்பருத்தியிலை ,,
கறிவேப்பிலையீர்க்கு ,, பொடுதலை ,,

இவற்றை எல்லாம் நசுக்கி 48-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு அதில்:—

ஓமம்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	இந்துப்பு	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
கடுகுரோகிணி	,,	$\frac{1}{2}$	

இவற்றைத் தனிமையாக ஒரு வெள்ளைத்தனியில் முடிந்துபோட்டு 12-அவுன்ஸாகும்வரை சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் மறுபடியும் துணியில் முடிந்திருந்த சரக்கையும் மைபோலரைத்துக் கலக்கி அதில் இரண்டு தேக்கரண்டி யளவாக காலே மாலே கொடுத்து வரலாம்.

(4) வால்மிளகு	ரூபாயெடை 2	வசம்பு	•	ரூபாயெடை	■
வெள்ளைப்பூண்டு	„ 2	கிராம்பு	„		2
ஓமம்	„ 2	செண்பகப்பூ	„		2

இவற்றைப் பொடுதலைச்சாறுவிட்டு 12-மணி நேரம் அரைத்துச் சுண்டக்காயளவு பெரிய மாத்திரைகள் செய்து காலை மாலை ஒரு மாத்திரை வீதம் பொடுதலைச்சாற்றில் மூன்றுநாளைக்குக் கொடுத்து வரலாம்.

(5) வேலிப்பருத்தியிலை	ரூபாயெடை ½	தைவேளைவேர்	ரூபாயெடை ½
வெள்ளைச்சாரணையிலை	„ „	வசம்பு	„ „
குட்டிவிளாயிலை	„ „	வெள்ளைப்பூண்டு	„ „

நன்றாகக் கசக்கி 5 ரூபாயெடை எருமைவெண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி நெய்யை வடித்து ஒரு அவுன்ஸ் முலைப்பாலில் ஒரு தேக்கரண்டி நெய் சேர்த்து மத்தித்து காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

(6) நுணயிலைச்சாறு (மஞ்சளெத்தி)	அவுன்ஸ்	24
வெங்காயச்சாறு	„	24
சிற்றாமணக்கெண்ணெய்	„	24
வில்வக்கொழுந்து		ஒருபிடி
பொரித்தவெங்காயம்	ரூபாயெடை	½
கடுக்காய்த்தூள்	„	½
சீரகம்	„	½

தூள் செய்யவேண்டியவற்றைத் தூள்செய்து எண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, 15, 20-துளி வரை கொடுத்து வரலாம். (கடும் பத்தியம்)

(7) திருகுக்கள்ளிப்பால்	அவுன்ஸ் 3	சீரகம்	ரூபாயெடை ½
வெள்ளாட்டுப்பால்	„ 96	கருஞ்சீரகம்	„ „
பச்சை இண்டுக்		வசம்பு	„ „
கொழுந்துச் சாறு	„ 24	விலாமிச்சுவேர்	„ „
சிற்றாமணக்கெண்ணை	„ 48	வெட்டிவேர்	„ „
செண்பகப்பூ	ரூபாயெடை ½	நன்னூரிவேர்	„ „
அதிமதுரம்	„	சிறுநாகப்பூ	„ „
சாதிக்காய்	„	பூலாக்கிழங்கு	„ „
சாதிப்பத்திரி	„	கடுக்காய்	„ „
ஏலம்	„	கடுகுரோகினி	„ „
கிராம்பு	„	கோரோசனை	„ „
வெங்காயம்	„	கோஷ்டம்	„ „
வெள்ளைப்பூண்டு	„	நாகேசரம்	„ „

இதில் பொடி செய்யவேண்டியவற்றைப் பொடிசெய்து, எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக எண்ணெயில் சேர்த்துக் கலக்கிக் காய்ச்சி வடித்து, ஒரு அவுன்ஸ் முலைப்பாவில் ஒரு தேக்கரண்டி எண்ணெய் விட்டுக் கலக்கி, காலையில் மட்டும் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

மாந்தப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

கட்டு மாந்தம்:—

திரோகோஷணம் அதிகமாயிருக்கும்: இருமல், தலைவலி, வயிற்றுவலி இருக்கும்; மலம் கட்டிக் கட்டியாகக் கழியும்; மலசலம் கட்டுப்படும்; அடிக்கடி கொட்டாவி உண்டாகும்; வியர்வை காணும்; உதடு வறண்டிருக்கும், தாங்கி விழுவதைப்போல் சோர்ந்து சோர்ந்து விழச் செய்யும். சில சமயங்களில் இரைப்பு உண்டாகும்.

சிகிச்சை

(1) வெள்ளாட்டுப்பால் அவுன்ஸ் 24	கடுக்காய்	ரூபாயெடை $\frac{3}{4}$
சுதரக்கள்ளிப்பால் „ 24	தான்றிக்காய்	„ $\frac{3}{4}$
சிற்றாமணக்கெண்ணெய் „ 48	நெல்லிவற்றல்	„ $\frac{3}{4}$
	வெள்ளைப்பூண்டு	„ $\frac{3}{4}$

பொடிக்கவேண்டியதைப் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, 15-20-துளி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

(2) சித்தகத்தியிலேச்சாறு அவுன்ஸ் 2	கடுகுரோகிணி	ரூபாயெடை 1
தாளியிலேச்சாறு „ 2	கடுக்காய்	„ 1
தகரவிலேச்சாறு „ 2	கருஞ்சீரகம்	„ 1
கழற்சியிலேச்சாறு „ 2	வெங்காயம்	„ 1
நொச்சியிலேச்சாறு „ 2	வெள்ளைப்பூண்டு	„ 1
செம்முள்ளியிலேச்சாறு „ 2	வசம்பு	„ 1
மிளகுத்தக்காளியிலேச்சாறு „ 2	பூதகரப்பன் பட்டை	„ 1
சுதரக்கள்ளிப்பால் „ $\frac{1}{2}$	தைவேளை வேர்	„ 1
சிற்றாமணக்கெண்ணெய் „ 12		

பொடிக்கவேண்டியவற்றைப் பொடித்துச் சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து, காலையில் 15, 20-துளி கொடுத்து சாயந்திரம்:—

மிளகு சாம்பல் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ சுக்கு ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$

ஒன்றாகக் கஷாயமிட்டு 2-அவுன்ஸ் கஷாயம் மட்டும் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

- (3) சீர்தில் தண்டு ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ கடுக்காய் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
 களிப்பாக்கு ,, $\frac{1}{2}$ கடுகுரோகிணி ,, $\frac{1}{2}$
 சிவதைவேர் ,, $\frac{1}{2}$

16-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டுக் கஷாயமிட்டு 2-அவுன்ஸ் கஷாயம் வீதம் காலை மாலை மூன்றுநாள் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

மாந்தப் பொதுமருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

சுழி மாந்தம்:—

மாந்தக்கழிச்சல் என்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

சல மாந்தம்:—

கீர்மாந்தமென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

சிலேத்தம் மாந்தம்:—

காச்சலுடன் குளிர்தடுக்க மிருக்கும்; உடம்பு சிலிர்க்கும்; நெஞ்சில் சபம் கட்டி திட்டுமுட்டடிக்கும்; நாவில் மாவு படர்ந்திருக்கும்; வயிறு பொருமி மலம் தண்ணீராய் கழியும்; சோர்வு உண்டாகும்.

கீத்கீதை

- (1) நொச்சியீர்க்கு ஒருபிடி வேலிப்பருத்தியிலை ஒருபிடி
 மூணு (மஞ்சநெத்தி) யீர்க்கு ,, தைவேலாவேர் ,,
 முருங்கையீர்க்கு ,, பொருதலை ,,

ஒரு மண்சட்டியில் போட்டு வதக்கி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீர்விட்டு அத் துடன்:—

ஓமம்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	மிளகு	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
சுக்கு	,, $\frac{1}{2}$	வசம்பு	,, $\frac{1}{2}$
திப்பிலி	,, $\frac{1}{2}$		

இவற்றை இளவறுப்பாய் வறுத்து ஒரு வெள்ளைத் துணியில் முடித்துப் போட்டு 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தை வடித்து, அத் துடன் துணியில் முடித்துப்போட்டவைகளை மைபோலரைத்து 1½-அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

- (2) ஆமையோடு ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ குரோசானியோமம் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
 ஓமம் ,, $\frac{1}{2}$ சீரகம் ,, $\frac{1}{2}$
 திப்பிலி ,, $\frac{1}{2}$ கருஞ்சீரகம் ,, $\frac{1}{2}$
 சுக்கு ,, $\frac{1}{2}$ கொத்தமல்லி ,, $\frac{1}{2}$

இவற்றைத் தண்ணீர்விட்டு மைபோலரைத்து மிளகவ்வளவு பெரிய மாத்திரைகள் செய்து காலை மாலை ஒரு மாத்திரை வீதம் சுடுதண்ணீரில் கரைத்துக்கொடுத்து வரலாம்.

(3) ஆமையோடு ரூபாயெடை 1	வாய்விளங்கம் ரூபாயெடை 1
மிளகு ,, 1	கழற்சிப்பருப்பு ,, 1
திப்பிலி ,, 1	பொடுதலைக்காய் ,, 1
வசம்பு ,, 1	

இவற்றைப் பொடுதலைச்சாற்றால் மைபோலரைத்துப் பட்டாணிக்கடலை பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்து காயவைத்து காலை மாலை ஒரு மாத்திரை வீதம் பொடுதலைக் கஷாயத்தில் கொடுத்துவரலாம்.

(4) கொச்சியிலை ஒருபிடி	றுணியிலை (மஞ்சகெத்தியிலை) ஒருபிடி
பொடுதலை ,,	வேலிப்பருத்தியிலை ,,

ஒரு சட்டியில் போட்டு வதக்கி சாறெடுத்துக் கொடுத்து வரலாம்.

(5) பொடுதலை ரூபாயெடை 2	கறியுப்பு ரூபாயெடை 2
------------------------	----------------------

கசக்கிப்பிழிந்த சாறு 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(6) வெற்றிலைக்காய் ரூபாயெடை ½	வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை ½
வசம்பு ,, ½	திப்பிலி ,, ½

இளவறுப்பாய் வறுத்து சுடுதண்ணீர்விட்டு அரைத்துக் கலக்கி வடிகட்டிய சாறு 1, ½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(7) வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை ½	ஓமம் ரூபாயெடை ½
மிளகு ,, ½	

ஒரு வெள்ளைத்துணியில் முடிந்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் அந்த முடிச்சியிலுள்ள மருந்தை அரைத்துக் கலக்கி 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

(8) ஆமையோடு ரூபாயெடை 1	வட்டத்திருப்பி ரூபாயெடை 1
வசம்பு ,, 1	

இவற்றை இலேசாய் வெதுப்பி, குட்டிவிளா இலையை வதக்கிப்பிழிந்த சாற்றை விட்டரைத்துச் சுடுதண்ணீரில் கலக்கி வடிகட்டி 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(9) வேலிப்பருத்தியிலை ஒருபிடி	பொடுதலை ஒருபிடி
குப்பைமேனியிலை ,,	அகத்தியிலை ,,
இண்டு ,,	

இவற்றை வதக்கிப் பிழிந்த சாற்றில் :—

ஆமையோடு ரூபாயெடை ½	ஓமம் ரூபாயெடை ½
வசம்பு ,, ½	

இளவறுப்பாய் வறுத்து அரைத்துக் கலக்கி வடிகட்டிய சாற்றில் 1, 1½ அவுன்ஸ் உள்ளாக்கும் கொடுத்து, உடலாகியந்தமும் தடவலாம்.

- (10) தைவேளைவேர் ரூபாயெடை 1 வெந்தயம் ரூபாயெடை 1
 ஒமம் ,, 1 வசம்பு ,, 1
 சுக்கு ,, 1 வெள்ளைப்பூண்டு ,, 1

இளவறுப்பாய் வறுத்துப் பொடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாக சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

- (11) நுணுயிலை (மஞ்சளெத்தியிலை) ஒருபிடி நொச்சியிலை ஒருபிடி
 கழற்சியிலை ,,

இவற்றை வதக்கி அத்துடன்:—

- ஒமம் ரூபாயெடை ½ மிளகு ரூபாயெடை ½
 வசம்பு ,, ½ திப்பிலி ,, ½
 சுக்கு ,, ½ பொடிதலைக்காய் ½

இவற்றை நல்லெண்ணெயில் சிவக்க வறுத்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் பொடித்துப்போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சி, 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

மார்தப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

சுரமார்தம்:—

திரேகோஷ்ணம் அகோரமாயிருக்கும்; உடம்பில் வீக்கம் காணும்; இரு மல், வீக்கல், ஏப்பம் ஏற்படும்; பெருமூச்சு வாங்கும்; சுவாசிக்கும்போது இருவிலாவும் குழி விழும்; தூக்கம் வராது; குழிதை புால் குடியாது.

சிகிச்சை

- (1) கரிசலாங்காணிச்சாறு அவுன்ஸ் 1 மூக்கிரசாரணைச்சாறு அவுன்ஸ் 1
 துளசியிலைச்சாறு ,, 1 முதியார்கூந்தல்சாறு ,, 1
 ஆடாதோடையிலைச்சாறு ,, 1 சோற்றுக்கற்றாழைச்சாறு ,, 1
 சங்கனிலைச்சாறு ,, 1 சிற்றாமணக்கெண்ணெய் ,, 8
 நாரத்தையிலைச்சாறு ,, 1

இவைகளை ஒன்று சேர்த்து, அதில்:—

- சாதிக்காய் ரூபாயெடை ½ திப்பிலி ரூபாயெடை ½
 பெருங்காயம் ,, ½ கடுகுரோகணி ,, ½
 கோரோசனை ,, ½

இளவறுப்பாய் வறுத்துப் பொடித்துச் சேர்த்து காய்ச்சி வடித்து, 1½-தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

- (2) குட்டிவிளாயிலை ரூபாயெடை ½ வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை ½
 அவுரியிலை ,, 1

மண்சட்டியில் போட்டு வதக்கி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீர்விட்டு 3-அவுன்ஸ் ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் $\frac{1}{2}$, 1-அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

(3) பாலசஞ்சீவி மாத்திரை; கோரோசனை மாத்திரை; பாலவினோத சஞ்சீவி மாத்திரை; கஸ்தூரி மாத்திரை; மகாரச பஸ்பம்; சுவர்ண வெள்ளி பஸ்பம்; வீரகுத சிந்தாமணி இவற்றிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகங் காண்க.

மார்தப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

சுழிமாந்தம்:—

திரேகோஷணம் மிதமாகவே இருக்கும்; முழங்காலுக்குங் கீழ் குளிர்ந்திருக்கும்; குமட்டல் உண்டாகும்; உடல் வீக்கங்கண்டிருக்கும்; பெருமூச்சோடு இரைப்புங் காணும்; மூச்சுவிடும்போது விலாவின் இருபுறமும், சுழித்துப் பள்ளமாகும்; ஊக்கம் பிடிக்காது; குழந்தை பால் குடியாது.

சிகிச்சை

(1) மாசிப்பத்திரி	ரூபாயெடை 1	முக்காவேனே	ரூபாயெடை 1
பற்பாடகம்	,, 1	கருஞ்சீரகம்	,, 1
நாயுருவி	,, 1	கோழியெச்சம் (மலம்)	,, 1

இவற்றை ஒரு மண்சட்டியில் போட்டு வறுத்து அத்துடன்:—

வெட்டிவேர்	ரூபாயெடை	$\frac{1}{2}$	கடுக்காய்	ரூபாயெடை	$\frac{1}{2}$
கோரைக்கிழங்கு	„	$\frac{1}{2}$	மாசிக்காய்	„	$\frac{1}{2}$
பறங்கிப்பட்டை	„	$\frac{1}{2}$	தான்றிக்காய்	„	$\frac{1}{2}$
ஏலரிசி	„	$\frac{1}{2}$	வசம்பு	„	$\frac{1}{2}$
கடுகுரோகினி	„	$\frac{1}{2}$	சங்கனவேர்	„	$\frac{1}{2}$

பொடித்துப்போட்டு 96-அவுன்ஸ் தண்ணீர்விட்டு 12-அவுன்ஸ் ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 1, $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ்வீதம் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

(2) வெங்காயச்சாறு	அவுன்ஸ் 2	நிற்றாமணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 2
இண்டுச்சாறு	,,	2	

ஒன்று சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து ஒரு தேக்கரண்டி யளவாக காலை மாலை கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

(3) துளசிச்சாறு	அவுன்ஸ் 12	நறுந்தாளிலைச்சாறு	அவுன்ஸ் 12
கோடகசாலைச்சாறு	,, 12	நிற்றாமணக்கெண்ணெய்	,, 12
ஆடாதோடையிலைச் சாறு	,, 12	சாதிக்காய்	ரூபாயெடை ½
		திப்பிலி	,, ½

தும்பைச்சாறு	„	12	பெருங்காயம்	„	$\frac{1}{2}$
முதியார்க்கூந்தல்சாறு	„	12	கடுகுரோகிணி	„	$\frac{1}{2}$
சங்கனிலைச்சாறு	„	12	கோரோசனை	„	$\frac{1}{2}$
சீந்திலிலைச்சாறு	„	12	வெள்ளைப்பூண்டு	„	$\frac{1}{2}$
சிறநிலைச்சாறு	„	12			

தூள் செய்யவேண்டியவற்றைத் தூள்செய்து ஒன்றுசேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து ஒரு தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

- (4) சுக்கு ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ ஒத்தைவெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
 கழற்சிப்பருப்பு „ $\frac{1}{2}$ பெருங்காயம் „ $\frac{1}{2}$
 மஞ்சள் „ $\frac{1}{2}$ வேப்பெண்ணெய் அவுன்ஸ் 16

தூள் செய்யவேண்டியவற்றை தூள்செய்து எண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து $\frac{1}{2}$, 1-தேக்காண்டி யளவாக 2-அவுன்ஸ் முலைப்பாறுடன் சேர்த்துக் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

செரியாமாந்தம் :—

நிரோகோஷணம் சந்தேறக்குறைய அதிகமாகவே யிருக்கும்; தலைவலி ஏற்படும்; வயிறு பொருமி மாவைக் கரைத்ததைப்போல் வெண்ணிற மாய் மலம் கழியும்; அடிக்கடி குழந்தை சீறியழும்; களைப்பினால் குழந்தை சோர்ந்து விழும்.

சிகிச்சை

- (1) வசம்பு ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$ மிளகு ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$
 சடா மாஞ்சில் „ $\frac{1}{4}$ திப்பிலி „ $\frac{1}{4}$
 வெள்ளைப்பூண்டு „ $\frac{1}{4}$ கருஞ்சிரகம் „ $\frac{1}{4}$
 ஒமம் „ $\frac{1}{4}$ ஆமையோடு „ $\frac{1}{4}$
 சுக்கு „ $\frac{1}{4}$

இவற்றை இளவறுப்பாய் வறுத்துப் பொடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சி வடிசட்டிய கஷாயத்தில் 1, $1\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ்ளவாகக் காலை மாலைகளில் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) மிளகு ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$ வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$
 வசம்பு „ $\frac{1}{4}$

இவற்றை வேலிப்பருத்தியிலையை வதக்கிப் பிழிந்த சாறுவிட்டு மை போலரைத்துக் குழம்பாகக் கரைத்து, ஒரு தேக்காண்டியளவெடுத்து அதில் பசுநெய் 3-துளிவிட்டுக் குழப்பிக் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

- (3) இஞ்சி ரூபாயெடை $1\frac{1}{2}$ பெருக்தும்பையிலை ஒருபிடி

இலேசாகத் தட்டி, 3-அவுன்ஸ் ஒருமை வெண்ணெயில் போட்டு, சட்டியிலிட்டு வேகவைத்துப் பிழிந்த நெய்யில் ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் காலே மாலை கொடுத்து வரலாம்.

(4) ஓமம் ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$ வசம்பு ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$
கோஷ்டம் ,, $\frac{1}{4}$

இவற்றை 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், காலே மாலை 1, $1\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ்வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

சொருகு மாந்தம்:—

இதில் மாந்தத்தின் குணங்குறிகளோடும், கண் விழிகளை மேல்நோக்கிச் சொருகி, பார்ப்பதற்குப் பயங்கரத்தை உண்டெண்ணும்.

மாந்தப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

தலை மாந்தம்:—

திரேகோஷ்ணம் மிகுதியாயும், குளிர்நடுக்கம் அதிகமாயிருக்கும்; குளிரி னால் நடுக்குண்டாகி, குழந்தை துள்ளித்துள்ளி வீழும்; முகத்தில்மாத் திரம் வியர்வைபுண்டாகும்; மூக்கில் நீர் வடியும்; உடல் வீக்கம் காணும்; வயிறு பொருமியிருக்கும்; ஏப்பம், கொட்டாவி முதலியவை உண்டா கும்; காலும் கையும் குளிர்ந்திருக்கும்; தலை கனதியாக விருப்பதினா லும், வலி எடுப்பதினாலும் குழந்தை தலையைப் பின்புறம் தொங்கப் போட்டுக்கொண்டிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) வெள்ளறுகுச்சாறு அவுன்ஸ் 1 வெதுப்படக்கிச்சாறு அவுன்ஸ் 1
வேலிப்பருத்திச்சாறு ,, 1 பெருந்தும்பைச்சாறு ,, 1
எல்லாம் ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு:—

திப்பிலி ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ சதைக்குப்பை ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
வசம்பு ,, $\frac{1}{2}$ தேசாவரம் ,, $\frac{1}{2}$
வெண்ணெய்ப்பூண்டு ,, $\frac{1}{2}$

இவற்றை மேற்படி சாறுகளால் மைபோலரைத்து கலக்கி 1, $1\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம் காலே மாலை உண்டுக்கும்கொடுத்து, உடலாதிமந்தமும் பூசியும்வரலாம்.

மாந்தப் பொதுமருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

துலை மாந்தம்:—

காச்சலிருக்கும்; காச்சல் அதிகரித்தவுடன் வியர்த்து உடல்குளிரும்; முகம் கடுகடுப்பாயிருக்கும்; உடலை முறுக்கிக்கொண்டு கொட்டாவி உண்டா கும்; வார்தி ஏற்படும்; கைகால்களில் வலிப்பு உண்டாகும்; சிலசமயம் விரைத்தபடியே கொஞ்சநேமிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) தைவேளைவேர் ரூபாயெடை	$\frac{1}{2}$ மிளகு	ரூபாயெடை	$\frac{1}{2}$
முடக்கொத்தான்வேர் ,,	$\frac{1}{2}$ கடுக்காய்	,,	$\frac{1}{2}$
அழிஞ்சில்வேர் ,,	$\frac{1}{2}$ தான்றிக்காய்	,,	$\frac{1}{2}$
வசம்பு ,,	$\frac{1}{2}$ நெல்லிவற்றல்	,,	$\frac{1}{2}$
சுக்கு ,,	$\frac{1}{2}$ சிற்றாமணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ்	10
திப்பிலி ,,	$\frac{1}{2}$		

தூள் செய்து எண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி வடிக்கடி, ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் உள்ளுக்கும் கொடுத்து மேலுக்கும் தடவி வரலாம்.

மாந்தப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

நீர்க்கிணை மாந்தம்:—

நீர்மாந்தமென்ற தலைப்பிண்கீழ் பார்க்கவும்.

நீர் மாந்தம்:—

கிரேகோஷ்ணம் அதிகமாயும், முகம் பளபளப்பாகவுமிருக்கும்; உடல் மெலிந்து கைகால்கள் மட்டும் வீங்கி நமைச்சல் உண்டாகும்; எச்சில் தடித்திருக்கும்; வயிறு பொருமி மலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் கழியும்; நீர் கடுப்புடனும் மஞ்சளாகவு மிறங்கும். நீரிறங்கும்போது எரிச்சல் தாங்காமல் குழந்தை கதறி அழும்; உடம்பு சிலிர்த்திருக்கும்; குழந்தை தூங்குவதைப்போலிருந்து சிரிக்கும்; பால் குடியாது.

சிகிச்சை

(1) மூக்கிரட்டைச்சாறு	அவுன்ஸ் 6	சிற்றாமணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 11
வெங்காயச்சாறு	,, 6		

ஒன்று சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து, ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) நொச்சியிலை	ஒருபிடி	தூதுவேளையிலை	ஒருபிடி
துளசியிலை	,,	வெதுப்படக்கிலை	,,
செம்முள்ளியிலை	,,	திருநீற்றுப்பச்சையிலை	,,

இவற்றை ஒன்றுசேர்த்துப் பிட்டலித்துப் பிழிந்த சாற்றில்:—

சீரகம்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	மிளகு	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
திப்பிலி	■ $\frac{1}{2}$	பொரித்தவெங்காயம்	,, $\frac{1}{2}$
சுக்கு	,, $\frac{1}{2}$		

வெங்காயம் நீங்கலாக 4 சேர்க்கையும், இவ்வறுப்பாக வறுத்துப் பொடித் தப் பொடியையம், வெங்காயத்தையும் சாற்றுடன் கலந்து, ஒரு இரும்புத்

துண்டைப் பழுக்கக் காயவைத்து அதில் துவைத்து முறித்து 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

- (8) வெதுப்படக்கிச்சாறு அவுன்ஸ் 12 நுணு (மஞ்சநெத்தி) அவுன்ஸ்
அம்மாம்பச்சரிச்சாறு ,, 12 யிலைச்சாறு ,, 12
சங்கனிலைச்சாறு ,, 12 சிற்றாமணக்கெண்ணெய் ,, 12

ஒன்றுசேர்த்து அவதறுடன்:—

வசம்பு ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$ மஞ்சள் ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$
வெள்ளைப்பூண்டு ,, $\frac{1}{2}$

பொடித்துப்போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, ஒரு தேக்கரண்டி யளவாக 8-நாட்களுக்குக் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

- (4) † சுத்திசெய்த ரசகர்ப்பூரம் ரூபாயெடை காலரைக்கால்
■ சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு ,, $\frac{3}{4}$
மிளகு ,, $\frac{3}{4}$
கிராம்பு ,, $\frac{3}{4}$

இவைகளை மைபோலரைத்து, 12-அவுன்ஸ் சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் கலக்கிக் காய்ச்சி, 10-துளி வீதம் கொடுத்துவரலாம். (பொரித்த அரிசிக் கஞ்சி, புனர்ப்பாகம்தான் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். (கடும்பத்தியம்.)

மாந்தப் பொதுமருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

பால்மாந்தம்:—

காச்சலூடன் மயிர்க்கூச்சமுண்டாகும்; வயிறு பொருமி பால் கட்டிக் கட்டி யாகக் கழியும்; வயிறு பொருமியதால் குழந்தை ஓயாமல் அழும்; மலம் புளிப்புநாற்ற மடிக்கும்; கண் குழிவிழும், தொண்டையில் கோழைக் கட்டி திட்டுமுட்டடிக்கும்; வாந்தி உண்டாகும்; குழந்தை பரதவிக்கத் தக்க விதமாய் துடிக்கும்.

சிகிச்சை

வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ பொடிதலைக்காய் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
மிளகு ,, $\frac{1}{2}$ இந்துப்பு ,, $\frac{1}{2}$
வசம்பு ,, $\frac{1}{2}$

24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் தட்டிப்போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

மாந்தப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

† சுத்திமுறை 6-ம் பாகம் காண்க.

■ 60-ம் பக்கம் காண்க.

பித்தமாந்தம் :—

சாங்காயும்; ஒரு சமயம் வியர்க்கும்; குரல் கம்மி யழுகும்; வயிற்றோட்டமும், மயக்கமும் காணும்.

சிகிச்சை

மாந்தப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

புளிமாந்தம் :—

குடல் புண்பட்டு வயிறு பொருமும்; வயிற்றிரைச்சலும், மலச்சிக்கலும் இதர மாந்தக் குறிகளும் தோன்றும்.

சிகிச்சை

மாந்தப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

பேதியக்கரமாந்தம் :—

அஸ்தியின் குடு அதிகம் கண்டு தகதப்பாயிருக்கும்; சுவாசம் அனல்வீசும்; உதடு, வாயின் உள்பாகம், தொண்டை முதலியவைகள் வெந்து புண்ணை விருக்கும்; குழந்தை வாயைத் திறக்கமுடியாமல் மூடிக்கொண்டே யிருக்கும்.

சிகிச்சை

மணத்தக்காளியிலேச்சாறு அவுன்ஸ் 6	மருக்காவேர்	ரூபாயெடை 8
சோற்றுக்கற்றாழைச்சாறு ,, 6	கிவாப்பூலாவேர்	,, 8
சிறுமணக்கெண்ணெய் ,, 6	துத்திவேர்	,, 8
வெங்காயச்சாறு ,, 6	வெந்தயம்	,, 8

வேர் மூன்றையும் வெந்தயத்தையும் இளவறுப்பாய் வறுத்துப் பொடித்துப்போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, அரை தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்தும், உதடு வாய் இவைகளிலும் தடவிவரலாம்.

மாந்தப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

பேப்மாந்தம் :—

விட்டுவிட்டு சுரம் காயும்; கைகால் குளிர்ந்திருக்கும்; குழந்தை பயத்ததைப் போல் மிரண்டு விழிக்கும்; குழந்தை வீறிட்டமும்; மயங்கிவிடும்

சிகிச்சை

மாந்தப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

போர் மாந்தம் :—

சுரம் இலேசாகவிருக்கும்; வயிறு பொருயிப் பொருயிச் சுழியும், மலம் புளிப்புநாற்றமடிக்கும்; ஆராயின் கீழ்பாகங்கள் குளிர்ந்திருக்கும்; நா

வாட்சியும், வாந்தியும், இருமலும் உண்டாகும். தலை சுழன்றுச்சுழன்று வீழும்; நெஞ்சுப் படபடப்பாயிருக்கும்; நெற்றியில் நடு நரம்பு வீங்கித் தெரியும்; கண் குழி விழுந்திருக்கும்; வாய் உலர்ந்திருக்கும்; மூச்சுத் திணறல் ஏற்படும்; கைகால் சோர்ந்து விழும்.

சிகிச்சை

- (1) ஆமையோடு ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$ நுணு (மஞ்சநெத்தி) யீர்க்கு ஒருபிடி
 ஓமம் ,, $\frac{1}{4}$ வேலிப்பருத்திக்காம்பு ,,
 வசம்பு ,, $\frac{1}{4}$ முதியார்கூந்தல் ,,
 வெள்ளைப்பூண்டு ,, $\frac{1}{4}$

பொடிக்கவேண்டியவற்றைப் பொடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில் கால மாலை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) ஓமம் ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$

இதை இனவறுப்பாய் வறுத்து உயிரீக்கி முலைப்பால்விட்டு மைபோ லரைத்துக் கலக்கிக் கொடுத்துவரலாம்.

- (3) வேலிப்பருத்தியிலை ஒருபிடி தும்பையிலை ஒருபிடி
 வெற்றிலை பொடியாய் வெட்டியது ,,

இதை உப்பை வெடிக்க வறுத்துக் கொட்டிய ருடுள்ள வெறும் சட்டியில் போட்டு வதக்கிச் சாறுபிழிந்த அந்தச் சாற்றில்:—

வசம்புக்கரி ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$ ஆமையோடு ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$
 உத்தேசமாய் இழைத்து ஒரு அவுன்ஸ் சாறுவீதம் கால மாலை கொடுத்து வரலாம்.

- (4) கோழிக்கல்லீரலிலிருக்கும்கல் ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$
 சீரகம் ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$ கிராம்பு ,, $\frac{1}{4}$

முலைப்பால்விட்டு மைபோ லரைத்து இரண்டு சுண்டக்காயளவு இரண்டவுன்ஸ் முலைப்பாலில் கரைத்துக் கால மாலை கொடுத்துவரலாம்.

- (5) ஆமையோடு ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ சத்திச்சாரணைவேர் ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$
 வெள்ளைப்பூண்டு ,, $\frac{1}{2}$ சிற்றாமணக்கெண்ணெய் அவுன்ஸ் 1
 வசம்பு ,, $\frac{1}{2}$

பொடித்து எண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

- (6) வெற்றிலைக்காம்பு ரூபாயெடை 1 ஆமையோடு ரூபாயெடை 1
 நுணுயீர்க்கு (மஞ்ச வசம்பு ,, 1
 நெத்தி) ,, 1 வெள்ளைப்பூண்டு ,, 1

வேலிப்பருத்திக்காம்பு ,,	1	கிராம்பு	1
பொடுதலை ,,	1		

இவற்றை இளவறுப்பாக வறுத்து நசுக்கி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(7) வசம்பு	ரூபாயெடை ½	சீரகம்	ரூபாயெடை ½
மயிலிறகுசுட்டசாம்பல் ,,	,,	வேப்பம்பருப்பு	,,
கிராம்பு	,,	பேய்ப்பீர்க்குவேர்	,,

இவற்றை முலைப்பால் வீட்டு மைபோலரைத்து, இரண்டு கழற்சிக்காயளவாக எடுத்து 2-அவுன்ஸ் முலைப்பாலில் கரைத்து வடிகட்டி காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

மாந்தப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

மலடிகள் மாந்தம்:—

சுரம் காயும்; மாந்தரோகப் பொதுக்குறிகளிருக்கும்; கைகளும் கால்களும் மட்டும் மிகுதியும் உஷ்ணமாயிருக்கும்; திரோகம் வெளுத்துப்போகும்; வயிற்றோட்டமும் திளைப்புமுண்டாகும்; குழந்தை பால் குடிக்கும் எண்ணத்துடன் முலையில் வாயை வைக்கும்; ஆனால், பால் குடியாமல் வாயை எடுத்துவிடும்; ஊங்குவதைப்போலிருந்து திடுக்கிட்டு விழித்து அழும்.

சிகிச்சை

மாந்தப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

முக்கு மாந்தம்:—

இதர மாந்தக் குறிகளுடன் குழந்தை முக்கி முணவியழும்; நாவு வரண்டிருக்கும்; மலமும் சீதமுமாகக் கழியும்; புறங்கால் வீக்கியிருக்கும்.

சிகிச்சை

ஓமம்	ரூபாயெடை ¼	வெள்ளைப்பூண்டு	ரூபாயெடை ¼
மிளகு	,,	ஆமையோடு	,,
திப்பிலி	,,	½	

இவைகளை இளவறுப்பாக வறுத்து, ஒரு வெள்ளைத் துணியில் முடிந்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சி, அந்தக் கஷாயத்திலேயே முடிந்துபோட்டிருக்கும் மருந்துகளையும் மைபோலரைத்துக் கலக்கி வடிகட்டி, 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

வாத மாந்தம்:—

காச்சலிருக்கும்; கைகால் குளிர்ந்திருக்கும்; முகத்தில் மட்டும் வியர்க்கும்; வயிற்றுப் பொருமலும் ஏப்பமும் உண்டாகும்; நாசித்துவாரங்கள் புண்பட்டிருக்கும்; ஓயாமல் நாசியிலிருந்து நீர் வடியும்; உடம்பு பலவித மாய் வலி எடுக்கும்.

சிகிச்சை

மாந்தப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

வாள் மாந்தம்:—

மாந்தரோகக் குறிகளுடனும் உடல் வெளுத்து மெலிந்திருக்கும்; உடலில் வாயுவேடி இரையும்; உடலில் குத்துவலிக் கண்டு வலிப்புக் காணும்.

சிகிச்சை

ஆடுதீண்டாப்பாளையிலேச்சாறு	அவுன்ஸ் 6	அவுரியிலேச்சாறு	அவுன்ஸ் 6
தேவேளையிலேச்சாறு	„ 6	பசுநெய்	„ 12
மணத்தக்காளியிலேச்சாறு	„ 6	கருஞ்சீரகம்	ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$
கழற்சியிலேச்சாறு	„ 6	கடுகுரோகணி	„ $\frac{1}{4}$
கரிசலாய்கண்ணிச்சாறு	„ 6	கஸ்தூரிமஞ்சள்	„ $\frac{1}{4}$
துளசிச்சாறு	„ 6	கோஷ்டம்	„ $\frac{1}{4}$

இதில், பொடிக்கவேண்டியவற்றைப் பொடித்துப்போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

மாந்தப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

விஷ மாந்தம்:—

காச்சல் நின்று நின்று வரும்; அரைக்குக்கீழ் குளிர்ந்திருக்கும்; தலைவலி, வயிற்றுப்பொருமல், வாந்தி, நாவாட்சி உண்டாகும்; தலை நேரே நிற் காமல் சாய்ந்து சாய்ந்து விழும்; நாசி வழியாக நீர் வடிந்துகொண்டே யிருக்கும்; உடல் சேர்த்துப்போகும்; ஒவ்வொரு சமயம் வயிறு சப்தத் துடன் இரைந்து மலம் கழியும்.

சிகிச்சை

(1) ஓமம்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	வெற்றிலை (அரிந்தது)	ஒருபிடி
வசம்பு	„ $\frac{1}{4}$	துணை (மஞ்சளெத்தி)யிலை	„
வெள்ளைப்பூண்டு	„ $\frac{1}{4}$	கொச்சியிலை	„
தேவேளையோர்	„ 1		

நகச்சி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சியகஷாயத்தில் 1, 1 $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

(2) துணுவேர்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	பொடுதலை	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
ரொச்சிவேர்	" $\frac{1}{2}$	வசம்பு	" $\frac{1}{2}$
தைவேளவேர்	" $\frac{1}{2}$	வெள்ளைப்பூண்டு	" $\frac{1}{2}$
ஓமம்	" $\frac{1}{2}$		

இவைகளைப் பொடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸ் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 1, 1 $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

மாந்தப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

வீக்க மாந்தம்:—

இதர மாந்தக் குறிகளுடன் கண்ணும் காதும் வீக்கி வற்றும்; உதடு நாவு வாய் இவைகள் புண்பட்டிருக்கும், கைகாலயர்ந்துவிடும்.

சிகிச்சை

பூவரசம்பழுப்பு	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	துதுவேளையிலை	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
சங்கனவேர்பட்டை	" $\frac{1}{2}$	சிறுகுறிஞ்சாக்கொழுந்து	" $\frac{1}{2}$
சீந்தில்தண்டு	" $\frac{1}{2}$	சத்திச்சாரணவேர்	" $\frac{1}{2}$
துளசி	" $\frac{1}{2}$	சக்கு	" $\frac{1}{2}$
முள்ளிவேர்	" $\frac{1}{2}$	ஓமம்	" $\frac{1}{2}$
முருங்கையிர்க்கு	" $\frac{1}{2}$	சதகுப்பை	" $\frac{1}{2}$
நீர்முள்ளிவேர்	" $\frac{1}{2}$	சேரகம்	" $\frac{1}{2}$
தைவேளவேர்	" $\frac{1}{2}$		

பொடித்து 48-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 1, 1 $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

மாந்தப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

மாந்தத்தில் மலம் கட்டியிருந்தால்:—

சிகிச்சை

முடக்கொத்தான்யிலை	ஒருபிடி	மூக்கிரசாரணவேர் (வேர்)	5, 6
மூக்கிரசாரணயிலை	"	குப்பைமேனியிலை	ஒருபிடி

நசுக்கி 8-அவுன்ஸ் சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து ஒரு தேக்காண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

மாந்தப் பொது மருந்துகள்:—

சிகிச்சை

(1) கோரோசனை	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	சக்கு	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
கோஷ்டம்	" $\frac{1}{2}$	மாசிக்காய்	" $\frac{1}{2}$

அதுமதூரம்	”	$\frac{1}{2}$	வெந்தயம்	”	$\frac{1}{2}$
சேரகம்	”	$\frac{1}{2}$	வெள்ளைப்பூண்டு	”	$\frac{1}{2}$
திப்பிலி	”	$\frac{1}{2}$	கஸ்தூரிமஞ்சள்	”	$\frac{1}{2}$
தேவதாரு	”	$\frac{1}{2}$	வசம்பு	”	$\frac{1}{2}$
சந்தனம்	”	$\frac{1}{2}$	கடுகுரோகிணி	”	$\frac{1}{2}$
ஏலம்	”	$\frac{1}{2}$	பச்சைமூங்கில்மேல்பட்டை	”	$\frac{1}{2}$

இவற்றை வறுத்துத் தூள்செய்து சங்கனிலைச்சாற்றால் அரைத்து, 48-அவுன்ஸ் சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் கலக்கிக் காய்ச்சி வடிக்கட்டி $\frac{1}{2}$, 1-தேக் கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

(2) மணித்தக்காளியிலைச்சாறு	24	நெல்லிவற்றல் ரூபாயெடை	$\frac{3}{4}$
துளசிச்சாறு	”	24 சுக்கு	$\frac{3}{4}$
பிரமதண்டுச்சாறு	”	24 திப்பிலி	$\frac{3}{4}$
வில்வயிலைச்சாறு	”	24 மிளகு	$\frac{3}{4}$
வல்லாரைச்சாறு	”	24 ஆமையோடு	$\frac{3}{4}$
கையாந்தகரைச்சாறு	”	24 சிற்றாத்தை	$\frac{3}{4}$
பொடுதலைச்சாறு	”	24 ஒமம்	$\frac{3}{4}$
முறையிலைச்சாறு (மஞ்சநெத்தி)	”	24 வசம்பு	$\frac{3}{4}$
புங்கனிலைச்சாறு	”	24 கஸ்தூரிமஞ்சள்	$\frac{3}{4}$
சங்கனிலைச்சாறு	”	24 தான்றிக்காய்	$\frac{3}{4}$
சிற்றாமணக்கெண்ணெய்	”	24 சாதிக்காய்	$\frac{1}{8}$
கடுக்காய்	ரூபாயெடை $\frac{3}{4}$		

பொடிக்கவேண்டியவற்றைப் பொடித்துப்போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து 1, $1\frac{1}{2}$ -தேக்கரண்டி யளவாய்க் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

(3) முருங்கைப்பட்டைச்சாறு	வசம்புக்கட்டசாம்பல் ரூபாயெடை	2
அவுன்ஸ் 96	வெள்ளைப்பூண்டு	” 1
நல்லெண்ணெய்	”	48

வசம்புச்சாம்பலையும், வெள்ளைப்பூண்டையும் பசும்பால்விட்டு மைபோலரைத்துக் கலக்கிக் காய்ச்சி வடிக்கட்டி 1, $1\frac{1}{2}$ -தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(4) வல்லாரை	ரூபாயெடை	1	குட்டிவிளாயிலை	ரூபாயெடை	1
சீந்திலித்தண்டு	”	1	வசம்பு	”	1
கஞ்சாங்கோரை	”	1	வெள்ளைப்பூண்டு	”	1
துளசி	”	1	கடுகுரோகிணி	”	1
பிரமதண்டு	”	1	சிற்றாமணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ்	32
பழம்பாசி	”	1			

இவற்றைப் பொடித்துப்போட்டுக் காய்ச்சிவடித்து 1, 1½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

- (5) பாலசஞ்சிவி மாத்திரை; கோரோசனை மாத்திரை; கஸ்தூரிமாத்திரை; பாலவிநோத சஞ்சிவி மாத்திரை; மகாரச பஸ்பம்; சுவர்ண வெள்ளி பஸ்பம்; வீரகுதிரிந்தாமணி; மாந்தமாத்திரை; தக்காளிக்கோரோசனை மரத்திரை இவற்றைக்கொடுத்துவரலாம் செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(6) சோடா டார்டரேட்டா (Soda Tartarata)	கிரான்ஸ்	10
டிஞ்சர் ரீயை கோ (Tincture Rhei Co)	துளி	15
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	8

ஒன்று சேர்த்து; நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று தடவை; தடவை ஒன்றுக்கு ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(7) பல்விஸ் கிரீட்டா அரோமாட்டிக் (Pulvis Creata Aromatic)	கிரான்ஸ்	18
சோடியம் கார்போனேஸ் (Sodium Carbonas)	"	5
அக்கேஷியா கம்மி (Gummi Acacia)	"	12

ஒன்றுசேர்த்துக் கலந்து 6-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு 3-மணிநேரத்திற்கொரு தடவை; ஒரு பாகம் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(8) டிஞ்சர் ஜிஞ்ஜிபரிஸ் (Tincture Zingiberis)	துளி	30
டிஞ்சர் அசபோட்டிசா (Tincture Asafoetidae)	"	20
ஸ்பிரிட் அமோனியா அரோமாட்டிக் (Spirit Ammonia Aromatic)	"	20
ஸ்பிரிட் குளோரோபாரம் (Spirit Chloroform)	"	10
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்துகொண்டு, 3-மணி நேரத்திற்கொரு தடவை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(9) பல்விஸ் ரீயை கோ (Pulvis Rhei Co)	கிரான்ஸ்	5
பல்விஸ் கிரீட்டா அரோமாட்டிக் கோ (Pulvis Creata Aromatic Co)	"	9

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து 3-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று தடவை, தடவை ஒன்றுக்கு ஒரு பாகம் வீதம் தேனில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

(10) ஸ்பிரிட் வைனி காலிவி (Spirit Vini Gallici)	துளி	10
தண்ணீர்	டிபாஸ்	1

ஒன்றுசேர்த்துக் கலந்துகொண்டு, இந்த விதமாக இரண்டுமணி நேரத் திற்கொரு தடவை கலந்துக் கொடுத்து வரலாம்.

மாந்தத்தில் வாய்ப்புண்ணுண்டாயிருந்தால்:—

சிகிச்சை

- | | | |
|---|----------|---------------|
| (1) கிளிசிரைன் (Glycerine) | அவுன்ஸ் | 1 |
| பொட்டாஷியம் புரோமைட் (Potassium Bromide) | கிரைன்ஸ் | 6 |
| ஒன்றுசேர்த்தரைத்து, வெளிப்பிரயோகமாக வாய்புண்ணில் தடவி வரலாம். | | |
| (2) மோஸ்சஸ் (Moschus) | கிரைன்ஸ் | $\frac{1}{2}$ |
| அக்கேஷியா கம்மி (Acacia Gummi) | " | 2 |
| சிரப் ரோஷி காலிக் (Syrup Rosae Gallic) | துளி | 8 |
| தண்ணீர் | அவுன்ஸ் | 1 |

ஒன்றுசேர்த்துக் கலக்கி 2-மணி நேரத்திற்கொருதரம் ஒரு தேக்காரண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

இழுப்பு (CONVULSIONS)

இழுப்பு என்பதை சிலர், ஈர்ப்பு, இசிவு, வலி, வலிப்பு என்றும் சொல் லுவர். இழுப்பு கை கால்களைக் கோணி இழுத்தும்; கண்விழினை மேலா கச் சொருகச்செய்தும், பற்களைக் கடிக்கச்செய்தும், தலையைக் கோணலாக இழுத்தும், உபத்திரவப்படுத்தும் ஒரு பயங்கர செய்கையோடுகூடிய வியாதி யாகும். இழுப்பினால் ஆபத்திற் கிடமில்லையென்றாலும் சிலசமயம் இழுப்பு நீடித்திருக்குமானால், அபாயகரத்தை புண்டுபண்ணுமோ வென்றஞ்ச வேண்டியதாகிவிடும். இழுப்பானது இருபது நிமிஷங்களுக் கதிகமாகவிருந்து தொர்திரவு செய்வதில்லை.

இழுப்பு சுகதேகியான குழந்தைகளுக்கு உண்டாவதில்லை. மூளை சரி யானபடி, வலுவடையாதிருப்பதினாலும், பிரதான இரத்தநாளங்களின் சக் திக் குறைந்திருப்பதினாலும், குழந்தைப் பருவத்தில் இழுப்பு ரோகங்கள் அதிகம் சம்பவிக்க ஹேதுவாயிருக்கின்றன.

இழுப்பு உண்டாவதற்குப் பல காரணங்கள் இருக்கவேண்டும். இழுப்பு ஒரு தனிப்பட்ட வியாதியல்ல. சில குழந்தைகளுக்கு முதற் பல் முளைக்கும் போது இழுப்புக் காணும். பல்லீரு உறுதியாக இருப்பதினால், பல் வெளிப் படும்பொருட்டு மேல்நோக்கி, அந்த ஈரை தாக்குவதினால், வலிப் பொறுக்க முடியாமல் இந்த இழுப்பு உண்டாகிறது.

சில குழந்தைகளுக்கு ஆகாரத்தின் காரணமாக உண்டாகலாம். இது அடிக்கடி சாதாரணமாக உண்டாகக்கூடியது. ஆகாரத்தை அளவுக்கதிகமாகக் கொடுத்துவிடுவதும், குழந்தை ஜீரணக் கருவிகளுக்குத் தக்க மெல்லிய ஆகாரம் கொடுக்கப்படாததினாலும், ஜீரணக் குடலில் ஆகாரம் தங்கி புளிப்பேறி இந்த இழுப்பை உண்டுபண்ணிவிடுகிறது.

மேலும், இழுப்புண்டாவதற்கு, வயிற்றுக் கிருமிகளின் காரணமாகவும், பயத்தின் காரணமாகவும் கீழேவியுவது, எதிர்ப்பாராமல் அடிப்படுவதின் காரணமாகவும், மூளை பலயீனம், அம்மைக்காய்ச்சல், இருதய பலயீனம், மாந்தவியாதி, கணைவியாதி, அஸ்தி, நயணரோகம் முதலிய யேதாவ்தொன்றின் காரணமாகவுயிருக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு கக்குவான் (கக்கிருமல்) வியாதி யிருந்தாலும், அந்தச் சமயம் இழுப்பு யேற்படும்.

இழுப்புக்குச் சிகிச்சை செய்யுமுன் அதன் காரணத்தைச் சம்பூரணமாயறிந்திருக்கவேண்டும்.

அடிபட்டதினால் இசிவு-Convulsions caused by Blow or Fall

குழந்தைகள் விளையாட்டு சமயங்களில் கால் வழக்கி விழுவதினாலாவது, எதிர்ப்பாராதசமயம் அடிகள் விழுவதினாலாவது, இசிவு யேற்படலாம். இது ஆபத்தானதல்லவென்றாலும், பயங்கரமாகவே யிருக்கும். கைகள் அதிகமாய் இழுக்கும்; கண் சொருகும்.

உபசிக்சிச்சை

உடைகளைத் தளர்த்தி முகத்தில் குளிர்த்த தண்ணீரால் தெளிக்கவும்; காற்றோட்டமான இடத்தில் படுக்க வைக்கவேண்டும்; 90-டிகிரிக்குமேல் தாங்கக்கூடிய உஷ்ணதண்ணீரில் கழுத்துவரையில் ஈனைத்தெடுக்கவும் இப்படி 10-நிமிஷம் உஷ்ணஜலத்தில் நிறுத்திவைக்கலாம் உடனே நன்றாக துடைத்து கம்பளியால் போர்த்திவிடவும். உஷ்ணகரிகளான தேயிலை, காப்பிப்பானங்கள் சிறு அளவாகச் சுடச்சுட கொடுக்கலாம். மலச்சிக்கல் இருந்தால் உடனே ஆசனவழியாய் ஈரேற்றம் செய்து (Enema) மலத்தை வெளியாக்கவும்.

அம்மைக்காய்ச்சலில்வரும் இசிவு-Convulsions in

Eruptive Fevers

அதிகமான காச்சலில் கை கால் இசிவு கண்டால், அம்மை வருவதற்குமுன் வரும் காச்சல் என்று சந்தேகிக்கலாம் அவ்விதமான சந்தர்ப்பங்களில், பொட்டாஷியம் புரோமைட் (Pot. Bromide) கொடுப்பதினால் வலிப்பு தடைபடலாமென்றாலும், அம்மைக் கொப்புளங்களை அதிகமாகப் போடச்செய்யும். ஆதலால், இவ்வித சந்தேகமான இடங்களில் வெந்நீரால் முகத்தைக்கழுவி, தலையில் வெந்நீர ரப்பர்ப்பையில் (Hot-Water Bottle) அடைத்து திரோகத்தில் ஒற்றிடம் கொடுக்க

லாம். இலகு விரேசன காரிகள் கொடுக்கலாம். ஆசனவழியாக எளிமா (Enema) கொடுத்து மலத்தை வெளியாக்கலாம்.

அஜீரணத்தால் உண்டாகும் இசிவு-Convulsions in Indigestion

கடுமையான ஆகாரங்களைப் புசித்ததினால் ஆகாரம் ஜீரணிக்காமல் புளிப்பேறினாலும், இழுப்பு உண்டாகலாம். இதில் உடல் சற்றே குடாயிருக்கும்; ஆனால், காச்சலாகத் தோன்றாது. இதற்கு இலகு விரேசனகாரிகளைக் கொடுக்கலாம். எளிமாவினால் (Enema) ஆசனத்து வழியே நீரேற்றம் செய்து மலத்தை வெளியாக்கலாம்.

சிகிச்சை

(1) ஓமம் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ வசம்பு ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$

இவற்றை இளம் வறுப்பாய் வறுத்துப் பொடித்து, வேலிப்பருத்திச் சாறுவிட்டு மெம்போலரைத்துக் கலக்கி ஒரு தேக்காண்டியளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

கோரோசனை மாத்திரைக் கொடுக்கலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(2) காலோமல் (Calomel) கிரைன்ஸ் $1\frac{1}{2}$
சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb) ,, 8

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரே தரமாகத் தேனில் குழைத்துக் கொடுக்கலாம்.

(3) பல்விஸ் ரீயைக்கோ (Pulvis Rhei Co) கிரைன்ஸ் 5
சுடுதண்ணீர் அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து 1-முதல் 3-வயது குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

குறிப்பு:—இந்த மருந்தைக் கொடுத்த 4-மணி நேரத்திற்குள் மலம் வெளியாகி இழுப்பும் கிறகவல்லையானால் மறுபடியும் இதே அளவில் கொடுக்கலாம்.

(4) டிஞ்சர் ஜிஞ்ஜிபரிஸ் (Tincture Zingiberis) துளி 30
டிஞ்சர் அஸபோட்டிடா (Tincture Asafoetidae) ,, 20
ஸ்பிரிட் அமோனியா அரோமாட்டிக் (Spirit Ammonia Aromatic) ,, 20
ஸ்பிரிட் குளோரோபாரம் (Spirit Chloroform) ,, 10
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்துக் கலக்கி, 4 மணிநேரத்திற்கு கொருதாம் 1-முதல் 3-வயது குழந்தைகளுக்கு இரண்டு தேக்காண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

அஸ்தி நயனரோகத்தால் வரும் இசிவு—Convulsions in Rickets

குழந்தைகள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் காலங்களில் உண்டாகும். சுரம் காயும்; கைகால்கள் வலித்திழுக்கும். இந்த ரோகத்தின் பூர்வத்தை அஸ்தி நயனரோகம் என்ற தலைப்பின்கீழ் தெரிந்துகொள்ளலாம். அதற்கான சிகிச்சையும் விவரமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆசன வழியாய் (Enema) எனிமா கொடுத்து மலத்தை வெளியாக்கவேண்டும்.

இருதய பலவீனத்தால் உண்டாகும் இசிவு—Convulsions Caused by Heart Weakness

இது சற்று பெரிய குழந்தைகளுக்கே சம்பவிக்கும். சரீர புஷ்டியில்லாமல் இருக்கும் குழந்தைகள் இதில் சற்றே வாதினாபடலாம் இரத்த ஓட்டம் அதிகமாக ஓட ஆரம்பிக்கும்பொழுதும், இரத்த ஓட்டம் தடைப்படுத்தப் பட்டபோதும் இவ்வவிப்பு யேற்படலாம்; ஆதலால், இன்னகாரணம் என்பதை நன்றாய் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். சப்தவேணுவை வைத்து (Stethoscope) தெரிந்துகொள்ளலாம். இருதய பலவீனத்தால் ஏற்பட்ட வலிப்பாயிருந்தால், குழந்தைத் தாங்கும்படியான வெந்நீரில் அதன் முழங்கால்வரை நனையும்படியாக அதில் 10-நிமிஷம் கிற்ச வைத்து, முகத்தை குளிர்ந்தநீரால் கழுவவும். பின்னர் தண்ணீரை நன்றாய் துவட்டிவிட்டு கம்பனியால் போர்த்திக் காற்றுள்ளவிடத்தில் படுக்கச் செய்யவும். மயக்கம் ஏற்பட்டிருந்தாலும், வாய்வழியாக ஆசாரம் உட்கொள்ள முடியாவிட்டாலும், தண்ணீர்விட்டுக் காய்ச்சியபாலுடன் கால் பங்கு ஆரஞ்சிப்பழ ரசம் சேர்த்து ஆசனத்தின்வழியாக உட்கொடுத்த வேண்டும். இருதய பலம்தரும் மருந்துகள் கொடுக்கவேண்டும்.

சிகிச்சை

ஸ்பிரிட் அமோனியா அரோமாட்டிக் (Spirit Ammonia Aromatic)	தூளி	10
ஸ்பிரிட் ஈதர் (Spirit Aether)	"	8
ஸ்பிரிட் குளோரோபாரம் (Spirit Chloroform)	"	8
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	2

ஒன்றுசேர்த்துக் கலந்துகொண்டு 3-முதல் 10-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 3-மணி நேரத்திற்கொருதரம் 2-தேக்கரண்டியளவு வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

கணரோகத்தில் உண்டாகும் வலிப்பு—Convulsions in Croup

கணரோகத்தினால் குழந்தைகளுக்கு வலிப்பு காணுவதுண்டு. அதனை விவரமாகக் கணரோகத் தலைப்பின்கீழ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

காக்கை வலிப்பு—Epilepsy

காக்கை வலி இளமையிலேயே ஆரம்பித்து, வயோதிகம்வரை நீடிக்கக் கூடியது. நோயாளியை அடிபட்டதைப்போன்று கீழே தள்ளிவிடும்; இவ்வலி சில நிமிஷநேரம்தான் இருக்கும் சிலருக்கு வலிவந்த இரண்டொரு தினத்திலும், சிலருக்கு ஒருவாரத்திற்கு பின்னும், சிலருக்கு ஒருமாதத்திற்கு பின்னும் வருவதுண்டு. நோயாளி சுய அறிவின்றி கீழே கிடப்பான். சற்றுச் சென்று கோணல் கோணலாக இழுக்கும். கழுத்தை சாய்த்து இழுக்கும்; நெடுமூச்சிகள் வரும்; வாயினின்றும் மூக்கினின்றும் வெள்ளை நுரை வரும்; பல்கடி அதிகமாயிருக்கும். சில சமயங்களில் அழுக்கை உண்டாகும்; ஒரு பக்கத்தைவிட மறுபக்கம் வலிப்புகள் அதிகமாயிருக்கும். கண் நிலை குத்திக்கொண்டிருக்கும்; அல்லது சுற்றி விழிக்கும். சிலசமயம் மலசலம் தன்னை யறியாமலே வெளிப்பட்டுவிடும்; சுவாசம் தினாலும்; முகம் வெளுராத தோன்றும்; நெற்றி நடுநரம்புப் புடைத்துத் தெரியும்; இருதய நடையானது ஒழுங்கினமாகவும், அதிதல்வியமாகத் தெரியாமலுமிருக்கும். மூன்று நிமிஷங்களுக்கு அதிகப்படியாக இந்த வலிப்பு இருப்பதில்லை. வலிப்பு விட்டவுடன் தூக்கத்திலிருந் தெழுந்ததைப்போன்றிருக்கும்.

காக்கைவலி திடீரென்று வந்துவிடும். வலி வருமென்று ஒரு அறிகுறியும் கண்டுகொள்ள முடியாது; ஆனாலும், அதிகமாய்க் கவனித்தவர்களுக்கு வலிப்பு வரும் அறிகுறி தெரியாமல் போகாது. வலிப்பு வரும் முன் சிலருக்குத் தலைவலி இருக்கலாம்; பார்வை மங்கி தெரியலாம்; தும்மல் வரலாம்; வாய் வழிவழிப்பாகத் தெரியலாம்; காதில் ஓர் இரைச்சல் கேட்கப்படலாம்.

மண்டை ஒட்டில் உண்டான காயங்களினாலாவது, மூளையில் நீர் சேர்ந்து விடுவதினாலாவது மூளை வீக்கம் காணுவதினாலாவது காக்கைவலி ஏற்படலாம். முக்கியமாக மூளை பலவீனத்தாலும், நரம்பு வலுவின்மையாலுமே இந்த வலிப்பு ஏற்படும்.

வலி வந்திருக்கும் சமயம் காக்கைக் கடித்துத் துண்டித்து விடாதபடி பற்களுக்கிடையில் கணத்த அட்டைத்துண்டுகளையாவது, காக்கையாவது வைத்துக்கொண்டிருக்கவேண்டும். வலிப்பிருக்கும் சமயம் கைகால் களை உதராமல் இருக்கும்படியாக பிடிக்கவே கூடாது. நோயாளியை கம்பளியில் படுக்கவைக்கவேண்டும். காற்று நன்றாக வீசும்படியாக அணித்துக்கொள்ளவேண்டும். படுக்கையில் தலை சற்று உயர்ந்திருக்கவேண்டும். ஆடைகளைக் களைந்துவிடவேண்டும். வலிப்பு இருக்கும் சமயம் முகத்தில் தண்ணீர் அடிப்பதினால் பூணை நன்மை கிடைப்பதில்லை என்றாலும் மூர்ச்சை தெளிய வழி உண்டாகலாம்.

வலிப்பு வரும் காலங்களை இரண்டொரு முறையால் நிதானித்துக்கொண்டு வலிப்பு வரும் சில தினங்களுக்கு முன்னிருந்தே மருந்துகள் கொடுத்து வந்தால் வலி வந்தாலும் வலுசெய்யாது. காக்கைவலிக்கு மருந்து நீடித்து சாப்பிடவேண்டும்.

வலிப்பு வந்திருக்கும் சமயத்தில் சிகிச்சை

செம்மறியாட்டுக்கொம்பு	வசம்பு	ரூபாயெடை	$\frac{1}{4}$
ரூபாயெடை	$\frac{1}{4}$	சக்கு	$\frac{1}{4}$
குதிரைக்குளம்பு	$\frac{1}{4}$	கடுகு	$\frac{1}{4}$
மயிலிறகு	$\frac{1}{4}$	பேயத்திவேர்	$\frac{1}{4}$
மிளகு	$\frac{1}{4}$	அழிஞ்சில்வேர்	$\frac{1}{4}$

ஒன்றுசேர்த்துத் தூள்செய்து, கம்பனியில் சுற்றி திரிபோலாக்கி, வேப்பெண்ணெயில் நனைத்துக் கொளுத்தி புரையைச் சுவாசிக்கச் செய்யலாம்.

காக்கை வலிப்புக்குச் சிகிச்சை

(1) கொடிவேலிவேர் மேல்பட்டை	ரூபாயெடை	$\frac{1}{4}$
சங்கனவேர் மேல்பட்டை	"	$\frac{1}{4}$
எருக்கனவேர் மேல்பட்டை	"	$\frac{1}{4}$
குங்குமப்பூ	"	$\frac{1}{4}$

இவற்றை மைபேரலரைத்து, சுடுதண்ணீரில் கலக்கி கொடுத்துவரலாம்.

புங்காங்கொட்டை எண்ணெய்க் கொடுக்கலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் காண்க.

(2) பொட்டாஷியம் புரோமைட் (Pot. Bromide)	கிரான்ஸ்	15
பொட்டாஷியம் ஐயோடைட் (Pot. Iodide)	"	10
அமோனியம் புரோமைட் (Ammonium Bromide)	"	10
பொட்டாஷியம் கார்போனேட் (Pot. Carbonate)	"	5
டிஞ்சர் கலம்பா (Tincture Calumbae)	அவுன்ஸ்	$\frac{1}{2}$
தண்ணீர்	"	

ஒன்றுசேர்த்து நான் ஒன்றுக்கு 3-தடவை, தடவை ஒன்றுக்கு ஒரு தேக்கரண்டிவீதம் ஆகாரத்திற்கு முன்னும்; படுக்கைக்குப் போகுமுன் 3-தேக்கரண்டி வீதமும் ஒன்று முதல் 3-வயதுக்குழந்தைக்குக் கொடுத்திவரலாம். வயது வந்த குழந்தைகளுக்கானால் தேக்கரண்டியின் அளவை யதிகப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

(3) பொட்டாஷியம் புரோமைட் (Pot. Bromide)	கிரான்ஸ்	5
சோடியம் புரோமைட் (Sodium Bromide)	"	5
லெக்கர் ஆசனிக்காலிஸ் (Liquor Arsenicalis)	துளி	2

சிரப் ஆரண்டி (Syrup Aurantii)

20

தண்ணீர்

அவுன்ஸ் 3

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்துகொண்டு 5-முதல் 12-வயது குழந்தைகளுக்கு, நாள் ஒன்றுக்கு 3-தடவை, தடவை ஒன்றுக்கு ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் நீடித்துக் கொடுத்துவரலாம்.

கிருமிகளால் ஏற்படும் வலிப்புகள்—Convulsions caused by Worms

மனிதர் குடல்களில் அநேக விஷக்கிருமிகள் சுஞ்சாரம் செய்கின்றன. அதிலும் சிறுவர்களிடத்திலேயே அதிகம் வாசஞ்செய்யும். அவைகளில் முக்கியமானவை, கோர்ப்பூச்சி, நாக்குபூச்சியாகும். இவை தவிர அநேகம் பூச்சிகளும் உண்டு. இவைகளின் அதிகரிப்பினாலும், இவைகள் விஷத்தைக் குடலில் கழிப்பதினாலும் வலிப்புகள் ஏற்படும். அவைகளுக்குத் தக்க ஒளவந்தம், கிருமிகள் என்ற தலைப்பின்கீழ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

குதிரை வலிப்பு—Falling Sickness

இது காக்கை வலிப்பைப்போன்றதே; ஆனால், அதிகமான வித்தியாசம் கண்டுகொள்வது கடினம். கால்கை இழுப்பெல்லாம் காக்கை வலியை ஒத்தே இருக்குமென்றாலும், காலை யெட்டி யெட்டி உதைக்கும். குதிரையைப்போல் வலிப்பதினால்தான் “குதிரைவலி” எனப்பட்டது. இதற்கும் காக்கைவலியின் சிகிச்சைகள்தான் செய்யவேண்டும்.

குமரகண்டன்வலிப்பு—Chorea-St., Guy's Dance

இது சிறு பிள்ளைகளுக்கும்படும்தான். வரும். எல்லாவிதத்திலும் காக்கை வலிப்பை ஒத்திருந்தாலும் வாயில் ஆரை தள்ளாது. கை இழுக்க ஆரம்பித்து, படிப்படியாகத் தோளையும், தலையையும் கோணி வலிக்க ஆரம்பிக்கும்; கழுத்தை முறுக்கி முறுக்கி வலிப்பெடுக்கும்; சிலசமயம் படுக்கையிலும் படுக்க முடியாதபடி படபடப்பாக வலித்து, படுக்கையிலிருந்து தள்ளிலீடும்; உடலின் ஒருபாகத்தையாவது இருபாகங்களை யாவது தாக்கலாம். சிலசமயம் இந்த வலிப்பு தூக்கத்திலேயே ஆரம்பித்துவிடும்.

இது குழந்தைகளுக் கேற்படும் ஓர்வீத வாதமாகும். மூளையின் பிரதான கார்பைப் பற்றிவரும் வியாதி. மூளைக்கு விகல்பம் ஏற்பட்டால்தான் இது வருகிறது.

இவ்வலி கண்டால் காற்றோட்டமுள்ள விடத்தில் குழந்தையைக் கிடத்த வேண்டும். நீடித்த நாளாகப் படுக்கையிலேயே கிடத்தவேண்டும். ஆகாரம் கிரமமாகவும் இலகுவில் ஜீரணிக்கக்கூடியதாகக் கொடுக்கவேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) தம்பையிலை ஒருபிடி இஞ்சியிலை (அவ்வது இஞ்சி) ஒருபிடி துளசி ,,

இவற்றை அரைத்து ஒரு கொட்டைப்பாக்களவு எடுத்தி சிற்றமணக் கிலையில் வைத்துச் சுருட்டி, இளவெதுப்பாக அனலில் வாட்டி, பிழிந்த சாற்றில் நான் ஒன்றுக்கு $\frac{1}{2}$, 1-தேக்கரண்டிவீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) புங்காங்கொட்டை எண்ணெய்க் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை ரீ-ம் பாகம் காண்க.

- (3) பெர்ரி எத் அமோனியம் சிட்ரஸ் (Ferri et Ammoniam Citras) கிரைன்ஸ் 15
பொட்டாஷியம் புரோமைட் (potassium Bromide) ,, 15
சிரப் டுலு (Syrup Tolu) துளி 15
தண்ணீர் டிராம் 15

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து 3-முதல் 6-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, நான் ஒன்றுக்கு 3-தடவை, தடவை ஒன்றுக்கு இரண்டுத் தேக்கரண்டி யள வாகக் கொடுத்துவரலாம்.

- (4) அண்டிமோனி டார்டரேட் (Antimony Tartarate) கிரைன்ஸ் 1
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 5

ஒன்றுசேர்த்துக் கலந்து 3-முதல் 6-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற் கொருதாம் ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

- (5) லைக்கர் ஆர்ஸனிக்காலிஸ் (Liquor Arsenicalis) துளி 3
பொட்டாஷியம் பைகார்போனேட் (Potassium Bicarbonate) கிரைன்ஸ் 1

பொட்டாஷியம் ஐயோடைட் (potassium Iodide) ,, 1

ஆக்குவா காம்பர் (Aqua Camphore) டிராம் 4 $\frac{1}{2}$

ஒன்றுசேர்த்துக் கலக்கிக்கொண்டு, 3-முதல் 6-வயதுக் குழந்தை களுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 3-தடவை, தடவை 1-க்கு ஒன்றரைத் தேக் கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

- (6) அஸபோட்டிடா (Asafoetidae) கிரைன்ஸ் 20
எகஸ்ட்ராக்ட் வெலிரியன் (Extract Valerian) ,, 20
விக் ஆக்சைட் (Zinc Oxide) ,, 10
எகஸ்ட்ராக்ட் பெல்லடோனா (Extract Belladonnae) 2

ஒன்று சேர்த்து, மிஷ்ரமித்து, 20-மாத்திரைகளாகப் பிரித்து உருட்டி, 3-முதல் 6-வயதுக் குழந்தைகளுக்குக் காலே மாலை ஒருமாத்திரை வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

தோஷத்தினால் உண்டாகும் வலிப்பு:—

அஸ்தி நயனரோகத்தில் உண்டாகும் இழுப்பைப் பார்க்கவும்.

பயத்தினால் உண்டாகும் வலிப்பு—Convulsions caused by Fears

சில குழந்தைகள் திடீரென்று பயந்துவிடுவதினால் இழுப்பு ஏற்பட்டுவிடுகிறது. அதினாலேயே குழந்தைகளுக்கு பயம் (பூச்சாண்டி) காட்டக் கூடாதென்று சொல்லப்படுகிறது. குழந்தைகள் பயந்துவிட்டால் உடனே கீழேவிழுந்து, கைகால்களை வலித்திழுத்து, கண்விழிகளை மேலேசொருகும். பயத்தினால் குழந்தைகளுக்கு சுரம் யேற்படுவதுண்டு.

சிகிச்சை

அடிப்பட்டதில் உண்டாகும் வலிப்புக்குள்ள சிகிச்சைகளைச் செய்யவும்.

பல் முளைக்கும்போதுண்டாகும் இழுப்பு—Convulsions caused by Dentition

குழந்தைகளுக்குப் பல்முளைப்பது இயற்கை யமைப்பினாலையினும், பல் முளைக்கும் விகல்பத்தினால் சிசு மரணமும் சம்பவித்துவிடுகின்றன. நருகளின் நரம்பிலிருந்து, பல் வெளிக் கிளம்பவேண்டியிருப்பதால், அக்காலங்களில் அதிகமாக ஏற்படும் வலியினால் குழந்தைகளுக்கு வலிப்பு ஏற்படுகிறது.

பல் முளைப்பதால் ஏற்படும் வலிப்பில், குழந்தை வாயைத் திறந்து கொண்டும், கண்களை விழித்துக்கொண்டு மிருக்கும். கைகால்கள் மட்டும் கோணலாகவிழுக்கும்; காச்சல் உண்டாயிருக்கும்; இழுப்பிலும் குழந்தை அழுதுகொண்டிருக்கும்.

சிகிச்சை

பல் முளைக்கும்போதுண்டாகும் கோளாறுகள் என்ற தலைப்பின்கீழ்க் காண்க.

உபசீகிச்சை

குழந்தைக்குப் பல் முளைக்கும்போது இழுப்பு வருவதா யிருந்தால், ஆகாரவிஷயத்தை சீர்திருத்தம் செய்யவேண்டும்; காலா காலங்களில் ஆகாரம் கொடுத்து வழக்கப்படியே நித்திரை முதலியவைகள் செய்துவைக்க வேண்டும்; குழந்தை எப்போதும் காற்றோட்டமானவிடத்தி லிருக்க வேண்டும்; கால்களை கம்பளியினால் பொதிந்து வைக்கவேண்டும். இழுப்பு வந்தவுடன், உள்ளங்கால், உள்ளங்கை இவைகளில் சூட்டை உண்டுபண்ணும் குணமுள்ள இயூகலிப்புடஸ் ஆயில் (Oil Eucalyptus), டர்பன்டைன் (Turpentine), காம்பர் ஆயில் (Oil Camphor) முதலியனவற்றில் ஒன்றால் குடி பறக்கத் தேய்க்கலாம்.

மாந்த வலிப்பு—Diphtheritic Convulsions

மாந்தவியாதியில் குழந்தைகளுக்குக் கால் இழுப்பு உண்டாவதுண்டு. இது மாந்தத்தில் மலச்சிக்கல் யேற்பட்டால் உண்டாகும். இழுப்பு வருமுன் குழந்தை பதரி அழும்; உடனே இழுப்பு ஏற்படும்; மறுபடியும் இழுப்புவிட்டதும் கை கால்களை கோணல் கோணலாக விழக்கும்; கழுத்தையும் கோணியிழக்கும்; கண் விழிகள் மேல்நோக்கிச் சொருகும்; கால் குளிரும்; மாந்த இழுப்பு ஆரம்பித்தால் அரைமணி நேரத்திற்கொருதரமும், சில சமயங்களில் அதற்குக் குறைந்தும் இழுப்பு வருவதுண்டு. இழுப்பு வந்தால் 3, 4-நிமிஷங்கள்வரைத்தான் நீடிக்கும்; மாந்த இழுப்பு குழந்தைகளுக்கு 6-வயதுவரை வந்து இம்சிப்பதுண்டு.

இழுப்பு வந்திருக்கும் சமயம் குழந்தையைத் தூக்கி வைத்திருக்கக்கூடாது. இழுப்பிலிருந்து விடுவிக்கும் பொருட்டாய், கை கால்களைக் கட்டுப்படுத்தக்கூடாது. அப்படிச் கட்டுப்படுத்தினால் இழுப்புவிட்டவுடன் கைகள்கள் கோணலாகவே நின்றாலும்.

உபச்சிக்சை

மாந்த இழுப்பு அதிக குளிர்ச்சி யேற்பட்டு விடுவதினால் ஏற்படுவதாயிருப்பதால் குளிர்த்தத் தண்ணீரைத் தெளிக்கக்கூடாது.

முதலில் மலத்தை வெளிப்படுத்தும் மார்க்கத்தைத் தேடவேண்டும். எனிமா (Enema) கொடுத்து மலத்தை வெளிப்படுத்தலாம். அல்லது சோப்பை (Soap) பெனிசல் மாதிரியாக னீனமாய் சீவி ஆசனத்தில் சொருகி வைத்திருந்தால் கொஞ்சநேரத்தில் மலம் கழியும்.

உஷ்ணத்தைப் பிறக்கும்படியாக இயூகலிபுடஸ் எண்ணெய் (Oil Eucalyptus) அல்லது கர்ப்பூரத் தைலம் (Oil Camphor) முதலியவற்றிலொன்றால் உள்ளங்கால், உள்ளங்கை முதலியவைகளிலும் தேவையானால் கால்களிலும் குடுபறக்கத் தேய்க்கலாம்.

சிக்சிக்சை

(1) குதிரைவாவிச்சமூலம்		விடுதாரி (விடத்தலாப்	
சூபாயெடை	பட்டை	சூபாயெடை	பட்டை
சிறுபுள்ளிச்சமூலம்	6	வெள்ளைப்பூண்டு	3
தைவேளைச்சமூலம்	6	வசம்பு	3
வெள்வேலம்பட்டை		சிறுமணக்கெண்ணெய்	
முருங்கப்பட்டை		அவுன்ஸ்	48
ஆமையோடு			

தட்டிப்போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, ஒரு தேக்கரண்டியளவாக உள்ளூக் கும் கொடுத்தும் மேலுக்கும் தடவி வரலாம்.

- (2) கொடிவேலிவோர் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ எருக்கன்வோர் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
சங்கன்வோர் ,, $\frac{1}{2}$ குங்குமப்பூ ,, $\frac{1}{2}$

ஒன்றுசேர்த்துத் தண்ணீர்விட்டரைத்து வடிகட்டி, ஒரு அவுன்ஸள வாகக் கொடுத்து வரலாம்.

- (3) குப்பைமேனிச்சாறு அவுன்ஸ் 1 முக்கரச்சாரணச்சாறு அவுன்ஸ் 1
முடக்கொத்தான்சாறு ,, 1 சிற்றாமணக்கெண்ணெய் ,, 1

ஒன்றாய்க் கலந்து காய்ச்சி வடித்து, ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

பாலசுரஹா மாத்திரை; கஸ்தூரி மாத்திரை; சுவர்ணகோரோசனை மாத்திரை; அப்ரகக் கோரோசனை மாத்திரை; மகாரஸைப்புஸ்பம் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் காண்க.

- (4) அமோனியம் புரோமைட் (Ammoniam Bromide) கிரைன்ஸ் 80
ஸ்பிரிட் ஈதர் டைட்ரோவரி (Spirit Aether Nitrosi) துளி 45
குளோரல் ஐட்ரஸ் (Chloral Hydras) கிரைன்ஸ் 24
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti) டிராம் 2
ஆக்குவா குளோரோபாரம் (Aqua Chloroform) அவுன்ஸ் 2

ஒன்றுசேர்த்துக் கலந்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒருமணி நேரத்திற் கொருநதாம் ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

- (5) லைக்கர் அட்ரோபி சல்பஸ் (Liquor Atropi Sulphus) துளி 1
லைக்கர் ஸ்டிரிக்னைன் (Liquor Strychnine) ,, 1
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti) ,, 20
தண்ணீர் டிராம் 2

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்குக் காலே மாலே ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

முயல் வலிப்பு:—

முயல் வலிப்பும் காக்கைவலிப்பில் சேர்ந்த வியாதித்தான்; ஆனால் காக்கை வலிப்பைப்போல் முயல் வலிப்பு வியாதியால் வாயிலிருந்து வெண்ணுரைத் தள்ளுவதில்லை. மூக்கிலிருந்துமட்டும் நீர் வீடிந்துக்கொண்டே யிருக்கும். மூச்சு நீளமாக இழுத்துவிடப்படும். அப்போது, கைகால் தலை எல்லாம் முயலைப்போல் உதறும்.

சிகிச்சை

காக்கை வலிப்புக்குச் சொல்லியதைச் செய்யலாம்.

விச்சுழி வலிப்பு:—

இது குமரகண்டன் வலிப்பு இனத்தில் சேர்ந்தது; ஆனால், இந்த வியாதியில், வலிப்பு வரும் சமயத்திலும், வந்திருக்கும் சமயத்திலும், நெஞ்சக் குழி பள்ளமாக அழுங்கி அழுங்கி எழும்பும்; விக்கல் உண்டாகும்.

சிகிச்சை

குமரகண்டன் வலிப்புக்குண்டான சிகிச்சையைச் செய்யலாம்.

விழுவதினால் உண்டாகும் வலிப்பு—Convulsion caused by Falling

அடிப்பட்டதினால் உண்டாகும் வலிப்பு என்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

தோஷம்—சீர்த்தட்டு (RICKETS—RACHITIS)

தோஷவியாதியை நம் நாட்டில் வியாதியாகக் கருதப்படாமல், திருஷ்டியினால் உண்டாவதென்கின்றனர். ஆனால், தோஷவியாதி எலும்பைப் பற்றி வருவது; எலும்பின் நடுவிலுள்ள மச்சை என்று சொல்லப்படும் கருப்புப் பசைப்போன்ற சத்துக் குறைந்தபோவதினாலேயே ஏற்படுகிறது. இந்த வியாதி மூன்று வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளைத்தான் அதிகம் ஹிம் சிக்கின்றது.

ஆனால், பன்னிரண்டு வயதுக்குமேல் இவ்வியாதி வருவதில்லை. சுகாதாரக்குறைவான வீடுகளில் வசிப்பதிலும், போதிய சூரிய ஒளியில் குழந்தைகள் கொண்டுவரப்படாததினாலும், கஷ்டப்பிரசவத்தினாலும் எலும்புகளின் வளர்ச்சிக்குத் தடைப்பட்டு இந்த வியாதி உண்டாகலாம். அதிகாற்றிய இடத்திலுள்ள குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி இவ்வியாதி உண்டாகலாம்.

பத்து மாதத்திற்கு மேலும் பல் மூளக்கும் அறிகுறிகள் காணப்படவில்லையானாலும், இரண்டு வயதுக்குமேல் குழந்தை நடக்கச் சக்தியற்றிருந்தாலும், தோஷ வியாதியென்றே தீர்மானிக்கலாம். கழுத்திலும் தலையிலும் வியர்வை உண்டாகி, படுத்திருக்கும் தலையணைகளை நனைத்துவிடும், குழந்தையின் உச்சக்குழி (Fontanellae) மூடப்படாமலிருக்கும்; அஜீரணம் மிகுந்து அருந்திய ஆகாரம் அப்படியே கழியும். சிலசமயம் மலம் மாணவக் கரைத்ததைப்போலும் அல்லது பச்சிலையைக் கசக்கிய சாறுபோலும் கழியும்; வயிறுதள்ளும்; உடல் வெளுக்கும்; பகலெல்லாம் குழந்தை நிம்மதியாயிருந்தாலும், இரவில் நித்திரையின்றிச் சஞ்சலமுண்டாகும்; காச்சல் உக்ரமாக விருக்கும். இவ்வித வியாதிக்குச் சுத்தமான காற்று மிக முக்கியமானதாகும். சூரிய ஒளி அதிக நன்மையைத் தரும். ஜீரணக்கருவிகளுக்கும், நரம்புகளுக்கும் பலம் தரும் மருந்துகளையும் கொடுக்கவேண்டும். காலையில் வெங்கீர் அல்லது குளிர்த்த தண்ணீர், முக்கியமாய் உப்பு (Bath Salt)

கலந்த தண்ணீரில் 10-நிமிஷம் ஸ்நானம் செய்துவைப்பது நல்லது. தோஷ வகை ஒன்பதுதான்; ஆனால், பல வகுப்பாகக் கூறப்படுவதால், அவைகளை யும் கீழே குறிப்பிடுகிறோம்:—

அந்திபக்ஷிதோஷம்	செங்கண்பக்ஷிதோஷம்	புருஷதோஷம்
அழிகர்ப்பதோஷம்	தூங்குபக்ஷிதோஷம்	முட்டுதோஷம்
எச்சிதோஷம்	தேரைதோஷம்	விளக்கொளிகண்பக்ஷி
கருடக்கண்பக்ஷிதோஷம்	நாய்முள்தோஷம்	[தோஷம்]
காண்பக்ஷிதோஷம்	நீர்ப்பக்ஷிதோஷம்	வீங்குபக்ஷிதோஷம்
குளிர்தோஷம்	பறவைதோஷம்	வெங்கண்பக்ஷிதோஷம்
செந்தாளிதோஷம்	பக்ஷிதோஷம்	ஸ்திரீதோஷம் [ம்]

அந்திபக்ஷி தோஷம்:—

சூரம் கரோமாயிருக்கும்; திரேகம் வெளுத்திருக்கும்; நரம்புகள் புடைத் துத் தோன்றும்; தலைநடுக்கம் உண்டாகும்; கைகால் ஜிவ்விட்டிருக் கும்; பால் குடியாது.

சிகிச்சை

குட்டிவிளாயிலை	ஒருபிடி	சீந்தில்தண்டு	ரூபாயெடை 1
நொச்சியிலை	„	வசம்பு	„ 1
சின்னியிலை	„	வெள்ளைப்பூண்டு	„ 1
வேப்பங்கொழுந்து	„		

ஒன்றுசேர்த்தரைத்து உடலெல்லாம் பூசியிருக்கலாம்.

தோஷப் பொது மருந்துகளி் லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

அழிகர்ப்ப தோஷம்:—

திரேகம் சிவந்து காணும்; உடம்பெல்லாம் சிவவலியாகவிருக்கும்; சூரம் காயும்; வாந்தி உண்டாகும்; நெஞ்சு வற்றும்; கைகாலிழுக்கும்; ஓயாது கழியும்; மயக்கம் வரும்; விழி மேல்நோக்கிச் சொருகும்; திரேகம் ஒருவிதமாய் நாளும்; பால் குடியாது.

சிகிச்சை

(1) கழுதைலத்திச்சாறு அவுன்ஸ் 1 பருத்திவேர் ரூபாயெடை 1

ஒன்றாய் அரைத்துக் கரைத்து வடிக்கட்டி ஒரு அவுன்ஸ்வீதம் 3-நாள் காலையில் மட்டும் கொடுத்துவரலாம். (கடும் பத்தியம்.)

(2) இந்துப்பு ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$ வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை 1
பொடுதலைக்காய் „ 1 மிளகு „ 1

ஒன்றுசேர்த்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

தோஷப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

எச்சித்தோஷம்:—

சுரம் காயும்; திரோகம் மெலிந்திருக்கும்; வயிற்றோட்டமிருக்கும்; திரோகம் ஒரு நாற்றமடிக்கும்; கண்களில் பூழை சேரும்; குழந்தை பால் குடிக்காமல் ஆயாசப்பட்டு படுக்கையில் புரண்டுகொண்டே யிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) சிரகம் ரூபாயெடை 1 வில்வயிலை ஒருபிடி

நசுக்கி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சி காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ்வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(2) குளவினாயிலை ஒருபிடி மஞ்சள் ரூபாயெடை 1
ஒமம் " 1

ஒன்றுசேர்த்து மைபோலரைத்து, உடம்பெல்லாம் பூசி வைத்திருந்து சாயந்திரத்தில் சுடுதண்ணீரால் குளிப்பாட்டி வரலாம்.

(3) வில்வயிலை ஒருபிடி மஞ்சள் ரூபாயெடை 1

ஒன்றுசேர்த்து அரைத்து உடம்பெல்லாம் பூசியிருந்து சாயந்திரம் சுடு தண்ணீரால் குளிப்பாட்டி வரலாம்.

மார்தப் பொதுமருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

சுருடக்கண்பகஷி தோஷம்:—

சுரமதிசுமா யிருக்கும்; வாந்தி உண்டாகும்; கடைவாயில் எச்சில் ஒழுங்கித் கொண்டேயிருக்கும்; கண் குழிவிழுந்து கண்ணில் பூழைசேர்ந்திருக்கும்;

சிகிச்சை

கோரோசனை ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$ தீப்பிலி ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$
அதிமதுரம் " $\frac{1}{8}$

மைபோலரைத்து முலைப்பாலில் கலக்கி வடிகட்டி ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

தோஷப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

காணப்பகஷி தோஷம்:—

சுரம் காயும்; உச்சியும் கண்ணும் குழிவிழும்; குழந்தை பால் குடியாது. குடித்தாலும் அப்படியே வாந்தியாகிவிடும்; பச்சிலைச்சாறுபோல் கழியும்; தொண்டைக்கம்மி அழுகையானது வக்கா பகஷி கத்துகிறதைப் போலிருக்கும்.

சிகிச்சை

சிறுபுள்ளிவோர்	ஒருபிடி	வெந்தயம்	ரூபாயெடை
ஒரிலைத்தாமரை	„	மிளகு சாம்பல்	„
விடத்தலாயிலை	„		

ஒன்றுசேர்த்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில் காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ்வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

தோஷப் பொதுமருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

குளிர் தோஷம் :—

சரம் அதிகமாயிருக்கும்; உச்சியும், கண்ணும், குழி விழுந்திருக்கும்; கைக் கால் குளிர்ந்திருக்கும்; தலையில் மட்டும் வியர்வை காணும்; அரையில் வியர்கூடுபோன்ற நமச்சல்கள் தோன்றும்; அதைச் சொறிந்தால் புண்பட்டுவிடும்; தண்ணீர் தண்ணீராய் வார்த்தியாகும்; வேளைக்கொரு விதமாக மலம் கழியும்; நெஞ்சு குழி விழுந்துவிடும்; கால்கள் வீங்கும். கண்ணில் நீர் வடிந்துகொண்டேயிருக்கும்; உடல் மிகவும் மெலிந்து போகும். குடித்தபால் அப்படியே கழியும்; வாய்கருப்பாகவும், வரண்டு மிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) சக்கு	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	மலைத்தாங்கிவோர்	ரூபாயெடை $\frac{3}{4}$
மிளகு	„ $\frac{1}{2}$	வேப்பங்கொழுந்து	ஒருபிடி
வசம்பு	„ $\frac{1}{2}$	சிற்றமணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 12

பொடித்து எண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, ஒரு தேக்காண்டி வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

(2) கீழ்க்காய்நெல்லி	ஒருபிடி	சாயனை	ஒருபிடி
அம்மாம்பச்சரிசி	„	வெங்காயம்	ரூபாயெடை 1
புளியங்கொழுந்து	„	வசம்பு	„ 1

இவற்றை ஒன்றாக மைபோலரைத்து உடலெல்லாம் பூசியிருந்து சாயந்திரம் சுடுத்தண்ணீரால் குளிப்பாட்டி வரலாம்.

தோஷப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

கெந்தாளித் தோஷம் :—

காச்சல் இலேசாகவிருக்கும்; வாயும் தொண்டையும் வெந்து புண்ணாயிருக்கும்; வாய் அழலை நாற்றமடிக்கும்; மூத்திரம் சுடுதண்ணீரைப்போல் சூட்டுடன் இறங்கும்; மலச்சிக்கல் உண்டாகும்.

சிகிச்சை

(1) பழம்பாசிச்சாறு அவுன்ஸ் 8 வெங்காயச்சாறு அவுன்ஸ் 3
வல்லாரைச்சாறு ,, 3

இதைக் கலந்து மண்சட்டியைக் காயவைத்து அதில் இத்தசாற்றை ஊற்றி முறியவைத்து அத்துடன்:—

வெள்ளாட்டுப்பால் அவுன்ஸ் 9

சேர்த்து, அதில்:—

சேகம் ரூபாயெடை 1

வறுத்துத் தூள்செய்துக் கலந்து 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

தோஷப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

செங்கண்பசுடி தோஷம்:—

சுரம் காயும்; கண் இரத்தம்போல் சிவந்திருக்கும்; கண்ணிலிருந்து நீர் வடியும்; தலையில்மட்டும் வியர்வை உண்டாகிக் குளிர்த்திருக்கும்; குழந்தை இருந்திருந்து புரண்டு புரண்டு அழும்; முகத்தைக் கையால் துடைக்கும்; தண்ணீர்த் தண்ணீராய்க் கழியும்; கழிந்த மலம் சுடுத்தண்ணீர்ப் போல் வெது வெதுப்பா யிருக்கும்.

சிகிச்சை

முகமுசுக்கையிலே ரூபாயெடை 3	ஏலரிசி	ரூபாயெடை 1½
டொன் ஞாங்காணி ,, 3	சாதிக்காய் ,,	1½
சிறுதேரை ,, 3	சாதிப்பத்திரி ,,	1½
சீர்தில்வேர் ,, 3	கிராம்பு ,,	1½
ஆவாரைவேர் ,, 3	இலவங்கப்பட்டை ,,	1½
அதிமதுரம் ,, 1½	செண்பகப்பு ,,	1½
சேகம் ,, 1½	வெங்காயச்சாறு அவுன்ஸ் 12	
கோரைக்கிழங்கு ,, 1½	சிற்றமுணக்கெண்ணெய் ,,	48

தட்டித் தூள்செய்து அரைத்து எண்ணெயில் போட்டுக் கலந்துக் காய்ச்சி வடித்து ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கால மாலை கொடுத்து வரலாம்.

தோஷப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

தூங்குபசுடி தோஷம்:—

சுரத்துடன் வயிற்றோட்டமும் வாந்தியுயிருக்கும்; குழந்தை தூங்குவதைப்போல் மயக்கிப் படுத்திருந்து திடீரென அலறி எழுந்திருக்கும்; நாவரட்சி யுண்டாகும்; குழந்தைத்தண்ணீருக்காக அங்கலாய்க்கும்;

முகம் மாறுபாடடைந்து, கண் விழிகள் மேல்கோக்கிச் சொருகி பற்கடிப்பு உண்டாகும்; உச்சிக்குழி பள்ளம் விழுந்திருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) குட்டிவிளாயிலே ரூபாயெடை 1 வசம்பு	ரூபாயெடை 1
பேய்ப்பீர்க்கம் வேர் ,, 1 ஏலம்	,, 1
மஞ்சள் ,, 1 ஒமம்	,, 1

தட்டி 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 4-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயம், 1, 1½-அவுன்ஸில் ஒரு குன்றிமணியளவு கோரோசனை யைக் கரைத்து உள்ளுக்குக் கொடுத்து:—

குட்டிவிளாயிலே ரூபாயெடை 1 வசம்பு	ரூபாயெடை 1
பேய்ப்பீர்க்கம்வேர் ,, 1 ஏலம்	,, 1
மஞ்சள் ,, 1 ஒமம்	,, 1

தண்ணீர் விட்டு மைபோலரைத்து, உடம்பில் பூசியிருந்து சாயந்திரத்தில் சுடுதண்ணீரால் குளிப்பாட்டி வரலாம்.

தோஷப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

தேரை தோஷம்:—

உடம்பில் சதைவற்றி எலும்பும் தோலுமாகவிருக்கும்; விசேஷமாய்க்கையும், காலும் சிறுத்து மெலிந்துவிடும்; உடல் வெளுத்துப்போம்; வயிறுமட்டும் பெரிதாகிவிடும்; கண் சிறுத்துப்போம்; வாய் உலர்ந்திருக்கும்; முகம் சோர்ந்த காதுகள் மடங்கியிருக்கும்; பால் குடியாத; மலச்சிக்கல் உண்டாகும்; முக்கல் முணவல் ஏற்படும்; பெருமூச்சு உண்டாகும்; நெஞ்சு வற்றிக் குரல் கம்மும்; இந்த வியாதிக்கு ஆரம்பத்தில் சிகிச்சை செய்யப்படாவிட்டால் பின்னை பிழைப்பது கஷ்டம்.

சிகிச்சை

(1) சிறுபுள்ளிச்சுமூலம்	நீர்முன்னிச்சுமூலம்	ரூபாயெடை 5
ரூபாயெடை 5	காட்டுமல்லிகைவேர்	,, 5
சிறுகிரைச்சுமூலம் ,, 5	அவுரிவேர்	,, 5
நீராரைச்சுமூலம் ,, 5	கரிசலாங்காணிவேர்	,, 5
பொன்னாங்காணிச்	நிலக்குமிழும்வேர்	,, 5
சுமூலம் ,, 5	முடக்கொத்தான்வேர்	,, 5

இவற்றை இடித்து, 48-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில்:—

அதிமதுரம்	ரூபாயெடை ½	மிளகு	ரூபாயெடை ½
திப்பிலி	,, ½	ஏலம்	,, ½

இது நான்கையும் பசும்பால்விட்டு மைபோலரைத்து மேற்படி கஷாயத்துடன் கலக்கி, அதில்:—

பசு நெய்

அவுன்ஸ் 48

சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து, 1, 2-தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

தோஷப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

நாய்முள் தோஷம்:—

சுரம் அதிகமாயிருக்கும்; குழந்தை பால் குடியாது; கொமட்டல் சப்தத்துடன் வாந்தி உண்டாகும்; இருமல் ஏற்படும்; தலை நடுக்கமுண்டாகும்; வாயில் நாய்முள் போன்ற சிறு நமச்சல்கள் உண்டாயிருக்கும்; இருமும் போது இருவிலாவும் தூக்கும்; பயத்துடன் பார்ப்பதைப்போல் மிரண்டு விழிக்கும்; கண்ணீர்வடியும். வெளிரின மஞ்சள் நிறமாகக் கழியும்.

சிகிச்சை

(1) முற்றிய கடுக்காய் ரூபாயெடை 1 சேரகம் ரூபாயெடை 1

இதை நன்றாகச் சூரணித்து, சோற்றுக்கற்றைமுச்சாறு ஒரு அவுன்ஸில் 1-ரூபாயெடை சூரணத்தைக் கலந்து, மூன்று நாள் கொடுத்துவரலாம்.

(2) நெறிஞ்சில்காய் ரூபாயெடை 1 மிளகு ரூபாயெடை 1
மணித்தக்காளியிலை " 1 மஞ்சள் " 1
சங்கன் கொழுந்து " 1 வெங்காயம் " 1

யாவற்றையும் ஒன்றாகத் தட்டிப் பிழிந்தச்சாற்றில் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

(3) மணித்தக்காளியிலைச்சாறு அத்திப்பால் தேக்கரண்டி ½
தேக்கரண்டி ½ ஆலம்பால் " ½

ஒன்று சேர்த்துத் தடவை ஒன்றுக்கு இதேயளவாக, காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

நீர்ப்பசுளி தோஷம்:—

சுரம் விடாமல் காயும்; குழந்தை ஓயாது அழுதுகொண்டே யிருக்கும்; நெஞ்சு வரண்டிருக்கும், பெருமூச்சு வாகும்; திரேகம் வெளுத்திருக்கும்; தலையில் வியர்வைக் காணும்.

சிகிச்சை

விஷ்ணுகிரந்தி ஒருபிடி சேரகம் ரூபாயெடை 1

24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் பொடித்து போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ்வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

தோஷப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

பறவைத் தோஷம்:—

இதுவே பக்ஷிதோஷம். சுரம் அதிகமாயிருக்கும்; அடிக்கடி மலம் தண்ணீர் போல் கழியும்; சிலசமயம் மாவுபோலும், பச்சையாயும் கழியும்; வார்தி உண்டாகும்; கண் குழிவிழுந்து, கண்ணில் பூழைசேரும்; முகம்வாடும்; கழுத்து மெலியும்; குழந்தை அலறியமும்; நாவரண்டிருக்கும்; சுவாச மிடும்போது நெஞ்சு குழி விழும்; இசிவு உண்டாகும்; உச்சிக்குழி பள்ளமாயிருக்கும்; முகம் மஞ்சளாகத் தோன்றும்; பிள்ளையின் உடல் பச்சிலைநாற்றமடிக்கும்; இந்த வியாதி குழந்தை நடக்க வாரம்பிக்கும் போதுதான் ஏற்படுகிறது.

சிகிச்சை

(1) ஒரிலைத்தாமரை	வெந்தயம்	ரூபாயெடை 1
	ரூபாயெடை 1	சுக்கு
விடத்தலாவேர்	1	வால்மிளகு

ஒன்று சேர்த்துத் தட்டி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 8-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

(2) வெங்காயம்	ரூபாயெடை 1	வாட்டிலாவேர்	ரூபாயெடை 1
சீரகம்	1		

ஒன்று சேர்த்துத் தட்டி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 8-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் காலை மாலை 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(3) மணித்தக்காளிவேர்	வெங்காயம்	ரூபாயெடை 1
	ரூபாயெடை 1	சிற்றமுணக்கெண்ணெய்
பிச்சிவேர்	1	அவுன்ஸ் 12

பொடித்து எண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, ஒரு தேக்கரண்டியளவாக உள்நுக்கும் கொடுத்தும், தலை உச்சியிலும் தடவிவரலாம்.

தோஷப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

பக்ஷி தோஷம்:—

பறவைதோஷ மென்றதின் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

பருஷ தோஷம்:—

சுரம் காயும்; உச்சிக் குழிவிழும்; கண் பள்ளமாயிருக்கும்; திரோகம் மெலியும்; பச்சை நிறமாகவும், தண்ணீராகவும், மலம் கழியும்; வார்தியும்

நாவாட்சியும் உண்டாகும்; குழந்தை சீதா அலறியலறி அழுதக் கொண்டேயிருக்கும்.

சிகிச்சை

தோஷப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

முட்டுத் தோஷம்:—

இதையும் குளிர்தோஷத்திற் கொப்பாகவே சொல்லலாம். சுரம் காயும், திரேகம் மெலியும்; குடித்த பாலை அப்படியே வார்த்திசெய்யும்; சில சமயம் வெறும் தண்ணீர்போலும் வார்த்தியாகும்; கால்மட்டும் குளிர்த்திருக்கும். கண் குழிவிழும்; வாயின் உட்புறம், நாவு, உதடு, முதலியவைகள் கருத்திருக்கும் நாவாட்சிக் காணும்.

சிகிச்சை

சுக்கு	ருபாயெடை $\frac{1}{2}$	மிளகு	ருபாயெடை $\frac{1}{2}$
திப்பிலி	,, $\frac{1}{2}$	சீசகம்	,, $\frac{1}{2}$

இவற்றைச் சுடுதண்ணீர் விட்டு மைபோலரைத்து, இரண்டு கழற்சிக்காயளவு 2-அவுன்ஸ் முலைப்பாலில் கரைத்துக் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

குளிர்தோஷத்துக்குண்டான சிதிச்சையையும், தோஷப் பொது சிதிச்சைகளையும் செய்துக்கொண்டு வரலாம்.

விளக்கொளிக்கண் பசுஷி தோஷம்:—

சுரம் காயும்; வார்தி பண்ணும்; பால் குடியாது. உச்சி குழிவிழும்; பச்சிலைச்சாறுபோலும், பால்போலும் வயிற்றால் போகும்; நாவு உலர்ந்திருக்கும். புறங்கையால் முகத்தைத் தேய்க்கும்.

சிகிச்சை

அதிமதுரம்	ருபாயெடை 1	வசம்பு	ருபாயெடை 1
அதிவிடயம்	,, 1	தேவதாரு	,, 1
கோரைக்கிழங்கு	,, 1	மஞ்சள்	,, 1
கடுக்காய்	,, 1		

ஒன்று சேர்த்தப் பொடுதலைச்சாறு விட்டு மைபோலரைத்துக் குன்றி மணியவ்ளவு பெரிய மாத்திரைகளாக உருட்டிக், காயவைத்து, காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் முலைப்பாலில் ஒரு மாத்திரைவீதம் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

தோஷப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

வெங்கண்பசுஷி தோஷம்:—

சுரம் காயும்; உடல் வெளுத்து மெலியும்; வயிற்றைந்து வெண்மையாகக் கழியும்; வயிற்றில் வலியுண்டாகி குழந்தை தடித்துடித்து அழும்.

சிகிச்சை

மேஸ்தோல் நீக்கிய சோற்றுக்கற்றாழைச் சனையில் ரூபாயெடை 5, எடுத்து இரண்டு மூன்றுதரம் தண்ணீர்விட்டுக் கழவி, ஒரு பீங்கான் பாத்திரத்தில் போட்டு, அதில் முத்தியக்கடுக்காய் ஒன்றை நன்றாகத் தூள் செய்து போட்டுக் கிளரி வைத்திருந்தால், தண்ணீர் கசிந்திருக்கும்; அந்தத் தண்ணீர் அவுன்ஸ் ஒன்றில், வறுத்துத் தூள்செய்த திப்பிலித்தூள் ரூபாயெடை 3-சேர்த்துக் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

தோஷப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

ஸ்திரீ தோஷம்:—

சூரம் காயும்; நெஞ்சு வற்றும்; பெருமூச்சுண்டாகும்; குழந்தை பால் குடியாது. இரவும் பகலும் புரண்டுப் புரண்டு அழும்; தலையில் வியர்வை யதிகரிக்கும்; கண்வெளுத்துப் பஞ்சடையும்; மயக்கமுண்டாகும்.

சிகிச்சை

(1) கஞ்சாக்கோரை ஒரு பிடியை 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3 - அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சி வடிசட்டிய கஷாயத்தில் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

(2) வசம்பு	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	சின்னியிலை	ஒருபிடி
வெள்ளைப்பூண்டு	" $\frac{1}{2}$	குட்டிவிளாயிலை	"
மஞ்சள்	" $\frac{1}{2}$		

தண்ணீரில் விட்டு மைபோலரைத்து உடம்பில் பூசியிருந்து சாயந்திரம் வெந்நீரால் குளிப்பாட்டிவரலாம்.

வெங்கண்பகலி தோஷத்திற்குச் சொல்லிய சோற்றுக்கற்றாழை நீர்க் கொடுத்து வரலாம்.

தோஷப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

தோஷப் பொது மருந்துகள்:—

(1) மஞ்சள்	ரூபாயெடை 3	கோரைக்கிழங்கு	ரூபாயெடை 3
வசம்பு	"	தேவதாரு	" 3
அதிமதுரம்	" 3	கடுக்காய்	" 3
அதிவிடயம்	" 3		

ஒன்று சேர்த்துப் பொடுதலைச்சாற்றால் மைபோலரைத்துத் குன்றிமணி பெரிய மாத்திரைகள் செய்து, காயவைத்து காலை மாலை தேனிலாவது அல்லது ஒரு அவுன்ஸ் முலைப்பாலிலாவது, ஒரு மாத்திரைவீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) சேகம்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	முசுமொசுக்கையிலை	ரூபாயெடை ■
கோரைக்கிழங்கு	„ $\frac{1}{2}$	பொன்னாங்காணி	„ 3
அதிமதுரம்	„ $\frac{1}{2}$	சிறுகீரை	„ 8
ஏலம்	„ $\frac{1}{2}$	சேந்திலவேர்	„ 8
சாதிக்காய்	„ $\frac{1}{2}$	ஆவாராவேர்	„ 8
சாதிப்பத்திரி	„ $\frac{1}{2}$	சிற்றாமணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 28
செண்பகப்பூ	„ $\frac{1}{2}$	வெங்காயச்சாறு	„ 12
இலவங்கப்பட்டை	„ $\frac{1}{2}$		

பொடிக்கவேண்டியவற்றைப் பொடித்துச் சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து 1, 1½ தேக்கரண்டி வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

(8) குட்டிவிளாயிலை	ஒருபிடி	சோம்பு	ரூபாயெடை 1
வேப்பங்கொழுந்த	„	வசம்பு	„ 1
மஞ்சள்	ரூபாயெடை 1	சுக்கு	„ 1

தண்ணீர்விட்டு மைபோலரைத்துக் கலக்கி உடம்பெல்லாம் பூசியிருந்து சுடுத்தண்ணீரில் தேய்த்துக் குளிப்பாட்டிய உடன் :—

நன்னூலிவேர்	ரூபாயெடை ■	பொன்னாங்காணி	ரூபாயெடை 3
தண்ணீர்விட்டான்		ஏலம்	„ $\frac{1}{2}$
கிழங்கு	„ 3	சேகம்	„ $\frac{1}{2}$
கொட்டைக்கரந்தை	„ 3		

இவற்றைப் பசும்பால் விட்டரைத்து :—

பசுநெய்	அவுன்ஸ் 24	நல்லெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 12
---------	------------	-------------	------------

ஒன்று சேர்த்து அரைத்தவைகளைக் கலக்கிக் காய்ச்சி வடித்து 1, 1½ தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

(4) மேற்றோல் நீக்கிய சோற்றுக்கற்றாழைச்சோறு ரூபாயெடை 5 எடுத்து இரண்டு மூன்றுதரம் நல்லத்தண்ணீர்விட்டுக் கழுவி, அதை ஒரு பீக் கான் பாத்திரத்தில் போட்டு, அதன்மேல் நன்றாகப் பொடிசெய்த ஒரு முற்றிய கடுக்காயின் தூளைப்போட்டுப் பிசரிவைக்க, கொஞ்சநேரத்தில் தண்ணீர் கசிந்திருக்கும். அந்தத் தண்ணீர் அவுன்ஸ் ஒன்றில், வறுத்துத் தூள்செய்த திப்பிலித் தூள் ரூபாயெடை அரைக்கால் சேர்த்துக் கலந்து காலை மாலைகளில் கொடுத்துவரலாம்.

(5) கோரோசனை	ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$	திப்பிலி	ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$
அதிமதுரம்	„ $\frac{1}{8}$		

1½-அவுன்ஸ் முலைப்பாலில் அரைத்துக் கரைத்து வடிகட்டி காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

(6) கால்வீவி லாக்டோ பாஸ்பேட் (Calcii Lacto Phosphate)

	கிரைன்ஸ்	2
ஒலியம் மொரோ (Oleum Morrhue)	துளி	45
லைக்கர் கால்வீஸ் (Liquor Calcis)	,,	45
டிஞ்சர் கலம்பா (Tincture Calumbae)	,,	9
தண்ணீர்	டிராம்	8

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஆகாரத்திற்குப்பின் ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(7) ஒலியம் மொரோ (Oleum Morrhue) துளி 45

ஒலியம் காவியா (Oleum Cassiae) ,, 12

கம் அக்கேஷியா (Gum Acacia) போதுமான அளவு
(அதாவது எண்ணெய் கலந்து தூளாகும் வரை)

ஒன்று சேர்த்துக் கலக்கிக்கொண்டு :—

சிரப் கால்வீஸ் லாக்டோ பாஸ்பேட் (Syrup Calcis
Lacto Phosphate) துளி 25

லைக்கர் கால்வீஸ் (Liquor Calcis) ,, 25

சோடியம் ஐப்போ பாஸ்பேடீஸ் (Sodium Hypo
Phosphatis) கிரைன்ஸ் 1

தண்ணீர் டிராம் 3

ஒன்று சேர்த்து, நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஆகாரத்திற்குப்பின் ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

தோஷத்தில் நாவரச்சியாயிருந்தால் :—

சிகிச்சை

கோஷ்டம்	ரூபாயெடை	½	ஆமையோடு	ரூபாயெடை	½
சீரகம்	,,	½	சந்தனம்	,,	½
ஏலம்	,,	½	மாண்கொம்பு	,,	½
சுக்கு	,,	½	சுக்குநாறிப்புல்	,,	½
அதிமதுரம்	,,	½	நெற்பொரி	,,	½
கூவினம்வேர்	,,	½			

ஒன்று சேர்த்துப் போதுமான தண்ணீரில்விட்டு நாலொன்றாய்ச் சுண்டக் காய்ச்சிய சுஷாயத்தில் 1, 1½-அவுன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

தோஷத்தில் வயிற்றேட்டத்தை நிறுத்தும்—

சிகிச்சை

ஒலியம் ரெசினி (Oleum Ricini)	துளி	21
லைக்கர் பிஸ்மத் (Liquor Bismuth)	"	21
கம் அக்கேஷியா (Gum Acacia)	டிராம்	1
சர்க்கரை	"	$\frac{1}{2}$
ஆக்குவா சின்னமோனி (Aqua Cinnamome)	"	8

ஒன்றுசேர்த்து நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை அரை அவுன்ஸ் தண்ணீரில் ஒரு தேக்காண்டி மருந்து கலந்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துவரலாம்.

காய்ச்சல்—சுரம்

(FEVERS—FEBRICULAS)

காய்ச்சல் தனிப்பட்ட ஓர் வியாதியல்ல. சரீர இரத்த நாளங்களில் அழற்சிக் கண்டு, இரத்தம் வீங்கித்து திரேகத்தையும் சருமத்தையும் உஷ்ணிக்கச் செய்கிறது.

குழந்தைகளுக் கேற்படும் காய்ச்சல் விசேஷமாக தடுமன் பிடித்துக் கொள்ளுவதினாலேயே உண்டாகலாம். ஆனால், குழந்தைகளுக்கு இன்புளு வென்ஸாசரம் அதிகமாய் வருவதில்லை.

சாதாரணமாகத் திரேகத்தின் உஷ்ண அளவு, 98. 4-டிகிரியாக இருக்கவேண்டியது, சுரத்தில் 100-முதல் 106-டிகிரிவரை யிருக்கும். 106-டிகிரியே மிகக் கொடுமையானதாக விருக்கும். அதற்குமேல் திரேகம் உஷ்ணமடையாமல் இரத்த ஒட்டத்தைத் தடைச்செய்து, சரம்த்தைக் குளிர்ச்செய்து, சன்னி யேற்படச் செய்துவிடும்.

காய்ச்சல்மட்டும் பெரியவர்களுக்கும், சிறியவர்களுக்கும் ஒன்றாகவே யிருக்கும்; ஆனால், குழந்தைகளுக் கணையினாலும், மார்த்தத்தினாலும், தோஷத்தினாலும், பல் முளைப்பதினாலும் ஏற்படும் சுரம்மட்டும் தனிமையாகவே யிருக்கும். பெரியவர்களுக் கேற்படும் சுரம் 64 என்று தமிழ்வைய நூற்கள் கூறுகின்றன. சிறுவர்களுக் குண்டாகும் சுரவகுப்புக்களைக் கீழே குறித்திருக்கிறோம். ஒவ்வொரு சுரத் தலைப்பின்கீழும், ரோககிதானத் தைக் கூறி விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அசுதிகுரம்	அற்பசுரம்
அட்ச்சரமாரந்தசுரம்	அன்புனாசுரம்
அபிரியாசசன்னிகுரம்	அஜீரணசுரம்
அர்த்தராத்திரிகுரம்	அஸ்திகுரம்

ஆமசுரம்

ஆமாதிசாசுரம்

இரத்தசுரம்

இராசுரம்

இன்புருவென்ஸாசுரம்

உட்சுரம்

கடுமையான சளிசுரம்

கணைசுரம்

கபசுரம்

குளிர்சுரம்

சந்திபாதசுரம்

சன்னைக்கடுப்புச்சுரம்

சாமசுரம்

சித்தவிப்ரமச்சன்னிபாதசுரம்

சிலேத்பனசுரம்

தருணசுரம்

தனிச்சுரம்

நிமோனியாசுரம்

பல்முனைக்கும்போதுண்டாகும்சுரம்

பழஞ்சுரம்

பித்தசுரம்

பித்தசிலேதம்சுரம்

பிரஞ்சோநிமோனியாசுரம்

மாங்கிஷ்சுரம்

மாந்தக்கணைசுரம்

மாந்தசுரம்

முறைசுரம்

வாதசுரம்

வாதசிலேத்பனசுரம்

வாதபித்தசுரம்

விடாசுரம்

விஷசளிசுரம்

விஷசன்னிசுரம்

அசதி சுரம்:—

சன்னைக்கடுப்புச்சுரம் என்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

அச்சர மாந்தசுரம்:—

அச்சரமாந்த ரோகத்திற்குண்டான எல்லா குறிகளுமிருந்து, அத்துடன் சுரம்மட்டும் கடுமையாயிருக்கும்; குளிர் நடுக்கம் ஏற்படும்; உதடுகள் வெடிப்புக் காணும்; வாயிலும், நாவிலும் வெண்ணிறமாக மாவுபடிந்திருக்கும்; வாய் ஒரு அழலைநாற்ற மடிக்கும்; குழந்தைப் பால் குடியாது; கண் திறவாமல் அழுதுகொண்டேயிருக்கும்; இத்துடன் வயிற் றோட்டமும் காணும்.

சிகிச்சை

பூவரசன்யிலை	ரூபாயெடை 3	பூவரசம்பூ	ரூபாயெடை 3
பூவரசன்காய்	" 3		

ஒன்றுச் சேர்த்து மைப்போலரைத்து, பில்லையாகத் தட்டி, சிற்றாம ணக்கெண்ணெய் அவுன்ஸ் 24-ல் போட்டு, பில்லைகள் பொன்னிறமாக வரும்வரை காய்ச்சி, பில்லையை எடுத்துவிட்டு அந்த எண்ணெயில்:—

சாதிக்காய்	ரூபாயெடை 3½	எலம்	ரூபாயெடை 3½
சாதிப்பத்திரி	" 3½		

தான் செய்துபோட்டு 1½ தேக்கரண்டிவீதம் கொடுத்து வரலாம்.

சுரப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

அபிநியாச சந்திரம்—Pneumonia

இதையே கபசரம், விஷசன்னிச்சரம் என்று சொல்லப்படும். இந்தச்சரம் சரதாரணமாக ஒன்றிரண்டு வயதுக் குழந்தைகளுக்கு வருவதுண்டு. சுரரோகத்தில் இது கொடியதன்மையுடையது. கபசரம் உண்டானால் சற்று எச்சரிக்கையாகவே சிகிச்சைகளும் செய்யவேண்டும். அப்படி இல்லாத பஷத்தில் விபத்து உண்டாகிவிடும். நுரையீரலில் சிறு கொப்புளங்கள் உண்டாவதினாலேயேதான் கபசரம் ஏற்படுகிறது.

கபசரத்தில் திரேகோஷ்ணம் மிகுதிப்பட்டிருக்கும்; கஷ்டமான இரும் லுடன் சில சமயம் வார்தியுண்டாகும்; இருமும் சிலசமயம் இழுப்புக் கண்டு விடுவதுமுண்டு. சுவாசம் தீவிரமாகவும் நாடி நடையானது படபடத்து மிருக்கும். அடிக்கடி வரட்சியான இரும்லும், அதிகக் கஷ்டத்தின் பேரில் அழுக்கு நிறமான கோழையும் வெளிப்படும்.

இருமும்போது நெஞ்சம் தொண்டைக்குழியும் புண்பட்டதேபோல் வலிக்கும்; உதட்டின்பேரில் வெயர்க்கூருபோன்ற சிறு நமைச்சல் கள் உண்டாயிருக்கும். பெரியவர்களுக்குண்டாகும் கபசரத்திற்கும் சிறியவர்களுக்குண்டாகும் கபசரத்திற்கும் பெரும் வித்தியாசமுண்டு. இதையே அள்ளுமார்த சுரமென்றும் கூறுவர்.

சிகிச்சை

(1)	கரிசலாங்காணி ரூபாயெடை $\frac{3}{4}$	கண்டுபாரங்கி ரூபாயெடை $\frac{3}{4}$
	சிறுவழுதலை ,, $\frac{3}{4}$	சுக்கு ,, $\frac{3}{4}$
	பெருவழுதலை ,, $\frac{3}{4}$	திப்பிலி ,, $\frac{3}{4}$
	கருநொச்சி ,, $\frac{3}{4}$	மிளகு ,, $\frac{3}{4}$
	நிலவேம்பு ,, $\frac{3}{4}$	கொடிவேலி ,, $\frac{3}{4}$
	பொன் முசுட்டை ,, $\frac{3}{4}$	கோஷ்டம் ,, $\frac{3}{4}$
	வெட்டாலைப்பட்டை ,, $\frac{3}{4}$	சிற்றரத்தை ,, $\frac{3}{4}$
	மதுக்காரை ,, $\frac{3}{4}$	கடுக்காய்த்தோல் ,, $\frac{3}{4}$
	திப்பிலிக்கட்டை ,, $\frac{3}{4}$	ஒமம் ,, $\frac{3}{4}$
	தேவதாரு ,, $\frac{3}{4}$	வசம்பு ,, $\frac{3}{4}$
	வாய்விளங்கம் ,, $\frac{3}{4}$	செவ்வியம் ,, $\frac{3}{4}$
	பால்சாம்பிராணி ,, $\frac{3}{4}$	

இவற்றையெல்லாம் பொடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில், நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை, 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(2)	நிலவேம்பு ரூபாயெடை 1	சிற்றரத்தை ரூபாயெடை 1
	சிந்தில்தண்டு ,, 1	திப்பிலி ,, 1

கண்டங்கத்திரிவோர்	„	1	கோஷ்டம்	„	1
பூணக்காஞ்சொறி	„	1	தேவதாரு	„	1
கடுகுரோகிணி	„	1	சக்கு	„	1
பர்ப்பாடகம்	„	1	கடுக்காய்	„	1
கிச்சிலிக்கிழங்கு	„	1	கண்டுபாரங்கி	„	1
			தூராயிலை	„	1

இவற்றையெல்லாம் பொடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை, வேளை ஒன்றுக்கு ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(3) முருங்கப்பட்டை	1	வசம்பு	1
எருக்கம்பேர்ப்பட்டை	„ 1	சக்கு	„ 1
நொச்சியிலை	„ 1	திப்பிலி	„ 1
கரிசலாங்காணி	„ 1	திப்பிலிக்கட்டை	„ 1
நிலவேம்பு	„ 1	கொடிவேலி	„ 1
தேவதாரு	„ 1	செவ்வியம்	„ 1
சிற்றரத்தை	„ 1	அதிவிடையம்	„ 1
வெள்ளைப்பூண்டு	„ 1		

இவற்றை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை, வேளை ஒன்றுக்கு 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(4) கோரோசனை மாத்திரை; சுரபூபதி மாத்திரை; தக்காளிக் கோரோசனை மாத்திரை; பாலசுரஹர மாத்திரை; பாலவிநோத சஞ்சீவி மாத்திரை; பாலசஞ்சீவி மாத்திரை; பாலசுரகுடோரி மாத்திரை; பாலசுரவிஷஹர மாத்திரை இவைகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் காண்க.

(5) டிஞ்சர் அக்கோனிட் (Tincture Aconite)	துளி	1
லைக்கர் அமோனியம் அவிட்டேட் (Liquor Ammonium Acetate)	„	10
லைக்கர் லாபூரோ சிரோவரி (Liquor Lauro Cerasi)	„	■
சிரப் சிம்பிள் (Syrup Simple)	■	15
தண்ணீர்	டிபாஸ்	■

ஒன்று சேர்த்துக் கலக்கிக்கொண்டு, 1 முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை, வேளை ஒன்றுக்கு ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

- (6) லைக்வர் அமோனியம் அவிட்டேட் (Liquor Ammonium Acetate) டிராம் 3
 பொட்டாஷியம் சிட்ரஸ் (Potassium Citras) " 1
 வைனம் இப்பிகாக் (Vinum Ipecace) " 1
 சிரப் அரோமாட்டிக்ஸ் (Syrup Aromatics) " 1
 தண்ணீர் அவுன்ஸ் 2

ஒன்று சேர்த்துக் கபசரத்தில் அதிகமான சனியிருக்கும் சமயம் 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, நாலுமணி நேரத்திற் கொருதடவை, ஒரு தேக் கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

- (7) ஸ்பிரிட் அமோனியம் அரோமாட்டிக் (Spirit Ammonium Aromatic) துளி 16
 வைனம் இப்பிகாக் (Vinum Ipecace) " 8
 டிஞ்சர் டிஜிடாலிஸ் (Tincture Digitalis) " 2
 சிரப் டோலு (Syrup Tolu) டிராம் 1
 தண்ணீர் " 4

ஒன்றுசேர்த்துக் கலந்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4 மணி நேரத்திற்கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

- (8) சோடியம் நைட்ரேட் (Sodium Nitrate) கிரான் 1
 சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti) துளி 25
 இன்பியூஷன் டிஜிடாலிஸ் (Infusion Digitalis) டிராம் 2

ஒன்றுசேர்த்துக் கலந்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற்கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

- (9) கிரியோசோட் (Creasote) துளி 10
 பொட்டாஷியம் ஐயோடைட் (Potassium Iodide) கிரான்ஸ் 2
 ஸ்பிரிட் வைனம் ரெக்டிபைட் (Spirit Vinum Rectified) துளி 10
 எக்ஸ்டிராக்ட் கிளிசிரிசா லிக்டுட் (Extract Glycerrhiza Liquid) டிராம் 2
 தண்ணீர் அவுன்ஸ் 2

ஒன்றுசேர்த்துக் கலந்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற்கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

கபசரத்தில் நெஞ்சில் அதிகமான சளிக்கட்டி திட்டெழுட்டடித்தால் சளியை இளகும்படியாக் மேல் பிரயோகமாக :-

- (10) அன்டிபிளாஜெஸ்டைன் (Antiphlogistine) என்னும் மருந்தை சற்றுநேரம் சுடுதண்ணீர் வைத்துச் சூடுண்டாக்கி, அதை ஒரு மெல்லிய

துணியில் தடவி நெஞ்சுக்குழியில் போட்டு வைக்கலாம் அல்லது ஆளி விரையைக் களிக்கிண்டிச் சுடச்சுட ஒரு துணியில் தடவி நெஞ்சுக்குழியில் போட்டு வைக்கலாம்.

சுரப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

அம்மைச்சுரம்:—

அம்மை என்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

அர்த்தராத்திரிச்சுரம்:—

சாமசுரம் என்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

அற்ப சுரம்—Simple Fever.

இதைத் தனிச்சுரம், தருணச்சுரம் என்றும் சொல்லப்படும். திரே கோஷ்ணம் 93-மிகிரிக்குக் கொஞ்சம் அதிகப்பட்டாலும், சுரம் என்றுதான் சொல்லவேண்டும். அற்பசுரம் 101, 102-மிகிரிக்கு மேல் உஷ்ணமிருக்காது.

ஜீரணிக்காத ஆகாரங்களைப் புசிப்பதினாலும், ஈரத்தில் ஈடமடல் குளிரி வீருத்தல் முதலிய இயற்கைப்பேதத்தாலும், பல் முலைக்கையிலும் பெரும்பாலும் அற்பசுரம் ஏற்படுகிறது.

சாதாரணமாக உடம்பு அசதி, களைப்பு, பசிமந்தம், தாகம், நாவாட்சி, தலை நெற்றி முதலிய விடங்களில் வலி முதலியவைகளும், மூத்திரம் பெய்யும்போது எரிச்சலும் உண்டாகும். மூத்திரம் மஞ்சள் நிறமாக விறங்கும்; சரீரம் வரண்டிருக்கும்; நாவில் மாவுப்படிந்திருக்கும்; தொண்டைப் புகைச்சல் இருமல் இவைகளேற்படும்; நாடி தீவிரமாக விரும்பும்; காலை நேரத்தில் சுரம் சற்றுத் தணிந்து, சாயந்திரங்களில் சற்று அதிகப்பட்டிருக்கும்; நித்திரையில் வாய்ப்பிதற்றும்.

சிகிச்சை

தலை அதிக சூடாயிருந்தால்:—

- | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| (1) | காடி | அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$ | தண்ணீர் | அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$ |
| | ஒன்று சேர்த்துத் தலையில் தடவலாம். | | | |
| (2) | தூதுவேளையிலை | ஒருபிடி | கோஷ்டம் | ரூபாயெடை 1 |
| | கண்டங்கத்திரிவேர் | | சிற்றாத்தை | " 1 |
| | | ரூபாயெடை 1 | சுக்கு | " 1 |
| | முகமுசுக்கையிலை | " 1 | திப்பிலி | " 1 |
| | கொடிவேலி | " 1 | மிளகு | " 1 |

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை கொடுத்து வரலாம்.

(3) காய்ந்த ஆடுதின்றிப்பாளை வேர் மேல்பட்டை ரூபாயெடை 3
கருவாப்பட்டை ,, 3

ஒன்று சேர்த்து, எலுமிச்சம் பழச் சாற்றால் மைபோலரைத்துக் குன்றி மணியல்வளவு பெரிய அளவாக மாத்திரைகள் செய்து காயவைத்து:—

விஷ்ணுகிரந்தி ரூபாயெடை ½ சுக்கு ரூபாயெடை ½
இண்டு ,, ½ கடுக்காய் ,, ½
வாலுமுவை ,, 1

ஒன்று சேர்த்து, 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயம் அவுன்ஸ் ஒன்றில், காலை மாலை ஒரு மாத்திரை வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(4) வெட்டிவேர் ரூபாயெடை 1 தோல் நீக்கிய சுக்கு ரூபாயெடை 1
விலாமிச்சமேவர் ,, 1 செஞ்சந்தனம் ,, 1
கோரைக்கிழங்கு ,, 1 பற்பாடகம் ,, 1

ஒன்று சேர்த்துத் தட்டி, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(5) தேவதாரு ரூபாயெடை 1 சிறுவழுதலை ரூபாயெடை 1
கொத்தமல்லி ,, 1 பெருவழுதலை ,, 1
சுக்கு ,, 1

இவற்றை 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(6) கோரோசனை மாத்திரை; கஸ்தூரி மாத்திரை; பால சுரஹர மாத்திரை; சுரபூபதி மாத்திரை; பாலசுர குடோரி மாத்திரை; பாலசுர விஷஹர மாத்திரை இவைகளைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(7) காலோமல் (Calomel) கிரைன் 1
சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb) ,, 1

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரே தடவையாக வாயில் கொட்டி விழுங்கச் செய்தால் மலம் இரண்டொருமுறை வெளியாகி சுரமும் தணியும். இதை இரவில் படுக்கைக்குப் போருமுன் கொடுத்தல் நல்லது.

(8) கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine Sulphus)	கிரான்ஸ்	12
ஆவீட் சல்பியூரிக் டில் (Acid Sulphuric Dil.)	துளி	24
சர்க்கரை	டிசாம்	2
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	3

முதலில் கொய்னைன் சல்பைஸ், ஆவீட் சல்பியூரிக் டில் விட்டுக் கரைத்துக்கொண்டு, பின் ஒன்று சேர்த்துக் காய்ச்சல் கொஞ்சம் மட்டாயிருக்கும் சமயம் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரு தேக்கரண்டி வீதமும், 3-10-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு இரண்டு தேக்கரண்டி வீதமும் கொடுத்து வரலாம்.

(9) எப்ஸம் ஸால்ட் (Epsom salt)	கிரான்ஸ்	8
டிஞ்சர் சென்னா கோ (Tincture sennae Co)	துளி	6
டிஞ்சர் ஜிஞ்சிபெரிஸ் (Tincture Zingiberis)	,,	1
தண்ணீர்	டிசாம்	1

ஒன்று சேர்த்து, ஒரே தடவையாக 1-முதல் 3-வயது குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்க, 4, 5-முறை மலம் வெளியாகி குடு தணியும். பின்னும் காய்ச்சலிருந்தால் 109-வது பக்கம் 8-வது இலக்கமுள்ள கொய்னைன் மிக்ச்சர் கொடுத்து வரலாம்.

(10) லைக்கர் அமோனியா அவிட்டேட் (Liquor Ammonia Acetate)	டிசாம்	1
ஸ்பிரிட் ஈதர் நைட்ரோஸி (Spirit Aether Nitrosi)	துளி	10
பொட்டாஷியம் விட்ரஸ் (Potassium Citras)	கிரான்ஸ்	15
ஆக்குவா காம்ப்ர் (Aqua camphor)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற் கொருமுறை ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

சரப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

அன்புநி சுரம்:—

காய்ச்சல் கொரோமாயிருக்கும்; கண் சிவந்திருக்கும்; காவரட்சி யதிசுமாயிருக்கும்; குழந்தை அவறியவறி அழும்; மலச்சிக்கல் ஏற்படும்.

சிகிச்சை

(1) கோரோசனை	ரூபாயெடை	$\frac{1}{2}$	கோஷ்டம்	ரூபாயெடை	$\frac{1}{2}$
அதிமதுரம்	"	$\frac{1}{2}$	சண்பகப்பூ	"	$\frac{1}{2}$
விலாயிச்சம்பேர்	ரூபாயெடை	$\frac{1}{2}$	மாசிப்பத்திரி	"	$\frac{1}{2}$
வெட்டிவேர்	"	$\frac{1}{2}$	சாஸ்திரப்பேதி	"	$\frac{1}{2}$
			ஏலம்	"	$\frac{1}{2}$

இவைகளை ஒன்று சேர்த்துப் பச்சைவெட்டி வேர் தண்டின் சாற்றினு
லாவது முலைப்பாலிலாவது மைபோலரைத்துக் குன்றிமணியல்வனவு பெரிய
மாத்திரைகள் செய்து காயவைத்து, 1-அவுன்ஸ் முலைப்பாலில் ஒரு மாத்
திரை வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

முதலில் மலச்சிக்கலைப் போக்க:—

(2) காலோமல் (Calomel)	கிரான்	1
சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb)	”	1

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரே தடவையாக
வாயில் கொட்டி விழுங்கச் செய்யலாம் 2, 3-தரம் மலம்கழிந்து குடுதணியும்.

மலம் வெளியாகி குடு தணிந்தவுடன்:—

(3) கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine Sulphus)	கிரான்ஸ்	12
ஆவிட் சல்பியூரிக் டில் (Acid Sulphuric Dil)	துளி	24
சர்க்கரை	டிபாம்	2
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	■

முதலில் கொய்னைன் சல்பஸை ஆவிட் சல்பியூரிக் டில் விட்டுக் கரைத்
துக்கொண்டு, பின் ஒன்று சேர்த்து, நாள் ஒன்றுக்கு 3-தடவை 1-முதல்
3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரு தேக்கரண்டியளவாகவும், 3-முதல் 10-வய
துக் குழந்தைகளுக்கு இரண்டு தேக்கரண்டியளவாகவும் கொடுத்து வரலாம்.

சுரப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

அஜீரணச் சுரம்:—

அதிகமான ஆதாரம் உட்கொள்ளுவதினாலும், சேக்கிரம் ஜீரணிக்கக்
கூடாத பதார்த்தங்களைப் புசிப்பதினாலேயும், அவைகள் சரியானவித
மாய் ஜீரணியாமல் குறித்தகாலத்திற் கதிகமாய் வயிற்றில் தங்கி
புளிப்பை யுண்டாக்கி, அதனால் காச்சல் ஏற்படுகிறது அஜீரணசுரத்
தில் பசிமந்தம், விக்கல், கொட்டாவி, புளித்தேப்பம் முதலிய குறி
கள் ஏற்படும்.

சிகிச்சை

(1) சுக்கு	ருபாயெடை $\frac{3}{4}$	துணியிலே (மஞ்சளெத்தி) ஒருபிடி
மிளகு	” $\frac{3}{4}$	வேப்பங்கொழுந்து
ஓமம்	” $\frac{3}{4}$	”

முதலில் துணியிலையும், வேப்பங்கொழுந்தையும் ஒரு சட்டியில்போட்டு
வறுத்து, சிவந்து வரும் சமயம் மற்றவைகளையும் தூள் செய்து போட்டு,
24-அவுன்ஸ் தண்ணீர் விட்டு, ■ அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சி வடித்து,
ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

(2) காட்டாத்திப்பூ ரூபாயெடை	1	வெட்டிவேர் ரூபாயெடை	1
வில்வப்பழம்	1	குருவிவேர்	1
யானைத்திப்பிலி	1		

எல்லாவற்றையும் ஒன்று சேர்த்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

(3) சீந்தில்தண்டு ரூபாயெடை	1	பெருமரத்துப்பட்டை ரூபாயெடை	1
சிற்றூழுட்டி	1	குருவிவேர்	1
பூனைக்காஞ்சொறி	1	அதிவிடயம்	1
பற்பாடகம்	1	கோரைக்கிழங்கு	1
வெட்டிவேர்	1	கொத்தமல்லி	1

ஒன்றாகச் சேர்த்துப் பொடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு நன்றாகப் பிசைந்து 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

சுரப் பொது மருத்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

(4) எப்சம் சால்ட் (Epsom Salt)	கிரான்ஸ்	40
மெக்னீஷியா கார்போனஸ் (Magnesia Carbonus)	,,	5
ஆக்குவா அனிசி (Aqua Anisi)	அவுன்ஸ்	½

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து, ஒரே தடவைதான் கொடுக்கலாம். 4-மணி நேரத்தில் மலம் வெளியாகிக் காச்சலும் தணியர்விட்டால் பின்னும் ஒரு முறை மட்டும் கொடுக்கலாம்.

(5) கோரோசனை மாத்திரை; பாலசஞ்சீவி மாத்திரை கொடுக்கலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

அஸ்தி சுரம்:—

எலும்புகளில் அனல் ஏற்படுவதினால் இந்த சுரம் உண்டாகிறது. சுரம் அதிகமாயிருக்கும்; திரோகம் மெலிந்து வற்றும்; அடிக்கடி வெண்மையான வார்தியுண்டாகும்; உடல் முழுவதும் நச்சு வலியாகவிருக்கும்; இரவில் சுரம் அதிகமாயிருக்கும்; இருமலேற்படும்; நாட் செல்லச் செல்ல உடல் வெளுத்து வீழ்க்காணும்.

சிகிச்சை

(1) சாஸ்திரபேதி ரூபாயெடை	¾	கெல்லிவற்றல் ரூபாயெடை	¾
அநிமதுரம்	¾	சண்பகப்பூ	¾
கோஷ்டம்	¾	கொத்தமல்லி	¾
சந்தனம்	¾	விலாமிச்சம்பேர்	¾

வலம்	■	3 1/2	பருத்திக்காய்ச்சாறு	அவுன்ஸ்	1
சேகம்	„	3 1/2	பொன்னுங்காணிச்சாறு	„	12
கொன்றைப்பிளின்	„	3 1/2	பசுவாய்	„	24
உருத்திராக்ஷம்	„	3 1/2			

பொடிக்கவேண்டியவற்றைப் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, 3-ரூபாயெடை சீனிசேர்த்துக் கலக்கி வைத்துக்கொண்டு, காலை மாலை 1 1/2, 2-தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

வீரகுதிரந்தாமணி கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

சுரப் பொதுமருந்துகளி் லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

ஆம் சுரம்:—

பசுவில் சுரம் அதிகமாயிருக்கும்; நடுக்கல் காணும்; திரோகம் மெலியும்; தலைவலியிருக்கும்; கைகால் குளிர்ந்திருக்கும்; குழந்தை சீறியழும்.

சிகிச்சை

(1) சங்கம்வேர்	ரூபாயெடை	■	ஓமம்	ரூபாயெடை	1/2
கூதுவேலாவேர்	„	3	மிளகு	„	1/2
வேலிப்பருத்திவேர்	„	3	வசம்பு	„	1/2
பொன்னுங்காணிவேர்	„	3	திப்பிலி	„	1/2
பொடுதலை	„	1/2	வெள்ளைப்பூண்டு	„	1/2
			ஆமையோடு	„	1/2

வேர்களுயும் பொடுதலையும் தட்டி, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, அதில் ஓமம் முதல் ஆமையோடு 6-சரக்கையும் ஒரு வெள்ளைத் துணியில் முடிந்துபோட்டு, 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டும்வரைக் காய்ச்சி கஷாயத்தை வடித்து, அதில் துணியில் முடிந்திருப்பவைகளை மைபோலரைத்துக் கலக்கி, 1, 1 1/2 அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

(2) வேலிப்பருத்திக்காம்பு	ஒருபீடி	துணியிலே	(மஞ்சளெந்தி)
பாவட்டையிலே ஈர்க்கு	„	யீர்க்கு	ஒருபீடி
முருங்கையீர்க்கு	„	பொடுதலை	„

நசுக்கி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, அதில்:—

ஓமம்	ரூபாயெடை	1/2	வசம்பு	ரூபாயெடை	1/2
திப்பிலி	„	1/2	ஆமையோடு	„	1/2

இவற்றை ஒரு வெள்ளைத் துணியில் முடிந்துபோட்டு 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சிக் கஷாயத்தை வடித்து, அதில் துணியில் முடிந்திருப்பவை

களை மைபோலரைத்துக் கலக்கி, 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை கொடுத்து வரலாம்.

சுரப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

ஆமாதிரசார் சுரம்—Dysentric Fever.

அதிகமான உஷ்ணத்தினால், ஜீரணக்கருவிகள் அழிவடைந்து சுரம் ஏற்படுகிறது. மலத்துவாரம் கடுப்பாயிருக்கும்; மலத்துடன் சேதமும், இரத்தமும் விழும்; திரோகம் வெளுக்கும்; கைகால் சோரும்; இருமல் உண்டாகும் மொத்தத்தில் சொல்லவேண்டுமானால், சேதபேதியுடன் கடுஞ்சுரமுமிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) சுக்கு	ரூபாயெடை 1	ஓம்ம்	ரூபாயெடை 1
திப்பிலி	” 1	கடுக்காய்ப்பூ	” 1
மிளகு	” 1	சிறுதேக்கு	” 1
சாதிக்காய்	” 1	இலவம்பிசின்	” 1
கிராம்பு	” 1	விளாம்பிசின்	” 1
சீமையகிலிடயம்	” 1	வில்வப்பிசின்	” 1
கழற்சிப்பருப்பு	” 1	மாதுளம்பிஞ்சு	” 1
சீரகம்	” 1	வில்வப்பழச்சதை	” 1

இவற்றையெல்லாம் ஒன்றாக ஒரு மண்சட்டியில் போட்டு, கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டு வாசனை வரும் வரை வறுத்து, வடிகட்டிய தயிர்த் தண்ணீர் விட்டு மைபோலரைத்து, 1, 2-கழற்சிக்காய்ளவாக ஒரு அவுன்ஸ் தயிர்த்தண்ணீரில் கலக்கிக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) சாதிக்காய்	ரூபாயெடை 1	புளியங்கொட்டை மேற்றோல்
புளியம்பருப்பு	” 1	ரூபாயெடை 1

நன்றாகத் துளியெடுத்து வைத்துக்கொண்டு, வில்வப்பழச் சதையுடன் சேர்த்துப் பிசைந்து ஒரு சுண்டக்காய்ப் பிரமாணமாய்க் கொடுத்து வரலாம்.

(8) மகாரசப்பஸ்பம்; சுவரணவெள்ளிப்பஸ்பம் இவைகளைக் கொடுத்து வரலாம். செய்யுறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(4) பல்விஸ் இபிகாக் (pulvis Ipecace)	கிரான்ஸ் 1
பல்விஸ் கிரீட்டா அரோமாட்டிக் (Pulvis Oreta Aromatic)	” 5

ஒன்று சேர்த்து மூன்று பொட்டமாகப் பிரித்து, நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு பொட்டலம் வீதம் 1-முதல் 3-வதுதக் குழந்தைகளுக்குத் தேனில் குழைத்தாகிலும் வெறும் வாயில் கொட்டிச் சப்பி விழுங்கும்படியாகிலும் கொடுத்து வரலாம்.

இரத்த சுரம்:—

சுரம் கடுமையாயிருந்து பிறகு இலேசாய் விடும்; சற்று விட்டு மறுபடியும் கடுமையாக் காயும்; வயிற்றோட்டமும், மயக்கமும் காணும்; நாவாட்சி ஏற்படும். கைகால் சோர்ந்து குளிர்ந்திருக்கும்.

சிகிச்சை

- (1) நாவிக்கிழங்கு ரூபாயெடை 1 வெங்காரம் ரூபாயெடை 1
திப்பிலி ,, 1 ■ சுத்திசெய்தசாதிவிக்கம் ,, ½

வேப்பம்பழச்சாற்றால் 6-மணி நேரம் மைப்போலரைத்து, மிளகவ்வளவு பெரிய மாத்திரைகள் செய்து காயவைத்து:—

சேகம் ரூபாயெடை ½ கிராம்பு ரூபாயெடை ½

ஒன்றும் 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 2-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயம் ஒரு அவுன்வில் ஒரு மாத்திரை வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

- (2) மகாரசிப்பஸ்பம்; சுவர்ண வெள்ளிப் பஸ்பம் கொடுத்துவரலாம். செழுறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

இராச்சுரம்:—

சாமச்சுரம் என்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

இன்புளுவென்ஸா—Influenza

இன்புளுவென்ஸாவென்பது ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்குத் தொத்தும் தன்மையுள்ள விஷக்கிருமிகளால் உண்டாகக்கூடிய விஷத் தன்மையுள்ள கடுமையான சளிசுரமாகும். இதுமிகவும் அபாயகரமானவியாதி.

இன்புளுவென்ஸாச்சுரம், குழந்தைகளுக்கு வருவதில்லையென்று சொல்லப்படுகிறதாயினும், சில சமயங்களில் தாய்க்கும், குழந்தையிடம் நெருங்கிப் புழங்குவோருக்கும் ஏற்படுவதால், அதன் காரணமாகக் குழந்தைகளுக்கும் இந்நோய் சம்பவிக்கிறது.

ஆரம்பத்தில் சாதாரணமாகச் சளிப்பிடித்திருப்பதைவிட சற்று அதிகமாயிருக்கும். உட்புறம் மிகுதியாக விஷத்தன்மைக் கொண்டிருந்தாலும், வெளித்தோற்றத்திற்கு தோன்றாமலேயிருக்கும். இன்புளுவென்ஸா சுரத்தில் திரேகோஷ்ணம் 102-டிகிரிக்கு மேலாகவேதானிருக்கும். முதுகில் ஒரு உணர்ச்சியுடன் ஒருவித நோயுமிருக்கும். தலைவலி ஏற்படும். கை கால்களில் அசதியான வலியுண்டாகும். சில சமயங்களில் தொண்டைப் புகைச்சலும், வயிற்றோட்டமாயிருக்கும்.

■ சுத்திமுறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

சிகிச்சை

- (1) ஆடாதோடையிலை ஒருபிடி கோரைக்கிழங்கு ரூபாயெடை 1
 சிறுகாஞ்சொறி ,, சுக்கு ,, 1
 வேப்பிலையீர்க்கு ,,

தட்டி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளைக் கொடுத்துவரலாம்.

- (2) கடுக்காய்ப்பூ ரூபாயெடை 1 மதுக்காரை ரூபாயெடை 1
 திப்பிலி ,, 1 கோஷ்டம் ,, 1

ஒன்று சேர்த்துச் சூரணித்து, வஸ்திரகாயஞ்செய்து, அரைக்கால் ரூபாயெடைச் சூரணம் வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை தேனில் குழப்பிக் கொடுத்துவரலாம்.

- (3) கோரோசனை மாத்திரை; சுரபூபதி மாத்திரை; பாலசஞ்சீவி மாத்திரை கொடுத்துவரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

- (4) பினசோனி (Phenazoni) கிரைன்ஸ் 3
 ஸ்பிரிட் குளோரோபாரம் (Spirit Chloroform) துளி ■
 சிரப் சிம்பிள் (Syrup Simple) ,, 10
 தண்ணீர் டிராம் 4

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 6-மணிநேரத்திற்கு ஒருமுறை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

- (5) பைனசெட்டின் (Phenacetin) கிரைன்ஸ் 2
 காபின் சிட்டரஸ் (Coffein Citras) ,, 1

ஒன்றுக்குக் கலந்து, காச்சலில் அதிக உஷ்ணத்தைத் தணிக்க 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். (இது உஷ்ணத்தையும், வலியையும் தணிக்குமேயல்லாது, காச்சலை சொஸ்தம் செய்யாது.)

குறிப்பு:—இதை மறுபடி கொடுக்க நேர்தால் 3-மணி நேரத்திற்குப் பின் தான் கொடுக்கலாம்.

- (6) பல்விஸ் இப்பிகாக் கோ (Pulvis Ipecace Co) கிரைன்ஸ் ½

இதை வயிற்றோட்ட மதிகமிருந்தால், நாள் ஒன்றுக்கு 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு மூன்றுவேளை இந்த அளவில் கொடுத்துவரலாம்.

- (7) சோடா ஸாலிசிலஸ் (Soda Salicylas) கிரைன்ஸ் 5
 பொட்டாஷியம் புரோமைட் (Potassium Bromide) ,, 5
 ஆக்குவர சின்னமோனி (Aqua Cinnamoni) டிராம் 2

டிஞ்சர் கார்டம் கோ (Tincture Cardamom Co)	துளி	15
ஆக்குவா குளோரோபாரம் (Aqua Chloroform)	அவுன்ஸ்	1

உப்புடன் நன்றாய்க் கரையும்படி செய்து எல்லாவற்றையும் ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற் கொருநரம் ஒரு தேக்காண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(8) சோடா சாலிசிலஸ் (Soda Salicylas)	கிரான்ஸ்	5
அமோனியம் கார்போனஸ் (Ammonium Carbonas)	,,	5
டிஞ்சர் ஆரண்டி (Tincture Auranti)	துளி	10
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற் கொருமுறை ஒரு தேக்காண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

உட் சுரம்:—Internal Fever

காய்ச்சலின் உக்கிரகம் வெளிக்குத் தோன்றாமல், உள்ளுக்குள்ளேயே சுரம் மிகுதியாக விருப்பதற்கு உட்சுரமென்று சொல்லப்படும்.

உடம்பு உட்காங்கையாக விருக்கும், உதடு வரண்டு நாவாட்சி யேற்படும்; கண்ணெரிச்சல் அதிகமாயிருக்கும்; ஆயாசமும் மயக்கமுமுண்டாகும்; மலச்சிக்கல் யேற்படும்; மூத்திரம் பெய்யும்போது நீர்த்தாரை எரிந்து; மூத்திரம் குடாக விறங்கும்; தொண்டைப் புகைச்சலு மிருமலமிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) சிறுவழுதலை	ரூபாயெடை 1	சுக்கு	ரூபாயெடை 1
பெருவழுதலை	" 1	கொத்தமல்லி	,, 1
தேவதாரு	,, 1		

ஒன்றாகத் தட்டி 24 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதமாக நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளைக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) சோற்றுக்கற்றாழைச்சாறு	அதிமதரம்	ரூபாயெடை	$\frac{3}{4}$
அவுன்ஸ் 24	சேகம்	"	$\frac{3}{4}$
இளநீர்த்தண்ணீர்	" 24	சாதிக்காய்	" $\frac{3}{4}$
பசும்பால்	" 24	சிறுநாகப்பூ	" $\frac{3}{4}$
சிறுமணக்கண்ணெய்	24	செண்பகப்பூ	" $\frac{3}{4}$
கணைப்பூண்டு ரூபாயெடை	1½	கருஞ்சேகம்	" $\frac{3}{4}$
சந்தனம்	" 1½	சாதிப்பத்திரி	" ½
ஆமையோடு	" 1½	கொத்தமல்லி	" 1½

இதில், கணைப்பூண்டு, சந்தனம், ஆமையோடு இவை மூன்றையும் இளநீர் தண்ணீர்விட்டு மைபோலரைத்தும், அதிமதர முதல் கொத்த

மல்லிவரையுள்ள சரக்குகளைப் பசும்பால் விட்டரைத்தும் ஒன்று சேர்த்துச் சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் கலக்கி காய்ச்சி வடித்து, காலை மாலை $\frac{1}{2}$, 1-தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(3) கோரோசனை மாத்திரை; கஸ்தூரி மாத்திரைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் காண்க.

(4) ஸ்பிரிட் ஈதர் டைட்ரோவி (spirit Aether Nitrosi) துளி 80
லைக்கர் அமோனியா அவிடேடிஸ் (Liquor Ammonia
Acetatis) டிராம் 1
சிரப் ஆரண்டி (syrup Auranti) துளி 40
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து, 4-மணிநேரத்திற்கொருதரம் 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(5) பல்விஸ் அன்டிமோனியாலிஸ் (pulvis Antimonialis) கிரைன்ஸ் $\frac{1}{2}$.

ஒன்று முதல் 3 வயதுக் குழந்தைகளுக்குச் சீனியில் கலந்து 4-மணி நேரத்திற் கொருதரம் இந்த அளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

கடுமையான சளிசரம்:—

இன்புளுவென்ஸா வென்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

கீணைச் சுரம்:—

கீணரோகத்தினால் குழந்தைகளுக்கு திரேகோஷ்டம், எக்காலமும் மிகுதிப் பட்டுக்கொண்டே யிருக்கும். இதைக் கீணைச்சுரு என்று சொல்லுவர். இது 12-வயது வரை சிறுவர்களைத் தொடர்ந்துவரும்.

சதாகாலம் திரேகோஷ்டம் 101, 102-மிகிரி உஷ்ணமாகவே யிருக்கும், நாவுலர்த், நாவரட்சியாகவேயிருக்கும்; திரேகம் இளைத்துவிடும்; சுவாசமானது அனல்காற்று வீசும்; கீணைச்சரம் திரேகத்தில் ஊறி நின்றுவிட்டால், நெஞ்சுக்கடி கட்டி அஸ்திகள் கஷீணமடைந்து, சதா ரோகத்திற்குள்ளாக்கிக்கொண்டே யிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) அதிமதுரம்	ரூபாயெடை 1	கோஷ்டம்	ரூபாயெடை 1
ஏலம்	,,	1 சுக்கு	,,
கிராம்பு	,,	1 சேகம்	,,
சண்பகப்பூ	,,	1 கோணைக்கிழங்கு	,,

ஒன்று சேர்த்துச் சூரணித்து, துணியில் வடிக்கடி அரைக்கால் ரூபாயெடை சூரணத்துடன் சமன் சீனி சேர்த்து, காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

(2) ஆவாராவேர் ரூபாயெடை	1½	சிறு அம்மாம்பச்சரிசி ரூபாயெடை	1½
சரக்கொன்றைவேர் ,,	1½	ஏலம் ,,	1½
விஷ்ணுக்கிரந்திவேர் ,,	1½	சேகம் ,,	1½
நிலக்குமிழும்வேர் ,,	1½	நெருஞ்சில் ,,	1½
சிறுமணக் கெண்ணெய்		அவுன்ஸ்	12

ஒன்று சேர்த்து, தட்டிப்போட்டுக் காய்ச்சி வடித்துக் காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(3) கணத்தெண்ணை கொடுத்துவரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(4) ஸ்பிரிட் ஈதர் ஐடரோசி (Spirit Aether Nitrosi) துளி	30
லைக்கர் அமோனியா அவிடேடிஸ் (Liquor Ammonia Acetatis)	டிராம் 1
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti)	துளி 40
தண்ணீர்	அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுதரம் ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(5) பல்விஸ் அன்டிமோனியாலிஸ் (Pulvis Antimonialis) கிரான்ஸ் ½

ஒன்றுமுதல் மூன்று வயதுக் குழந்தைகளுக்கு சமன் சீனிசேர்த்து, 4-மணி நேரத்திற் கொருதரம் கொடுத்துவரலாம்.

கபசுரம்:—

அபினியாச சன்னிச்சுரம் என்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

கபவாத சுரம்—Broncho Pneumonia

இது அபினியாச சன்னிச்சுரத்தில் சேர்ந்ததென்றாலும், கொடுமையை விரைவில் விளைவிக்கும் தன்மை வாய்ந்தது. இரத்தப்பொடி நாளங்களிலெல்லாம் சளி பிடித்துக்கொண்டு தீமையை உண்டாக்கும். இதை டபிள் டிமோனியா (Double Pneumonia) என்றும் சொல்லுவர். இதற்கு அபினியாச சன்னியின் குணங்கள் மிகுதிப்பட்டிருக்கும்.

சிகிச்சை

அபினியாச சன்னிச்சுரத்தின் சிகிச்சையையே செய்து வரலாம்.

குளிர்சுரம்—Aque

இதையே சிதச்சுரமென்றும் சொல்லுவர். காச்சல் 102-டிகிரிக்கு மேலாகவே யிருக்கும்; குளிர் தாங்க முடியாது; திரோகாதியந்தமும் நடுக்கம் உண்டாகும் நாவரட்சி யுண்டாகும்; பசிமந்தமுமேற்படும்.

சிகிச்சை

- (1) சுக்கு ரூபாயெடை 1 திப்பிலி ரூபாயெடை 1
மிளகு ,, 1

ஒன்றாகச் சூரணித்துத் துணியில் வஸ்திரகாயஞ்செய்து, அரைக்கால் ரூபாயெடையளவாக மோர்த்தண்ணீரிலாவது, புளித்தக் கள்ளிலாவது கொடுத்துவரலாம்.

- (2) வெட்பாலேவிரை ரூபாயெடை 1 சீந்தில்தண்டு ரூபாயெடை 1
தகரைவிரை ,, 1 சிறுவழுதலை ,, 1
அதிவிடயம் ,, 1 கொச்சியிலை ,, 1
சுக்கு ,, 1 கரிசலாங்காணி ,, 1
குரோசரணி மூம் ,, 1

ஒன்று சேர்த்து நசுக்கி, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸ் ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

- (3) சீந்தில்தண்டு ரூபாயெடை 1 கோரைக்கிழங்கு ரூபாயெடை 1
நிலவழுதலை ,, 1 நெல்லிவற்றல் ,, 1
சுக்கு ,, 1

ஒன்று சேர்த்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸ் ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயம் 1, 1½-அவுன்ஸ் விலை:—

திப்பிலிச்சூரணம் ரூபாயெடை ½ தேன் தேக்கரண்டி ½

ஒன்று சேர்த்துக் கலக்கி காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

- (4) புரசனிலை ரூபாயெடை 1 சோற்றுக்கற்றழைச்சோறு
புரசம்பட்டை ,, 1 ரூபாயெடை 1

ஒன்றாகச் சேர்த்து தட்டிப்பிழித்தச் சாற்றில் ½, 1-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

- (5) பச்சைக்கற்பூரம் ரூபாயெடை 1 சாதிக்காய் ரூபாயெடை 1
இலவங்கப்பட்டை ,, 1 † சுத்திசெய்த நேர்வாளம் ,, 1

இவற்றைச் சேர்த்துச் சோற்றுக்கற்றழைச்சாற்றால் மைபோலரைத்து, உருந்துப் பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்து காயவைத்துக் காலையில் மட்டும் ஒரு மாத்திரையை கொஞ்சம் சீனியுடன் சேர்த்துக்கொடுத்து, கால்மணி நேரத்திற்குப்பின்:—

குப்பைமேனியிலை கொடிவேலியிலை ரூபாயெடை 1
ரூபாயெடை ½ சுக்கு ,, ½

† 60-ம் பக்கம் பார்க்கவும்.

இவற்றை மைபோலரைத்துச் சுண்டக்காயளவாகக்கொடுத்து வரலாம்.

- (6) மிளகு ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$ கழற்சிப்பருப்பு ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
பெருங்காயம் ,, $\frac{1}{4}$

ஒன்று சேர்த்து தேன் விட்டு மைபோலரைத்து, 30-மாத்திரைகளாகப் பிரித்து உருட்டி, காலை மாலை ஒரு மாத்திரை வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (7) பாலசுரஹர மாத்திரை; கொவ்வைக்காய் கோரோசனை மாத்திரைக் கொடுத்து வரலாம் செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

- | | | |
|--|----------|---------------|
| (8) கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine sulphus) | கிரைன்ஸ் | 8 |
| ஆவலிட் சல்பியூரிக் டில் (Acid sulphuric Dil) | துளி | 4 |
| சிம்பிள் சிரப் (simple syrup) | டிராம் | $\frac{1}{2}$ |
| தண்ணீர் | அவுன்ஸ் | 1 |

முதலில் கொய்னைன் சல்பஸை ஆவலிட் சல்பியூரிக் டில் விட்டுக் கரைத்துக்கொண்டு ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று தடவை, தடவை ஒன்றுக்கு ஒரு தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- | | | |
|---------------------------------------|----------|----|
| (9) கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine sulphus) | கிரைன்ஸ் | 48 |
| அண்டிபெப்ரின் (Antifebrine) | " | 72 |
| கம் டிராககன் (Gum Tragacanth) | " | 80 |

இத்துடன் பசையாகும்படியாகக் கொஞ்சம் தண்ணீர் விட்டு நன்றாயரைத்து, 48-மாத்திரைகளாகப் பிரித்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 6-மணிநேரத்திற்கொருதரம் ஒரு மாத்திரைவீதம் கொடுத்துவரலாம்.

- | | | |
|------------------------------------|----------|----|
| (10) ஆவலிட் சிட்ரிக் (Acid citric) | கிரைன்ஸ் | 10 |
| அக்கேஷியா கம்மி (Acasia Gummi) | " | 10 |
| கொய்ரெட்டம் (Quinetum) | " | 40 |

முதலில் ஆவலிட் சிட்ரிகையும், அக்கேஷியா கம்மியையும் கொஞ்சம் தண்ணீர் விட்டு அரைத்துப் பசையாகச் செய்துகொண்டு, பின் கொய்ரெட்டத்தைச் சேர்த்து 30-மாத்திரைகளாகப் பிரித்து, நாள் ஒன்றுக்கு 3-தடவை, தடவை ஒன்றுக்கு ஒரு மாத்திரை வீதம் 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஆகாரத்திற்குப் பின் கொடுத்து வரலாம்.

- | | | |
|--|--------|---------------|
| (11) டிஞ்சர் ஓபியம் (Tincture Opium) | டிராம் | $\frac{1}{2}$ |
| லினிமென்ட் சொபோனிஸ் (Liniment soponis) | " | $\frac{1}{2}$ |

ஒன்று சேர்த்து, நடுமுதுகில் குளிர் வந்திருக்கும் சமயம் தேய்க்கக் குளிர் நிற்கும்.

சந்நிபாத சுரம்—Typhoid

இதை விஷ சன்னிச்சுரம் என்றும் சொல்வதுண்டு. இது தொத்தரோகக் கிருமிகளால் உண்டாகும் அபாயகரமான வியாதி.

சுரம் ஆரம்பத்தில் 101, 102-டிகிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் காலை யில் 2-டிகிரிக் குறைந்து, சாயந்திரமானவுடன் 2-டிகிரி யதிகப்பட்டுப் போகும். காய்ச்சல் ஆரம்பித்த இரண்டொரு நாட்களுக்குப் பின், நெற்றியில் வலியுண்டாகும். சிறுகுடலில் அழலைக்கண்டு வலியுண்டாகி, அதனால் வயிற்றோட்டமும் ஏற்படும். வெளிப்படும் மலமானது அதிக துர்நாற்றமடிக்கும். மலம் சிலசமயம் குழம்பாகவும், சிலசமயம் நெகிழ்த்தியாகவு் மிருக்கும்.

காய்ச்சல் கண்ட 7-வது நாளிலிருந்து, 12-நாளைக்குள் செந்நிறமான சிறுத் தடிப்புகள், நெஞ்சு, வயிறு, முதுகு முதலியவிடங்களில் உண்டாகும்.

மேற்படி தடிப்புகளை விரலால் அழுத்தினால் மறைந்துவிடும். இந்தச் செந்நிறத் தடிப்புகள் மூன்று வாரத்திற்குமேல் 30-நாட்கள் வரையிலு் மிருக்கும். ஒன்று மறைந்தவுடன் ஒன்று தோன்றும். இரண்டாம் வாரக் கடைசியில் திரேகோஷ்ணம் 104-டிகிரியில் நின்றதுவிடும்.

காய்ச்சல் 104-டிகிரியில் நின்றிருக்கும் சமயம் ஆபத்தானதாக விருக்கும். சந்நிபாதசுரமானது 21-நாள்வரைக்கும் சில சமயங்களில் 4, 5-வாரம், அல்லது அதற்குமேலும் நீடித்திருப்பதுண்டு.

சந்நிபாதசுரத்தின் ஆரம்பத்தில், அஜீரணம், புளித்தேப்பம், பசிமந்தம், மலச்சிக்கல், தலைவலி முதலியவைகளிருக்கும் சிலருக்கு மூக்கிலிருந்து இரத்தம் வடிவதுமுண்டு. இரவில் ஊக்கமின்மையும் சந்நிபுமுண்டாகும். அதிகபலயீனமும், அசதியும், நாவாட்சியும் காணும். நாவு வெடித்தாவது, சிவந்தாவது, மாவு பூசியதைப்போலாவதிருக்கும்; ஆரம்பத்தில் நாடியின் நடை தீவிரமாக யில்லாவிட்டாலும், நாளடைவில் மிகுதியும் தீவிரப்பட்டுவிடும்.

சுரம் வரட்சியாகவும், கன்னங்கள் பச்சை மாயிசம் போலவும் காணப்படும் அடிவயிறுப் பொருமி வயிற்றோட்டம் ஆரம்பிக்கும்; தொப்புளின் கீழ் வலதுபக்க அடிவயிற்றில் திமிர்த்ததைப்போல் மறமறப்பாக விருக்கும். அங்கு விரலால் அழுத்தினால் குருகுருவென்ற சப்தத்துடன் அழுந்துவதான உணர்ச்சித் தெரியும்.

இந்த வியாதியில் மண்ணீரல் வீக்கம் கண்டிருக்கும்; நான்பட்ட பின் வயிற்றால் கழிவது; சில சமயம் தண்ணீராகவும், மண்ணிறமாகவும், துவரையைக் கழுவித் தண்ணீர்போலும், கடைசியாக மாயிசம் கழுவி யத் தண்ணீரைப்போலும் இரத்தம் கலந்தும் வெளிப்படும்.

சிகிச்சை

(1)	திப்பிலிக்கட்டை ரூபாயெடை	1	ஓமம்	ரூபாயெடை	1
	வெட்பாலைப்பட்டை	1	வசம்பு	1	1
	தேவதாரிச்சக்கை	1	செவ்வியம்	1	1
	பால்சாம்பிராணி	1	கொடிவேலி	1	1
	வாய்விளங்கம்	1	நிலவேம்பு	1	1
	கண்டுபாரங்கி	1	கரிசலாங்காணி	1	1
	சுக்கு	1	மதுக்காரை	1	1
	மிளகு	1	சிறுவழுதலை	1	1
	திப்பிலி	1	பெருவழுதலை	1	1
	கோஷ்டம்	1	கருநொச்சி	1	1
	சிற்றரத்தை	1	பொன்முசுட்டை	1	1
	கடுக்காய்த்தோல்	1			

ஒன்று சேர்த்துத் தட்டி, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸ் ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதமாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(2)	எருக்கம்பேர்ப்பட்டை	வெள்ளைப்பூண்டு	ரூபாயெடை	½
	ரூபாயெடை ½	வசம்பு	1	1
	நிலவேம்பு	1	சுக்கு	1
	நொச்சி	1	திப்பிலி	1
	முருங்கைப்பட்டை	1	திப்பிலிமூலம்	1
	கரிசலாங்காணி	1	கொடிவேலி	1
	சிற்றரத்தை	1	செவ்வியம்	1
	தேவதாரு	1	அதிவிடயம்	1

ஒன்றாகத் தட்டி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 6-அவுன்ஸ் ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை கொடுத்துவரலாம்.

(3)	சீந்தில்தண்டு ரூபாயெடை	1	சுக்கு	ரூபாயெடை	1
	செங்கழுநீர்க்கிழங்கு	1	திப்பிலி	1	1
	பேய்ப்பீர்க்கம்பேர்	1	சிறுதேக்கு	1	1
	சிறுகாஞ்சொறி	1	கோரைக்கிழங்கு	1	1
	நிலவேம்பு	1	கோஷ்டம்	1	1
	ஆடாதோடையிலை	1			

இவற்றைத் தட்டி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸ் ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் நான் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை கொடுத்து வரலாம்.

- (4) பால சுரஹரமாத்திரை; சுவர்ண கோரோசனை மாத்திரை; அப்ரகக் கோரோசனை மாத்திரை; மகா ரசப்பஸ்பம்; சுவர்ண வெள்ளி பஸ்பம்; கொடுத்துவரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(5) ஒலியம் டர்பென்டைன் (Oleum Turpentine)	டிராம்	2
தேன் (Honey)	அவுன்ஸ்	1½
காம்பவுண்ட்பவுடர் ஆப்டிராககந்த் (Pulvis Tragacanth Co) „		1
ஆக்குவா பெப்பர்மென்ட் (Aqua Peppermint)	„	6

ஒன்றுசேர்த்துக் கலக்கிக்கொண்டு 1-முதல் 3 வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை, ஒருத் தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(6) வைனம் இபிக்காக் (Vinum Ipecace)	டிராம்	1
ஸ்பிரிட் ஈதர் நைட்ரோசி ((Spirit Aether Nitrosi)	„	1
சிரப் டொலு (Syrup Tolu)	அவுன்ஸ்	1
கிளிசரின் (Glycerine)	„	½
தண்ணீர்	„	8

ஒன்று சேர்த்துக் கலக்கி 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 4-மணி நேரத்திற் கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(7) கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine Sulphus)	கிரான்ஸ்	80
ஆவிட் ஐட்ரோகுளோரிக்டில் (Acid Hydrochloric Dil)	டிராம்	1
பொட்டாஷியம் குளோரஸ் (Potassium Chloras)	கிரான்ஸ்	80
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti)	அவுன்ஸ்	1
தண்ணீர்	„	10

முதலில் கொய்னைன் சல்பஸை, ஆவிட் ஐட்ரோகுளோரிக்டில் விட்டுக் கரைத்துக்கொண்டு பின்னர் எல்லாவற்றையும் ஒன்று சேர்த்துக் கலக்கி, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற் கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(8) ஒலியம் இயூகலிப்புடஸ் (Oleum Eucalyptus)	டிராம்	1
அக்கேஷியா கம்மி (Acasia Gummi)	அவுன்ஸ்	1
ஸ்பிரிட் அமோனியம் அரோமாட்டிக் (Spirit Ammonium Aromatic)		½
கிளிசரின் (Glycerine)	„	½
ஸ்பிரிட் குளோரோபாரம் (Spirit Chloroform)	டிராம்	2
ஆக்குவா குளோரோபாரம் (Aqua Chloroform)	„	2
	அவுன்ஸ்	12

முதலில் ஒலியம் இயூகலிப்புடஸுடன் அக்கேஷியா கம்மியைச் சேர்த்து கலந்துகொண்டு பின் எல்லாவற்றையும் ஒன்றுசேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக்

குழந்தைகளுக்கு 4-மணிநேரத்திற் கொருதடவை ஒரு தேக்கரண்டி யள வாகக் கொடுத்து வரலாம்.

தாங்கமுடியாத வயிற்றோட்டமிருந்தால்மட்டும்;—

(9) பல்விஸ் இபிகாக் கோ (Pulvis Ipecace Co) கிரான்ஸ் 3

1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு இந்த அளவாக 4-மணி நேரத் திற் கொருதரம் கொடுத்து வரலாம்.

சளிகளைக்கடுப்புச் சுரம்:—

இதை அசுதிச்சுரமென்றும் சொல்லப்படும். இது அதிகமான அசுதியினு லும், ஜலதோஷத்தினாலும் ஏற்படுகிறது. சுரம் 101, 102-மிகிரி வரையிருக்கும். குழந்தை முக்கி முணவியமும்; உதட்டைக்கடிக்கும்; அடிக்கடி உடம்பை முறுக்கும்; மூக்கில் சளி வடிந்துகொண்டே யிருக்கும்.

சிகிக்கை

(1) சுக்கு	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	தேவதாரு	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
மிளகு	"	தானிசப்பத்திரி	" $\frac{1}{2}$
திப்பிலி	" $\frac{1}{2}$		

இவற்றைப் பொடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன் ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 1, 1 $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் அளவாக நாள் ஒன் றுக்கு 3-வேளைக் கொடுத்துவரலாம்.

(2) மதுக்காரை	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	வசம்பு	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
நிலப்பனைக் கிழங்கு	" $\frac{1}{2}$	கண்டுபாரங்கி	" $\frac{1}{2}$
கோரைக் கிழங்கு	" $\frac{1}{2}$	பற்பாடகம்	" $\frac{1}{2}$
கொத்தமல்லி	"	சுக்கு	" $\frac{1}{2}$
கடுக்காய்ப்பூ	" $\frac{1}{2}$	தேவதாரு	" $\frac{1}{2}$

இவற்றைத் தூள்செய்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன் ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில், ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை கொடுத்து வரலாம்.

(3) சீந்தில்தண்டு	ரூபாயெடை	சீச்சிலிக்கிழங்கு	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
துராயிலை	" $\frac{1}{2}$	சிறந்தை	" $\frac{1}{2}$
கண்டங்கத்திரியிலை	"	சுக்கு	"
பூனைக்காஞ்சொறி	" $\frac{1}{2}$	திப்பிலி	" $\frac{1}{2}$
நிலவேம்பு	" $\frac{1}{2}$	கோஷ்டம்	" $\frac{1}{2}$
கடுகுரோகிணி	" $\frac{1}{2}$	தேவதாரு	" $\frac{1}{2}$
பற்பாடகம்	"	கடுக்காய்த்தோல்	" $\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்துத் தட்டி, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸ் ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(4) வெட்டிலேவர் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	பெருவழுதலை ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
பேராமல்லி „ $\frac{1}{2}$	சிந்தில்தண்டு „ $\frac{1}{2}$
சிறுமல்லி „ $\frac{1}{2}$	நெருஞ்சில்காய் „ $\frac{1}{2}$
நிலவேம்பு „ $\frac{1}{2}$	சுக்கு „ $\frac{1}{2}$
சிறுவழுதலை „ $\frac{1}{2}$	கோரைக்கிழங்கு „ $\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்துத் தட்டி, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸ் ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், 1-அவுன்ஸ் வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை கொடுத்து வரலாம்.

(5) பால சுரஹர மாத்திரை; கோரோசனை மாத்திரை; கஸ்தூரி மாத்திரை முதலியவைகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(6) சளி அதிகம் வடிந்துகொண்டிருந்தால், செம்மாத்தை முலைப்பாலில் உரைத்துக் கொதிக்கவைத்து, நெற்றி, மூக்கு முதலியவைகளில் கனமாய்ப் பற்றுப் போடலாம்.

(7) நெஞ்சில் அதிகமான சளிக்குட்டி பிள்ளை திட்டிமுட்டடித்தால், வேப் பெண்ணெயை வெற்றிலையில் தடவி, அனலில் வாட்டி சுடச்சுட மார் பிலும், பின்புற முதுகிலும் ஒற்றிடம் கொடுக்கலாம்.

(8) பொட்டாஷியம் நைட்ரஸ் (Potassium Nitras) கிரைன்ஸ் 15
லைக்கர் அமோனியா அவிடேடிஸ் (Liquor Ammonia

Acetatis)	டி.ராம் 8
டிஞ்சர் ஐயோவியாமஸ் (Tincture Hyoscyamus)	„ $\frac{1}{2}$
ஸ்பிரிட் ஈதர் நைட்ரோவி (spirit Aether Nitrosi)	„ 1
தண்ணீர்	அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து ஒன்றுமுதல் மூன்றுவயதுக் குழந்தைகளுக்கு 3-மணி நேரத்திற் கொருதடவை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(9) லைக்கர் ஆர்சனிக்காலிஸ் (Liquor Arsenicalis)	துளி 5
பொட்டாஷியம் புரோமைட் (Potassium Bromide கிரைன்ஸ்	20
டிஞ்சர் ஆரண்டி (Tincture Auranti)	துளி 40
ஸ்பிரிட் குளோரோபாரம் (spirit Chloroform)	„ 30
தண்ணீர்	அவுன்ஸ் 3

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயது குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற் கொருமுறை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

சாமச் சுரம்—Night Fevers

இது முறைக்காய்ச்சல் இனத்தைச் சேர்ந்து பகலெல்லாம் சுரம் விட்டிருந்து, பொழுதுப்பட்டதும் சுரம் காயும், திரேகோஷ்ணம் 101, 103-மிகிரி வரை யிருக்கும்; குளிருமிருக்கும்.

சிகிச்சை

- | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| (1) சிறுவழுதலை | ரூபாயெடை 1 | கொத்தமல்லி | ரூபாயெடை 1 |
| பெருவழுதலை | „ 1 | தேவதாரு | „ 1 |
| சுக்கு | „ 1 | | |

இவற்றைப் பொடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை 1-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- | | | | |
|-------------------|------------|---------------|------------|
| (2) சித்தில்தண்டு | ரூபாயெடை 1 | பெருவழுதலை | ரூபாயெடை 1 |
| சண்டுபாரங்கி | „ 1 | கோரைக்கிழங்கு | „ 1 |
| தேவதாரு | „ 1 | சுக்கு | „ 1 |
| திப்பிலி | „ 1 | கோஷ்டம் | „ 1 |

ஒன்றுசேர்த்துத் தட்டி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- | | | | |
|------------------------|------------|-----------------|------------|
| (3) ஆடாதோடையிலை | ரூபாயெடை 1 | பேய்ப்புடல்வேர் | ரூபாயெடை 1 |
| கொன்றைப்பட்டை | „ 1 | வேப்பம்பட்டை | „ 1 |
| கருப்புத் திராஷுப்பழம் | „ 1 | கடுக்காய்த்தோல் | „ 1 |
| தான்றிக்காய் | „ 1 | கெல்லிவற்றல் | „ 1 |

ஒன்றுசேர்த்துத் தட்டி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

- (4) கோரோசனை மாத்திரை; கஸ்தூரி மாத்திரை; சுரபூபதி மாத்திரை; பாலசரகுடோரி மாத்திரை இவற்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் காண்க.

- | | |
|--|-----------|
| (5) ஸ்பிரிட் ஈதர் ஹைட்ரோவ்னி (Spirit Aether Nitrosi) | டிபிரம் 2 |
| லைக்கர் அமோனியா அலமிடேடிஸ் (Liquor Ammonia Acetatis) | „ 1 |
| சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti) | துணி 40 |
| தண்ணீர் | „ 1 |

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 3-மணி நேரத் திற்கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(6) பெர்ரை எம் கொய்னைன் ஹிட்ரேஸ் (Ferri Et Quinine

Citras

கிரான்ஸ் 10

லைக்கர் ஸ்டிரிக்வேன் ஐட்ரோகுளோரைட் (Liquor

Strychnine Hydrochloride)

துளி ■

டிஞ்சர் கலம்பா (Tincture Calumbae)

„ 40

சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti)

டிராம் 1½

தண்ணீர்

அவுன்ஸ் 3

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஆகாரத்திற்குப்பின் ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

சித்தவிப்பிரம சன்னிகரம் :—

சந்திபாதச் சுரமென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

சீதச் சுரம் :—

குளிர்ச்சுரமென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

தருணச் சுரம் :—

அற்பச் சுரமென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

தனிச் சுரம் :—

அற்பச்சுரமென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

நிமோனியாச் சுரம் :—

அபிநியாசச் சன்னிகரமென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

பல் முளைக்கும்போதுண்டாகும் சுரம்—Fever in Dentition

பல் குழந்தைகளுக்குச் சாதாரணமாய் ஆறாம் மாதம் பாற்பற்கள் முளைக்கும். முளைப்பது இயற்கைப்பிரகிருதியாயினும், குழந்தைகளுக்குச் சோதனையானதாகவேயிருக்கும்; ஆனால் எல்லாக் குழந்தைகளுக்கும் பல் முளைக்கும்போது காய்ச்சலேற்படுவதில்லை தோஷவியாதியினால் மெலியுற்றிருக்கும் குழந்தைகளுக்கே பல் முளைக்கும்போது காய்ச்சல் உண்டாகலாம்.

பல் முளைக்கும்போதுண்டாகும் காய்ச்சலில், வாயிலிருந்து எச்சில்வழிந்து கொண்டேயிருக்கும்; மலச்சிக்கலேற்படும்; காய்ச்சல் 101, 103-டி.கிரிக்குக் குறையாமலும், கூடாமலுமிருக்கும். சில சமயம் காய்ச்சலினால் இழுப்பும் யேற்படுவதுண்டு. இதனால் விபத்தேற்படுவதுமுண்டு.

* விஷதன்மையுள்ளது ஜாக்ரதையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

சிகிச்சை

(1) சிறுவழுதலை	ரூபாயெடை 1	பெருவழுதலை	ரூபாயெடை 1
சக்கு	„ 1	தேவதாரு	„ 1
கொத்தமல்லி	„ 1		

இவற்றைத் தண்ணீர்விட்டரைத்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலக்கி 8-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தை வடிகட்டி அதில் நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை 1-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(2) வெட்டிவேர்	ரூபாயெடை 1	விலாமிச்சம்பேர்	ரூபாயெடை 1
கோரைக்கிழங்கு	„ 1	செஞ்சந்தனம்	„ 1
பற்பாடகம்	„ 1	சக்கு	„ 1

இவற்றை ஒன்றாகத்தட்டி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(3) செற்றி, தாடை இவைகளில் சிற்றாமணக்கெண்ணையைத் தடவிவந்தால் வலி மட்டுப்படும்.

(4) கோரோசனை மாத்திரை; கன்னாசி மாத்திரை; சுரப்பூபதி மாத்திரை; இவைகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம். செய்யுறை 6-ம் பாகம் காண்க.

(5) சோடா சாலிஸில்ஸ் (Soda Salicylas)	கிரான்ஸ் 60
எக்ஸ்ட்ராக்ட் கிளிசிரிஸா லிக்குட் (Extract Glycyrrhza Liquid)	டிராம் 4
லைக்கர் அமோனியா அவிடேடிஸ் (Liquor Ammonia Acetatis)	„ 4
தண்ணீர்	அவுன்ஸ் 2

ஒன்று சேர்த்து 3-மணி நேரத்திற் கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(6) டிஞ்சர் காம்ப்ர் கோ (Tincture Camphore Co)	டிராம் 1
லைக்கர் அமோனியா அவிடேடிஸ் (Liquor Ammonia Acetatis)	„ 8
பொட்டாஷியம் லிட்ரஸ் (Potassium Citras)	„ 1
சிரப் டோலு (Syrup Tolu)	„ 1
தண்ணீர்	அவுன்ஸ் 3

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து 3-மணி நேரத்திற் கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

பழஞ் சுரம்—Relapsing Fever.

இதை விடாச்சுரமென்றும் சொல்லுவர். மலச்சிக்கலினாலாவது குடலில் யேற்படும் அழலையினாலாவது சுரம் கண்டு அப்படியே நீடித்திருக்கச் செய்து விடுகிறது. இது அதிக வெயிலினாலும் கொடியக் குளிரினாலும்கூட ஏற்படுவதுண்டு.

இந்தக்காய்ச்சல் 101, 102-டிகிரிக்குக் குறையாமலும், மேல்போகாமலும்; காய்ச்சல் விடாமலுமிருக்கும். காலே நேரங்களில் அசதியுடன் குளிர் நடுக்கம் உண்டாகி காய்ச்சல் 100, 101-டிகிரி யிருக்கும். சாயந்திரம் 101, 102-டிகிரி யிருக்கும். இரவில் வியர்வைக் கண்டு காலையில் சற்று காய்ச்சல் தணிந்திருக்கும்.

இந்த வியாதியில் மலச்சிக்கலாவது, வயிற்றோட்டமாவது இருப்பதுண்டு. வயிற்றோட்டமிருந்தால் மலம் புளிப்பு காற்றத்துடன் வெண்மையாகவும், கருப்பாகவும், பச்சையாகவும், கழியும். குடலில் அழலையென்ற அருக்குமானால், கழியும் மலத்துடன் இரத்தமும் சீதமும் கலந்திருப்பதுண்டு.

பழஞ் சுரத்தில், ஆகார வெறுப்பு, அசதி, இருமல், முதலியவைகளேற்படும். சரமம் வரண்டு, திரேகம் இளைத்திருக்கும். மூத்திரம் மஞ்சளாகவும், எரிச்சலுடனு யிறங்கும்.

இதில் மயக்கம், கண், மூகம், முதலியவைகளில் வலி, மூச்சுத்திணரல், தடைச்செய்யக்கூடாத வயிற்றோட்டம், தலையில் அதிகமான குடு முதலிய குணங்கள் கண்டால், அசாதாரணத்தைக் குறிக்கும் குறிகளாக விருக்கும்.

திரேகம் குளிராயிருந்தால் பசும்பாலைச் சுடச்சுடக் கொடுக்கலாம். அதிக பலயீனமாயிருந்தால் காய்ச்சலில்லாத நேரங்களில் காரயில்லாத சூப்பு (Soup) கொடுக்கலாம். இவ்ருவில் ஜீரணிக்கும் ஆகாரங்களாகிய பால் சுவரிகிடுக்குளி, அரிசிக்குஞ்சி முதலியவைகளை மட்டும் கொடுக்கலாம். ஆகாரம் வராதியாகிக்கொண்டிருந்தால், இரண்டவுன்ஸ் பாலில் அரைக் காலவுன்ஸ் சுண்ணாம்புத் தெளிவுத் தண்ணீரைக் கலந்துகொடுக்கலாம். அல்லது பாலுடன் சோடாத் தண்ணீரைக் (Soda water) கலந்து கொடுக்கலாம்.

சிகிச்சை

(1) ஊதுவேளை	ருபாயெடை 1	சிறுமுட்டி	ருபாயெடை 1
சிறு காஞ்சொறிவேர்	” 1	பேராழுட்டி	” 1
சீந்தில்தண்டு	” 1	பற்பாடகம்	” 1
கொச்சியீர்க்கு	” 1	கடுக்காய்	” 1

ஒன்றாய் இடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயம் அவுன்ஸ் ஒன்றில் வறுத்துச் சூரணித்த திப்பிலிச் சூரணம் $\frac{1}{2}$ -ரூபாயெடைக் கலக்கி இந்த அளவாக நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளைக் கொடுத்துவரலாம்.

(2) ஏலம்	ரூபாயெடை 1	திராகுப்பழம்	ரூபாயெடை 1
கிராம்பு	„ 1	கோரோசனை	„ 1
கோரைக்கிழங்கு	„ 1	தாளிசப்பத்திரி	„ 1
அதிமதுரம்	„ 1	சடாமாஞ்சில்	„ 1
வெட்டிவேர்	„ 1	சந்தனம்	„ 1
விலாமிச்சம்வேர்	„ 1	இலுப்பைப்பூ	„ 1
நன்னூரிவேர்	„ 1	தேவதாரு	„ 1
நிலப்பிளைக்கிழங்கு	„ 1	திப்பிலி	„ 1
சுக்கு	„ 1	சமுகரோகிணி	„ 1

இவற்றை எல்லாம் ஒன்றுசேர்த்து, 6-மணிநேரம் முலைப்பால் விட்டரைத்து, மறுபடியும் 6-மணிநேரம் இளநீர்விட்டு அரைத்து, மிளகவ்வளவு பெரிய மாத்திரைகளாக்கி காயவைத்து, காலை மாலை ஒரு மாத்திரை வீதம் முலைப்பாவில் கொடுத்துவரலாம்.

(3) பேய்ப்புடல்வேர்	பற்பாடகம்	ரூபாயெடை	1
ரூபாயெடை 1	சுக்கு	„	1
பேராழுட்டி	„ 1	மிளகு	„ 1
விஷ்ணுக்கிரந்தி	„ 1	நாரத்தைப்பட்டை	„ 1

ஒன்றுசேர்த்துத் தட்டி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சி காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் கஷாயத்தில் $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் தேன் சேர்த்துக் கொடுத்துவரலாம்.

(4) தக்காளிக் கோரோசனை மாத்திரை; கஸ்தூரிமாத்திரை; ராஜவில்வாதி லேகியம்; கோரோசனை மாத்திரை; வீரசூதசுந்தாமணி; பாலவிநோத சஞ்சீவிமாத்திரை; பாலசஞ்சீவிமாத்திரை; கணத்தெண்ணெய்; சுவர்ண கோரோசனை மாத்திரை; இவைகளைக் கொடுத்துவரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்

(5) கலோமெல் (Calomel)	கிரைன்ஸ் $\frac{1}{2}$
சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb)	„ 1

ஒன்றுசேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரே தடவையாக வாயில் கொட்டி விழுங்கச்செய்து இரண்டுமணி நேரத்திற்குப் பின்:—

பல்விஸ் ரீயைக் கோ (Pulvis Rhei Co)	கிரைன்ஸ் 3
தண்ணீர்	அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$

ஒன்றுசேர்த்துக் கொடுக்க மலம் வெளியாகி காய்ச்சல் தணியும். காய்ச்சல் தணிந்தவுடன் கீழ் குறிப்பிட்ட 7-ம் நெம்பர் கொய்னைன் மிக்சர் கொடுத்துவரலாம்.

- (6) பொட்டாஷியம் குளோரைஸ் (Potassium Chloras) கிரைன்ஸ் 24
பொட்டாஷியம் பைகார்போனேட் (Potassium Bicarbonate) „ 48
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்த்துக் கலந்துகொண்டு, நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(இந்த மருந்தைக் கொடுக்கப்போகும் சமயம் முப்பது துளி எலுமிச்சம் பழச்சாறும், கொஞ்சம் சர்க்கரையும் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். இம்மருந்தினால் தாகமும் நாவாட்சியும் தணிந்து, திரோகோஷ்ணமும் மட்டுப்படும்.)

- (7) கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine Sulphus) கிரைன்ஸ் 40
ஆவிரிட் சல்பியூரிக் அிட் (Acid Sulphuric Dil) துளி 60
ஸ்பிரிட் ஸ்தர் ஐதரோலி (Spirit Aether Nitrosi) டிராப் 4
சிரப் டூலு (Syrup Tolu) „ 1
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 4

முதலில் கொய்னைன் சல்பஸை ஆவிரிட் சல்பூரிக் அிட் கரைத்து பின்னர் மற்ற மருந்துகளைச் சேர்த்துக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற் கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

பித்தச் சுரம்—Remittent Fever

இது பித்த உபரிபினால் உஷ்ணம் மிகுதிப்பட்டு ஏற்படக்கூடியது. சுரம் 100-க்கு மேல் 103, 104-டிகிரி வரை மிகுக்கும் வயிற்றோட்டமும் வரத்தியும் உண்டாகும்; தலை கிழுகிறத்து, மயக்கம்போல் வந்து, மஞ்சள் கரைத்தத் தண்ணீரைப்போல் வார்தியாகும்; தாக்குவதைப்போல் குழந்தை ஆயர்ந்து படுத்திருக்கும்; தாக்கத்தில் புலம்பல் ஏற்படும்; மூத்திரம் சிவந்து தடித்திருக்கும்; நாவு வாண்டிருக்கும்; விக்கலுண்டாகும்; களைப்பேற்படும்.

சிகிச்சை

- (1) லீலவேம்பு ரூபாயெடை 1 கோரைக்கிழங்கு ரூபாயெடை 1
செறுகாஞ்சொறி „ 1 பற்பாடகம் „ 1
கடுகுரோகிணி „ 1

ஒன்றாகத் தட்டி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) பற்பாடகம் ரூபாயெடை 1 வெட்டிவேர் ரூபாயெடை 1
செஞ்சந்தனம் ,, 1 சுக்கு ,, 1

ஒன்று சேர்த்திடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

- (3) திராகுப்பழம் ரூபாயெடை 1 கோரைக்கிழங்கு ரூபாயெடை 1
பற்பாடகம் ,, 1 கடுக்காய்த்தோல் ,, 1
கடுகுரோகணி ,, 1 கொன்றைப்பட்டை ,, 1

ஒன்று சேர்த்திடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸாகக் கொடுத்து வரலாம்.

- (4) சிறுகாஞ்சொறிவேர் நிலவேம்பு ரூபாயெடை 1
ரூபாயெடை 1 அதிவிடயம் ,, 1
ஆடாதோடையிலை ,, 1 கடுகுரோகணி ,, 1
பற்பாடகம் ,, 1

ஒன்று சேர்த்திடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (5) தேந்தில்தண்டு ரூபாயெடை 1 கடுக்காய்த்தோல் ரூபாயெடை 1
பற்பாடகம் ,, 1

ஒன்று சேர்த்திடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (6) தக்காளிக் கோரோசனை மாத்திரை; பால் சுரந்திர மாத்திரை; கஸ்தூரி மாத்திரை; ராஜவில்வாதி லேகியம்; சுவர்ண கோரோசனை மாத்திரை; பாலசஞ்சீவி மாத்திரை இவைகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் காண்க.

- (7) காலோமல் (calomel) கிரைன்ஸ் 1½
பெனசெட்டின் (Phenacetin) ,, 8
காபீன் சிட்ரஸ் (caffine citras) ,, 1½
சோடா பை கார்ப் (soda Bicarb) ,, 1½

ஒன்று சேர்த்து ஒரேதடவையாக 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு வாயில் கொட்டி எச்சல் சேர்த்து விழுங்கும்படிச் செய்தால், 2, 3-தரம் மலம் கழிந்து சுரம் தணியும். இதை அடிக்கடி கொடுக்கக்கூடாது.

(8) கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine sulphus)	கிரைன்ஸ்	15
ஆவலிட் ஐட்ரோகுளோரிக் டில் (Acid Hydrochloric Dil)	துளி	25
பொட்டாஷியம் குளோரைஸ் (potassium chloras)	கிரைன்ஸ்	15
சிரப் ஆரண்டி (syrub Auranti)	டிராம்	4
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	8

முதலில் கொய்னைன் சல்பைஸ் ஆவலிட் ஐட்ரோகுளோரிக் டில் விட்டுக் கரைத்துக்கொண்டு பின் மற்றவைகளைச் சேர்த்துக் கலந்த 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 3-மணிநேரத்திற்கு கொருமுறை ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

பிராஞ்சோ நிமோனியா—Broncho Pneumonia

கபவாத சன்னி சுரமென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

பூத சுரம்:—

சன்னைக்கடுப்புச் சுரமென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

மாங்கிஷுச் சுரம்:—

இந்தச் சுரத்தில் தசை நார்தளில் வலி யிருக்கும்; காய்ச்சல் 102, 104-டிகிரியிருக்கும்; இருமலும், லியர்வையும் உண்டாகும்; உதடு உலர்ந்து நாவாட்சி யேற்படும்; ஆயாசமும், மயக்கமும் காணும்; திரேகம் வெளுத்து மயிர்கள் சிவிர்த்திருக்கும்; குழந்தை உடம்பில் கைபட்டால் கதரும்.

சிகிச்சை

(1) சிறுவழுதலை	ரூபாயெடை 1	பெருவழுதலை	ரூபாயெடை 1
சுக்கு	„ 1	கொத்தமல்லி	„ 1
தேவதாரு	„ 1		

ஒன்று சேர்த்திடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸ் ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) வெட்டிவேர்	ரூபாயெடை 1	விலாமிச்சம்வேர்	ரூபாயெடை 1
கோரைக்கிழங்கு	„ 1	பற்பாடகம்	„ 1
சுக்கு	„ 1	செஞ்சந்தனம்	„ 1

ஒன்று சேர்த்திடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸ் ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(3) சீர்தில்தண்டு ரூபாயெடை 1 தேவதாரு	ரூபாயெடை 1
பெருவழுதலை	1 சுக்கு
கண்டுபாங்கி	1 திப்பிலி
கோரைக்கிழங்கு	1 கோஷ்டம்

ஒன்று சேர்த்திடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸ் ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-தடவை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(4) பாலவிகோதச் சஞ்சீவி மாத்திரை; பால சஞ்சீவி மாத்திரை; சுர பூபதி மாத்திரை; பால சுரகுடோரி மாத்திரை; இவைகளில் ஒன்றைக் கொடுத்துவரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(5) லைக்கர் அமோனிய அவிடேடிஸ் (Liquor Ammonia	
• Acetavis)	அவுன்ஸ் 1
ஸ்பிரிட் ஈதர் ஹைட்ரோவி (Spirit Aether Nitrosi)	டிராம் 1
பொட்டாஷ்யம் சிட்ரஸ் (Potassium Citras)	2½
ஆக்குவா காம்ப்ர் (Aqua Camphor)	அவுன்ஸ் 6

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதக் குழந்தைகளுக்கு இரண்டுமணி நேரத்திற்கொரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(6) கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine Sulphus)	கிரான்ஸ் 2
ஆவிட் சல்பியூரிக் டில் (Acid Sulphuric Dil)	துளி 6
பெர்ரி எத் அமோனியம் சிட்ரஸ் (Ferri et Ammonium Citras)	கிரான்ஸ் 4
■ லைக்கர் ஆர்ஸனிக்காலிஸ் (Liquor Arsenicalis)	துளி 8
தண்ணீர்	அவுன்ஸ் 1½

முதலில் கொய்னைன் சல்பைஸ், ஆவிட் சல்பியூரிக் டில் விட்டுக் கரைத்துக்கொண்டு, பின்னர் மற்றவைகளைச் சேர்த்துக் கலக்கி, 1-முதல் 3-வயதக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஆகாரத்திற்குப்பின் ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

மாந்தக் கலிணச்சுரம்:—

இது மாந்த ரோகத்தினால் குழந்தைகளுக்கு வரும் சுரம். சுரம் கடுமையாக விருக்கும்; திரோகம் வற்றிவிடும்; உள்ளங்கால்மட்டும் குளிர்த்திருக்கும்; சுவாசமிடும்போதெல்லாம் மார்பு உயர்ந்து அழுங்கும்; கண்ணில் நீர் வடிந்துகொண்டே யிருக்கும். வயிறிறைந்துப் பாசிப்போல் கழிபும்; நாவரண்டுவிடும், கண்விழி வட்டமாய்ச்சுற்றி மேற்சொருகும். இந்தச் சுரத்தில் சில சமயம் இழுப்பு காண்பதுண்டு.

* விஷத்தன்மை புள்ளது ஜாக்ரதையாக உபயோகிக்க வேண்டும்.

சிகிச்சை

(1) பழம்பாசி	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	பேய்மிரட்டியிலை	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
நாய்த்தளசி	,, $\frac{1}{2}$	வல்லாரையிலை	,, $\frac{1}{2}$
கணைப்பூண்டு	,, $\frac{1}{2}$	தகரையிலை	,, $\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்திடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 8-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம், அந்த 1-அவுன்ஸ் கஷாயத்தில்:—

சேகத்தூள் குன்றமணியெடை 2 கோரோசனை குன்றமணியெடை 2
சுருஞ்சேகத்தூள் ,,
கலந்து கலக்கி வடிகட்டிக் கொடுத்துவரலாம்.

(2) புளியீர்க்கு	ஒருபிடி	கோழியவரையிலை	ஒருபிடி
றுணு (மஞ்சளெத்தி)		குட்டிவிளாயிலை	,,
யிலையீர்க்கு	,,	பழம்பாசி	,,
நெல்லியீர்க்கு	,,	விஷ்ணுகிரந்தி	,,
வேம்பீர்க்கு	,,	செருப்படை	,,
தகரையிலையீர்க்கு	,,	மணித்தக்காளியிலை	,,
ஒதியனிலையீர்க்கு	,,	வல்லாரையிலை	,,
பொடுதலை	,,	சீந்தில்தண்டு	ரூபாயெடை 1
அம்மாம்பச்சரிசி	,,	நன்னூரிவேர்	,, 1
வில்வயிலை	,,	பேய்ப்புடல்வேர்	,, 1
சிறுபுள்ளடி	,,	வில்வப்பழத்தோடு	,, 1

ஒன்றாய்ச் சேர்த்திடித்து இளவறுப்பாய் வறுத்து, 48-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டவைத்த கஷாயத்தில், நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் அந்த ஒரு அவுன்ஸ் கஷாயத்தில்:—

இலவம்பிசின்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	மாசிக்காய்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
வில்வப்பிசின்	,, $\frac{1}{2}$	சாதிக்காய்	,, $\frac{1}{2}$
விளாம்பிசின்	,, $\frac{1}{2}$	வெந்தயம்	,, $\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்து இளவறுப்பாக வறுத்துச் சூரணித்து சலித்துவைத்துக்கொண்டு, 3-கஷாயத்தில் அரைக்கால் ரூபாயெடைச் சூரணம் சேர்த்துக் கலக்கிக் கொடுத்துவரலாம்.

(3) இரசச்செந்துரம்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	கஸ்தூரிமஞ்சள்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
குங்குமப்பூ	,, $\frac{1}{2}$	ஏலம்	,, $\frac{1}{2}$
கோரோசனை	,, $\frac{1}{2}$	கிராம்பு	,, $\frac{1}{2}$

■ செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

கடுக்காய்	,,	$\frac{1}{2}$	சுக்கு	,,	$\frac{1}{2}$
தான்றிக்காய்	,,	$\frac{1}{2}$	மிளகு	,,	$\frac{1}{2}$
நெல்லிவற்றல்	,,	$\frac{1}{2}$	திப்பிலி	,,	$\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்து, கருநொச்சிச்சாறுவிட்டு மைபோலரைத்து, உளுத்துப் பிரமாணம் மாத்திரைகள்செய்து உலர்த்திக்கொண்டு, காலை மாலை $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் துளசிச்சாறும், $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் சுடுதண்ணீரும் கலந்து, அதில் ஒரு மாத்திரை வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(4) பாலசஞ்சீவி மாத்திரை; கோரோசனை மாத்திரை; தக்காளிக்கோரோசனை மாத்திரை; பாலவிநோத சஞ்சீவி மாத்திரை; கஸ்தூரி மாத்திரை; மகாரஸப் பஸ்பம்; சுவர்ண வெள்ளிபஸ்பம்; வீரகுதச்சிந்தாமணி; கணத்தெண்ணெய் இவைகளிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(5) டிஞ்சர் பெரி பெர்க்லோரைட் (Tincture Ferri Perchloride) டிராம் 4
லைக்கர் அமோனியா அவிடேடிஸ் (Liquor Ammonia Acetatis) அவுன்ஸ் $1\frac{1}{2}$
கிளிசரின் (Glycerine) ,, $\frac{1}{2}$
தண்ணீர் ,,

ஒன்றுசேர்த்து ஒன்று முதல் மூன்று வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 3-மணி நேரத்திற்கொருநாள் ஒரு தேக்காண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(6) டிஞ்சர் அஸபோட்டிடா (Tincture Asafoetidae) துளி 30
டிஞ்சர் சிஞ்ஜிபெரிஸ் (Tincture Zingiberis) ,, 15
லைக்கர் ஆர்ஸனிக்காவில் (Liquor Arsenicalis) ,, 5
எக்ஸ்ட்ராக்ட் ரீயை (Extract Rhei) கிரைன்ஸ்
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti) அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$
தண்ணீர் ,, 5

ஒன்றுசேர்த்துக் கலந்து, ஒன்று முதல் மூன்று வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 3-மணி நேரத்திற்கொருமுறை ஒரு தேக்காண்டியளவாகக்கொடுத்துவரலாம்.

மாந்தச் சுரம்—Diphtheritic Fever

இதைப்பற்றிச் சுரமாந்தமென்றத் தலைப்பின்பேரில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆயினும் அதைப்பற்றி மறுமுறையும் எழுதவேண்டியது அவசியமாதலின் அதையும் கீழே விவரிக்கவேண்டியதாயிருக்கிறது.

மாந்தச்சுரத்தில் சுரம் கடினமாயிருக்கும்; குழந்தை பால் குடியாத; வாந்தியும் வயிற்றோட்டமும் உண்டாகும். சில சமயம், முறிந்தப் பால்போலும், சில சமயம் சீதம் கலந்தும் கழிபும்; கைகால் குளிர்ந்திருக்கும்;

நாவாட்சி யேற்பட்டு குரல் கட்டிவிடும்; கண் சிவந்தும், முகமும் உடலும் மினுமினுப்பாகவுமிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) சேந்தில்தண்டு	ரூபாயெடை 1	சுக்கு	ரூபாயெடை 1
■ சிவதைவேர்	„ 1	கடுக்காய்	„ 1
களிப்பாக்கு	„ 1	கடுகுரோகினி	„ 1

ஒன்றுசேர்த்திடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) சிற்றமுட்டி	ஒருபிடி	புக்கையிலையீர்க்கு	ஒருபிடி
பேராமுட்டி	„	வேப்பங்கொழுந்து	„
விஷ்ணுகிரந்தி	„	ஒரிலைத்தாமரை	„
சேரகம்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	திப்பிலி	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
கிராம்பு	„ $\frac{1}{2}$	செல்லிவற்றல்	„ $\frac{1}{2}$

ஒன்றுசேர்த்திடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(3) புளியிலையீர்க்கு	ஒருபிடி	குட்டிவிளாயிலை	ஒருபிடி
நுணுயிலையீர்க்கு	„	பழம்பாசி	„
நெல்லியீர்க்கு	„	விஷ்ணுகிரந்தி	„
வேம்புயீர்க்கு	„	செருப்படை	„
ஒதியன்யீர்க்கு	„	வல்லாரையிலை	„
தகரையிலையீர்க்கு	„	நரிபயற்றந்தண்டு	ரூபாயெடை 1
பொடுதலைக்காம்பு	„	நன்னூரிவேர்	„ 1
ஆம்மாம்பச்சரிசிக்காம்பு	„	மணித்தக்காளிவேர்	„ 1
வில்வயிலை	„	சேந்தில்தண்டு	„ 1
சிறுபுள்ளடி	„	பேய்ப்புடல்வேர்	„ 1
கோழியவரையிலை	„	வில்வப்பழத்தோடு	„ 1

ஒன்று சேர்த்திடித்து ஒரு மண்சட்டியில் போட்டு இளவறுப்பாக வறுத்து 43-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம், அந்த ஒரு அவுன்ஸ் கஷாயத்தில் :-

இலவம்பிசின்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	மாசிக்காய்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
விளாம்பிசின்	„ $\frac{1}{2}$	சாதிக்காய்	„ $\frac{1}{2}$

■ இதைப் பசும்பாலில் போட்டு வேகவைத்து எடுத்துக்கொள்ளவும்.

வீல்வப்பிசின்	,,	$\frac{1}{2}$	வெந்தயம்	,,	$\frac{1}{2}$
கோஷ்டம்	,,	$\frac{1}{2}$			

ஒன்று சேர்த்து இளவறுப்பாய் வறுத்து, சூரணித்து ஷை கஷாயத் தில் $\frac{1}{2}$ -ரூபாயெடை கலந்து கலக்கி வடிக்கட்டிக் கொடுத்து வரலாம்.

(4) பச்சைகற்பூரம்	ரூபாயெடை	$\frac{1}{2}$	ஏலம்	ரூபாயெடை	$\frac{1}{2}$
கிராம்பு	,,	$\frac{1}{2}$	சடாமாஞ்சில்	,,	$\frac{1}{2}$
வால்மிளகு	,,	$\frac{1}{2}$	சுக்கு	,,	$\frac{1}{2}$
சிறுநாகப்பூ	,,	$\frac{1}{2}$	சேகம்	,,	$\frac{1}{2}$
கடுகுரோகணி	,,	$\frac{1}{2}$	§ சுத்திச்செய்த நேர்வாளப்		
			பருப்பு	,,	$\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்துப் பொடுதலைச்சாற்றால் 6-மணினேரம் அரைத்து, மிளகு அளவு பெரிய மாத்திரைகளாக உருட்டிக் காயவைத்து, காலை மாலை ஒரு மாத்திரைவீதம் தேனிலாவது, முலைப்பாலிலாவது கொடுத்து வரலாம்.

(5) குட்டிவிளாயிலை	ரூபாயெடை	1	வெள்ளைப்பூண்டு	ரூபாயெடை	1
அவுரியிலை	,,	1			

ஒன்று சேர்த்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் அளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(6) பாலசஞ்சீவி மாத்திரை; தக்காளிக் கோரோசனை மாத்திரை; கோரோசனை மாத்திரை; பாலவிகோத சஞ்சீவி மாத்திரை; கஸ்தூரி மாத்திரை; மகாரஸ பஸ்பம்; சுவர்ணவெள்ளிப்பஸ்பம்; வீரகுதச்சிந்தா மணி இவைகளில் ஒன்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(7) மாந்தசுரத்திற்கான ஆங்கிலமருந்து கலைவகளில் ஒன்றையும் கொடு த்து வரலாம்.

முறைச் சுரம்—Intermittent Fever

இதில் சுரம் விட்டுவிட்டு குறித்த நேரத்தில் வரும். இதை ஆவிகஜ்வர மென்று சொல்லப்படும். இது எட்டுவிதமான காலதாமதத்தில் வரக் கூடியது.

ஒன்றைவிட்டு டொருநாளிக்கு வரும் முறைச்சுரத்திற்கு; முறைச்சுரம், ஏகாஹிகச் ஜ்வரமென்றும்; இரண்டுநாட்களுக்கு கொருமுறை வருவதை இரண்டாம் முறைச்சுரம், அது துவியாஹிகச் ஜ்வரமென்றும்; மூன்று நாட்களுக்கு கொருமுறை வருவதை மூன்று முறைச்சுரம், அது திரியா ஹிகச் ஜ்வரமென்றும்; நான்குநாட்களுக்கு கொருமுறைவரும் சுரத்தை நான்காம் முறைச்சுரம், அது சதுர்த்திக ஜ்வரமென்றும்; ஐந்துநாட்க்

§ சுத்திமுறை 60-ம் பக்கம் பார்க்கவும்.

ளுக் கொருமுறை வருவதை ஐந்தாமுறைச்சாரம்; அது பஞ்சாஹிக ஜ்வரமென்றும்; பதினைந்து நாட்களுக் கொருமுறை வருவதை பருவ முறைச்சாரம், அது பக்ஷாஹிக ஜ்வரமென்றும், மாதமொருமுறை வருவதை மாதார்திரச்சாரம், அது மாலிக ஜ்வரமென்றும்; இராத்நிரி வேளைகளில் மட்டும் வருவதை சாமச்சாரம், அது அர்த்தராத்நிரி ஜ்வரமென்றும் சொல்லப்படும்.

முறைச்சாரத்தில், குளிர்நடுக்கம், இருமல், கண்ணெரிச்சல், கண்வலி, தலைவலி, உடலாதிவந்தமும் நச்சவலி முதலிய குணங்களிருக்கும்; சிலருக்கு வயிற்றுவலியும், வயிற்றோட்டமுமிருக்கும்; வாய் வழுவழப்பாகவும், அதிகமான தண்ணீர் தாகமுமிருக்கும்; ஆகார வெறுப்புண்டாகும்; சுரமில்லாத நேரங்களில் தூக்கமுண்டாகும்; கால், அடிவயிறு, முகம் சற்று வீக்கமுடனிருக்கும்; நகக்கண்களும், கண்ணிரப்பைகளும், இரத்தமின்றி வெளுத்திருக்கும்; கண்விழி மஞ்சளாகத்தோன்றும்; உள்ளங்கால், உள்ளங்கை எரிச்சலுண்டாகும்; கடுமையான சுரமும், குளிர்நடுக்கமுங்கண்டு குறைந்தது 15-நிமிஷநேரம் உபத்திரவித்தவுடன், வியர்வைகண்டு சுரம் வீடும்.

இந்தச் சுரத்திற்கு ஆரம்பத்திலேயே சரியான விதமாகச் சிகிச்சைச் செய்ப்பாடாவிட்டால், மண்ணீரல் வீக்கங்கண்டு அகால மரணத்தை விளைவிக்கும் இந்த வியாதியில் மண்ணீரல் வீக்கம் கண்டுவிடுவதற்குத் தான், சூலைக்கட்டி, காய்ச்சல்கட்டி (Spleen Enlargement) என்று சொல்லப்படும்.

குளிர்நடுக்கம் உண்டாகும் சமயம், சூடானதேயிலை, காப்பி, பாணங்களையும் பால், கஞ்சி முதலியவைகளையும் கொடுக்கலாம். மலச்சிக்கலிருந்தால் மலத்தை வெளிப்படுத்தும்படியான மருந்துகளைக் கொடுக்கவேண்டும்.

சிகிச்சை

(1) வெட்பாலிப்பட்டை	தேவதாரு	ரூபாயெடை	1
ரூபாயெடை 1	பால் சாம்பிராணி	,	1
கரிசலாங்காணி	கண்டுப்பாங்கி	,	1
மதுக்காரை	சுக்கு	,	1
சிறுவழுதலை	திப்பிலி	,	1
பெருவழுதலை	மிளகு	,	1
கருநொச்சி	கொடிவேலி	,	1
பொன்முசுட்டை	ஓமம்	,	1
நிலவேம்பு	வசம்பு	,	1
திப்பிலிக்கட்டை	செவ்வியம்	,	1

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதமாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) சிந்தில்தண்டு ரூபாயெடை	1	சிற்றரத்தை	ரூபாயெடை	1
துராயிலை	1	சக்கு	1	1
கண்டங்கத்திரிவேர்	1	திப்பிலி	1	1
பூனைக்காஞ்சொறி	1	கோஷ்டம்	1	1
பற்பாடகம்	1	தேவதாரு	1	1
நிலவேம்பு	1	கடுக்காய்த்தோல்	1	1
கடுகுரோகிணி	1	கண்டுபாரங்கி	1	1
கிச்சிலிக்கிழங்கு	1			

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(3) கொவ்வக்காய்க் கோரோசனை மாத்திரை; கோரோசனை மாத்திரை; சுரபூபதி மாத்திரை; பாலசுரஹர மாத்திரை; பாலசுரவிஷஹர மாத்திரை; இவைகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(4) ஸ்பிரிட் ஈதர் கைட்ரோவரி (spirit Aether Nitrosi)	டிசராம்	1
லைக்கர் அமோனியா அலிடேடிஸ் (Liquor Ammonia		
Acetatis)	1	1
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti)	துளி	40
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்து, ஒன்று முதல் மூன்று வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 3-மணி நேரத்திற்கொரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(5) பெர்ரி எத் கொய்னைன் டிட்ரஸ் (Ferri et Quinine	கிரைன்ஸ்	10
citras)		
லைக்கர் ஸ்டிரிகினைன் ஐட்ரோ குளோரைட் (Liquor		
strychnine Hydro chloride)	துளி	6
டிஞ்சர் கலம்பா (Tincture calumhae)	1	45
சிரப் ஆரண்டி (syrup Auranti)	டிசராம்	1
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்து, ஒன்று முதல் மூன்று வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஆகாரத்திற்குப் பின் ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(6) பொட்டாஷியம் குளோரைஸ் (potassium chloras)	கிரைன்ஸ்	10
ஆவிட் ஐட்ரோ குளோரிக் (Acid Hydrochloric)	துளி	10

■ விஷமானது ஜாக்ரஸையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine Sulphus)	கிரைன்ஸ்.	8
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti)	டிராம்	2½
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	8

இந்த மிகச்சுருகிய மிகவும் ஜாக்கிரதையாகக் கீழ்க்கூறியிருக்கும் பிரகாரம் செய்யவேண்டும். முதலில் 10-அவுன்ஸ் பிடிக்கக்கூடிய கல் காரக் சீசாவில் பொட்டாஷியம் குளோரைஸ்போட்டு, அதில், ஆவிட் ஐட்ரோ குளோரிகைவிட்டு காரக்கால் மூடிவிடவேண்டும். அதில், ஒருவிதப் புகைக் கிளம்பி, அமரும் சமயம் அதாவது அரைமணி நேரத்திற்குப் பின் காரக் கைத் திறந்து, 2-அவுன்ஸ் தண்ணீரை விட்டு, மறுபடியும் சீசாவை மூடி விடவும். குளோரேட் உப்பு முழுமையும் தண்ணீருடன் கலந்து விட்ட பின் காரக்கைத் திறந்து, கொய்னைன் சல்பஸ், சிரப் ஆரண்டி முதலியவை களைக் கணக்குப்படியும், பாக்கியுள்ள 6-அவுன்ஸ் தண்ணீரையும் விட்டு நன்றாய்க் குலுக்கிக்கொள்ளவும். இந்த மருந்தை “குளோரின் மிக்ச்சர்” என்று சொல்லப்படும். இதில் ஒன்று முதல் மூன்று வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 2-மணி நேரத்திற் கொருமுறை ஒரு தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

அதிகமான நாவரட்சியிருந்தால்:—

சிகிச்சை

(7) கோஷ்டம்	ருபாயெடை	1	சந்தனம்	ருபாயெடை	1
சீரகம்	„	1	மாண்கொம்பு	„	1
ஏலம்	„	1	துடைப்பப்பூ	„	1
சுக்கு	„	1	நெற்பொரி	„	1
அதிமதுரம்	„	1	வில்வவேர்	„	1
ஆமையோடு	„	1			

ஒன்று சேர்த்த தினம்வறுப்பாய் வறுத்திடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுக்கலாம்.

இதையும் அதிகமான நாவரட்சிக்குக் கொடுக்கலாம்:—

(8) பொட்டாஷியம் குளோரைஸ் (Potassium Chloras)	கிரைன்ஸ்	24
பொட்டாஷியம் பைகார்போனேட் (Potassium Bicarbonate)	„	48
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	8

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரு தேக்காண்டி மருந்துடன் அரைத் தேக்காண்டி எலுமிச்சம் பழச்சாறும், கொஞ்சம் சர்க்கரையும் கலந்து கொடுக்கலாம்.

வாத பித்தச்சுரம் :—

தருணச் சுரமென்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

வாத சிலேத்பனச் சுரம் :—

தருணச் சுரமென்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

விடாச் சுரம் :—

பழஞ் சுரமென்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

விஷச் சளிச்சுரம் :—

இன்புளுவென்ஸா வென்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

விஷச் சன்னிசுரம் :—

அபிரியாசச் சன்னிசுரமென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

சுரங்களுக்குப் பொதுமருந்துகள் :—

- | | | | | |
|-----|--------------------------|----------------|------------|-----------------|
| (1) | கீழ்க்காய்நெல்லிவேர்சாறு | பாதிரிவேர்சாறு | தேக்கரண்டி | 1 |
| | | தேக்கரண்டி | 1 | முலைப்பால் ,, 2 |

ஒன்றுசேர்த்து சாதாரணச் சுரங்களுக்குக் காலி மாலி கொடுத்துவரலாம்.

- | | | | | | | |
|-----|-----------|----------|------|---------------|----------|------|
| (2) | நிலவேம்பு | ரூபாயெடை | 1 | சீந்தில்தண்டு | ரூபாயெடை | 1 |
| | பற்பாடகம் | | ,, 1 | கோரைக்கிழங்கு | | ,, 1 |

ஒன்றுசேர்த்திடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை, ஒரு தேக் கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

- | | | | | | | |
|-----|-----------|----------|------|-------|----------|---|
| (3) | நிலவேம்பு | ரூபாயெடை | 1 | மினகு | ரூபாயெடை | 1 |
| | மறிமஞ்சள் | | ,, 1 | | | |

ஒன்றுசேர்த்திடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் சாதாரணச் சுரங்களுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

- | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------|------|------------|----------|------|
| (4) | பற்பாடகம் | ரூபாயெடை | 1 | சுக்கு | ரூபாயெடை | 1 |
| | சீந்தில்தண்டு | | ,, 1 | சிறுதேக்கு | | ,, 1 |
| | நன்னூரிவேர் | | ,, 1 | தேவதாரு | | ,, 1 |
| | முகாஞ்சொறி | | ,, 1 | கோஷ்டம் | | ,, 1 |
| | பேய்ப்புடல்வேர் | | ,, 1 | | | |

ஒன்றுசேர்த்திடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(5) சிறுவழுதலை	ரூபாயெடை 1	சுக்கு	ரூபாயெடை 1
பெருவழுதலை	„ 1	கொத்தமல்வி	„ 1
தேவதாரு	„ 1		

ஒன்றுசேர்த்திடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(6) வெட்டிவேர்	ரூபாயெடை 1	சுக்கு	ரூபாயெடை 1
லிலாமிச்சம்வேர்	„ 1	செஞ்சந்தனம்	„ 1
கோரைக்கிழங்கு	„ 1	பற்பாடகம்	„ 1

ஒன்றுசேர்த்திடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3 வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(7) பூனைக்காஞ்சொறி	கிச்சிலிக்கிழங்கு	ரூபாயெடை 1
ரூபாயெடை 1	சிறுறத்தை	” 1
துராயிலை	” 1	திப்பிலி
” 1	” 1	” 1
கண்டங்கத்திரிவேர்	” 1	கோஷ்டம்
” 1	” 1	” 1
சீந்தில்தண்டு	” 1	தேவதாரு
” 1	” 1	” 1
பற்பாடகம்	” 1	சுக்கு
” 1	” 1	” 1
நிலவேம்பு	” 1	கடுக்காய்த்தோல்
” 1	” 1	” 1
கடுகுரோகிணி	” 1	கண்டுபாரங்கி
” 1	” 1	” 1

ஒன்றுசேர்த்திடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(8) கோரைக்கிழங்கு	ரூபாயெடை 1	கடுக்காய்ப்பூ	ரூபாயெடை 1
அதிவிடயம்	„ 1		

ஒன்று சேர்த்துச் சூரணித்து, துணியில் வடிவட்டி $\frac{1}{2}$ -ரூபாயெடைச் சூரணத்துடன் தேன் சேர்த்துக் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

(9) காட்டாத்திப்பூ	ரூபாயெடை 1	வெள்ளிலோத்திரம்	ரூபாயெடை 1
வில்வப்பழம்	„ 1	யானைத்திப்பிலி	„ 1

ஒன்றுசேர்த்திடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் கஷாயத்தில் $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் தேன் சேர்த்துக் கொடுத்துவரலாம்.

(10) கோரோசனை மாத்திரை; சுரூபதி மாத்திரை; பாலசுரஹர மாத்திரை; பாலவிநோத சஞ்சீவி மாத்திரை; பாலசஞ்சீவி மாத்திரை; பாலசுர

குடோரி மாத்திரை; பாலசர விஷஹா மாத்திரை; தக்காளிக்கோரோ சனை மாத்திரை; கொவ்வைக்காய் கோரோசனை மாத்திரை முதலிய வைகளில் ஒன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

(கொய்னைன் மிக்ச்சர்)

(11) கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine Sulphus)	கிரான்ஸ்	40
ஆவிட் சல்பியூரிக் டில் (Acid Sulphuric Dil)	துளி	60
ஸ்பிரிட் ஈதர் ஐடீரோவி (spirit Aether Nitrosi)	டிராம்	4
சிரப் டோலு (syrup Tolu)	"	1
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	4

முதலில் கொய்னைன் சல்பஸை ஆவிட் சல்பியூரிக் டில் விட்டுக் கரைத்துக்கொண்டு, பின் மற்ற மருந்துகளைச் சேர்த்து ஒன்று முதல் மூன்று வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணிகோத்திற் கொரு தேக்கரண்டிவீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(கொய்னைன் குளோரஸ் மிக்ச்சர்)

(12) கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine sulphus)	கிரான்ஸ்	15
ஆவிட் ஐட்ரோகுளோரிக் (Acid Hydrochloric)	துளி	25
பொட்டாஷியம் குளோரஸ் (potassium chloras)	கிரான்ஸ்	15
சிரப் ஆரண்டி (syrup Auranti)	டிராம்	4
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	8

முதலில் 10-அவுன்ஸ் பிடிக்கக்கூடிய கல்கார்க் சீசாவில் பொட்டாஷியம் குளோரவைப் போட்டு அதில் ஆவிட் ஐட்ரோகுளோரிகை விட்டு காரக்கால் மூடிவிடவும். (அதில் ஒரு புனைக்கிளம்பி அமரும்) அரை மணிகோம் சென்றபின் காரக்கைத்திறந்து 2-அவுன்ஸ் தண்ணீர்விட்டு மூடி உப்பு களையும்வரை வைத்திருந்து, உப்புக்கரைந்து தண்ணீருடன் கலந்த பின் திறந்து ஒன்றின்பின் ஒன்றாக மற்ற மருந்துகளையும் சேர்த்து பாக்கி யுள்ள 6-அவுன்ஸ் தண்ணீரையும் ஊற்றி நன்றாகக் குலுக்கிக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 2-மணிகோத்திற் கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(கொய்னைன் சிட்ரஸ் மிக்ச்சர்)

(13) கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine sulphus)	கிரான்ஸ்	2
ஆவிட் சல்பியூரிக் டில் (Acid sulphuric Dil)	துளி	6
பெர்ரி எத் அமோனியம் சிட்ரஸ் (Ferri et Ammonium citras)	கிரான்ஸ்	4
* லைக்கர் ஆர்ஸனிக்காவீஸ் (Liquor Arsenicalis)	துளி	3
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	1½

■ விஷமானது; ஜாக்கதையாக உபயோகிக்க வேண்டும்.

முதலில் கொய்னைன் சல்பனைஸ் ஆவரிட் சல்பியூரிக் அமிலம் விட்டுக் கரைத்துக்கொண்டு, பின் இதர மருந்துகளையும் சேர்த்துக் குலுக்கி, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஆகாரத்திற்குப் பின் ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(கொய்னைன் பெர்ரி மிக்ச்சர்)

(14) பெர்ரி எற் கொய்னைன் சிட்ராஸ் (Ferri et Quinine Citras)	கிரைன்ஸ்	10
■ லைக்கர் ஸ்டிரிக்னைன் ஐட்ரோகுளோரைட் (Liquor Strychnine Hydrochloride)	துளி	■
டிஞ்சர் கலம்பா (Tincture calumbe)	,,	45
சிரப் ஆரண்டி ((Syrup Auranti)	டிபாம்	1½
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	■

ஒன்று சேர்த்து, ஒன்று முதல் மூன்று வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஆகாரத்திற்குப்பின், ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

எவ்விதச் சுரத்திலும் சூடுதனிய:—

(1) † டிஞ்சர் அக்கோனிட் (Tincture Aconite)	துளி	4
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	1

இதை ஒன்றாகச் சேர்த்து, காய்ச்சல் 105, 106-டி கிரியிலிருக்கும்போது வேறெந்தவிதத்திலும், திரோகோஷணத்தைத் தணிக்கமுடியாதென்று தீர்மானித்தபின்பே, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 15-நிமிஷத்திற்கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவந்து, உடனுக்குடன் தெர்மாமீட்டர் ((Thermometer) வைத்துப் பார்த்து, உஷ்ணம் 101-டி கிரிக்கு இறங்கியவுடன், இந்த மருந்தை நிறுத்திக்கொண்டு 11, 12, 13, 14-இலக்க கொய்னைன் மிக்ச்சர்களி லென்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

குறிப்பு:—டிஞ்சர் அக்கோனிட் மிகவும் நஞ்சாகையால் அளவுகளில் வெகு எச்சரிக்கையாகவே விருக்கவேண்டும்.

(2) காலோமல் (Calomel)	கிரைன்ஸ்	1½
பெனாசெட்டின் (phenacetine)	,,	3
காபின் சிட்ராஸ் (caffien citras)	,,	1½
சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb)	,,	■

ஒன்று சேர்த்து, ஒன்று முதல் ஐந்து வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, இரவில் படுக்கப் போகும்போது, ஒரே தடவையாக வாயில் கொட்டி எச்சில் கூட்டி விழுங்கச் செய்யலாம்.

† விஷமானது ஜாக்கரையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

குறிப்பு:—இது, காலையில் 2, 3-தரம் மலத்தைக் கழித்துப் பித்தத்தையும் தணித்து, திரேகோஷத்தைத் தையும் காய்ச்சலையும் தணிக்கும். பின்னர் 11, 12, 13, 14-இலக்க கொய்னைன் மிகச்சர்களில் ஒன்றைக் கொடுத்து வரலாம். பெரு செட்டின் சேர்த்த மருந்துகளைத் திரும்பக் கொடுக்க நேர்த்தால் 8-மணி நேரத்திற்குள் கொடுக்கக்கூடாது.

- (3) ஸ்பிரிட் ஈதர் ஐதர்நோஸி (Spirit Aether Nitrosi) டிராம் ½
லைக்கர் அமோனியா அவிடேடிஸ் (Liquor Ammonia
Acetatis) ,, 1
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti) ,, ½
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்த்து, ஒன்று முதல் மூன்று வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 3-மணி நேரத்திற்கொரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

குறிப்பு:—இதைக் காய்ச்சல் 101, 102-டிகிரியிருக்கும்போது கொடுத்து வந்தால், காய்ச்சல் குடிதணியும். காய்ச்சல் 101, 102-டிகிரியிருந்தால் வேறு மருந்துகளைக் கொடுக்காமலே இதைக் கொடுத்து வரலாம்.

- (4) பல்விஸ் அன்டிமோனியாலிஸ் (Pulvis Antimonialis) கிரான் ½
இதைத் தேனில் கலந்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற்கொருதரம் கொடுத்துவரலாம்.

குறிப்பு:—101, 102-டிகிரியுள்ள காய்ச்சல்களுக்கு இதவே போதுமானதாகும்.

- (5) டிஞ்சர் சின்கோனா கோ (Tincture Cinchonae Co) டிராம் 1
ஸ்பிரிட் ஈதர் ஐதர்நோஸி (Spirit Aether Nitrosi) ,, 1
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti) ,, 1½
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 4

ஒன்றுசேர்த்து, ஒன்று முதல் மூன்று வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற்கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

குறிப்பு:—காய்ச்சல் 101, 102-டிகிரியிருந்தால் இந்த மருந்தையே கொடுத்துவரலாம். காய்ச்சல்திகமாயிருந்தால், இந்த மருந்தினால் குட்டைத் தணித்துக்கொண்டு, பின் 11, 12, 13, 14-இலக்கக் கொய்னைன் மிகச்சர்களில் எதையாவதொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

- (6) லைக்கர் அமோனியா அவிடேடிஸ் (Liquor Ammonia
Acetatis) டிராம் 2
பொட்டாஷியம் ஐதர்நோட் (Potassium Nitrate) கிரான்ஸ் 12
ஸ்பிரிட் ஈதர் ஐதர்நோஸி (Spirit Aether Nitrosi) துளி 24
ஆக்குவா கரம்பர் (Aqua Camphor) அவுன்ஸ் 1½

ஒன்று சேர்த்துக் குலுக்கிக்கொண்டு 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற்கொரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

குறிப்பு:—சுரம் அதிகமாயிருக்கையில் இந்த மருந்தைக் கொடுத்து வந்தால் வியர்வைப் பிரிந்து சூடு மட்டுப்படும். சூடு மட்டுப்பட்டதும் 11, 12, 13, 14-இலக்க கொய்னைன் மிகச்சர்களிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

(7) அமோனியம் குளோரைட் (Ammonium Chloride) கிரைன்ஸ் 20

■ லேம் ஜுஸ் (Lime Juice) டிராம் 6

சிரப் டுலு (Syrup Tolu) „ ½

டிஞ்சர் நட்மேக் (Tincture Nutmeg) „ ½

ஒன்றுசேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற்கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

குறிப்பு:—இதை நீடித்துக் கொடுக்கவேண்டாம். வியர்த்துச் சுரம் தனியும் வரை இரண்டு மூன்று தடவை மட்டும் கொடுத்து, வியர்வை கண்டுகாய்ச்சல் சூடுதணிந்ததும் 11, 12, 13, 14-இலக்கக் கொய்னைன் மிகச்சர்களிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

(8) பொட்டாஷியம் கார்போனேட் (Potassium

Carbonate)

கிரைன்ஸ் 1½

■ லேம் ஜுஸ் (Lime Juice) டிராம் ½

ஆக்குவா காம்ப்ர் (Aqua Camphor) „ 1½

ஒன்றுசேர்த்துப் பொங்கும்போது 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற்கொருதரம் இந்தவிதம் செய்து கொடுத்துவரலாம்.

குறிப்பு:—இதை நீடித்துக் கொடுத்துவரவேண்டாம். வியர்த்துக் காய்ச்சலின் சூடுதனியும்வரை 2, 3-முறைக்கொடுத்து, சூடுதணிந்தபின் 11, 12, 13, 14-இலக்கக் கொய்னைன் மிகச்சர்களிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

(9) பொட்டாஷியம் நைட்ரேட் (Potassium Nitrate) கிரைன்ஸ் 3

அமோனியம் குளோரைட் (Ammonium Chloride) „ 2

தண்ணீர் அவுன்ஸ் ½

ஒன்று சேர்த்துக் குலுக்கிக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 3-தடவை, தடவை ஒன்றுக்கு ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

குறிப்பு:—இதனால் வியர்வை கண்டு, சுரத்தின் சூடுதனியும். பின்னர் 11, 12, 13, 14-இலக்கக் கொய்னைன் மிகச்சர்களிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

(10) அமோனியம் குளோரைட் (Ammonium Chloride)	டிசாம் 4
ஸ்பிரிட் ரெக்டிபைட் (Spirit Rectified)	„ 4
தண்ணீர்	அவுன்ஸ் 8

ஒன்றுசேர்த்து, வெளிப்பிரயோகமாகக் காய்ச்சலில் சூடு தணிவதற்கு வெள்ளைத் துணியில் நனைத்து உடம்பின்மேல் துவட்டலாம். இதனால் வியர்வைகண்டு சூடு தணியும்.

குறிப்பு:—வெளிப்பிரயோகமட்டும்.

(11) அமோனியம் குளோரைட் (Ammonium Chloride)	அவுன்ஸ் 2½
பொட்டாஷியம் நைட்ரேட் (Potassium Nitrate)	„ 2½
தண்ணீர்	„ 8

ஒன்று சேர்த்துக் கலக்கிக்கொண்டு வெளிப்பிரயோகமாக ஒரு வெள்ளைத் துணியில் நனைத்து உடம்பெங்கும் துவட்டலாம்.

குறிப்பு:—வெளிப்பிரயோகமாக மட்டும் இதைச் செய்யவேண்டும். இதனால் வியர்வை கண்டு சூடு தணியும்.

சுரத்திலுண்டாகும் இருமலை நிறுத்த:—

சிகிச்சை

(1) கண்டங்கத்திரிவேர்	சிற்றாத்தை	ரூபாயெடை 1
	ரூபாயெடை 1	கோலாகிழங்கு „ 1
சீந்தில்தண்டு	„ 1	சுக்கு „ 1

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 8-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(2) தூதுவேளையிலை	ரூபாயெடை 1	திப்பிலி	ரூபாயெடை 1
கண்டங்கத்திரிவேர்	„ 1	கொடிவேலி	„ 1
முசுமுசுக்கை	„ 1	கோஷ்டம்	„ 1
சுக்கு	„ 1	சிற்றாத்தை	„ 1
மிளகு	„ 1		

ஒன்று சேர்த்திடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 8-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், 1-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(3) லைக்கர் அமோனியம் அவிடேடிஸ் (Liquor Ammonium Acetatis)	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட் ஈதர் நைட்ரோஸி (Spirit Aether Nitrosi)	„ 1
வைனம் இப்பிக்காக் (Vinum Ipecac)	துளி 10
தண்ணீர்	அவுன்ஸ் 3

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 3-மணி நேரத் திற்கொரு தடவை ஒரு தேக்காண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

சுரத்திலுண்டாகும் நாவரட்சியையும், தாகத்தையும் தணிக்க:—

சிகிச்சை

(1) கோஷ்டம்	ரூபாயெடை 1	ஆமையோடு	ரூபாயெடை 1
சீரகம்	„ 1	சந்தனம்	„ 1
ஏலம்	„ 1	மான் கொம்பு	„ 1
சுக்கு	„ 1	நெற்பொரி	„ 1
அதிமதுரம்	„ 1	துடைப்பப்பின்பூ	„ 1

ஒன்று சேர்த்து, மண் சட்டியில் போட்டு இளவறுப்பாய் வறுத்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 1-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(2) பொட்டாஷியம் நைட்ரேட் (Potassium Nitrate)	கிரான்ஸ்	■
சர்க்கரை	„	12
ஆக்குவா மெந்தா பிப் (Aqua Mentha Pip)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்றுசேர்த்துக் கலந்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு தாகம் தணியும்வரை 3-மணி நேரத்திற் கொருமுறை ஒன்றரைத் தேக்காண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(3) பொட்டாஷியம் டார்ட்ராஸ் அவிடஸ் (Potassium Tartarus Acidus)	கிரான்ஸ்	30
எலுமிச்சம்பழச்சாறு (Lime Juice)	டிசரம்	$\frac{1}{2}$
சர்க்கரை	„	2
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	3

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்குத் தாகம் தணியும்வரை 3-மணி நேரத்திற் கொருமுறை 2-தேக்காண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(4) பொட்டாஷியம் குளோரஸ் (Potassium Chloras)	கிரான்ஸ்	15
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	5

ஒன்றுசேர்த்துக் கலந்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்குத் தாகம் தணியும்வரை, 3-மணினேரத்திற் கொருமுறை ஒரு தேக்காண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

குறிப்பு:—வீடாச்சூம்; சன்னிபாதச்சூம் முதலிய சுரங்களிலுண்டாகும் தாகத்திற்கு இதைக் கொடுக்கலாம்.

- (5) பொட்டாஷியம் குளோரைஸ் (Potassium chloras) கிரைன்ஸ் 4
 பொட்டாஷியம் பைகார்போனேட் (Potassium
 Bicarbonate) „ 8
 தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து, 1 முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்குத் தாகம் தணியும் வரை 4-மணி நேரத்திற் கொருமுறை 2-தேக்கரண்டி மருந்தில்:—

எலுமிச்சம்பழச்சாறு டிராம் ½
 சர்க்கரை கிரைன்ஸ் 30
 சேர்த்துக் கொடுத்த வரலாம்.

சுரத்திலுண்டாகும் வயிற்றுப்பொருமலை நீக்க:—

சிகிச்சை

- (1) துணுயிலை ரூபாயெடை ½ மிளகு ரூபாயெடை ½
 வேப்பங்கொழுந்து „ ½ ஒமம் „ ½
 சச்சு „ ½

முதலில் வேப்பங்கொழுந்தையும், துணுயிலையையும் ஒரு மண் சட்டியில் போட்டு வறுத்து, சிவந்து வரும் சமயம் மற்றவைகளை பொடித்துப் போட்டு, அதில் 12-அவுன்ஸ் தண்ணீர் வீட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) முருங்கையிலை ஒருபிடி பெருங்காயம்(சுட்டது)ரூபாயெடை ½
 கறியுப்பு ரூபாயெடை ½ ஒமம் „ ½

முதலில் முருங்கையிலையையும் உப்பையும் ஒன்றாகச் சசக்கி எடுத்தச் சாற்றில் சுட்டபெருங்காயத்தையும், ஒமத்தையும் கலந்ததாத்து, ½-அவுன்ஸ் சுடுதண்ணீர் கலந்து கலக்கி வடிக்கட்டி, 1-அவுன்ஸ் உன்றாக்குக் கொடுத்து:—

முருங்கையிலைச்சாறு அவுன்ஸ் 1 கறியுப்பு ரூபாயெடை ½
 பெருங்காயம் ரூபாயெடை ½
 ஒன்றாகச் சேர்த்துத் தொப்புளைச் சுற்றி தடவி வரலாம்.

- (3) சோடா பைகார்ப் (Soda.Bicarb) கிரைன்ஸ் 10
 பல்விஸ் ரீயை (pulvis Rhei) „ 4
 ஒலியம் அனிசி (Oleum Anisi) துளி 2

எண்ணெய்க் கலந்து கொள்ளும்படியாக ஒன்றுசேர்த்துப் பிசரி, 4-பாகமாகி மடித்துக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 4-மணி நேரத்திற் கொருநாள் ஒரு பாகத்தைத் தேனில் கலந்து கொடுத்துவரலாம்.

- (4) பல்விஸ் ரீயை (pulvis Rhei) கிரைன்ஸ் 1
 காலோமல் (calomel) „ 1

சோடா பைகார்ப் (soda Bicarb)	கிரான்ஸ்	3
ஒலியம் அனிசி (Oleum Anisi)	துளி	1

எண்ணெய் கலந்துகொள்ளும்படியாக நன்றாகச் சேர்த்து, ஒரேதடவை யாக 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்குத் தேனில் கலந்துகொடுத்து வயிற்றுப்பொருமல் குறைந்ததும்:—

பல்வீஸ் ரீயை கோ (pulvis Rhei co)	கிரான்ஸ்	2
சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb)	"	0
ஒலியம் அனிசி (Oleum Anisi)	துளி	1

எண்ணெய் கலக்கும்படியாய் நன்றாய்க் கலந்து, 4-பாகமாக்கி வடித்து வைத்துக்கொண்டு, 3-மணிநேரத்திற் கொருபாகமாகத் தேனில் கலந்து கொடுத்துவரலாம்.

சுரத்திலுண்டாகும் ஜலதோஷத்தையும் இருமலையும் நிறுத்த:—

சிகிச்சை

அமோனியம் கார்போனஸ் (Ammonium carbonas)	கிரான்ஸ்	10
டிஞ்சர் செனிகா (Tincture senegae)	துளி	40
டிஞ்சர் சின்கோனா கோ (Tincture Cinchonae co)	"	40
டிஞ்சர் சில்லி (Tincture Seille)	"	15
வைனம் இப்பிக்காக் (vinum Ipecac)	"	30
ஸ்பிரிட் ஈதர் டைரோசி (Spirit Aether nitrosi)	"	60
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	4

ஒன்று சேர்த்துக்கலந்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 4-மணி நேரத்திற் கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

சுரம் தணிந்தபின், சுதகதப்பையும் சுளைப்பையும் ஆகார வெறுப் பையும் மாற்ற:—

சிகிச்சை

டிஞ்சர் சின்கோனா கோ (Tincture Cinchonae co)	துளி	40
ஆலிட் டைரோ ஐட்ரோ குளோரிக் அிட் (Acid Nitro Hydrochloric Dil)	"	15
† டிஞ்சர் நக்ஸ் வாமிகா (Tincture nux vomica)	"	12
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti)	டிராம்	1½
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	5

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்துக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயது குழந்தைகளுக்கு ஈரம் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒருதேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

† விஷமானது ஜாக்கையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

அம்மை—வைசூரி VARIOLA

அம்மை ஒருவரிடமிருந்து ஒருவருக்குத் தொத்தக்கூடிய சபாவமுள்ள ஒரு தொத்துநோயாகும். அம்மை ரோகத்தை 'வைசூரி; குருநோய்; கோடகம்; மகமாரி' என வெவ்வேறாகக் கூறுவர். அதிலும் பலவகைகள் உண்டு. அம்மை ரோகத்தில் பதினான்குவித முண்டெனத் தமிழ் வைத்திய நூல்கள் கூறுகின்றன.

அம்மை விஷக்கிருமிகளால் திரோகத்தில் சேர்க்கப்படும் விஷத்தன்மையினால் உண்டாவதாகும். விஷக்கிருமிகள் அஸ்தியில் ஆதிக்கம்பெற்று சுரத்தை முதல் குறியாகக்கொண்டு வருகிறது.

அம்மையானது 2-வயது முதல் 5-வயதுக்குழந்தைகளித்தான் அதிகம் பாதிக்கிறதென்றும், ஒரு வயதிற்குக் குறைந்த குழந்தைகளுக்கு அதிகமாய் அம்மை நோய் வருவதில்லை யென்றும் டாக்டர் ரூடாக்ஸ் (Dr Ruddocks) அபிப்பிராயப்படுகிறார். மேலும் அம்மை ரோகமானது ஒருமுறைதான் வருமென்றும், அது அடிக்கடி வருவதில்லை யென்றும் கூறுகிறார்.

அம்மை வருமுன் காய்ச்சல் அடிக்கும்; செற்றி வலியும், தும்மலும் ஏற்படும்; நாசியில் நீர் ஓழுகும்; சர்மம் வாட்சியடையும்; நாடி தீவிரமாக நடக்கும்; வாந்தியும், அரோசிகமும் ஏற்படும்; நாவாட்சியும், தொண்டை புரைச்சலும் உண்டாகும்; இரண்டொரு நாளைக்கெல்லாம் 100, 120-இருக்கவேண்டிய நாடித் துடிப்பானது 130, 140-ஆக தீவிரப்பட்டிருக்கும்; ஆரம்பத்தில் நாக்கில் குழுகுழப்பான மாவு படிந்திருக்கும்; அடி நாக்கும், துணி நாக்கும் இரத்தச் சிசுப்பாக விருக்கும்; கண் விழியானது சிவந்து மாமிசத் துண்டு போல் காணப்படும்; நாவானது படிப்படியாக சுவாபீக நிலைக்கு வந்துவிடும்.

அம்மை ரோகத்தில் விஷச்சளி சுரமும், மாந்த வியாதியும், தொண்டை வீச்சமும் ஏற்பட்டால் பரிகரிக்கக்கூடாத நிலைமையை அடையும். மேலும் அம்மைரோகத்தினால் ஈன ரோகமும், மாந்த வியாதியும், கண்டக்குழல் வீச்சுக்களும், எலும்பு வியாதிகளும், கண் கோளாறுகளும், செவி ரோகங்களும், சர்ம வியாதிகளும் உண்டாகும். அம்மை குறிகள் தோன்றிநிபிறக்கும் திரோகோஷ்ணம் 100-டிகிரிக்கு குறையாமலே இருக்கும்; அம்மைகளின் தனிப்பட்ட பெயரைக் கீழ்க்குறிப்பிடுகிறோம். அம்மையில் தண்ணீரை வேண்டிய மட்டும் குடிக்கக் கொடுக்கலாம். தனி வெந்நீரிலாவது அல்லது ஒரு பங்குக் காடியும், மூன்றுபங்கு வெந்நீரும் கலந்த கலவை நீரிலாவது கடற்பஞ்சை நனைத்து, நாஸ்தோறும் 2-தடவை அம்மைச் சிரங்குகளை பதமாய் துடைப்பது மிகுந்த நன்மையைத் தரும்.

உப்புதரியம்மை	நீர்க்குழுவானம்மை
உமியம்மை	பினைமுகரியம்மை
கடுகம்மை	பாசிபயற்றம்மை
கரும்பனிச்சையம்மை	பாலம்மை
கல்லுதரியம்மை	மொழுக்கனம்மை
கொள்ளம்மை	வரகுதரியம்மை
கோணிதட்டம்மை	விச்சரிப்பனம்மை
தவளையம்மை	வெந்தயவம்மை

உப்புதரி அம்மை—German Measles—False Measles

காய்ச்சல் 101, 103-டிகிரியவரை அடித்து, மூன்றாம் நாளில் முகத்தில் பொறிப்பொறியாக நமச்சல்போல் தோன்றும்; பின் திரேகமெல்லாம் உண்டாகும்; ஐந்தாம் நாளில் அவற்றில் நீர்க்கோத்து, அரிப்பு அதிகமாகத் தோன்றும்; ஏழாம்நாள் மறைந்துவிடும், பதினேராம் நாளில் தலைக்கு தண்ணீர் விடலாம்.

உமியம்மை—Rubella—Rotheln

காய்ச்சல் 101, 102-டிகிரியிருக்கும்; வயிற்றோட்டமும் வார்த்தியிருக்கும்; மூன்றாம்நாள் முகத்தில் சிறு நமச்சல்கள் போல் தோன்றி, பின் உடலாகியந்தமும் உயிப்போல் இருக்கும்; ஐந்தாம்நாள் நமச்சல்களில் நீர்க்கோர்த்து, ஒன்பதாம்நாள் மறைந்துவிடும்; பத்தாம்நாள் தலைக்குத் தண்ணீர் விடலாம்.

கடுகம்மை—Scarlatina Anginosa

காய்ச்சல் 101, 103-டிகிரியிருக்கும்; உடம்பெல்லாம் அசுதியாகவும், சிறு வலியாகவுமிருக்கும்; தொண்டைகட்டிக் குரல் கம்மும்; வயிற்றோட்டமிருக்கும்; மூன்றாம்நாளில் தலையில் கடுகுப்போன்ற நமச்சல்கள் தோன்றும்; நான்கு நாளேக்குள் நீர்க்கோர்த்துக் கொப்புளங்கள் நன்றாகத் தெரியும்; ஏழாம்நாள் ஒன்றுமில்லாமல் மறைந்துவிடும்; பதினேராம்நாள் தலைக்குத் தண்ணீர் விடலாம்.

கரும்பனிச்சையம்மை—Measles

காய்ச்சல் 102, 104-டிகிரியிருக்கும்; நான்காம்நாள் சிரசில் மயிர்க்கால்கள் சமீபமாக கொப்புளங்கள் கிளம்பும்; இதில் வயிற்றோட்டம் ஏற்படுவது மிகவும் கல்லது; மலம் கட்டினால், உடம்பெல்லாம் பாளமாக வெடித்துச் சீழ்ப்பிடித்து புழு உற்பத்தியாகிவிடும். முதல் முதல் நெற்றியிலும், தலை ரோமங்களிலும் கொப்புளங்கள் கிளம்பி, பின் முகத்திலும் கழுத்திலும் உடம்பிலும், கடைசியாகக்கால்களிலும் உண்டாகிவிடும். கொசுக்கடிமாதிரியாக உண்டாகி வட்டவளையமாக, கொப்புளங்களாக நீர்கோற்றுச் சற்றுச் செந்நிறமாக தோன்றும். கொப்புளங்கள் தோன்றி

மூன்றுநாளில் சுரம் வீட்டுவிடும். வயிற்றோட்டம் ஏற்பட்டுவிட்டால், ஏழாம்நாள் கொப்புளங்கள் வாடிவிடும். மலம் கட்டுமானால் பதினான் காம் நாள்தான் கொப்புளங்கள் வாடும். இருபத்தோராம்கான் தலைக்குத் தண்ணீர் விடலாம். இது மிகவும் கொடுமையான அம்மைரோகமாகும். ஐந்துநாள்வரையிலும் காய்ச்சல் 105-டிகிரி வரை அடிபதுண்டு. மலம் கட்டாதிருந்தால் யாதொரு குற்றமும் நேறுவதில்லை. மலம் கட்டிவிட்டால் அநேகமாக நம்பிக்கை யற்றதாகவே கூறவேண்டும்.

கல்லுதரியம்மை—Scarlatina

கடுமையான சுரம் காயும்; ஒருசமயம் 104, 105-டிகிரியு மிருக்கும்; வயிற்றோட்டமும் வாந்தியும் அதிகமாயிருக்கும்; மூன்றாம் நாள் முகத்தில் சிறு கொப்புளங்கள் உண்டாகி, ஏழாம் நாள் பெருங்கொப்புளங்களாக மாறிவிடும்; கொப்புளங்கள் சிவந்திருக்கும்; 10-ம் நாள் கொப்புளங்கள் வாடிவிடும் பதினோராம் நாள் தலைக்குத் தண்ணீர் விடலாம்.

கொள்ளம்மை—Small Pox

காய்ச்சல் 102, 104-டிகிரி யிருக்கும்; வாய்பிதற்றலும், சன்னியும், வலிப்பும், காணும்; மூன்றாம் நாளில் முகப்பருபோல் அம்மைக் குறித் தோன்றி ஏழாம் நாள் நீர்க்கோர்த்து பதின்மூன்றாம் நாள் மறையும் 16-ம் நாள் தலைக்குத் தண்ணீர் விடலாம்.

கோணிதட்டம்மை—

உப்புதரி அம்மை என்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

தவளையம்மை—Measles

இது சாதாரண காய்ச்சலாக 102, 103-டிகிரியிலிருக்கும்; நடக்கமுடியாமல் கால்கள் கடுக்கும்; நெஞ்சில் வலி உண்டாகும்; நான்காம் நாள் கிரகில் அம்மைக்குறி தோன்றி ஏழாம் நாள் பெரும் கொப்புளங்களாக விருக்கும்; ஒன்பதாம் நாள் கொப்புளங்கள் வாடிவிடும். பதினோராம் நாள் தலைக்குத் தண்ணீர் விடலாம்.

நீர்க்குழுவான் அம்மை—

காய்ச்சல் 101, 102-டிகிரி அடிக்கும்; மூன்றாம் நாள் சுண்டக்காய் பெரிய கொப்புளங்கள் தோன்றும்; ஏழாம் நாள் வாடிவிடும். ஒன்பதாம் நாள் தலைக்குத் தண்ணீர் விடலாம்.

பனைமுகரியம்மை—Small Pox

காய்ச்சல் 101, 102-டிகிரி யிருக்கும்; கண் சிவந்து எரியும்; கைகால் வீங்கும்; குளிர் நடுக்கும்; வாய் பிதற்றல் யேற்படும்; சில சமயம் சன்னியும்

வருவதுண்டு. மூன்றாம் நாள் முகத்தில் சிறு கொப்புளங்கள் தோன்றி பதின்மூன்றாம் நாள் மறைபும். பதினாறாம் நாள் தலைக்குத் தண்ணீர் விடலாம்.

பாசிப்பயிற்றம்மை—Chicken Pox Vericella Vesicularis

காய்ச்சல் 102, 103-டிகிரி யிருக்கும்; இரண்டாம் நாள் முகத்தில் சிறு நமச்சல்போல் உண்டாகி ஏழாம் நாள் பாசிப்பயிற்றுபோல் கொப்புளங்கள் காணப்பட்டு ஒன்பதாம் நாள் மறைந்துவிடும். பதின்மூன்றாம் நாள் தலைக்குத் தண்ணீர் விடலாம்.

பாலம்மை—Scaratina

சூரம் கடுமையாக 103, 105-டிகிரி யிருக்கும்; உடம்பு கடுப்பு வலியாக விருக்கும்; மூன்றாம் நாள் முகத்தில் கொப்புளங்கள் தோன்றும்; ஏழாம் நாள் கொப்புளங்கள் நீர்க்கோர்த்து மினுமினுப்பா யிருக்கும்; ஒன்பதாம் நாள் கொப்புளங்கள் வாடிவிடும். பதினேந்தாம் நாள் தலைக்குத் தண்ணீர் விடலாம்.

மொழுக்கம்மை—Scarlatina Maligna

ஏழுநாள்வரை காய்ச்சல் 101, 103-டிகிரி அளவாகவே இருக்கும். ஏழு நாளைக்குப்பின் முகத்தில் அம்மைக் குறிகள் தோன்றும்; உடம்பாதி யந்தமும் குடைச்சல் உண்டாகும்; இடுப்பும், முழங்காலும் வீங்கும்; உடம்பெல்லாம் எரிச்சல் உண்டாகும்; பதினேந்தாம் நாள் மறையும். பதினேழாம் நாள் தலைக்குத் தண்ணீர் விடலாம்.

வரகுதரியம்மை—Small Pox

காய்ச்சல் அதிகமாய் 103, 104-டிகிரி இருக்கும்; வாயிலிருந்து இரத்தம் வரும்; நீதாமையிலும் இரத்தம் கசியும்; மூன்றாம்நாள் முகத்தில் வர கரிசிபோன்ற கொப்புளங்கள் தோன்றி, ஏழாம்நாள் கொப்புளங்கள் நீர்க்கோர்த்து காணப்படும்; பதினாறாம் நாள் கொப்புளங்கள் மறையும். பதின்மூன்றாம் நாள் தலைக்குத் தண்ணீர் விடலாம்.

விச்சிலுப்பையம்மை—

உயி அம்மை என்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

வெந்தய அம்மை—Scarlatina Simplex

காய்ச்சல் 101, 103-டிகிரி அடித்து உடம்பெல்லாம் சூத்தலும், வலியும் காணும்; மூன்றாம் நாள் வெந்தயம்போல் கொப்புளங்கள் உண்டாகி, ஏழாம் நாளில் கொப்புளங்களெல்லாம் நீர்க்கோர்த்து ஒன்பதாம் நாள் மறைந்துவிடும். பதினேந்தாம் நாள் தலைக்குத் தண்ணீர் விடலாம்.

அம்மை யிறங்கியபின்—After Variola

அம்மை யிறங்கியபின், அம்மையின் உத்வேகத்தைத் தணிக்கும்பொருட் டாக சில சிகிச்சை முறைகளைச் செய்யவேண்டும்.

அம்மை யிறங்கித் தண்ணீர்விடும்போது:—

வேப்பிலை	இரண்டுபிடி	அறுகம்பில்	ரூபாயெடை
மஞ்சள்	ரூபாயெடை 1		

இவற்றை மைபோலரைத்து, உடம்பெல்லாம் பூசியிருந்த, வேப்பிலைப் போட்டுக் காய்ச்சிய தண்ணீரைத் தானாகவே குளிரவைத்து, அதனால் ஸ்நானம் செய்விக்கவேண்டும். தண்ணீரில் அதிகநேரம் வைத்திருக்கக்கூடாது.

அம்மை இறங்கியதிவிருந்து ஒருவாரம் வரையில்:—

அத்தியஞ்சு	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	சாதிக்காய்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
பருத்திப்பிஞ்சு	" $\frac{1}{2}$	சோகம்	" $\frac{1}{2}$

மைபோலரைத்து, மோரில் கலக்கிக் காலை நேரங்களில் நான்தோறும் கொடுத்துவரலாம்.

அம்மை இறங்கியபின் ஒன்றுவிட்டொருநாள், மேற்சொல்லியவிதமாக மருந்தைப் பூசியிருந்த, வேப்பிலை போட்டத் தண்ணீரினால், ஸ்நானம் செய்வித்து வரவேண்டும்.

அம்மை இறங்கியபின், அம்மைப் புண்களிருந்தால் வேப்பங்கொழுந்தையும், மஞ்சளையும் சமமாகவெடுத்து, மைபோலரைத்துப் பூசியிருந்து பின்னர், தயிரை உடலெல்லாம் தேய்த்து, வேப்பிலை போட்டத் தண்ணீரினால் ஸ்நானம் செய்துவைக்கலாம். இப்படி ஒன்றுவிட்டொருநாள் மூன்று ஸ்நானங்கள் செய்துவைத்தபின், சிற்றமுணக்கெண்ணெயைத் தடவி ஒன்றுவிட்டொருநாள், மூன்று ஸ்நானங்கள் செய்துவைக்கவேண்டும்.

ஆறுமாதம் வரை, அம்மை வந்தவர்களுக்கு காரமான ஆகாரங்கள் கொடுத்தால் சிலசமயம் கெடுதல்கள் நேரிடலாம். குழையவடித்தச்சோற்றில் வெங்காயத்தைக் குறுவ அரிந்துபோட்டு, தயிர்விட்டுக் கொடுப்பதே அம்மை ரோகத்தில் கஷ்டப்பட்டவர்களுக்கேற்ற ஆகாரமாகும்.

அம்மை ரோகத்திலேற்படும் கோளாறுகள் SEQUELAE BY VARIOLA

அம்மை ரோகமுண்டா யிருக்கும்போதும், அம்மை யிறங்கித் தலைக்குத் தண்ணீர் விட்டபின்பும், சில கோளாறுகள் ஏற்படுவதுண்டு. அதற்குத் தகுந்த பரிகாரங்கள், செய்யப்பட்டாவிட்டால் அசம்பாவித மாகுமாதலால், தகுந்த சிகிச்சைகள் செய்யும் முறையை இதன்மீழ் கூறப்படுகிறது:—

அம்மை அதிகப்படாதிருக்க:—

சிலருக்கு அம்மையானது, அகோரமாக உடலாதிநீர்தழும் பரவிக் கொப் புளிக்கும். அதை மட்டுப்படுத்தினால் சற்று இலகுவாயிருக்கும் அதற்கு ஆரம்பத்திலேயே, மட்டுப்படுத்தும்படியான சிகிச்சை செய்வதே உத்தமமானது.

சிகிச்சை

- (1) வெள்ளைக்குங்கிலியத்தை அவுரியிலேச்சாற்றால் 12-மணிநேரம் மைபோ லரைத்துச் சுண்டக்காயளவு மாத்திரைகளாகச் செய்து உலர்த்திக் கொண்டு, சரம் காயும்போதேனும், அம்மைக் குறிகள் தோன்றின உடனேயேனும் ஒரு மாத்திரையை வெந்நீரில் கரைத்துக் கொடுத்து வந்தால் அம்மை அதிகப்படாதிருக்கும்.
- (2) பழந்தோலை (பழய, செருப்பு முதலியது) சுட்டுக் கருக்கிய சாம்பலில் தேன் விட்டுப் பிசைந்து கழற்சிக்காயளவுக் கொடுத்து வந்தாலும் அம்மை அதிகப்படாது.

அம்மை உள்ளே இறங்காதிருக்க:—

சில சமயங்களில் அம்மைரோகக் குறிகள் அதிகம் வெளியில் தோன்றாம லிருக்கலாம். இவ்விதமாக அம்மைத் திரோகத்தினுள்ளே சரம்பங்களுக் குள்ளும், அஸ்தி நரம்புகளிலும், லீரண உருப்புகளிலும், தொண்டை நாளங்களிலும் தாக்கி, வெளிக்குத் தெரியாமல் செய்து விபத்தை உண்டுபண்ணும். போதிய அளவாக மருந்தினால்லாது இயற்கை தற் குணத்தால், சரம்பங்களுக்குக்கீழ் அம்மைக் கொப்புளங்கள் உண்டாகி மேற்தோன்றாதிருக்குமானால் அசாதாரணமாகவே முடியும். எவ்வளவு அம்மையின் கொரோம் வெளிக்குத் தோன்றுகிறதோ அவ்வளவாலும், உள் இறங்கவில்லை என்று சற்று நம்பலாம். எவ்வாறிருப்பினும் அம்மை ரோக ஆரம்பத்திலேயே காய்ச்சலடிக்கும்போதே அம்மைக் காய்ச்ச லென்றதத் தெரிந்த உடனே தக்க அலுஷதப் பிரயோகங்களினால் உள் றுக்கிரங்காம லிருக்கும் வழியைத் தேடவேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) தேற்றுவிரை ரூபாயெடை $1\frac{1}{2}$ ■ வேகவைத்த இளநீர் தண்ணீர்
கோரைக்கிழங்கு ,, $1\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் 6

■ இளநீர்க்காயின் மேல் மட்டையை நீக்கிவிட்டு, ஒட்டோடுக்கடிய இளநீர்த் தேங்காயை தண்ணீரில்போட்டு நன்றாக வேகவைத்துப் பின் அத னுள்ளிருக்கும் தண்ணீரை எடுத்துக் கொள்ளவும்.

வேகவைத்த இளநீர் தண்ணீரால் அரைத்துக் கலக்கி வடிகட்டி நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை கொடுத்துவந்தால் அம்மை உள்ளுக்கிறங்காது.

(2) சீரகம்	ருபாயெடை	1
■ வேகவைத்த இளநீர் தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	6

ஒன்றுசேர்த்தரைத்துக் கலக்கி வடிகட்டி நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை கொடுத்துவந்தால் அம்மை உள்ளுக்கிறங்காது.

(3) சீரகம்	ருபாயெடை	1½
† நாக்குப்பூச்சி	„	1½
‡ ஈனுக்கிடேரிச் சாணிப்பால்	அவுன்ஸ்	3

ஒன்றுசேர்த்தரைத்துக் கலக்கி வடிகட்டி நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளைக் கொடுத்துவாலாம். இதனால் அம்மை உள்ளுக்கிறங்காது.

(4) கருடக்கல் (பளிங்குபோலுள்ளது)	ருபாயெடை	1½
மான் கொம்பு	„	1½
காண்டாமிருகத்தின் கொம்பு	„	1½

இவற்றை மான்கொம்பை அரத்தால் ராவிப்போட்டு ஆறவைத்த தண்ணீரில் அரைத்துக் கலக்கி வடிகட்டி 4-அவுன்ஸ் வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை கொடுத்துவருவதினாலும் அம்மை உள்ளுக்கிறங்காது.

(5) பிராய மரத்து இலையை ஒரு மண்சட்டியில் போட்டுத் தண்ணீர்விட்டு நன்றாக அலசிச்சொண்டிருந்து, பின் அந்தத் தண்ணீர் 4-அவுன்ஸ்வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை கொடுத்துவருவதினாலும் அம்மை உள்ளுக்கிறங்காது.		
---	--	--

அம்மைப் புண்ணுகள் :—

அம்மை யிறங்கி தண்ணீர்விட்ட பின்னும் அம்மைப்புண்ணுகள் இருக்குமானால் அதில் ஈ, கொசு முதலிய விஷசத்துருக்கள் வந்து உட்கார்ந்து கிருமிகளைப்பெருக்கி புண்ணைப் பின்னும் ஆறாமல் செய்து புழு உண்டாக்கிவிடும். அதனால் அதிக உபத்திரவங்கள் சம்பவிக்குமாதலால் கூடியவிரைவில் அப்புண்ணுகளை ஆற்றும்படியான சிகிச்சைகள்செய்து வரவேண்டும்.

■ வேகவைத்த இளநீர்த்தண்ணீர் 158-ம் பக்கம் பார்க்கவும்.

† நாக்குப்பூச்சியைப் பாலில் போட்டுக் கொஞ்சநேரம் வைத்திருக்க, மண்ணைக் கக்கிவிடும்; பின்னர் எடுத்துக்கொள்ளவும்.

‡ கன்றுபோடாத பசுமாட்டின் சாணியைக் கரைத்து வடிகட்டியது.

சிகிச்சை

- (1) வேப்பங்கொழுந்து ஒருபிடி விரலிமஞ்சள் (கறிமஞ்சள்) ரூபாயெடை 1 ஒன்றுசேர்த்து மைபோலரைத்து புண்ணுகளில் பூசுவரலாம்.
- (2) முற்றின தேங்காயைத் திருகிக் காய்ச்சியெடுத்த தேங்காய் எண்ணெய் 1-அவுன்ஸில் $\frac{1}{2}$ -ரூபாயெடை கடுங்காய்த் தூள் அல்லது மிளகு சாம்பல் போட்டு வெயிலில் வைத்திருந்து குளிர்ந்தபின் கோழியிறகால் புண்ணின்மேல் தடவி வரலாம். அல்லது வெள்ளைத் துணியில் நனைத்து புண்ணின்மேல் போட்டு வரலாம்.
- (3) நன்றாக முத்திய தேங்காயைத் திருகி, அந்தத் தேங்காய்ப் பூவுடன் நாலில் ஒருபங்கு நன்றாகத் தூள்செய்த புளியங்கொட்டையின் மேற் ரோலைபோட்டுப் பிசைய பசைபோல் வரும். அந்தப் பசையை வழித்து புண்ணுகளில் தடவிவரலாம்.

அம்மைப் பூரிகள்:—

அம்மை உள்ளே இறங்காதிருக்கவென்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

அம்மையால் உண்டாகும் கதகதப்பு:—

அம்மையிறங்கித் தலைக்குத் தண்ணீர்விட்டதன்பின், திரோகத்தில் அதிக கதகதப்பு இருந்துகொண்டே யிருக்கலாம். அவ்விதமாகக் கதகதப்பு நீடித்திருக்குமானால் வயிற்றிளைச்சிலை உண்டுபண்ணி உடம்பை மெலியச் செய்தலும். தலைக்குத் தண்ணீர்விட்டபின் திரோகத்திலிருக்கும் கதகதப்பைத் தணிக்க கீழ்க்கண்ட சிகிச்சை செய்யலாம்.

சிகிச்சை

ஆவாரையிலையை மோர்விட்டரைத்து உடம்பெல்லாம் பூசுவைத்திருந்துக் குளிப்பாட்டி வரலாம்.

அம்மையில் அதிகாரம் காண்டல்:—

கரும்பினைச்சை யம்மையில் வயிற்றோட்டமிருப்பது நன்மையானதாகும். மற்றய அம்மைகளில் வயிற்றோட்டமிருந்தால் அதிகப்பலயின மாக்கி வீடுமாதலால், வயிற்றுப்போக்கு அதிகமாயிருப்பதை நீக்கி, மலம் சாதாரணமாகக் கழிபும்படி செய்பவேண்டியது அவசியமானதாகும். சில சமயங்களில் அம்மையிறங்கித் தலைக்குத் தண்ணீர்விட்டபின்பும் வயிற்றோட்டம் காண்பதுண்டு. இவைகளுக்கெல்லாம் கீழ்க்கண்ட சிகிச்சை பயனளிக்கக் கூடியதாகவிரும்பும்.

சிகிச்சை

- (1) சிறு சண்பகம் (பிச்சி) இலை இரண்டுபிடி புது கண்ணீரில் போட்டு, நீராகாரம் (பழஞ்சோற்றுத் தண்ணீர்) 4-அவுன்ஸ் விட்டுக் கொஞ்ச

நேரம் அலசிக்கொண்டிருந்து, பின் வழக்கடிக்க கொடுக்கலாம். இந்த விதமாய் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை கொடுக்கவேண்டும்.

- (2) சுக்கு ரூபாயெடை 1 எலுமிச்சைவேர் ரூபாயெடை 1
பேய்ப்பீர்க்கனவேர் ,, 1 கோரைக்கிழங்கு ,, 1

இவற்றை நசுக்கி 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 3, 4-அவுன்ஸ் வீதம் நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை கொடுத்து வரலாம்.

- (3) ஆலஞ் சருகு ரூபாயெடை 1 சிறு சண்பகச்சருகு (பிச்சி)
அத்திச்சருகு ,, 1 ரூபாயெடை 1
இத்திச்சருகு ,, 1 துத்திச்சருகு 1
மாவிலைச்சருகு ,, 1 நாணற்சருகு ,, 1
ஒதியஞ்சருகு ,, 1 சுக்கு ,, 1

ஒன்று சேர்த்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை 3, 4-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (4) சீந்தில்தண்டு ரூபாயெடை 1 சுக்கு ரூபாயெடை 1
கோரைக்கிழங்கு ,, 1

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை 2, 3-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (5) மான்கொம்பை, கோவையிலைச்சாற்றில் 3-நாள் ஊறவைத்தெடுத்து கோவையிலையை அரைத்து அந்தக் கொம்புக்குக் கவசம்செய்து, 20-வரட்டியில் புடமிட பஸ்பமாகும். அந்த பஸ்பத்தில் ரூபாயெடை, $\frac{1}{4}$ -எடுத்து மான்கொம்பை ஊறவைத்த 5 தண்ணீர் 2-அவுன்ஸில் கலக்கி இந்தவிதமாக நான் 1-க்கு 3-வேளை கொடுத்து வரலாம்

அம்மையில் இரத்தம் கக்குதல்:—

அம்மை யுண்டாயிருப்பதாலான அதிக உஷ்ணத்திலாவது, தொண்டை-ஜீரண உறுப்புகள்; சுவாசாசயம் முதலியவைகளில் அழலைக் கண்டு விடுவதினாலாவது, இருமும்போதாகிலும், அவ்வது எச்சில் பெருக்கைப்போவென்கிலும் இரத்தம் வெளிப்படுவதுண்டு. இரத்தம் கக்கும் குணங்கள் கண்டால் சற்று அஞ்சவேண்டிய சந்தர்ப்பமாகவே யிருக்கும். ஆதலால் முடிந்தவரையில் இரத்தம் கக்குவதைத் தடுக்கவேண்டிய பரிகாரங்களைத் தேடவேண்டுவது அவசியமாகும்.

■ சருகு என்றால் காய்ந்த இலை.

§ 164-ம் பக்கம் பார்க்க.

சிகிச்சை

நன்னூரிவேர் மேல்பட்டை மான்கொம்பு ரூபாயெடை $\frac{3}{4}$
 ரூபாயெடை $\frac{3}{4}$ நாக்ரூப்பூச்சி $\frac{3}{4}$

இதில் நாக்ரூப்பூச்சியை முதலில் பாலில் போட்டு மண்ணைக் கக்கியபின் எடுத்துக்கொண்டு, மற்ற மருந்துகளையும் சேர்த்து மான்கொம்புத் தூள் ரூபாயெடை-6, போட்டு $\frac{3}{4}$ -மணிசேரம் ஊறவைத்த தண்ணீரால் மைபோ லரைத்துக் கலக்கி வடிகட்டி 2, 3-அவுன்ஸ் அளவாக நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை கொடுத்து வரலாம்.

அம்மையில் கண்ணிவந்து புண்பட்டிருந்தல்:—

அதிகமான உஷ்ணத்தினாலும், அம்மையின் பேதத்தினாலும், கண்ணிவந்து பூழைக் கட்டிக்கொண்டு புண்பட்டுவிடும். பூழையை அப்போதைக் கப் போது சுத்தி செய்யாது விடுத்தால், கண்ணை ஒட்டிக் கொள்ளும்படி செய்து விஷத்தன்மையை உண்டாக்கி கண் பார்வையை மங்கச்செய்து விடும். ஆதலால் ஆரம்பத்திலேயே கண்ணிவந்திருந்தால் தக்க சிகிச்சைகள் செய்யவேண்டும்.

சிகிச்சை

(1) சேகத்தை அழுக்கில்லாத ஒரு சுத்தமான வெள்ளைத் துணியில் முடிந்து முலைப்பாலில் ஊறவைத்து கண்ணில் அடிக்கடி ஒற்றிடம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கலாம்.

(2) சுடுசோற்றில் பசு வெண்ணையைப்போட்டுப் பிசைந்து, ஒரு வெள்ளைத் துணியில் முடிந்து நீராக்காரத்தில் (பழஞ்சோற்றுத் தண்ணீரில்) நனைத்து அடிக்கடி கண்ணுக்கு ஒற்றிடம் கொடுத்து வரலாம்.

கண்ணில் அதிகமான பூழைச் சேர்ந்திருந்தால்:—

(3) போரிக் காவியட் (Acid Boric) கிரைன்ஸ் 10
 டிஸ்டில் வாட்டர் (Aqua Distill) அவுன்ஸ் 1

நன்றாகச் சேர்த்துக் கலந்துகொண்டு மிருதுவான சுத்த வெள்ளைத் துணியில் நனைத்து முதலில் கண்களை நன்றாகச் சுத்தம் செய்துவிட்டு, பின்னர் 1, 2-இலக்க சிகிச்சைகளைக் கையாளலாம்.

அம்மையில் காய்ச்சலிருந்தால்:—

அம்மைக்குறிகள் தோன்றும் வரை காய்ச்சல்திகமிருக்கும். அம்மைக்குறிகள் கண்டவுடன் காய்ச்சல் தணிந்துவிடும்; பின்னர் 100-டிகிரிக்கு அதிகப்படாமலே யிருந்துவரும்; சில சமயங்களில் அம்மைக்குறிகள் வெளித்தோன்றின பின்னும், காய்ச்சல் மட்டுப்படாமல் இருந்து கொண்டிருக்கும், ஆகையினால், அம்மைக்குறிகள் தோன்றியபின்னும்

காய்ச்சல் அதிகமாகவிருந்தால் தகுந்த சிகிச்சை செய்யவேண்டும். காய்ச்சலை மட்டுப்படுத்தாம லிருந்துவந்தால், காய்ச்சலதிகரித்து சந்நிதோஷத்தை உண்டுபண்ணி ஆபத்தை விளைவிக்குமாதலால் அம்மைக்குறிகள் கண்டவுடன் காய்ச்சலதிகமிருந்தால் கீழ்கண்ட சிகிச்சைகளினால் காய்ச்சலின் உஷ்ணத்தைத் தணிக்க முயற்சிக்கலாம்.

சிகிச்சை

- (1) எலுமிச்சை வேர்ப்பட்டை விலாமிச்சைவேர் ரூபாயெடை 1
ரூபாயெடை 1 ஏலம் ,, 1
சீந்தில்தண்டு ,, 1 சந்தனம் ,, 1
பற்பாடகம் ,, 1 கோரைக்கிழங்கு ,, 1

ஒன்றுசேர்த்திடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

- (2) வெந்தயம் ரூபாயெடை 2 கோரோசனை ரூபாயெடை 1
முதலில் வெந்தயத்தை 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயம் அவுன்ஸ் ஒன்றில் கோரோசனையைக் கரைத்து, நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை கொடுத்துவரலாம்.

- (3) டிஞ்சர் காம்ப்ர் கோ (Tincture Camphor Co) டிராம் 1
லைக்கர் அமோனியா அவிடேடிஸ் (Liquor Ammonia
Acetatis) ,, 2
பொட்டாஷியம் ஸிட்ரஸ் (Potassium Citras) ,, 1
சிரப் டோலு (Syrup Tolu) ,, 1
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்த்துக் கலக்கி, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 3-மணி நேரத்திற்கொரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

அம்மையில் சந்நி உண்டாகுதல்:—

அம்மைக் குறிகள் தோன்றிய பின்னும் காய்ச்சல் அதிகரித்துவருவதினாலும், திரோகத்தினுள்ளுறுப்புகள் அழிவென்கொண்டு விடுவதினாலும், அம்மையின் கொடூரச் செய்கைகளினால் தாங்கமுடியாத தினாலும், சந்நி கண்டு விடலாம். = சந்நி கண்டவுடன் தொண்டைக்கம்மும்; மேல்மூச்சு அதிகமாய் வாங்கும்; கண்ணைச்சொருகும்; சிலசமயங்களில் கைகால்கள் கோணி வலிப்பெடுக்கும். இவ்வித கோளாறுகள் கண்டுவிட்டால் அஞ்சவேண்டிய சந்தர்ப்பமாகவே கருதவேண்டும். ஆயினும், சிகிச்சை செய்து பார்ப்பதே நல்லது.

சிகிச்சை

நன்னூரிவேர்ப்பட்டை

மாண்கொம்பு

ரூபாயெடை 1

ரூபாயெடை $\frac{3}{4}$ நாக்குப்பூச்சி,, $\frac{3}{4}$

முதலில் நாக்குப்பூச்சியை பாலில்போட்டு வைத்திருந்து மண்ணைக் கக்கியபின் எடுத்து மற்றதைச் சேர்த்து, ■ மாண்கொம்பு ஊறவைத்த தண்ணீரைவிட்டு மைபோலரைத்து * மாண்கொம்பு ஊறவைத்தத் தண்ணீர் அவுன்ஸ் 4-ல் கரைத்து வடிகட்டி இந்தவிதமாக நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை கொடுத்துவரலாம்.

அம்மையில் சீதபேதிக்குக் காணுதல்:—

அம்மையின் கொடுரத்தினாலும், அது உஷ்ணத்தினால் சிறுகுடல் புண்பட்டு விடுவதினாலும் சிலசமயம் அம்மைபுண்டா யிருக்கும்போது சீதபேதியும் காண்பதண்டு. சிலசமயம் மலத்துடன் இரத்தமும் சீதமும் கலந்துக் கழியும். வயிற்றுவலியும், வயிறு ஆசனவாய் முதலியவைகளில் கடுப்பும் ஏற்படும். அம்மையில் சீதபேதிகண்டால் திரேகத்தை மிகவும் மெலியச்செய்து பலயீனப்படுத்திவிடும்

சிகிச்சை

(1) முற்றின நாவலப்பட்டையைப் பசும்பால்விட்டு இடித்துப் பிழிந்த சாறு அவுன்ஸ் 1-ம், பசும்பால் அவுன்ஸ் 2-ம், ஒன்றுசேர்த்து நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை கொடுத்துவரலாம்.

(2) கல்வத்திவேர்ப்பட்டை வெங்காயம் ரூபாயெடை $1\frac{1}{2}$
ரூபாயெடை $1\frac{1}{2}$ சேகம் ,, $1\frac{1}{2}$

இவற்றை வெள்ளாட்டுப் பால்விட்டு இடித்துப் பிழிந்து வடிகட்டி 2, 3-அவுன்ஸ் அளவாக நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை கொடுத்துவரலாம்.

(3) பழைய மாங்கொட்டைப் பருப்பு எருமைத்தயிர் அவுன்ஸ் 3
ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$

மாம்பருப்பை எருமைத்தயிரில் அரைத்துக் கலக்கி நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை கொடுத்துவரலாம்.

(4) வெங்காயத்தைக் குறுவ அரிந்து பசுநெய்விட்டு வதக்கி வேண்டியமட்டும் கொடுத்துவரலாம்.

(5) வெங்காயச்சாறு அவுன்ஸ் 1 பசுநெய் , அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$
ஒன்றாக மத்தித்து காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

* மாண்கொம்பை தண்ணீரில் ஊறவைத்து, மூன் அரத்தால் ராவியெடுத்து ஊன ரூபாயெடை-6, இதை 24-அவுன்ஸ் கடுஞ்சூடான தண்ணீரில்போட்டு $\frac{1}{2}$ -மணிநேரம் சென்றபின் எடுத்து வடிகட்டி உபயோகிக்கவும்.

- (6) வில்வப்பழ ஓட்டுக் கஷாயம் அதிவிடயம் ரூபாயெடை ½
அவுன்ஸ் 1½ கிராம்பு ,, ½

கஷாயத்தில் பொடித்துப்போட்டு வடிகட்டி நான் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை கொடுத்துவரலாம்.

அம்மையில் சுரமதிகயிருத்தல்:—

அம்மையில் காச்சலிருந்தால் என்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

அம்மையில் தாகம் காணுதல்:—

அம்மை வார்த்திருக்கும்போது, நாவாட்சி யதிகயிருக்கலாம். தண்ணீரைக் கொடுப்பதினால் தாகம் தணியாமல் மேலுமேலும் தாகமெடுத்துக் கொண்டேயிருக்கும். ஆதலால், தாகமடங்கும்படியான சிகிச்சைசெய்ய வேண்டியது அவசியமாகும்.

சிகிச்சை

ஊரவைத்த மான்கொம்பை, முள்ளரத்தால் ராவியெடுத்ததன் ரூபாயெடை 6-ஐ 24-அவுன்ஸ் கடுஞ்சூடாயுள்ள தண்ணீரில்போட்டு ½-மணி நேரம் வைத்திருந்து, வடிகட்டி வேண்டியமட்டும் கொடுத்துவரலாம்.

அம்மையில் தொண்டைக் கம்முதல்:—

அம்மை ரோகத்தினால் திரோகம் மிகவும் உஷ்ணமடைந்து, தொண்டைக் கம்மலேற்பட்டால் அல்லது அம்மைக் கொப்புளங்கள் தொண்டை நாளங்களில் தாக்கி, வீக்கத்தைபுண்டாக்கி தொண்டைக்கம்மலை உண்டு பண்ணலாம். அம்மை ரோகத்தில் தொண்டைக் கம்மலேற்பட்டால், அம்மை குணமானபின்பும் அந்தத் தொண்டைக் கம்மலிருந்துகொண்டேயிருக்கும்; ஆதலால், அம்மையில் தொண்டைக் கம்மலேற்பட்டால் உடனே தக்க பரிகாரம் செய்யவேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) கர்ப்பூரவல்லிச்சாறு அவுன்ஸ் 1 கோரோசனை குன்றிமணியெடை 2 ஒன்றுசேர்த்துக் கரைத்து காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.
- (2) மாதாளம்பூக்கஷாயம் அவுன்ஸ் 4 தேன் அவுன்ஸ் 1 எலுமிச்சம்பழச்சாறு ,, 1 ஒன்றுசேர்த்து, நான் ஒன்றுக்கு 3, 4-தடவை வாய் கொப்புளிக்கலாம். குறிப்பு:—இதை உன்னுக்குக் கொடுக்கக்கூடாது.

அம்மையில் நீர்த்தாரையில் இரத்தம் கசிந்தால்:—

அம்மை ரோகத்தில் அதிக உஷ்ணம் ஏற்பட்டாலும், மூத்திரத்தாரை, குண்டிக்காய் முதலியவைகளில் அழற்சிக்கொண்டாலும், அம்மை

வார்த்திருக்கும் காலங்களிலாகிலும், அம்மையிறங்கித் தலைக்குத் தண்ணீர்விட்ட பின்பாகிலும், மூத்திரம் பெய்யும்போதாவது அல்லது சாதாரண நேரங்களிலாவது நீர்த்தாரையில் இரத்தம் கசிவதுண்டு.

சிகிச்சை

மாண்கொம்பு ரூபாயெடை $\frac{3}{4}$ நாக்குப்பூச்சு ரூபாயெடை $\frac{3}{4}$
நன்னூரிவேர்ப்பட்டை ,, $\frac{3}{4}$

முதலில் நாக்குப்பூச்சியை பாலில்போட்டு வைத்திருந்து, மண்ணைக் கக் கியபின் எடுத்து, எல்லாம் ஒன்றுசேர்த்து ஊறவைத்து ராவிய மாண்கொம்பு புத்தூள் ரூபாயெடை 6-ஐ, 24-அவுன்ஸ் அதிசூடான தண்ணீரில் போட்டு 2-மணினேரம் ஊறவைத்த தண்ணீர் விட்டு அரைத்து 2-அவுன்ஸ்ளவாகக் கரைத்து வடிகட்டி, 4-மணி நேரத்திற்கொருதடவை கொடுத்துவரலாம்.

அம்மையில் மலசலம் கட்டி வயிறு பொருமுதல்:—

அம்மை வார்த்திருக்கும்போதும், அம்மையிறங்கித் தலைக்குத் தண்ணீர் விட்டபின்பும், மலசலம் கட்டுவதுண்டு. அவ்விதம் மலசலம் கட்டினால் பின்னர் கெடுதலேற்படலாமாதலால், சரியான விதமாய் மலசலம் கழியும்படி பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

சிகிச்சை

சீனுகற்கண்டு ரூபாயெடை $1\frac{1}{2}$ கிற்றாமணக்கெண்ணெய் அவுன்ஸ் 6
வெங்காயம் ,, $1\frac{1}{2}$

வெங்காயத்தையும், கற்கண்டையும் நன்றாகப் பொடித்து எண்ணெயில் போட்டு வெயிலில் வைத்திருந்து, ஆறினபிறகு $\frac{3}{4}$ 1-அவுன்ஸ் வீதம் அதி சூலையில் கொடுத்துவரலாம். அல்லது இரவு படுக்கைக்குப் போருமுன், 1, $1\frac{1}{2}$ -தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

அம்மையில் மூட்டுப்பிடிப் பேற்படுதல்:—

அம்மை வார்த்திருக்கும்போது, ஒரேபக்கமாகப் படுத்திருப்பதினாலாவது, மூட்டு எலும்புகளிலும், மூட்டை ஒன்றிக்கும் நரம்பு நாரங்களிலும் அம்மையின் கொப்புளங்களுண்டா யிருப்பதினாலும், மூட்டுகள் நீடித்த அசைவின்றி இருந்துவிடுவதினாலும் மூட்டுப்பிடிப் பேற்பட்டு, தலைக்குத் தண்ணீர் விட்டபின்பும் அவைகள் அசைவற்றிருக்கலாம்; தலைக்குத் தண்ணீர் விட்டவுடன், மூட்டுப் பிடித்திருப்பதாகத் தெரிந்தால் தாமதமின்றிப் பரிசாரகர்கள் செய்யப்படாவிட்டால், ஸ்திரமான மூட்டு பிடிப்பேற்பட்டு விடலாம்.

செய்து

- (1) பழைய வைக்கோலையும், வேப்பிலையையும் போட்டு அவித்து, அந்த ஆவியை மூட்டுப் பிடிப்புள்ள விடங்களில் பிடிக்கலாம். அதோடு அவற்றை அரித்து துணியில் முடிந்து சுடச்சுட பிடிப்புள்ள விடங்களில் ஒற்றிடம் கொடுத்து சிற்றாமணக்கெண்ணையைத் தாராளமாகத் தேய்த்து வைக்கலாம். இந்தவிதமாக காலையிலும், இரவில் படுக்கைக்குப் போகுமுன்னும் 10, 15-நாள்க்குச் செய்யவேண்டும்.
- (2) வட்டத் துத்திச்செடியை அப்படியே தண்ணீரில் போட்டு அவித்து, அந்த ஆவியை மூட்டுப்பிடிப்புள்ள விடங்களில் பிடித்தும், அவற்றை ஒரு துணியில் முடிந்து, சுடச்சுட பிடிப்புள்ள விடங்களில் ஒற்றிடம் கொடுத்து பின் சிற்றாமணக்கெண்ணையைத் தடவி வரலாம். இப்படியே காலையிலும், இரவு படுக்கைக்குப் போகுமுன்னும் 10-15-நாள்க்குச் செய்துவரலாம்.

அம்மையில் வயிறு பொறுமி மலசல்ம் கட்டுதல்:—

அம்மையில் மலசலம் கட்டி வயிறு பொருமுதல் என்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

அம்மை ரோகத்தால் கண்ணில் பூ விழுதல்:—

அம்மையின் கொடூர உஷ்ணத்தினால் கண்ணில் பூழை சார்த்து புண்பட்டுப் போவதினாலாகிலும், அம்மைக் கொப்புளங்கள் கண்ணிலுண்டாகும்தினாலாகிலும், கண்ணின் கருமணிகளில் பூவும், -பூப்போன்ற மாசும் விழுவதுண்டு. கருமணியில் அம்மைக்கொப்புளங்களுண்டாகியு விருந்து விட்டால், ஒருவித சிகிச்சைக்கும் வசப்படாது; என்றாலும், முடிந்த வரையில் பரிசுத்தமான செய்வதே உத்தமமாகும். கண்ணில் பூழைச் சார்த்து கருமணியில் பூ மாசு பிடித்திருந்தால் சிகிச்சையினால் குணமுண்டாகும்.

சிறீ கங்கை

- (1) பனங்குருத்தைத்தட்டி சாற்றைக் கால மூலை கண்ணில் பிழிந்து வரலாம்.
- (2) முருங்கைப்பு, ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$ நந்தியாவட்டைப்பு ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$
 நெருஞ்சிப்பு, ,, $\frac{1}{2}$ சேரகம் ,, $\frac{1}{2}$

இவற்றை யொரு துய்ய வெள்ளைத் துணியில் முடிந்து தட்டி சூற்
றைக் கால மாலை கண்ணில் பிழியலாம்.

அம்மை வராதிருக்க—Prevention of Variola

அம்மைரோகம் தொத்தும் தன்மைபுள்ள விஷக்கிருமிகளால் வருவதென்பதை முன்னமே எழுதியிருக்கிறோம். அவ்விதமான தொத்துவியாதியி

விருந்து தப்பித்துக்கொள்ள ஒவ்வொருவரும் அம்மைக்குத்திக் (Vaccination) கொள்ளவேண்டும். அம்மைக்குத்தும் முறையை டாக்டர் ஜென்னர் (Dr. Jenner) என்பவர் முதல் முதல் கண்டுபிடித்து உலகிற்குத் தந்தார். அம்மைக் குத்திக்கொள்ளுவதினால் அம்மை வியாதியை வராதென்பதல்ல, ஒருமுறை அம்மைரோகம் உண்டானால் பின்னர் அந்நோய் வருவதேயில்லை. அதேமுறையில் அம்மைக்குத்தி அம்மைரோகத்தின் கொடுமையைக் குறைந்த அளவில் திரோகத்தில் வியாபிக்கச் செய்வதினால் அம்மை ஏற்படாதென்ற சித்தாந்தத்தின்மேல் அம்மைக்குத்தும் முறை கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகும். இயற்கை அம்மைக்கும் அம்மைபின் தன்மையைச் செயற்கையினால் உட்புகுத்துவதற்கும் பெருத்த வித்தியாசங்கள் இருப்பதினாலேயே அம்மைக் குத்திக்கொண்டவர்களுக்கும், அம்மைநோய் உண்டாகிறது; ஆனாலும், அம்மையின் கொடுமை அடங்கிவிடுவதே தானிருக்கும்.

குழந்தைகள் பிறந்த ஆறுமாதத்திலேயே அம்மைக் குத்தவேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும். அவ்விதம் செய்வதினால் அநோக சில மாணவர்களைத் தப்பிவிடும்.

சிகிச்சை

ஒரு மங்கு (porcelain) ஜாடியில் 24-அவுன்ஸ் சுத்தமான எள்ளெண்ணெய் வீட்டு, அதில் 4-செந்தாமற்பூவை குறுக நறுக்கிப்போட்டு வாயை மூடி சீலைமண்ணெய்த் ஈரமில்லாத தலையில் 1-கஜ ஆழத்தில் புதைத்து வைத்து மூன்றுமாதத்திற்குப்பின் அதை வெளியிலெடுத்து தேய்த்து ஸ்நானம் செய்து கொண்டும் தலையில் தடவிக்கொண்டுவந்தால் அம்மைரோகம் உண்டாகாது.

ஆராத அம்மைப்புண்:—

அம்மைப் புண்ணுகளென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

கண்ணில் அம்மை வராதிருக்க:—

அம்மையானது உடலின் சகல அவயவங்களிலும், தன் கொடுமை செய்கைகளைக்காட்டும் குணமுள்ளது. கண், சூது, தொண்டை, நாக்கு முதலிய பாகங்களிலும் அம்மைதாக்கி தீங்குசெய்வதுண்டு மற்றெல்லா பாகங்களையும் விட கண் பிரதானமாக இருப்பதினால் அதில் அம்மைக் கொப்பளம் கண்டால் பூ விழுந்துவிடும். அதற்காக கண்ணில் அம்மை வரக்கூதிருக்கும்படியான முன் எச்சரிக்கையுடனிருக்கவேண்டும்.

சிகிச்சை

அம்மைக் காய்ச்சல்தானென்று தெரிந்தவுடனே ஒருவர் வாயில் வெங்காயத்தைப் போட்டு மென்று, அம்மைக் காய்ச்சலுட்ப்பவர்களின் கண்களில் கால மரலை ஊதுவதினால் அம்மைக் கொப்புளங்கள் கண்ணிலுண்டாகாது.

மறுமுன்:—

அம்மை சரிவர இறங்குமுன் தலைக்குத் தண்ணீர் விட்டதினாலும், கிராமாகத் தண்ணீர் விட்டபின், வெயிலிலேந்து திரிந்ததினாலென்கிலும், திரேகாரோகியத்திற்கு தீங்கை விளைவிக்கும். அருசியான விடங்களுக்கு அம்மைவார்த்தவர்கள் சென்றதினாலென்கிலும், அம்மைவார்த்தவர்கள் சுகாதாரக்குறைவான விடங்களி லிருந்ததினாலென்கிலும், அதிக காரம், அதிக உஷ்ண முதலிய ஆகாரங்களையும், ஜீரணிக்கத் தகுதியற்ற பதார்த்தங்களையும் புசித்ததினாலென்கிலும், மறுபடியும் சுரம் கண்டு வாடியுள்ள அம்மைப் புண்ணுகள் சீழ்க்கொண்டு தடித்து ரணமாகி தீங்கை விளைவிப்பதற்கே மறுமுன்னென்று சொல்லப்படும்.

சிகிச்சை

- (1) சாதிக்காய் ரூபாயெடை 1½ கிராம்பு ரூபாயெடை 1½
நறுக்குமூலம் ,, 1½ சீரகம் ,, 1½

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து, 8-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு ஒரு அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய:—

கஷாயம் அவுன்ஸ் 1 வேப்பிலைச்சாறு அவுன்ஸ் 1
வெங்காயச்சாறு ,, 1 தேன் ,, 1

ஒன்றுசேர்த்து, நான் ஒன்றுக்கு 8-வேளை இந்த அளவாகக் கொடுத்து:—
வட்டத் துத்தியிலை ஒருபிடி சிற்றாமணக்கெண்ணெய் அவுன்ஸ் 1
கற்பூரம் ரூபாயெடை ½

முதலில் இலையையும், கற்பூரத்தையும் மைபோலரைத்து, பின் எண்ணெய் சேர்த்துக் குழப்பி வெளிப்பிரயோகமாகப் புண்களின்மேல் தடவி வரலாம்.

கணை—கணம்

CROUP

கணை ரோகத்திற்கும், மாந்த ரோகத்திற்கும் வித்தியாசம் சூடுதியில் கண்டுபிடிப்பது முடியாததாகவிருக்கிறது. மாந்தம் முற்றியே கணை பிறப்பதாக தமிழ் வைத்தியம் கூறுகிறது.

குழந்தைகள் புறங்கையை முகத்தில் தேய்த்துக்கொண்டு அழ ஆரம்பிக்கும்; காய்ச்சல், தொண்டைக்கம்மல், தொண்டைப் புகச்சல், ஏற்பட்டு, வரட்டி இருமலாகவிருக்கும்; இந்த ரோகத்தில் சுரம் கொஞ்சம் கடுமையாய் அதாவது 101, 105-டிகிரி இருக்கும்; மூகம் கண்கணப்பாகவும், சுவாசக்ஷடமும் ஏற்பட்டு, மூச்சு வீடும்போது கரபுவெண்ச் சப்தம் உண்டாகும். அதிகமான கஷ்டத்தின்பின் இருபி, கொஞ்சம் சளி கக்கும்; பகலி விருப்

பதை காட்டிலும் இரவிலேயே அஞ்சத்தக்கவிதமாக மாறிவிடும். குழந்தை கழுத்தின் பின்புறமாய் தலையை தொங்கவைத்துக்கொள்ளும்; நெஞ்சானது சுவாசிக்கும்போது உயர்ந்து சர்மமும் வியர்வையால் நனைந்திருக்குமானால் ஆபத்தையே விளைவிக்குமென்று அஞ்சவேண்டியதாகும். தண்ணீர் குடிப் பதுகூட கஷ்டத்திடமிருக்கும்; சிலசமயம் இருமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேணும், அல்லது இல்லாமலேனும் மறைந்துவிடும்; மிகவும் ஆபத்தான சமயத்தில் தொண்டைக்கம்மல் அதிகரித்து, சுவாசம் சீக்கிரமாக விடப்பட்டு, நாடிநடை மெலிந்து, முகம் வெளுத்து, உதடுகள் நீலமாக மாறிவிடும். இழுப்பு காண்பதினாலேயே சில மாணமும் சம்பவிற்கும்.

குழந்தைகளின் நாக்கு தண்டுகளிலும், தொண்டை உட்புற சிறு நாளங் களிலுமுள்ள இளஞ் சவ்வுகளின் வீக்கத்தினாலும், அவைகளில் இயற்கை யாக உண்டாகும் நீர் பெருக்கத்தினாலும் குழந்தைகளுக்கு இது சம்பவிக் கிறது. பனிரெண்டு ஆண்டுவரையில் குழந்தைகளுக்கு கணைகோய் வருவ துண்டு. தொண்டை உட்புற எச்சிலூறும் நாளங்களில் கோழை மிகுதிபடு வதே காரணமாகும். அவைகளில் பொய்தசைகள் வளர்வது நின்றதானால் தான் மாந்தம் என்ற ரோகம் வருமென்று கூறுவர்.

சிசுவின் நாவின் தண்டும், தொண்டை உட்புற நாளங்களும் மிகவும் சிறுத்திருந்து, மூன்றாண்டுகளுக்குப் பின்னரே அவை பெரிதாகின்றன. அப் போது கணைக்கு ஆஸ்பதமான குணங்கள் மாறிவிடும் இதைத் தவிர்த்து கணைரோகத்திற்கு மற்றும் சில காரணங்களும் கூறுகின்றனர். தொண்டை வீங்கியதினாலும், மூக்கில் சதை வளர்ந்திருத்தலினாலும், சம சீதோஷ்ணத்தி லிருந்து குளிர்ச்சியாக மாறுவதினாலும், குழந்தைகள் ஈர்க்காலுடன் திரி வதினாலும், பால் மறக்கச் செய்யும்போது, சுத்தமான ஆகாரம் கொடுக்கப் படாததினாலும், கிரம வேளைகளில் ஆகாரம் கொடுக்காததினாலும், ஈரத் தரைகளில் குழந்தைகளைச் சயனிக்க விடுவதினாலும், கணைரோகம் தாக்கலாமென சொல்லப்படுகிறது. முக்கியமாக குளிர் காலத்திலும் மாரிகாலத் திலும்தான் இவ்வியாதி அடிக்கடி வருகிறதென்று டாக்டர் ரூடாக்ஸ் (Dr. Ruddocks) கூறுகிறார்.

தமிழ் வைத்தியப்படி கணைரோகம் எட்டு என்று சிலரும், பதினெட் டென்று சிலரும், இருபத்தைந்தென்று சிலரும் கூறுகிறார்கள். என்றாலும், நமக்குத் தெரிந்தமட்டுள்ள பெயர்களையும் சிகிச்சைகளையும் கூறுகிறோம்.

அந்தக்கணை	கொதிப்புக்கணை	தெற்கத்திக்கணை
ஆமக்கணை	சிக்கிமாந்தக்கணை	நீராமக்கணை
இரத்தக்கணை	சிலேதப்பனக்கணை	நீர்க்கணை
ஊது மாந்தக்கணை	சேதக்கணை	நீர்மாந்தக்கணை
எச்சிக்கணை	சுழிக்கணை	பித்தக்கணை
எரிக்கணை	சூலைக்கணை	பிராஸிக்கணை

பிறக்கணை	மந்தாரக்கணை	வரட்கணை
பேராமக்கணை	மூக்குக்கணை	வாதக்கணை
மகாக்கணை	மூலக்கணை	விஷமாந்தக்கணை

அந்தகக் கணை: —

காய்ச்சலும் கணைக்குரிய குறிகளோடும், நாவு உலர்தல்; விழிவெளுருதல்; மூகம் மஞ்சளாகவும் மினுமினுப்பாகவும், மாறுதல் முதலிய குறிகளும் ஏற்படும்.

சிகிச்சை

சிறுகீரைவேர்	ரூபாயெடை 3	தேற்றுவிரை	ரூபாயெடை 3
பொன்னாங்காணியேர்	„ 3	கடுக்காய்	„ 3
வரப்பூலாவேர்	„ 3	அவுரிகேர்	„ 11
பசுவெண்ணெய்	„ 10		

வெண்ணெய் நீக்கி மற்றவைகளை ஒன்றாக மைபோலரைத்து வெண்ணெயுடன் சேர்த்துக் கலந்து காய்ச்சி வடிக்கட்டி எடுத்து, காலை மாலை 2-தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்து; நெய்யில் வெந்த மருந்தை தலையிலும் தடவி வரலாம்.

கணைப் பொதுமருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

ஆயுக் கணை:—

கணைரோகக் குறிகளுங்களுடன் இரவில் சுரமதிகமாயிருக்கும்; திரேகம் மெலிந்துவரும்; நாவாட்சியதிகமுண்டாகும்; ஆகாரவெறுப்பேற்படும்; வயிறுபொருமி இரைச்சலுடன் வயிற்றோட்டமுண்டாகும்; குறும் சுவாசம் காணும்; கால்கள்மட்டும் குளிர்த்திருக்கும்; கண்ணைத்திறவாமலே குழந்தை பயந்து அலறி அழும்; மூக்கு உயர்ந்தும் புருவம் வளைந்தும் தெரியும்.

சிகிச்சை

(1) இண்டுவேர்ச்சாறு	அவுன்ஸ் 12	மாசிப்பத்திரி	ரூபாயெடை 3
மூங்கிலிலேச்சாறு	„ 12	சாதிக்காய்	„ 3
நிலக்குமிழஞ்சாறு	„ 12	எலம்	„ 3
புங்கனிலேச்சாறு	„ 12	கிராம்பு	„ 11
நிலதுளசிச்சாறு	„ 12	கடுகுரோகிணி	„ 11
வெங்காயச்சாறு	„ 12	கடுக்காய்	„ 11
முடக்கோத்தான்சாறு	„ 12	வால்மிளகு	„ 3
துதுவேளையிலேச்சாறு	„ 12	ஓமம்	„ 11
நுணுயிலேச்சாறு	„ 12	வசம்பு	„ 3
வலலாரைச்சாறு	„ 12	சுக்கு	„ 11
கஞ்சாங்கோரைச்சாறு	„ 12	சிற்றமணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 24

சாற்றையும் எண்ணெயையும் ஒன்றுசேர்த்து, அதில் இதர சரக்குகளை இளவறுப்பாய் வறுத்துப் பொடித்துப்போட்டுக் காய்ச்சி வடித்த எண்ணெயில் காலை மாலை 2-தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

(2) வேலிப்பருத்திவேர்	வசம்பு	ரூபாயெடை	1
ரூபாயெடை	1	வெந்தாயம்	1
கோழியவரைவேர்	1	கடுகுரோகிணி	1
கிளுவைவேர்	1	சேகம்	1
பொடுதலைவேர்	1	கருஞ்சேகம்	1
கொடிக்கள்ளிவேர்	1	சிற்றமணக்கெண்ணெய் அவுன்ஸ்	12
சிவதைவேர்	1	வெள்ளாட்டுப்பால்	12
வெளுச்சிப்பிசின்	1		

எண்ணெயுடன் பாலைச் சேர்த்துக்கொண்டு, மற்றய சரக்குகளையும் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடிகட்டி, காலை மாலை $\frac{1}{2}$, 1-தேக்கரண்டி வீதம் ஒரு அவுன்ஸ் முலைப்பாலில் கலக்கிக் கொடுத்துவரலாம். அல்லது பால் கொடுக்கும்போதெல்லாம் முலைக்காம்பில் தாராளமாகத் தடவிக் கொண்டு பால் கொடுக்கும்படி செய்யலாம். (பத்தியம்.)

கணைப் பொது மருத்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

இரத்தக் கிணை:—

கணைரோகக் குறிதளுடன், இருமலதிகமாயிருக்கும்; வயிற்றோட்டமேற்படும்; சில சமயங்களில் ஆசனம் கடுத்த இரத்தம் கழியும்; இறப்பும் தொடையும் குடைச்சலுடன் வலியாயுமிருக்கும்; நாவாட்சியதிகப்படும்; நாடிநடை ஸ்தீணித்து மெதுவாய் நடக்கும்; ஆகாரம் ஜெல்லாது.

சிகிச்சை

(1) வில்வவேர்	ரூபாயெடை	$\frac{1}{8}$	ஆவாரம்பூ	ரூபாயெடை	$\frac{1}{8}$
கருவேலங்கொழுந்து	1	$\frac{1}{8}$	ஏலம்	1	$\frac{1}{8}$
கிராம்பு	1	$\frac{1}{8}$	சாதிக்காய்	1	$\frac{1}{8}$
வேப்பம்பருப்பு	1	$\frac{1}{8}$	சாதிப்பத்திரி	1	$\frac{1}{8}$
சேகம்	1	$\frac{1}{8}$			

இவற்றை முலைப்பால்விட்டு மைபோலரைத்து, ஒரு அவுன்ஸ் முலைப்பாலில் கலக்கி வடிகட்டி நான் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

(2) நன்னூரிவேர்	ரூபாயெடை	$\frac{1}{8}$	ஏலம்	ரூபாயெடை	$\frac{1}{8}$
சூதுவேளைவேர்	1	$\frac{1}{8}$	கோஷ்டம்	1	$\frac{1}{8}$
செக்கமுநீர்க்கிழங்கு	1	$\frac{1}{8}$	செண்பகப்பு	1	$\frac{1}{8}$
அதிமதுரம்	1	$\frac{1}{8}$	சேகம்	1	$\frac{1}{8}$

ஒன்றுசேர்த்து, முலைப்பால் விட்டு மைபோலரைத்து, நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை கழற்சிக்காயனவு, சமன் பசு நெய்யுடன் சேர்த்துக் குழப்பிக் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

(3) முருங்கையிலேச்சாறு அவுன்ஸ் 12	கோரோசனை	ரூபாயெடை 1
நல்லெண்ணெய் ,,	கோஷ்டம்	1
சிற்றாமணக்கெண்ணெய் ,, 12	அதிமதுரம்	1
பசுவெண்ணெய் ரூபாயெடை 10	கொத்தமல்லி	1
கார்போகரிசி ,, 1	ஏலம்	1
சாதிக்காய் ,, 1	சேகம்	1
சாதிபத்திரி ,, 1	லவங்கப்பத்திரி	1
கிராம்பு ,, 1	செங்கழுநீர்க்கிழங்கு	1
இலவங்கப்பட்டை ,, 1	செண்பசப்பு	1

முதலில் சாற்றையும் எண்ணெய்யையும் ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு, பின்னர் சரக்குளைப் பொடித்துப்போட்டு காய்ச்சிவடிசுட்டி, காலை மாலை 2, 3-தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்)

கணைப் பொதுமருந்துகளி லொன்றையும் கொடுத்துவரலாம்.

இளநீர்க் சுட்டுக்கிணை:—

எச்சில் கிணை என்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

ஊதுமாந்தக் கிணை:—

கிணைரோகத்திற்குண்டான இதர குறிகளுடனும் கால், கை, கண்ணிமைகள் வீங்கியிருக்கும்; நாக்கு புண்பட்டிருக்கும்; ஆகாரம் செல்லாது; குறுமூச்சுகிரித்து வயிறுதித் தெரியும்; மூச்சானது துருத்தியின் சப்தம் போல் கேழ்க்கும்.

சிகிச்சை

(1) நீர்முள்ளிச்சாறு அவுன்ஸ் 6	தேங்காய்ப்பால்	அவுன்ஸ் 6
வாமுள்ளிச்சாறு ,, 6	சிற்றாமணக்கெண்ணெய் ,, 24	
கருசலாங்காணிச்சாறு ,, 6	இண்டுவேர் ரூபாயெடை 1	
கொட்டைக்கரந்தைச்சாறு 6	வாள்யிளகு ,, 1	
மாதுளம்பழச்சாறு ,, 6	அதிவிடயம் ,, 1	
பற்பாடகச்சாறு ,, 6	வசம்பு ,, 1	
வல்லாரைச்சாறு ,, 6	வெட்பாலையரிசி ,, 1	
வட்டத்திருப்பிச்சாறு ,, 6	பெருங்காயம் ,, 1	
செங்கழுநீர்க்கிழங்குச்சாறு 6	கோரைக்கிழங்கு ,, 1	
செந்தாமரைக்கிழங்குச்சாறு 6	இலவம்பிசின் ,, 1	

ஒரிலைத்தாமரைச்சாறு அவுன்ஸ் 6	விளாம்பிசின்	ரூபாயெடை 1
சூரத்தாவரைச்சாறு ,, 8	மதுக்காரைப்பிசின்	,, 1
கண்டங்கத்திரிச்சாறு ,, 6	மாசிக்காய்	,, 1
கலியாணமுருங்கை	சாதிபத்திரி	,, 1
யிலைச்சாறு ,, 6	செங்கத்தாரிப்பட்டை	,, 1

சாற்றையும், எண்ணெய் பால் முதலியவற்றை ஒன்று சேர்த்துக் கொண்டு அதில் மற்ற சரக்குகளைப் பொடித்துப்போட்டு காய்ச்சி வடித்து, காலே மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம். (உப்பு, புளி நீக்கிக் கடும் பத்தியம்.)

(2) கரிசலாங்காணிச்சாறு அவுன்ஸ் ½ காய்வேளைவேர் ரூபாயெடை ½ முலைப்பால் ,, ½

முதலில், வேரை சாற்றாலரைத்துக்கொண்டு பின், பாலைச் சேர்த்து வடிக்கடி, காலே மாலை கொடுத்து:—

நீர் முள்ளிச் சமுலத்தைச் சுட்டுச் சீரம்பலாக்கி, அதைக் கரிசலாங்காணிச் சாறுவிட்டுக் கரைத்து, காலையில் உடம்பெல்லாம் தடவிவைத்து, சாயந்திரம் சுடுதண்ணீரால் குளிப்பாட்டி வரலாம். (பத்தியம்.)

எச்சிக் கீணை:—

இதை, இளநீர் கட்டுக்கீணை என்றும் சொல்லப்படும். இது அமாவாசை பெளர்ணமி தினங்களில்தான் குணத்தை அதிகமாகக் காண்பிக்கும். மற்றைய நாட்களில் இதன் குணம் ஒன்றும் தோன்றாது. இது மிகவும் கொடுமையான வியாதி. நினைவாத நேரத்தில் மரணத்தை யுண்டு பண்ணும்.

கீணை ரோகத்தின் மற்றைய குறிகளோடும், குழந்தைகளின் மேல் வாயிலும், தாடையின் இருபக்கங்களிலும் உருண்டையான நீர்க்கொப்புளங்கள் உண்டாகும்; ஓயாமல் வாயில் எச்சில் தடித்து வடிந்துகொண்டே யிருக்கும்; மலச்சிக்கலேற்படும்; வாயில் அதிக வலி வேதனையிருப்பதால், ஆகாரம் உட்கொள்ள முடியாது; குழந்தை எப்போதும் குப்பறப்படுத்துக்கொண்டிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) சந்தனம் ரூபாயெடை 1 வெட்டிவேர் ரூபாயெடை 5
அறுகம்புல் தண்டு ,, 1 விலாமிச்சம்வேர் ,, 5

ஒன்றுசேர்த்து தடித்து, 15-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சியு:—

கஷாயம்	அவுன்ஸ்	பசுநெய்	அவுன்ஸ்
வெங்காயச்சாறு	24	கொம்புத்தேன்	12
எலுமிச்சம்பழச்சாறு	24	தேங்காய்ப்பால்	32
கோவையிலைச்சாறு	24	சாதிக்காய்	5
வல்லாரைச்சாறு	24	சாதிப்பத்திரி	5
வில்வயிலைச்சாறு	24	மாசிக்காய்	5
குட்டிவிளாயிலைச்சாறு	24	கடுக்காய்	5
அத்திப்பால்	12	கெல்லிக்காய்	5
ஆலம்பால்	12	தான்றிக்காய்	5
முலைப்பால்	6	சடாமாஞ்சில்	5
பசும்பால்	24	அதிவிடயம்	5
வெள்ளாட்டுப்பால்	24		

முதலில், சாறு, பால், தேன், நெய் இவற்றை ஒன்று சேர்த்துக் கொண்டு, பின்னர் இதர சரக்குகளைப் பொடித்துப் போட்டுக் கலக்கிக் காய்ச்சி வடிக்கட்டி, காலை மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம். (உப்பு, புளி தன்னி கடும் பத்தியம்.)

(2) வில்வயிலைச்சாறு	அவுன்ஸ் 6	தேன்	அவுன்ஸ் 2
மாசிபத்திரிச்சாறு	6	சிறுமணக்கெண்ணெய்	12
நிலத்துளசிச்சாறு	6	சுக்கு	1
துளசியிலைச்சாறு	6	மிளகு	1
கஞ்சாங்கோரைச்சாறு	6	திப்பிலி	1
வெங்காயச்சாறு	6		

சாறு, எண்ணெய், இவைகளை ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு இதர சரக்கு களை இளவறுப்பாய் வறுத்துப் பொடிசெய்துப் போட்டுக் கலந்து காய்ச்சி வடித்து, காலை மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(3) தென்னங்குரும்பைச்சாறு	சேற்றுக்கற்றாழைச்சாறு	அவுன்ஸ் 24
அவுன்ஸ் 12	அதிமதுரம்	ருபாயெடை 1
தகரையிலைச்சாறு	கோஷ்டம்	1
துண்டு (மஞ்சநெத்தி)	எலம்	1
யிலைச்சாறு	சேரகம்	1
வெங்காயச்சாறு	சந்தனம்	1
பழம்பாசிச்சாறு	இலவங்கப்பட்டை	1
சிறுமணக்கெண்ணை	24	

சாற்றையும் எண்ணெயையும் ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு அதில் இதர சரக்குகளைப் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடிக்கட்டி, காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்)

கணைப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

எரிக் கணை :—

கணைரோகக் குறிகளோடும், திறைமெல்லாம் எரிச்சலாக விருக்கும் ; வாய்கீர் சதா வடிந்துகொண்டே யிருக்கும் ; வாயினால் சுவாசம் வாய்கும் ; இரவு பகல் நித்திரையின்றி, குழந்தைகள் சதா அலறிக் கொண்டே யிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) எச்சிக் கணைக்குச் சொல்லிய மூன்றாவதிலக்க அவுஷதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) கணைப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

கொதிப்புக் கணை :—

கணைரோகக் குறிகளுடனும், நெஞ்சும், விலாவும் தணல்போற் சுடும் ; இருமலிருக்கும் ; தொண்டைக் கம்மும் ; கொடுமையான தலைவலியுண்டாகி, நெற்றியில் மட்டும் வியர்த்திருக்கும்.

சிகிச்சை

எலுமிச்சம்பழச்சாறு அவுன்ஸ் 12 சோற்றுக்கற்றாழைச்சதை ரூபாயெடை 5 இலந்தையிலைச்சாறு „ 12 கருஞ்சீரகம் „ 1 வெங்காயச்சாறு „ 12 சிற்றாமணக்கொண்டெண்ய அவுன்ஸ் 15

சோற்றுக்கற்றாழைச் சதையை எழுதாம் தண்ணீர் விட்டுச் சுத்தமாய் அலம்பி எடுத்துக்கொண்டு ஒரு மண் சட்டியில் எண்ணெயை விட்டு அதில் சாற்றையும், மற்றையவைகளையும் போட்டு அடுப்பிலேற்றி எரித்துச் சோற்றுக் கற்றாழைச் சதை கன்றாய் வெந்திருக்கும் சமயம் பார்த்துக்கி வடிகட்டி, கால மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

கணைப்பொது மருந்துகளிலொன்றையும் கொடுத்து வரலாம்.

சிங்கிமாந்தக் கணை :—

கணைரோகக் குறிகளோடும் காய்ச்சல் மிகுந்திருக்கும் ; சுவாசம் மேல் நோக்கிப் போகும் ; குழந்தைக்குத் திக்குமுக்கடித்து மயங்கம் காணும்.

சிகிச்சை

கோரோசனை	ரூபாயெடை 1	கோஷ்டம்	ரூபாயெடை 1
கிரம்பு	„ 1	சண்முகப்பூ	„ 1
அதிமதுரம்	„ 1	சகஸ்ரபேதி	„ 1
ஏலம்	„ 1	மாசிக்காய்	„ 1

இவற்றை ஒன்று சேர்த்து, வெட்டிவேர் கஷாயத்தால் ஒருமணி நேரமும் மாசுப்பத்திரிச் சாற்றால் ஒருமணி நேரமும், விலாமிச்சம்பேர்க் கஷா

யத்தால் ஒருமணி நேரமும், கருத்துளசிச் சாற்றால் ஒருமணி நேரமும் அரைத்து குன்றிமணி யளவாக மாத்திரைகள் செய்துலர்த்தி, காலை மாலை 1-அவுன்ஸ் மாசிப் பத்திரி கஷாயத்தில் ஒரு மாத்திரை வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

கணைப்பொது மருந்துகளி லென்றையும் கொடுத்து வரலாம்.

சிலேக்பனக் கீணை:—

கணைரோகக் குறிகளுடனும் உடம்பெரிச்சல், கால் சோர்வு, கை கால் வீக்கம் முதலியதும் இருமலு மேற்படும்; அதிக நேரம் இருமிய தற்குப் பின் சளி வெளிப்படும்; உதும், வாயின் உட்புறங்களும் வெடித்திருக்கும்; வாய் நாற்றமடிக்கும்.

சிகிச்சை

- (1) வெங்காயம் ரூபாயெடை 1 வில்வப்பழத்துஉள்தோல்ரூபாயெடை 1
சேரகம் ,, 1 வெந்தயம் ,, 1

ஒன்று சேர்த்து இளவறுப்பாக வறுத்த 10-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 2-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

- (2) விலாமிச்சம்வேர் ரூபாயெடை 5 கோஷ்டம் ரூபாயெடை 5
நிலக்குமிழம்வேர் ,, 5 கடுருகோகினி ,, 5
அவுரிவேர் ,, 5 கிராம்பு ,, 5
வெங்காயம் ,, 5 நல்லெண்ணெய் அவுன்ஸ் 1
சண்பகப்பூ ,, 5 பசுநெய் ,, 6

பொடிக்க வேண்டியவற்றைப் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து காலை மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

- (3) வேப்பிலையீர்க்கு ரூபாயெடை 2 பெரன்னாங்காணிவேர் ரூபாயெடை 2
புளியிலையீர்க்கு ,, 2 கோழியவரைவேர் ,, 2
சிற்றாமணக்கெண்ணெய் அவுன்ஸ் 12

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து எண்ணெயில் கலந்து கடும் வெயிலில் 12-மணி நேரம் வைத்திருந்து அந்த எண்ணெயில் காலை மாலை ஒரு தேக் கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (4) அவுரிவேர் ரூபாயெடை 4 வெங்காயம் ரூபாயெடை 4
வில்வயிலை ,, 4 கடுக்காய் ,, 4
சிற்றாமணக்கெண்ணெய் அவுன்ஸ் 12

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்துப் போட்டு காய்ச்சி வடித்து காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

(5) இண்டிலை	ரூபாயெடை 4	கடுக்காய்	ரூபாயெடை 4
உசிலையிலை	„ 4	கடுகுரோகிணி	„ 4
காட்டுமல்லிசையிலை	„ 4	கருஞ்சீரகம்	„ 4
வெங்காயம்	„ 4	சிற்றாமணக்கெண்ணெய் அவுன்ஸ்	12

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்துக் காய்ச்சி வடித்து காலில் ஒரு தேக்கரண்டி எண்ணெயை இரண்டு தேக்கரண்டி முலைப்பாலுடன் சேர்த்துக் கொடுத்து வரலாம்.

கணைப்பொது மருந்துகளி் லொன்றையும் கொடுத்து வரலாம்.

சீதக் கீணை:—

ஆமக்கீணை யென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

சுழிக் கீணை:—

இதை நாய்க்கீணை என்றும் சொல்லப்படும். கணைரோகக் குறிகளோடும் குளிர் நடுக்கம், மேல் மூச்சியும் உண்டாகும்; உச்சக்குழி பள்ளமாகவே யிருக்கும்; கண் பஞ்சடைந்திருக்கும்; உடம்பு நச்சுவலியாகவும், நெஞ்சு எரிவாகவு யிருக்கும்; சில குழந்தைகளுக்கு மேல்மூச்சோடு இருமலு யிருக்கும்; சில குழந்தைகளுக்கு நெஞ்சில் கபம் கட்டி திட்டிமுட்டடிக்கும்; நெஞ்சும், முகமும் வீக்கி யிருக்கும்; தொண்டையும், நாவும் வெந்திருக்கும்; கை கால் குளிர்த்திருக்கும்; வயிறு உப்புசமாயிருக்கும்; நாவு வறண்டிருக்கும்; இருமலும், இளைப்பும் காணும்; மார்பு பள்ளம் விழுந்திருக்கும்; வாயில் துரைபோல் எச்சில் பெருகி யிருக்கும்; வாந்தியும் வயிற்றோட்டமு மேற்படும்; முகம் மஞ்சகித்துத் தெரியும்.

சீகிச்சை

(1) உசிலம்பட்டை	ரூபாயெடை 1	வெங்காயம்	ரூபாயெடை 1
வசம்பு	„ 1		

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 2. அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை, ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) சீர்கில்தண்டு	ரூபாயெடை 1	தூதுவேளையிலை	ரூபாயெடை 1
வில்வப்பழத்தோடு	„ 1	கடுக்காப்பிஞ்சு	„ 1
கண்டங்கத்திரிவேர்	„ 1	சீரகம்	„ 1
முகமுசுக்கை	„ 1	அதிவிடயம்	„ 1
முள்ளி	„ 1	கடுகுரோகிணி	„ 1
திப்பிலி	„ 1		

ஒன்று சேர்த்திடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(8) காட்டுமல்லிகையிலே	வெங்காயம்	ரூபாயெடை 3
ரூபாயெடை 3	கடுக்காய்	" 3
சோற்றுக்கற்றாழைச்	வெந்தயம்	" 3
சோறு	3- சேரகம்	" 3
சாரணத்திவேர்	3 சிற்றாமணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 12

முதலில் சோற்றுக்கற்றாழைச்சோற்றை 7-முறை தண்ணீர்விட்டு சுத்தமாகக் கழுவி எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பின் மற்ற மருந்துகளைப் பொடித்துச் சேர்த்துச், சோற்றுக்கற்றாழைச் சோறு நன்றாக வேகுத்தனையும் எரித்த பின் வடித்து, காலை மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(4) கிலுகிலுப்பைவேர்	ரூபாயெடை 4	துளசிவேர்	ரூபாயெடை 4
குன்றிமணியேர்	" 4	வில்வவேர்	" 4
முகமுசுக்கைவேர்	" 4	சிற்றாமணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 12

இவற்றை நன்றாகப் பொடித்து எண்ணெயில் போட்டு, கடும் வெயிலில் 6-மணிநேரம் வைத்திருந்து வடிக்கடி காலை மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(5) இண்டிலைச்சாறு	அவுன்ஸ் 6	செம்முள்ளிச்சாறு	அவுன்ஸ் 6
சங்கனிலைச்சாறு	" 6	நுணுபிலைச்சாறு	" 6
பொடுதிலைச்சாறு	" 6	வெள்ளைப்பூண்டுச்சாறு	" 6
பசுவெய்	" 12		

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து காய்ச்சி வடித்து, காலை மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(6) குப்பைமேனிச்சாறு	அவுன்ஸ் ½	கறியுப்பு	ரூபாயெடை ½
வேப்பெண்ணெய்	" ½		

ஒன்றுசேர்த்தரைத்துக் கலக்கி காலையில் மட்டும் கொடுத்து வரலாம்.

(7) இன்புருவேர்	ரூபாயெடை 1	கடுக்காய்	ரூபாயெடை 1
இண்டம்வேர்	" 1	சிற்றாமணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 12
கண்டங்கத்திரிவேர்	" 1		

நன்றாகப் பொடித்து எண்ணெயில் போட்டு, 6-மணிநேரம் கடும் வெயிலில் வைத்திருந்து காலை மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(8) கோரோசனை	ரூபாயெடை ½	செண்பகப்பு	ரூபாயெடை 3½
சாதிபத்திரி	" ½	சிற்றாமணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 12

பொடித்துப் போட்டு, இலேசாய் குடேற்றி வைத்துக்கொண்டு, காலை மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

கணைப் பொது மருந்துகளில் ஒன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

சூலைக் கீலை:—

கணைரோகக் குறிகளுடனும் வயிற்றுப் பொருமலிருக்கும்; இருமல்திகமாயிருக்கும்; மேல்மூச்சுக் காணும்; தொண்டையும், நாவும் சுவந்து புண்ணாயிருக்கும்; முகம் ஒருவித நாற்றமடிக்கும்; குழந்தை பாலுண்ணாமல் மயங்கும்.

சிகிச்சை

மாசிப்பத்திரிச்சாறு அவுன்ஸ்	■	சிற்றமணக்கெண்ணெய் அவுன்ஸ்	12
கஞ்சாங்கோரைச்சாறு	„	6 தேன்	„ 2
துளசிச்சாறு	„	6 சுக்கு	ரூபாயெடை 1
நிலத்துளசிச்சாறு	„	6 திப்பிலி	„ 1
வில்வயிலைச்சாறு	„	■ மிளகு	„ 1
வெள்ளைப்பூண்டுச்சாறு	„	6	

சாறுகளையும் எண்ணெயையும் ஒன்று சேர்த்து, அத்துடன் இதர சர்க்கு களை இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூரணித்து, கலக்கிக் காய்ச்சி வடிகட்டி, காலை மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

கணைப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

தெற்கத்திக் கீலை—Periodical Delirium

இக்கீலை நோய் அமாவாசை, பெளர்ணமி திளங்களித்தான் உண்டாகு மென்பதாகத் தமிழ் வைத்திய தூல்கள் கூறுகின்றன. இது, ஆரம்பத்தில் சொற்ப சளியோடும், கணைரோகக் குறிகளுடனும் ஆரம்பித்து, மிகத் தீங்கை விளைவிக்கும் ஒரு பயங்கர வியாதி; கணைரோகத்தில் ஜீரணக் கருவிகளும் பெலஹீன மடைந்திருப்பதினால், அக்காலங்களில் இலகுவில் ஜீரணியாத கடின ஆகாரங்களை அருந்தச் செய்து விடுவதினால், கணைரோகக் குழந்தைகளுக்கு, அவ்வாகாரங்கள் குடலில் தங்கி, புளிப்பாக மாறி இரத்தத்தை விஷமிக்கச்செய்து, சன்னியையும், சன்னியில் வலிப்பையும் உண்டாக்கிவிடுகிறது.

இது கணைரோகக் குறிகளோடு பற்கடிப்பையும், மூச்சுத்திணறலையும் உண்டுபண்ணி, திட்டிமுட்டிக்கச்செய்யும்; தலை, கைகால், கழுத்து இவைகளைக் கோணி இழுக்கச் செய்வதோடுங்கூட, கண்களை மூடி மூடித் திறந்து, சன்னியின் சேஷ்டைகளை வெளியாங்கமாகக் காண்பிக்கும்; நெஞ்சு யெழும்பி யெழும்பி தணிந்து, மூச்சு முட்டேற்பட்டு எதிர்பாராதவிதமாய் மரணத்தை உண்டுபண்ணிவிடும்.

சிக்ச்சை

(1) வேலிப்பருத்தியிலைச்சாறு	வெள்ளறுருவேர்	ரூபாயெடை	4
அவுன்ஸ் 12	நொச்சிவேர்ப்பட்டை	,,	4
சூப்பைமேனியிலைச்சாறு	முருங்கைவேர்ப்பட்டை	,,	4
வேப்பெண்ணெய் ,,	வசம்பு	,,	$\frac{1}{2}$
வெள்ளெருக்கம்பழுப்	சிற்றரத்தை	,,	$\frac{1}{2}$
பின்சாறு ,,	12		

சாற்றையும், எண்ணெயையும் ஒன்று சேர்த்து, மற்றய மருந்துகளையும் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, காலை மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை	1	வசம்பு	ரூபாயெடை	1
பெருங்காயம் ,,	1	ஓமம்	,,	1
வேப்பெண்ணெய் அவுன்ஸ்	12			

பொடித்து எண்ணெயில் போட்டு, அடுப்பிலேற்றி 3 மணி நேரம் சிறு தீயாக எரித்து, கொதி கிளம்பியவுடன் இறக்கி, 6-மணினேரம் கடும் வெயிலில் வைத்திருந்து, பின் காலை மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

கணைப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

நாய்க் கணை:—

அள்ளுமாந்தமென்ற தலைப்பின்னீழ் பார்க்கவும்.

நீராமக் கணை:—

கணை ரோகத்திற்குண்டான குறிகளுடனும், மலம் சில சமயம் தண்ணீராகவும், சில சமயம் சீதம் கலந்தும், சில சமயம் பச்சிலைச்சாறு போலும், மஞ்சளைக் கரைத்ததைப்போலும் கழியும்; கண்களில் பூழை யதிகமாய் சேர்ந்திருக்கும்; கண்ணீர் அருவிபோல் வடிந்தோடிக் கொண்டே யிருக்கும்; ஆயாசமும் மயக்கமும் காணும்.

சிக்ச்சை

இரண்டு ரூபாயெடை பசுவின் வெண்ணெய்யை ஒரு மண்சட்டியில் போட்டு உருக்கி, அதில் அரை ரூபாயெடை மணித்தக்காளி இலையை அரைத்துப்போட்டுக் கிண்டி சிவந்து வரும் சமயமிறக்கி நெய்யை வடித்து காலை மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

கணைப் பொது மருந்துகளிலொன்றையும் கொடுத்து வரலாம்.

நீர்க் கிணை:—

கணைரோகக் குறிகளுடனும் சுரம் விட்டு விட்டு காயும்; வியர்வையதிக
மாக்காணும்; நாவரட்சியும் தரகமுமேற்படும்; கண்குழி விழுந்திருக்கும்;
நாக்கும் உதடும் வெடித்து புண்ணாகவிருக்கும்; மலம் தண்ணீராய் கழி
யும்; கைகால் சோர்ந்துக் குளிர்ந்திருக்கும்; தலைச்சுற்றேற்படும்; கால்
■■■ முகம் வீங்கித் தெரியும்.

சிகிச்சை

சத்திச்சாரணைக்காய்	சுக்கு	ரூபாயெடை 2
ரூபாயெடை 2	திப்பிலி	,, 2
மூக்குரெட்டைக்காய் ,,	2 மிளகு	,, 1
பொழுதலைக்காய் ,,	1 சேகம்	,, 1

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 3-அவுன்ஸ்
ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒரு
அவுன்ஸ் வீதமாகக் கொடுத்து வரலாம்.

கணைப் பொதுமருந்துகளி லொன்றையும் கொடுத்து வரலாம்.

நீர்மாந்தக் கிணை:—

■ணைரோகக் குறிகளுடனும் மூக்கில் சதா நீர் வடிந்துகொண்டே யிருக்
கும்; நெஞ்சு இடுப்பு இவ்விடங்களில் சூடு அதிகமாயிருக்கும்; வயிறு
பொருமியும் இறைந்தும் தண்ணீராகவும், பலவிதமாகவும் கழியும்;
தலைச்சுற்றும், மயக்கமும் கண்டு உடல் சோர்ந்து வாடிவிடும்.

சிகிச்சை

வெட்டிவேர்	ரூபாயெடை 1	அதிமதுரம்	ரூபாயெடை 1
விலாமிச்சம்வேர்	,, 1	ஏலம்	,, 1
கோரோசனை	,, 1	செண்பகப்பூ	,, 1
கோஷ்டம்	,, 1	சகஸ்திரபேதி	,, 1
மாசிக்காய்	,, 1		

ஒன்று சேர்த்து ஆடாதோடையிலைச் சூற்றால் 3-மணிநேரம் மைபோல்
அரைத்துக் குன்றுமணியவ்வளவு பெரிய மாத்திரைகள் செய்து உலர்த்திக்
கொண்டு, காலை மாலை ஒரு மாத்திரை வீதம் முலைப்பாலில் கரைத்துக்
கொடுத்து வரலாம்.

கணைப் பொதுமருந்துகளி லொன்றையும் கொடுத்து வரலாம்.

பித்தக் கிணை:—

கணைரோகக் குறிகளுடனும், மஞ்சளைக் கரைத்ததைப்போல் வயிற்றால்
போகும்; நாக்கும், கடைவாயும் புண்பட்டிருக்கும்; திரைகாந்தியந்தமும்

நெருப்பால் சுட்டதைப்போ வெரியும்; தலை கிறுகிறுப்பும் மயக்கமு முண்டாகும்.

சிகிச்சை

சிலேத்பனக் கணை அலுவுதம்வகனி லொன்றையாவது, கணைப் பொது மருந்துகனி லென்றையாவது கொடுத்து வரலாம்.

பிரளிக் கணை:—

கணைரோகக் குறிகளுடனும், வயிறு பொருமி யிருக்கும்; ஏப்பமுண்டா கும்; உடலாதிமயந்தமும் ஈச்சவலியா யிருக்கும்; குழந்தை துடிதுடித்து அழுது, தலையில் அங்குமிங்கும் உருளும்; மலம் மாவைக் கரைத்ததைப் போல் வெள்ளையாகக் கழியும்; சில குழந்தைகளுக்கு மலச்சிக்கலேற் பட்டு வயிறு பொருமிப் போவதுமுண்டு. அடிக்கடி அடிவயிற்றைப் புரட்டிப் புரட்டி வலியுண்டாகுமாதலால், குழந்தைக்கு முக்கலும் மேல் மூச்சு முண்டாகும்; வாயுலர்ந்து தாகமதிகரிக்கும்; மூலகில் மட்டும் நீர் வடிந்து கொண்டேயிருக்கும்; இளைப்புக் காணும்; உடல் மஞ்சள் நூற்ற மடிக்கும்.

சிகிச்சை

வெங்காயம் ரூபாயெடை 30	கருஞ்சீரகம்	ரூபாயெடை 1
பேய்க்கும்மட்டிக்காய் ,, 10	கஸ்தூரிமஞ்சள்	,, 1
கடுகுரோகிணி ,, 1	சிற்றமணக்கெண்ணெய் அவுன்ஸ் 24	

வெங்காயத்தையும், கும்மட்டிக்காயையும் குறுவ அரிந்தும், மற்ற சரக்கு களைத் தூள் செய்தும் எண்ணெயுடன் சேர்த்துக் காய்ச்சி வடிக்கடி, காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம். (கடும் பத்தியும்; கஞ்சி ஆகாரமட்டுந்தான் கொடுக்கலாம்.)

கணைப் பொது மருந்துகனி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

பிறக் கணை:—

கணைரோகக் குறிகளுடனும் வயிறு பொருமியிருக்கும்; மலம் பச்சிலைச் சாறு போலும் தயிர்க்கட்டிபோலும் கழியும்; குழந்தை குடித்த பாலு அப்படியே வாந்தி எடுத்துவிடும்; சதாசலமும் தூங்கிக்கொண்டே யிருக்கும்; கைகால் குளிர்ந்து கண்விழி மேல்நோக்கிச் சொருகும். குழந்தை படுக்கையிலிருக்கும்போது தலையை மட்டும் இப்படியும் அப் படியும் உருட்டிக்கொண்டே யிருக்கும்.

சிகிச்சை

கஞ்சாங்கோரைச்சாறு அவுன்ஸ் 6	முடக்கொத்தான்சாறு	அவுன்ஸ் 6
பொண்ணுக்காணிச்சாறு ,, 6	சிற்றமணக்கெண்ணெய் ,, 24	
வல்லாரைச்சாறு ,, 6	பெருங்காயம்	ரூபாயெடை 1

கோழியவரைச்சாறு	அவுன்ஸ் 6	வசம்பு	ரூபாயெடை 1
தைவேளைச்சாறு	„ 6	கருஞ்சீரகம்	„ 1
பேய்மிரட்டிச்சாறு	„ 6	வெள்ளைப்பூண்டு	„ 1
சிறுபுள்ளிச்சாறு	„ 6		

சாற்றையும் எண்ணெயையும் ஒன்றுசேர்த்து, மற்றவைகளைப் பொடித்துப்போட்டு, காய்ச்சி வடித்து, காலை மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

கணைப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

பேராமக் கணை:—

கணைரோகக் குறிகளுடனும், வயிற்றுப் பொறுமலும், வயிற்றோட்டமுமிருக்கும்; வாந்தியுண்டாகும்; கைகால் குளிர்த்திருக்கும்; விழித்திருக்கும்போதே குழிந்தை பயந்து திடுக்கிட்டு அழும்.

சிகிச்சை

கொழுஞ்சிவோர்	ரூபாயெடை ½	ஓமம்	ரூபாயெடை ½
பொடுதலைவோர்	„ ½	திப்பிலி	„ ½
தும்பைவோர்	„ ½	சீரகம்	„ ½

ஒன்றுசேர்த்து, பசுமோர் விட்டரைத்துக் கலக்கி வடிகட்டி, ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

கணைப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

மகாக் கணை:—

கணைரோகக் குறிகளுடனும், முகம், பின்னங்கால், பின்னங்கை இவைகள் வீக்கம் கண்டிருக்கும்; கண் வெளுத்திருக்கும், உதடும் நாவும் வெடித்திருக்கும்.

சிகிச்சை

ஆடாதோடையிலை	ரூபாயெடை 2	கீழ்க்காய்நெல்வி	ரூபாயெடை 2
சீந்தில்தண்டு	„ 2	சிறுகிரைவோர்	„ 2
வெதுப்படக்கி	„ 2	சிறுபூளை	„ 2

ஒன்று சேர்த்துத் தட்டியிடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

கணைப் பொது மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

மந்தாரக் கீணை:—

கணைரோகக் குறிகளுடனும், வயிறு பொருமியிருக்கும்; மேல்மூச்சும் மயக்கமு முண்டாகும்.

சிகிச்சை

கவுதும்பைச்சாறு	அவுன்ஸ் 8	மிளகு	ரூபாயெடை 4
கண்டங்கத்திரிச்சாறு	„ 8	திப்பிலி	„ 4
கரிசலாங்கண்ணிச்சாறு	„ 8	கடுக்காய்	„ 4
வல்லாரைச்சாறு	„ 8	தான்றிக்காய்	„ 4
நொச்சியிலைச்சாறு	„ 8	நெல்விவற்றல்	„ 4
நாயுருவிச்சாறு	„ 8	வெள்ளைப்பூண்டு	„ 4
சிறீராமணக்கெண்ணெய்	„ 36	வசம்பு	„ 1
சுக்கு	ரூபாயெடை 4	கிராம்பு	„ 1

சாற்றையும் ஏண்ணெயையும் ஒன்றுசேர்த்து, மற்ற சரக்குகளையும் பொடித்துப்போட்டு காய்ச்சி வடித்து காலை மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டியள வாகக் கொடுத்து வரலாம்.

கீணைப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

முக்குக் கீணை:—

கணைரோகக் குறிகளுடனும், வந்தியதிகமாயிருக்கும்; முக்கிழுக்கி சீத மும் மலமுமாகக் கழியும், மலம் கழியும்போது ஆசனவாய் நெருப்புச் சுட்டதைப்போ லெரியுமாதலால், மலம் கழிக்கும்போதெல்லாம் குழந்தை கதறியழும்; ஆசனவாய் வெளிப்பிதுக்கித் தெரியும்; நாக்கு வெடித்திருக்கும்; தலைவலியும், தலைநடுக்கமும் காணும், நாவரண்டு அதிக தாகத்தை யுண்டு பண்ணும்; மூட்டுகளில் வலியதிகமா யிருக்கு மாதலால் குழந்தை திரும்பிப்படுக்கும்போதும், கையிலெடுக்கும் போதும் கதறியழும்; உடம்பு கருத்து குழந்தை மயக்கித் தள்ளாடும்.

சிகிச்சை

- (1) சோற்றுக்கற்றாழைச்சதை வெந்தயம் ரூபாயெடை 3
ரூபாயெடை 5 எலுமிச்சம்பழச்சாறு அவுன்ஸ் 2

முதலில் சோற்றுக் கற்றாழைச்சோற்றை 7-தரம் தண்ணீர்விட்டுக் கழுவி ஒரு மண்சட்டியில் போட்டு அதில் பொடித்த வெந்தயத்தையும், எலுமிச்சம்பழச்சாற்றையும் கலந்து, அடுப்பேற்றி சிறுதீயாக எரித்துக் காய்ச்சி அதில் கசுந்திருக்கும் தண்ணீரை இறுத்து, காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) எலுமிச்சம்பழச்சாறு அவுன்ஸ் 6	முருங்கைவிரை ரூபாயெடை 2
சிற்றமணக்கெண்ணெய் „ 30	கோஷ்டம் „ 2
முலைப்பால் „ 8	விலாமிச்சைவேர் „ 2
சோற்றுக்கற்றாழைச்சாறு „ 8	கோங்கிலவன் பிசின் „ 2
அதிமதுரம் ரூபாயெடை 2	துளசிவிரை „ 2
அக்கிரகாரம் „ 2	ஒரிஸைத்தாமரை „ 2
தாளிசபத்திரி „ 2	விஷ்ணுகிரந்தி „ 2
கேரரைக்கிழங்கு „ 2	வில்வயிலை „ 2

முதலில் எண்ணெய், சாறு, பால் இவற்றை ஒன்று சேர்த்து, அதில் இதர மருந்துகளை இளவறுப்பாய் வறுத்துப் பொடித்துச் சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து, காலையில் மட்டும் 1, 1½, தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து,—

இண்டந்தண்டுச்சாறு அவுன்ஸ் 1 ரோகம் ரூபாயெடை 1

இண்டந்தண்டை இடித்துச் சாறெடுத்து, அத்துடன் ரோகத்தை வறுத்துப் பொடித்துப்போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சி வடிகட்டிய சாற்றில் சாயந்திரம் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

மூலக்கணைக்குரிய மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

மூலக் கீணை:—

இதன் குறிகளும் முக்குக் கணைக்குண்டானதைப்போலவே யிருக்கும். இது கணைரோகக் குறிகளுடனும் வயிறு இரைந்து, இரத்தமும் சீதமுமாகக் கழியும்; ஆசனவாய் கடுத்து எரியும்; ஆசனவாய் வெளிப் பிதுங்கி மூலத்தைப்போலிருக்கும்; தலைவலி யதிகமாயிருக்கும்; உடல் கருப்பாகவும் சிகப்பாகவும் நிறம் மாறும்.

சிகிச்சை

(1) பழம்பாசி ரூபாயெடை இரண்டை 3-அவுன்ஸ் வெள்ளாட்டுப் பாலில் போட்டு வேகவைத்துக் கசக்கிப் பிழிந்த பால் அவுன்ஸ் ஒன்றறையில் ½-அவுன்ஸ் எலுமிச்சம்பழச்சாறு சேர்த்து காலே மாலை கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

(2) சிற்றமுட்டிவேர் ரூபாயெடை 5	நெல்விவற்றல் ரூபாயெடை 5
செம்பருத்திவேர் „ 5	அதிவிடயம் „ 5
விலாமிச்சைவேர் „ 5	ரோகம் „ 5
வில்வவேர் „ 5	சுக்கு „ 5
சந்தனத்துள் „ 5	பறங்கிப்பட்டை „ 5
சாதிப்பத்திரி „ 5	கற்கண்டுத்துள் „ 8
கடுக்காய் „ 2	புகடுய் „ 12

ஒவ்வொரு சமீபையும் தனித்தனியே காயவைத்துச் சூரணித்து, துணியில் சலித்து, 5-ரூபாயெடை வீதமாக எடுத்து கலந்துக்கொண்டு, பசு நெய்யைச் சட்டியிவிட்டு உருகிவரும் சமயம், சூரணத்தை கொட்டிக்கிண்டி, சற்று வேகவைத்து, பின் கற்கண்டுப் பொடியை சேர்த்துக் கிளரி, லேகிய பதமாக்கி வைத்துக்கொண்டு, காலை மாலை கழற்சிக்காயளவாகக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

(3) சீரகம் ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$ அநிமதுரம் ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$
ஏலம் ,, $\frac{1}{4}$ பெருமரத்துப்பட்டை ,, $\frac{1}{4}$

இவற்றை கருவேலம்பட்டைக் கவராயம் விட்டரைத்து, காலை மாலை ஒரு கழற்சிக்காயளவாக $1\frac{1}{2}$, 2-அவுன்ஸ் வெள்ளாட்டுப் பாலில் கரைத்து வடிக்கட்டி கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)

வறட்டி கீணை :—

கணைரோகக் குறிகளுடனும், இரும்பும் சளிபுமதிகமாயிருக்கும்; நெஞ்சு படபடவென் றடித்துக்கொள்ளும்; உடம்பெல்லாம் சிவந்து தோன் றும்; முகம் மஞ்சளித்திருக்கும்; வயிற்றில் எரிச்சலேற்படும; நாக்குக் கருத்திருக்கும்; சில குழந்தைகளுக்கு கடுகாக்கு வெடித்து, மஞ்சள் வெண்மையான நமச்சல்கள்போன்ற முட்கள் தோன்றும்; கிறுகிறுப் பும ஆயாசமும் கண்டு குழந்தை மயங்கிவிடும்.

சிகிச்சை

(1) நீர்முள்ளிவேர் ரூபாயெடை 1 செவ்வல்லிக்கிழங்கு ரூபாயெடை 1
தூதுவேளையிலை ,, 1 தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு ,, 1
கண்டங்கத்திரியிலை ,, 1 கருஞ்சீரகம் ,, 1
முசுமுசுக்கையிலை ,, 1 வசம்பு ,, 1
திருகுக்கள்ளிவேர் ,, 1 வெள்ளைப்பூண்டு ,, 1
மணித்தக்காளியிலை ,, 1 சிற்றாமணக்கெண்ணெய்
சீரகம் ,, 1 அவுன்ஸ் 24

பொடித்துப்போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் உள்ளுக்குக் கொடுத்து, உடம்பிலும் பூசிவரலாம். (பத்தியம்.)

(2) அநிமதுரம் ரூபாயெடை $\frac{3}{4}$ செண்பகப்பூ ரூபாயெடை $\frac{3}{4}$
கோஷ்டம் ,, $\frac{3}{4}$ கொன்றைப்பிசின் ,, $\frac{3}{4}$
சகஸ்திரபேதி ,, $\frac{3}{4}$ கொத்தமல்லி ,, $\frac{3}{4}$
சந்தனத்துள் ,, $\frac{3}{4}$ விலாமிசைவேர் ,, $\frac{3}{4}$
ஏலம் ,, $\frac{3}{4}$ வெள்ளைச்சர்க்கரை ,, $1\frac{1}{2}$
சீரகம் ,, $\frac{3}{4}$ பருத்திக்காய்ச்சாறு அவுன்ஸ் 12
உருத்திராக்ஷம் ,, $\frac{3}{4}$ பொன்னாங்காணிச்சாறு ,, 12
நெல்லிவற்றல் ,, $\frac{3}{4}$ பசுநெய் ,, 24

சாற்றையும் நெய்யையும் ஒன்றுசேர்த்து, அதில் சரக்குகளைப் பொடித் துப்போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, காலே மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம். (பந்தியம்.)

(3) ஓரிலைத்தாமரைவேர்	அகத்தியிலேச்சாறு	அவுன்ஸ் 24
ரூபாயெடை 1	கருவேலங்கொழுந்துச்சாறு	24
தகரைவேர்	முசமுசுக்கைச்சாறு	24
பழம்பரிசுவேர்	செம்முள்ளிச்சாறு	24
நெருஞ்சில்வேர்	வல்லாரைச்சாறு	24
நாண்லவேர்	மிளகுத்தக்காளிச்சாறு	24
நன்னூரிவேர்	கரிசலாங்காணிச்சாறு	24
சாரணத்திவேர்	சிற்றாமணக்கெண்ணெய்	48
நொச்சிவேர்	பற்பாடகம்	ரூபாயெடை 1
சங்கன்வேர்	சோகம்	1
இன்புறவேர்	கடுகுரோகிணி	1
ஆடாதோடைவேர்	கஸ்தூரிமஞ்சள்	1
சிறுவழுதலைவேர்	திப்பிலி	1
சோற்றுக்கற்றாழைவேர்	வசம்பு	1
வேலிப்பருத்திவேர்	சிற்றாத்தை	1
நாயுருவிவேர்	மாசிக்காய்	1
தூதுவேளைவேர்	கடுக்காய்	½
மூக்குரெட்டைவேர்	கருஞ்சோகம்	½
செங்கழுநீர்க்கிழங்கு	கிராம்பு	½
மிளகுத்தக்காளிவேர்	சாதிக்காய்	½
கண்டங்கத்திரிவேர்	கொடிவேலி	½
வெதாப்பிடக்கிச்சாறு	திப்பிலிமூலம்	½
பேய்மருட்டிச்சாறு	செவ்வியம்	½
முடக்கொத்தான்சாறு	ஓமம்	½
விஷ்ணுகிரந்திச்சாறு	தேவதாருச்சக்கை	½
சங்கனிலேச்சாறு	வெள்ளைப்பூண்டு	2
தகரையிலேச்சாறு	வெங்காயம்	2

சாற்றையும், எண்ணெயையும் ஒன்றுசேர்த்து, அத்துடன் வேர்களையும் சரக்குகளையும் பொடித்துப்போட்டு காய்ச்சி வடித்து காலே மாலை ஒரு தேக் கரண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம். (கடுகு, உப்பு, புளி நீக்கி கடுப்பத்தியம்)

குறிப்பு:—இதைச் சலக்களை ரோகங்களுக்குக் கொடுக்கலாம்

(4) சிற்றாமணக்கெண்ணெய்	விஷ்ணுகிரந்திவேர்	ஒருபிடி
அவுன்ஸ் 24	கடுக்காய்	ரூபாயெடை 1

பசம்பால்	,,	24 தான்றிக்காய்	,,	1
கீழ்க்காய்கெல்விச்சாறு	,,	6 சுக்கு	,,	1
துளசி	ஒருபிடி	அதிமதுரம்	,,	1
தூதுவேளையிலை	,,			

சாற்றையும் எண்ணெயையும், ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு மற்றவைகளைத் தண்ணீர் விட்டரைத்து எல்லாம் ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கரைத்துக் காய்ச்சி வடித்து, இரவில் ஆகாரத்திற்குப்பின் 1½, 2-தேக்கரண்டி கொடுக்க காலையில் 2, 3-தடவை மலம் கழியும்; பின் காலையிலும் ½, 1-தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

வாதிக் கீணை:—

கணைரோகக் குறிகளுடனும், இளைப்பும், நாவாட்சியும் காணும்; தொண்டைப்புனைச்சூறு மிருமலுமேற்படும்; மலச்சிக்கவேற்படும்; நீர் சுருக்குண்டாகும், உடலாதிபந்தமும் வீங்கித் தெரியும்.

சிகிச்சை

சிலேத்பனக் கீணை மருந்துகளி் லொன்றையாவது, கீணைப் பொது மருந்துகளிலொன்றையாவது கொடுத்து வரலாம்.

விஷமாந்தக் கீணை:—

சிக்கிமாந்தக் கீணையென்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

விக்ஷக் கீணை:—

கணைரோகக் குறிகளுடனும், குழந்தையின் உடல் முழுதும் வீக்கம் கண்டிருக்கும்; மேல்மூச்சு வாங்கும்; சுவாசிக்கக் கஷ்டப்படும்; குளிர் நடுக்கமும், உடலாதிபந்த வலியுமேற்படும்; உண்ட ஆகாரத்தை உடனே வாந்தி பண்ணும்.

சிகிச்சை

அதிமதுரம்	ரூபாயெடை ½	மிளகு	ரூபாயெடை ½
கோஷ்டம்	,, ½	கிராம்பு	,, ½
வசம்பு	,, ½	வெள்ளைப்பூண்டு	,, ½
ஒமம்	,, ½	கூத்தங்குதம்பைவேர்	,, ½
ஏலம்	,, ½	சிற்றாமணக்கொண்ணெய் அவுன்ஸ் 12	
சுக்கு	,, ½		

ஒன்று சேர்த்து, நன்றாகப் பொடித்து எண்ணெயில் போட்டு, 6-மணி நேரம் கடும் வெயிலில் வைத்திருந்து எண்ணெயை வடித்து, காலே மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

கீணைப் பொது மருந்துகளி் லொன்றைக் கொடுத்துவரலாம்.

கணரோகத்திற்குப் பொது மருந்துகள்:—

- (1) வெட்டிவேர் ரூபாயெடை 3 அறுகம்வேர் ரூபாயெடை 3
விலாமிச்சைவேர் ,, 3

இதைப் பொடித்து, 12 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 6-அவுன்ஸ் ராக் சுண்டக் காய்ச்சிய:—

கஷாயம்	அவுன்ஸ் 6	வல்லாரைச்சாறு	அவுன்ஸ் 20
ஆலம்பால்	,, 24	வெங்காயச்சாறு	,, 20
அத்திப்பால்	,, 24	எலுமிச்சம்பழச்சாறு	,, 20
வெள்ளாட்டுப்பால்	,, 24	அதிவிடயம்	ரூபாயெடை 3
கொம்புத்தேன்	,, 24	சாதிக்காய்	,, 3
பசுரெய்	,, 24	சாதிபத்திரி	,, 3
முலைப்பால்	,, 6	மாசிக்காய்	,, 3
பாசிப்பத்திரிச்சாறு	,, 20	சடாமாஞ்சில்	,, 3
குட்டிவிளாயிலைச்சாறு	,, 20	கடுக்காய்	,, 3
வில்வயிலைச்சாறு	,, 20	தான்றிக்காய்	,, 3
கோவையிலைச்சாறு	,, 20	நெல்லிவற்றல்	,, 3

சாற்றையும், பாலையும், ரெய்யையும், கஷாயத்தையும் ஒன்று சேர்த்து, அத்துடன் சரக்குகளை மாவுபோல் அளசெய்து, துணியில் சலித்துச் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கி, காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்)

- (2) வெட்டிவேர் ரூபாயெடை 3 சகஸ்திரபேதி ரூபாயெடை 3
விலாமிச்சைவேர் ,, 3 இலுப்பைப்பூ ,, 3
நன்னூரிவேர் ,, 3 கிராம்பு ,, 3
கோரைக்கிழங்கு ,, 3 கடுகுரோகிணி ,, 3
கோவட்டம் ,, 3 திப்பிலி ,, 3
அதிமதுரம் ,, 3 திராசைப்பழம் ,, 3
ஏலம் ,, 3 பேரிச்சம்பழம் ,, 3
சந்தனத்துள் ,, 3

ஒன்று சேர்த்து, கரிசலாங்காணிச் சாற்றால் மைபோலரைத்து, பட்டாணிக் கடலைப் பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்து உலர்த்திவைத்துக்கொண்டு, காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் முலைப்பாலிலாவது, சுடுதண்ணீரிலாவது ஒரு மாத்திரை வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (3) வெந்தயம் ரூபாயெடை 20 வெங்காயம் ரூபாயெடை 3
சோற்று கற்றாழைச்சதை ,, 20 சிற்றாமணக்கெண்ணெய் அவுன்ஸ் 24

முதலில் சோற்றுக்கற்றைமுடிச்சோற்றை ஏழுமுறை தண்ணீர்விட்டுச் சுத்தமாக்கமுடிவது எடுத்து எண்ணெயில்போட்டு, அத்துடன் வெந்தயத்தையும், வெங்காயத்தையும் நசுக்கிப்போட்டுக் காய்ச்சி சோற்றுக்கற்றைமுடிச் சோறு சிவந்துவரும் சமயம் இதங்கிவடித்து காலை மாலை 1, 1½-தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(4) மான் கொம்புத்துள் ரூபாயெடை	2	ஏலம்	ரூபாயெடை	2
சந்தனத்துள்	2	திப்பிலி		2
புளியங்கொட்டைமேல்		உருத்திராஷம்		2
தோல்	2	கோரோசின		2
நன்னூரிவேர்	2	குப்பைமேனிவேர்த்தோல்		2
கோரைக்கிழங்கு	2	பொன்னாங்காணிவேர்த்தோல்		2
சாதிக்காய்	2	சிறுகேரைவேர்த்தோல்		2
சாதிபத்திரி	2	காயுருவிவேர்த்தோல்		2
செண்பகப்பூ	2	வல்லாரைவேர்த்தோல்		2
சீரகம்	2	ஒரிலைத்தாமரை		2
கருஞ்சீரகம்	2	கல்கார்பஸ்பம்		4
இலவங்கப்பட்டை	2	சுகந்திரபேதி		2

இதனுள் மான்கொம்பை தண்ணீரில் ஊறவைத்து முள்ளரத்தால் ராவி துளசெய்துகொண்டு எல்லாம் ஒன்றுசேர்த்து பொன்னாங்காணிச் சாற்றால் 2-மணி நேரமும், வல்லாரைச்சாற்றால் 2-மணி நேரமும் மைபோலரைத்துச் சுண்டக்காயல்வனவு பெரிய மாத்திரைகள் செய்து உலர்த்திக் கொண்டு, காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் முலைப்பாலிலாவது, சுடுதண்ணீரிலாவது ஒரு மாத்திரைவீதம் கரைத்துக் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்)

(5) சங்கனவேர்	ரூபாயெடை 1	கடுக்காய்	ரூபாயெடை 1
நீர்முள்ளி	1	தான்றிக்காய்	1
வெங்காயம்	1	கெல்லிவற்றல்	1

இவற்றைப் பொடித்து 12-அவுன்ஸ் பசுமோரில்போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தைச் சுத்தம்செய்து நெருப்பில் காயவைத்த இரும்பு சட்டியில் ஊற்றி முறித்து வைத்துக்கொண்டு காலை மாலை 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்)

(6) 188-ம் பக்கமுள்ள மூன்றாமிலக்க மருந்தையும் கொடுத்துவரலாம்.

(7) கணத்தெண்ணெய்; கணைநெய்; வெங்காய எண்ணெய்; வெந்தய எண்ணெய்; இவற்றிலொன்றைக் கொடுத்துவரலாம் செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

■ செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(8) சிரப் இப்பிகாக் (Syrup Ipecac)	டிபிராம் 9
சிரப் சில்லி (Syrup Scillae)	” 1½
டிஞ்சர் ஓபியம் காம்போட்டா (Tincture Opium Camphorata)	அவுன்ஸ் 2

ஒன்றுசேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற் கொருதரம் ½-தேக்காண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(9) பல்விஸ் இப்பிகாக் (Pulvis Ipecac)	கிரான்ஸ் 3
---------------------------------------	------------

இதைக் கண்ணியில் தொண்டைக்கம்மலும், சளியும் அதிகயிருந்தால் கால் மணினேரத்திற்கொருதரம் இந்த அளவாக 2, 3-தடவைமட்டும் கொடுக்கலாம்.

(10) வைனம் அன்டிமோனியாலிஸ் (Vinum Antimonialis)	டிபிராம் 4
வைனம் இப்பிகாக் (Vinum Ipecac)	” 4
சிரப் சில்லி (Syrup Scillae)	” 4
ஆக்குவா டிஸ்டில் (Aqua Distill)	அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்த்து, தொண்டைக்கம்மலும் சளியுமிருந்தால் 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு வார்தியுண்டாகும் வரை கால்மணி நேரத்திற்கொருதரம் அரைத் தேக்காண்டியளவாகக் கொடுத்துவரலாம். தொண்டையில் வலி வேதனை யிருந்தால் சுடுதண்ணீர் ஒற்றிடம் கொடுக்கலாம்; அல்லது ஆளிலிவரக் களியையாவது, அன்டிபிளாஜெஸ்டைன் (Antiphillogistine) என்ற மருந்தையாவது சுடசுட துணியில் தடவி கெஞ்சிலும், தொண்டைக் குழியிலும் போடலாம்.

(11) டிஞ்சர் டோலு (Tincture Tolu)	அவுன்ஸ் 3
சிரப் ஸ்குவில்ஸ் (Syrup Squills)	டிபிராம் 4
டிஞ்சர் காம்பர் கோ (Ticture Camphor Co)	” 4
கிளிசரின் (Glycerine)	” 12
தண்ணீர்	அவுன்ஸ் 5

இதை ஒன்று சேர்த்து, இழுப்பு அதிகமாயுள்ள கண்ணோகத்திற்கு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்குப் பகல் நேரங்களில் 3-மணி நேரத்திற்கொருதரம் ½-தேக்காண்டி வீதமும், இரவில் 4-மணி நேரத்திற்கொருதரம் ¾-தேக்காண்டி வீதமும் கொடுத்துவரலாம். மருந்துகொடுத்த இடை நேரங்களில், 100-பங்கு தண்ணீரில் 2-பங்கு கெக்கோயின் சொலூஷன் (Solution Cocaine) கலந்து வெளிப்பிரயோகமாக தொண்டையில் தெளித்து 8-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் ஒரு தேக்காண்டி சீமைக் கடுகையரைத்துக் கலக்கி, உள்ளங்கையளவு துணியில் கனைத்து, தொண்டைக்குழியில் போட்டு வைக்கலாம்.

(12) காலோமல் (Calomel)	கிரான்ஸ் 2
சோடியம் பைகார்ப் (Sodium Bicarb)	” 2

பல்விஸ் இப்பிக்காக் (pulvis Ipecac)	1
பல்விஸ் பெப்சினா (Pulvis pepsinae)	24

ஒன்றாகக் கலந்து 12-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு, இருந்தாப்போலிருந்து தொண்டையைச் சட்டிவிடும் கணைரோகத்திற்கு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு இரண்டுமணி நேரத்திற் கொருதரம் ஒரு பொட்டலம் வீதம் வாயில் கொட்டி விழுங்கச் செய்யலாம்.

வெளிப்பியோகமாக ஆலிட் லாக்டிக் (Acid Lactic) கில் 20-பங்கும், தண்ணீர் 100-பங்கும் சேர்த்துத் தொண்டையில் தடவி வரலாம்.

(13) பொட்டாஷியம் புரோமைட் (Potassium Bromide) கிரான்ஸ்	8
குளோரல் ஐட்ரஸ் (Chloral Hydras)	4
சிரப் டோலு (Syrup Tolu)	1
தண்ணீர்	4

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற் கொருதரம்-ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(14) பத்த அவுன்ஸ் கொதிக்கிற தண்ணீரில் 3-கிரான்ஸ் அமோனியம் குளோரைட் (Ammonium Chloride) போட்டி, அதிலிருந்து வரும் ஆவியை வாயால் இழுக்கும்படிச் செய்பலாம்.

(15) 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, இரவில் படுக்கைக்குப் போகுமுன் ஒரு கிரான் (Antipyrin) அன்டிபைரின் கொடுத்தால், இரவில் கணைரோயில் உண்டாகும் இழுப்பு ஏற்படாது.

கணைரோகத்தினால் ஏற்படும் வியாதிகள் DISEASES CAUSED BY CROUP

குழந்தைகள் கணைரோகத்தினால் பாதிக்கப்படும் சமயங்களிலும், கணைரோகத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பின்பும், சில கோளாறுகளும், திரேகமாறுதல்களு முண்டாகலாம். கணைரோகத்தால் பாதிக்கப்படும் சமயங்களிலும்; கணைரோகம் செளகரியமான பின்பும் அவர்களுக்கு:—

அடித்தள்ளுதல்	இருமல்	பலவிதக்கழிச்சல்
ஆசனக்கடுப்பு	கணைச்சுருடு	மூலம்
இரத்தபேதி	நீர்ச்சுருக்கு	வயிற்றுப்பொருமல்
		வாய்நாற்றம்

முதலிய வியாதிகளேற்படலாம்; அவைகளுக்கு அவ்வப்போது தகுந்த சிகிச்சைகள் மூலம், பரிகாரங்கள் தேடாதுபோனால் அவை திரேகத்தில் சாஸ்வதமாகக் குடிக்கொண்டு சில சமயங்களில் அகாலமரணத்தை யுண்டாக்கிப் போகும்.

அடித்தள்ளுதல்:—

குழந்தைகளுக்குக் கணைரோகத்திலுண்டான அதிகமான வயிற்றோட்டத் திறலாகிலும், திரோக மெலிவுறலாகிலும், ஆசனக் கடுப்பேற்பட்டக் காலங்களில் முக்கிமுக்கி மலம் கழித்ததினாலாகிலும், ஆசன வாயான துப் பெருத்துக்கீழ் கொங்கிவிடும். இதற்கே அடித்தள்ளுதல் (Prolapsus Ani) என்று சொல்லப்படும். இது மூலரோகத்தைப் போல் மலக்குடல் வெளியில் பிதுங்கி வந்துவிடாமல், ஆசன வாய்மட்டும் கனத்துப் பெருத்து, வெளித்தெரியும்படியாக கீழ் இறங்கியிருக்கும். இதனால் ஆசனத்துவாரம் திறந்துப்போய் மலத்தை யடக்கும் தத்துவமும் கஷ்டிணித்துப்போகும்.

சிகிச்சை

- (1) பழையபுளி ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ கரிசலாங்காணி ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ இதில் புளியை கொட்டை, கோதுமீக்கி மைபோலரைத்து, கால மாலை ஒரு கொட்டைப்பாக்களவு கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)
- (2) ஒரு பெரும் இஞ்சியை எடுத்துத் தோல்சீவி, இரண்டாகப் பிளந்து, இரண்டுக்கும் மத்தியில் குழியாகச் செய்து, அதில் $\frac{1}{2}$ -ரூபாயெடை பெருங்காயத்தை வைத்து இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்து, நூலால் சுற்றிச்சுட்டி, பசுந் தயிரில் போட்டு வேகவைத்தெடுத்து, பசுந் தயிரி லரைத்துக் கலக்கி கால மாலை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்.)
- (8) மாசிக்காய்த்தூள் ரூபாயெடை 1 அபினி ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ வாசலின் (Vaseline) ,, 3

ஒன்று சேர்த்துக் குழப்பி வெளிப்பிரயோகமாக வெளித்தள்ளியிருக்கும் ஆசனத்தை நன்றாகக் கழுவிவிட்டு கால மாலை அதில் தடவி வரலாம்.

கணை ஆசனக் கடுப்பு:—

கணை ரோகத்தால் பாதிக்கப்படும் சமயங்களிலாவது, கணைரோகம் சொஸ்தமான பின்னாவது, மலம் கழிக்கும்போது, ஆசனவாய் கடுப் பேற்படலாம். மலம் கழிக்கும்போது, ஆசனவாயில் கெருப்புசுட்டி வைப்போல் எரிச்சலும் கடுப்புமிருக்கும்.

சில சமயங்களில் கணைரோகத்தில், தேபேதி காணும் சமயங்களிலும், கணைமுற்றிலும் சௌகர்யமானபின், கணைபுண்டாயிருந்த சமயங் களில் மலச்சிக்கல் ஏற்பட்டு அதனால், முக்கி மலம் கழிக்கும்போது ஆசனவாயில் விரிவேற்பட்டு புண்பட்டு போவதினாலாவது, ஆசனக் கடுப் புண்டாகலாம்.

சிகிச்சை

- (1) வேப்பிலைச்சாறு அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$ வெந்தயம் ரூபாயெடை
சிற்றமணக்கெண்ணெய் ,, $\frac{1}{2}$

எண்ணெயையும், சாற்றையும் ஒன்றுசேர்த்து வெந்தயத்தை தண்ணீர் விட்டரைத்து, அத்துடன் கலக்கி காலையில் கொடுத்துவரலாம்.

(2) கால்ரூபாயெடை வெந்தயத்தை எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் வேகவைத் தெடுத்து, அப்படியே வாயில் கொட்டி விழுங்கச் செய்யலாம்.

(3) வெட்டிவேர்	ரூபாயெடை 1	சகஸ்திரபேதி	ரூபாயெடை 1
கோக்டம்	„ 1	தான்றிக்காய்	„ 1
ஏலம்	„ 1	மாசிக்காய்	„ 1
கோரோசனை	„ 1	அதிமதுரம்	„ 1
செண்பகப்பூ	„ 1		

இவற்றை ஒன்றுசேர்த்து வெட்டிவேர் கஷாயம்விட்டு, 2-மணி நேரம் மைபோலரைத்து பட்டாணிபயிறு அவ்வளவு பெரிய மாத்திரைகள் செய்து உலர்த்தி வைத்துக்கொண்டு காலே, மாலை ஒரு அவுன்ஸ் முலைப்பாலில் ஒரு மாத்திரை வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

கிணை இரத்தபேதி:—

கணைரோகத்தால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கும் சமயங்களிலும், கணைரோகம் சொகர்யமானதன் பின்னும் இது உண்டாகலாம். சில சமயங்களில் கணைரோக முண்டாயிருப்பதாகத் தெரியாமல் மலம் மட்டும் இரத்தம் சேர்ந்து கழியும்; இரவில் சுரம் காயும்; மலத்துடன் இரத்தமும் சீதமும் கலந்து ஆசனவாய் கடுப்புடன் மலம் கழியும். இது குழிந்தைகளுக்குச் சதைப்பிடிக்க விடாமல் எலும்புத் தோலுமாக்கி, ஆசனவரைய வெளிக்குத் தள்ளும்படியாக செய்துவிடும். ஆகார வெறுப்பையும் ஆயாசத்தையும் முண்டிபண்ணும். இவ்வித குறிகளெல்லாயிருக்குமானால் கணைரோகம் சம்பந்தப்பட்ட இரத்தபேதியென்றே தீர்மானிக்கலாம். இதைப்பற்றி, “கணையினால் முக்கல் வயிற்றுக்கடுப்பு” என்ற தலைப் பிண்கீழும் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

சிகிச்சை

(1) ஆவாரம்வேரப்பட்டை	விஷ்ணுகிரந்தி	ரூபாயெடை 4
ரூபாயெடை 4	அம்மாம்பச்சரிசி	„ 4
கொன்றைவேர்ப்	கணைப்பூண்டு	„ 4
பட்டை „ 4	அதிமதுரம்	„ 3
எருக்கம்வேரப்பட்டை „ 4	சீரகம்	„ 3
நிலக்குமிழம்பேர்ப்	ஏலம்	„ 3
பட்டை „ 4	சிறுமணக்கெண்ணெய் அவுன்ஸ் 24	

இதில், வேர்ப்பட்டைகளையும் பச்சிலைகளையும் பொடித்து, எண்ணெயில் போட்டுக்காய்ச்சி வடித்து அதில் அதிமதுரம், ஏலம், சீரகம் இவைகளை இள

வறுப்பாய் வறுத்துத் தூள்செய்து போட்டுக் கலந்து காலை மாலை $\frac{1}{2}$, 1-தேக் கரண்டி வீதம் 1-அவுன்ஸ் முலைப்பாலில் கலந்து கொடுத்துவரலாம்.

(2) கோரோசனை ரூபாயெடை $1\frac{1}{2}$	கடுகுரோகிணி ரூபாயெடை $1\frac{1}{2}$
பால் துத்தம் „ $1\frac{1}{2}$	கொழிஞ்சிவேர் „ $1\frac{1}{2}$
வெண்காரம் „ $1\frac{1}{2}$	

இவற்றை ஒன்றுசேர்த்து அகத்தியிலேச்சாறுவிட்டு 3-மணிநேரம் மைபோ. வரைத்து, உளுந்தல்வளவு பெரியமாத்திரைகள் செய்து உலர்த்திக்கொண்டு காலை மாலை 1-அவுன்ஸ் முலைப்பாலில் 1-மாத்திரை வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(3) எலுமிச்சம்பழச்சாறு அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$	தென்னம்பூச்சாறு அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$
பசுந்தயிர் „ $\frac{1}{2}$	

ஒன்றுசேர்த்து, காலை மாலை கொடுத்துவரலாம். (புளிதள்ளி பத்தியம்)

(4) நன்னூரிலேர் ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$	கிராப்பு ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$
பொன்முசட்டை „ $\frac{1}{4}$	சாதிக்காய் „ $\frac{1}{4}$
சேகம் „ $\frac{1}{4}$	பருத்திவினாப்பருப்பு „ $\frac{1}{4}$

ஒன்றுசேர்த்துத் தட்டி, சிறுபுள்ளடிச்சாற்றில் கலந்து, ஒன்றுசேர்ப் பாதியாக வற்றவைத்து வடிக்கட்டி, அதில் காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(5) பசுநெய் அவுன்ஸ் 24	கார்போகரிசி ரூபாயெடை 3
சிற்றமணக்கெண்ணெய் „ 12	கோரோசனை „ 3
நல்லெண்ணெய் „ 6	கோஷ்டம் „ 3
முருங்கையிலேச்சாறு „ 24	செண்பகப்பு „ 3
செங்கழுநீர்க்கிழங்கு	கொத்தமல்லி „ 3
ரூபாயெடை 1	இலவங்கப்பட்டை „ 3
அதிமதுரம் „ 3	சாதிக்காய் „ 3
சேகம் „ 3	சாதிப்பத்திரி „ 3
ஏலம் „ 3	கிராப்பு „ 3

எண்ணெயையும் சாற்றையும் ஒன்றுசேர்த்துக்கொண்டு அத்துடன் இதர சரக்குகளையும் நன்றாகப் பொடித்துப்போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து காலை மாலை $1\frac{1}{2}$, 2-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(6) வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$	வினாம்பிசின் ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$
---	-------------------------------------

இவற்றை 2-அவுன்ஸ் பசுந்தயிரில் அரைத்துக் கலக்கி வடிக்கட்டி காலை யில் 1, $1\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(7) பல்வீஸ் இப்பிகாக் Pulvis Ipecac	கிரான்ஸ் 1
பல்வீஸ் கிரீட்டா அரோமாட்டிக் (Pulvis Creta Aromatic)	

ஒன்று சேர்த்து 6-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுதடவை தேனில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

(8) மன்னா ஆப்டிமா (Mannae Optimae)	கிரான்ஸ்	15
சிரப் சென்னா (Syup Sennae)	துளி	12
சிரப் டோலு (Syrup Tolu)	"	12
லேக்கர் மாக்னிஷி சார்போனஸ் (Liquor Magnesi Carbonas)	டிராம்	3

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு மூன்று தடவை, ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(9) டிஞ்சர் ஒபியம் (Tincture Opium)	துளி	4
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	10

ஒன்று சேர்த்து, இரத்தம் அதிகமாய் சுழிவதாயிருந்தால், ஆசனத்தின் மூலம் பீச்சுக்குழலால் (Enema) உட்செலுத்தலாம்.

கீளை இருமல்:—

கீளை ரோகத்தால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கும்போதும், கீளைரோகம், சொஸ்தமான பின்னும் இருமல் தாக்குவதண்டு. இரவில் மட்டும் சுரம் காயும்; எந்நேரமும் ஓயாமல் இருமும்; ஆனால், சளிவராது. இது கீளைரோகமென்று வெளிக்குத் தெரியாமலும் வரட்சியிருமலாகவு் பிருப்பதண்டு. இதனால் கீளைரோகம் உடலில் சார்ந்திருப்பதாகத் தீர்மானிக்கலாம்.

சிகிச்சை

(1) சிற்றமணக்கெண்ணெய்	வசம்பு	ரூபாயெடை	1
அவுன்ஸ் 24	வெண்ணெய்ப்பூண்டு	"	1
கண்டங்கத்திரிச்சாறு	"	"	1
கரிசலாங்காணிச்சாறு	"	"	1
துதுவேளைச்சாறு	"	"	1
வல்லாரைச்சாறு	"	"	1
நாயுருவிச்சாறு	"	"	1
கொச்சிச்சாறு	"	"	1
	6	மெல்லிவற்றல்	"

சாற்றையும் எண்ணெயையும் ஒன்று சேர்த்து, அத்துடன் இதர சரக்குகளையும் பொடித்துப்போட்டுக் காய்ச்சி வடிக்கட்டி, காலை மாலை 1, 1½ தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) வெங்காயம்	ரூபாயெடை	1	வெந்தயம்	ரூபாயெடை	3
எலம்	"	½	மணத்தக்காளியிலை	"	3

ஒன்று சேர்த்து, ஒரு மண் சட்டியில் போட்டு சிவக்க வறுத்து, அதில் 24-அவுன்ஸ் தண்ணீர் விட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கவராயத்தில், நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(3) இரண்டவுன்ஸ் அதிகம் சுடுகிற தண்ணீரில் 1-டிபிராம் கிளிசரினை (Glycerine) விட்டு, நான் ஒன்றுக்கு 3-தடவை கொடுத்து வரலாம்.

(4) வைனம் இப்பிகாக் (Vinum Ipecac)	தனி	12
சிரப் டோலு (Syrup Tolu)	"	15
இன்பியூஷன் செனிகர (Infusion Senegale)	டிபிராம்	3

ஒன்று சேர்த்து, 1 முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 3-தடவை ஒரு தேக்காண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

கீளை சீதபேதி:—

கீளை இரத்தபேதி என்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

கீளைச் சூடு:—

இதைக் கீளைக்காய்ச்சல் என்றும் சொல்லுவதுண்டு. இக்கீளைச் சூடு குழந்தைகளுக்குக் கேற்பட்டால் சரியான விதமாய் சிகிச்சை செய்து, வேருடன் போக்கும்படிச் செய்யவேண்டியது. அப்படிச் சரியான சிகிச்சையினால் இவ்வியாதியைப் போக்கடிக்காவிட்டால், இது குழந்தைகளுக்கு 12-வயது வரையிலும் ஸ்திரமாயிருந்து, அதற்குப் பின்னும் பலவீனமுடையவர்களாகவே இருக்கச்செய்யும். இவ்வியாதிகளினால் உயிருக்கு ஹானியேற்படாதென்றாலும், சீரத்தை கீழைத்தையில் ஸ்திரப்படுத்தி விடும்.

இதில் திரோகம் சதாகாலமும் உஷ்ணமாகவே இருக்குமென்றாலும், பகலை விட இரவில் உஷ்ணம் மிகுதிப்படும்; வயதிற்குத்தக்க வளர்ச்சியின்றி உடல் கீழைத்திருக்கும்; அன்னத்துவேஷம், ஆயாசம் முதலியவைகளேற்படும்; நெஞ்சக் கூடுகட்டி உயர்ந்திருக்கும்; கண்ணெரிச்சலும் கண்ணில் பூழையும் உண்டாகும்; வாய் நாற்றமடிக்கும்.

இதற்குத் தக்க மருந்துகளைப் பிரயோகம் செய்யாமல், நம் நாட்டு மக்கள் குடுபோட்டு வருகின்றனர். அஸ்தியில் கனலேறியிருப்பதற்கும், எலும்பின் தத்துவம் கேடுற்றிருப்பதற்கும் குடு போடுவதினால் பயன் என்ன கிடைக்கப்போகிறது? குழந்தைகளை ஹிமசிப்பதைத் தவிர, குடு போடுவதினால் கூடு கட்டிய நெஞ்சு வலுபெற்று அமிழ்த்தவிடுமென்று நினைக்கவே கூடாது.

மேலும் கீளைச் சூட்டிற்கு உபசாந்திகளாக எண்ணெய் ஸ்நானம், குளிர்ச்சியான ஆகாரம், சந்தூஷடியான போஷிப்பு முதலியவைகளினால் திரோகோஷ்ணத்தை சமரசப்படுத்தி வரவேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) சிற்றுமணக்கெண்ணெய் வல்லாரைச்சாறு அவுன்ஸ் 24
அவுன்ஸ் 32 வெந்தயம் ரூபாயெடை 3

இவற்றுள் வெந்தயத்தைப் பசும்பால்விட்டு டரைத்து கலந்து கரைத்து எரித்து வடித்து காலே, மாலை 2, 3-தேக்கராண்டி யளவாகச் சர்க்கரை சேர்த்துக் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) பேயன் வாழைப்பழத்தை சுண்டுவிரல் கனமான பில்லுகளாக நறுக்கி, சிற்றுமணக்கெண்ணெயில் போட்டு வெயிலில் வைத்திருந்து, இரவு படுக்கைக்குப் போகுமுன் ஒரு துண்டுவீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (8) லைக்கர் அமோனியா அலிடேடிஸ் (Liquor Ammonia Acetatis) டிராம் 1
ஸ்பிரிட் ஈதர் ஷேட் ரோவரி (Spirit Aether Nitrosi) ,, ½
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti) துளி 40
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்த்து 4-மணி சேரத்திற்கொருத் தேக்கராண்டிவீதம் நீடித்துக் கொடுத்து வரலாம்.

- (4) டி ஜாங்க்ஸ் காட் லிவர் ஆயில் (De Joughs Cod Liver Oil)
ஸ்காட்ஸ் எமுலஷன் ஆப் காட் லிவர் ஆயில் (Scott's Emulsion of Cod Liver Oil)
அல்லன்பீஸ் காட் லிவர் ஆயில் (Allenbury's Cod Liver Oil),
கிரிமால்ட்ஸ் மால்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆப் காட் லிவர் ஆயில் (Gremalt's Malt Extract of Cod Liver Oil)
பவல்ஸ் காட் லிவர் ஆயில் வித் ஐபோபாஸ்பேட் அன்ட் லைம்
Powell's Cod Liver Oil with Hypophosphate and Lime)

இவற்றி் லேதேனு மொன்றையாகிலும், இதுபோன்ற இதர மீன் ரண்ணெய்களி் லொன்றையாகிலும் நீடித்துக் கொடுத்து வரலாம்.

கலை முலம்:--

கணரோகந்தரல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் சமயங்களிலாவது, கணரோகம் சொஸ்தமான பின்னாவது, வலிற்றுக்கடுப்பும், ஆசனக்கடுப்பும் யேற்பட்டு, மலம் வருவதைப்போல் அடிக்கடி உணர்ச்சியேற்பட்டு, மலம் கழியாததால், முக்கிமுக்கி மலம் கழிப்பதாலும்; ஆசனக்கடுப்பின் உபத்திரவம் தாங்காது, சதா முக்கிக்கொண்டிருப்பதாலும், மலக் குடவின் கடைசிபாகம் வெளிக்குத் தள்ளிவிடுவதுண்டு. அதினால் மலம் கழிக்கும்போதெல்லாம், அந்த மலக்குடல் கடைசிபாகம் பிதுக்கி வெளியே வந்துவிடும்.

இது பெரியவர்களுக்குண்டாகும் மூலவியாதியைப்போலவே காணப்படும். மலம் கழித்தபின் சுத்தி செய்தவுடன் தானாகவேனும், கையால் தள்ளி விடுவதினாலேனும், அதன் ஸ்தானத்திலேறிக்கொள்ளும். குழந்தைகளுக்கு வரும் கணைமூலத்தில், அவர்கள் மலவாயிலை திறந்துகொண்டிருப்பதினால், கொசு, ஈ முதலியவைகள் உட்கார்ந்து இருமிக்கொத்தொத்தச் செய்ததினாலென்கிலும்; அடிக்கடி மலம் கழிப்பதினாலென்கிலும், மலக்குடல் கடைசி பாகம் ஆசனத்துவாரத்தின் வழியே உரசிவந்துகொண்டிருப்பதால் தேய்வுபட்டுக்கிலும், இயற்கையாகக் கணைரோகத்தின் கோளாரினாலென்கிலும், வெளித் தள்ளியுள்ள மூலத்திலிருந்து, இரத்தமும் சீழும் கசிவதுண்டு. இதற்குத் தக்கவிதமான சிகிச்சைகள் செய்யாத பக்கத்தில், மூலம் ஸ்திரீப்பட்டு, ஆபுள் வுரையில் உபத்திரவத்தை புண்டிபண்ணிக் கொண்டிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) கோரோசின்	ரூபாயெடை 1	திப்பிலி	ரூபாயெடை 1
கிராம்பு	„ 1	சாதிக்காய்	„ 1
சீரகம்	„ 1	மாசிக்காய்	„ 1

ஒன்று சேர்த்து முலைப்பாலில் மைப்பாலரைத்து, குன்றிமணிப் பிரமாணமாக மாத்திரைகள் செய்து உலர்த்திக்கொண்டு, இரத்தம் கசிந்து கொண்டிருக்கும் கணை மூலத்திற்கு, காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் முலைப்பாலில் ஒரு மாத்திரை வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) சோற்றுக்கற்றழைச்சோறு	சர்க்கரை	ரூபாயெடை 2
	ரூபாயெடை 5	நல்லெண்ணெய்
செக்காயுருவியிலை	„ 1	அவுன்ஸ் 18

சோற்றுக் கற்றழையை 7-முறை தண்ணீர் விட்டுக் கழுவி பின் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து, எண்ணெயில் பேரட்டு, சோற்றுக்கற்றழைச்சோறு சிவந்து வரும்வரை பதமாய் காய்ச்சி இறக்கி வடிக்கட்டி, சீழ் கசிந்து கொண்டிருக்கும் கணைமூலத்திற்கு காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(3) மாசிக்காய்த் தூள்	ரூபாயெடை 1	வாசலின் (Vaseline)	ரூபாயெடை 1
அபினி	„ 1		

ஒன்றுசேர்த்துத் தரைத்து, மலம் கழிக்கும் ஒவ்வொருதரமும் மூலத்தை கன்றாய் சுத்திசெய்து வெளிப்பிரயோகமாகத் தடவி வரலாம்.

(4) கொக்கோலின் ஐட்ரோ குளோரைட் (Cocaine Hydrochlorate)	கிரைன்ஸ்
சொலுஷன் அட்ரினாலின் குளோரைட் (Solution Adrenalin chloride)	டிராம் 1

பிஸ்மத் சப்நைட்ரஸ் (Bismuth subnitras)	கிரான்ஸ்	10
வாசலின் (vaseline)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்றுசேர்த்து களிம்பாக அரைத்துக்கொண்டு, மலம் கழித்த ஒவ்வொரு நேரமும், இரவு படுக்கைக்குப் போகுமுன்னும், மூலத்தை சுடுத்தண்ணீரால் சுத்திசெய்துவிட்டு வெளிப்பிரயோகமாகத் தடவி வரலாம்.

(5) பல்விஸ் கிளிசரினா கோ (pulvis Glycyrrhizae co) டிராம் 1

இதைத் தேனில் குழைத்து 5-வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இரவில் படுக்கைக்குப் போகுமுன் ஒரே தடவையாகக் கொடுத்துவந்தால் காலையில் முக்கலில்லாமல் மலம் சாதாரணமாகக் கழிந்து, மூலத்தில் வடியும், இரத்தத்தையும், சீழையும் மட்டுப்படுத்தும்

(6) ஐட்ராஸ்டின் (Hydrastin)	கிரான்ஸ்	5
கொக்கோயின் ஐட்ரோ குளோரைட் (cocaine Hydrochlorate)	"	3
பல்விஸ் அலம் (pulvis Alum)	"	5
பசுவெண்ணெய்	போதுமானது	

களிம்புசெய்யப் போதுமான பசுவெண்ணெய் செய்து களிம்பாக்கி 20-பாகமாகப் பிரித்து, இரவு படுக்கைக்குப் போகும்போதும், காலையில் மலம் கழித்த உடனையும் ஆசனவாயை சுடுத்தண்ணீரால் கழுவிவிட்டு ஒரு பாகத்தைத் தடவி வரலாம்.

தறிப்பு:—உள்ளுக்கு மருத்துவன் கொடுப்பதோடும் 3, 4, 5-வெளிப் பிரயோகக் களிம்புகளையும் உபயோகிப்பது நல்லது.

கண்ணீரோசுத்தில் இருந்தாப்போலிருந்து தொண்டை சுட்டிவிடுதல்:—

சில சமயம் கண்ணீரோசுத்தின் கொளும் மிகுதிபட்டு விடுமானால் எதிர் பாராதவிதமாய், இருந்தாப்போலிருந்து தொண்டைக் சுட்டிவிடும். குழந்தை அழுவதற்கும் முடியாமல் திட்டுமுட்டித்து சண்விழியை மேலே சொருகும்.

சிகிச்சை

(1) காலோமல் (calomel)	கிரான்ஸ்	2
சோடியம் பைகார்ப் (sodium Bicarb)	"	24
பல்விஸ் இப்பிக்காக் (pulvis Ipecac)	"	1
பல்விஸ் பெப்ஸினால் (pulvis pepsinal)	"	24

ஒன்றுச் சேர்த்து 12-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு, இரண்டு மணி நேரத்திற் கொருதரம் ஒரு பாகத்தை வாயில் கொட்டி, விழுங்கும்படி செய்யலாம்.

(2) பொட்டாஷியம் புரோமைட் (potassium Bromide) கிரைன்ஸ்	2
குளோரல் ஐடரஸ் (Chloral Hydras)	1
சிரப் டோலு (Syrup Tolu)	துளி 15
தண்ணீர்	டிராம் 1

ஒன்றுசேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரே தடவை யாகக் கொடுக்கலாம்.

(3) ஆலிட் லாக்டிக் (Acid Lactic)	டிராம் 1
தண்ணீர்	6

ஒன்றுசேர்த்து வெளிப்பிரயோகமாக மட்டுமே வெளிப்புறம் தொண்டைக் குழியில் தடவி வரலாம்.

(4) சுடுதண்ணீர்	அவுன்ஸ் 10
அமோனியம் குளோரைட் (Ammonium chloride) கிரைன்ஸ்	3

இதில், தண்ணீர் நன்றாகக் கொதிக்கும் சமயம் மருந்தைப் போட ஆவி புண்டாகும் அதை சுவாசிக்கும்படி செய்யலாம்.

தற்ப்பு:—உள்ளுக்கு மருந்து கொடுக்கும்போதும் 3, 4-இலக்க வெளிப் பிரயோக மருந்துகளையும், வெளிப்பிரயோகமாக உபயோகித்து வரலாம்.

கண்ணியில் இழுப்பு:—

கண்ணோக்கத்தில் சாதாரணமாகவே இழுப்பு இருப்பதுண்டு; என்றாலும், இழுப்பு அதிகமாகச் சில கண்ணோக்கங்களில்தானிருக்கும். அவ்விதமான சமயங்களில் இழுப்பைக் கண்டிக்கும்படியான ஒளவுதப்பிரயோகம் செய்ய வேண்டும். கண்ணியில் இழுப்பு சாதாரணமாகவே இருக்குமென்று மிதமா யிருந்துவிட்டால், இழுப்பானது உக்கிரமாக ஆரம்பித்து விபத்தை உண்டு பண்ணும்.

சிகிச்சை

(1) டிஞ்சர் டோலு (Tincture Tolu)	டிராம் 3
சிரப் ஸ்குவில்ஸ் (Syrup Squills)	4
டிஞ்சர் காம்பர் கோ (Tincture Camphor co)	4
கிளிசரின் (Glycerine)	12
தண்ணீர்	அவுன்ஸ் 6

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, பகல் நேரங்களில் 3-மணிக்நேரத்திற் கொருமுறை $\frac{1}{2}$ -தேக்கரண்டி யளவாகவும், இரவில் 4 மணி நேரத்திற் கொருமுறை $\frac{1}{2}$ -தேக்கரண்டி யளவாகவும் கொடுத்து, இடை நேரங்களில்,

கொக்கோயின் சொலூஷன் (Cocain Solution)	டிடாம்	1
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	2

ஒன்று சேர்த்து, வெளிப்பிரயோகமாக தொண்டையில் கொஞ்சம் தெளித்து, 3-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் ஒரு தேக்கரண்டி சீமைக் கடுகையரைத் துக் கலக்கி, உள்ளங்கை யளவு துணியை அதில் நனைத்து, தொண்டை யின்மேலும் தொண்டைக் குழியிலும் போட்டு வைக்கலாம்.

(2) பொட்டாஷியம் புரோமைட் (Potassium Bromide) கிரைன்ஸ்	2
குளோரல் ஐட்ரஸ் (Chloral Hydras)	1
சிரப் டுலு (Syrup Tolu)	தனி 15
தண்ணீர்	டிடாம் 1

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு இழுப்பு வரும் சமயத்தில் ஒரே தடவையாகக் கொடுக்கலாம்.

கணையில் தொண்டைக் கம்மி சளி அதிகரித்தல்:—

கணை ரோகத்தினால் பாதிக்கப்படும் சமயங்களில் தொண்டைக்கம்மி லேற்பட்டு, சிச்சுக்குலாய் குழந்தையழும்; சளியும் மிகுதிப்பட்டு தொண்டையில் அடைத்துக்கொண்டு, குறுகுறுவென்ற சப்தம் ஏற்படும்; இதுசளியின் மிகுதியினால் தொண்டைக் கம்முவதாயிருப்பதால், சளியை வெளிப்படுத்தும்படியான மருந்துகளை முதலில் பிரயோகித்துச் சளியை வெளிப்படுத்தி, கணையையும் சொஸ்தம் செய்யவேண்டும்.

சிகிச்சை

(1) பல்விஸ் இப்பிக்காக் (pulvis Ipecac)	கிரைன்ஸ்	1
---	----------	---

இதை 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்குச் சளியை வெளிப்படுத்தி தொண்டைக் கம்மில் கீக்க, கால்மணிகேரத்திற் கொருதரம் இந்தவிதமாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(2) வைனம் ஆன்டிமோனியாலிஸ் (vinum Antimonialis) டிடாம்	4
வைனம் இப்பிக்காக் (vinum Ipecac)	4
சிரப் செல்லி (Syrup Seille)	4
தண்ணீர்	அவுன்ஸ் 3

ஒன்று சேர்த்து வார்த்தியுண்டாகும் வரை, கால்மணி நேரத்திற்கு ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து, பின் இரண்டுமணி நேரத்திற் கொருதரம் ½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(3) ஆளிவிராயைக் களி கிண்டியாவது, அல்லது அன்டிபிலாஜெஸ்டைன் (Antiphlogistine) என்ற மருந்தையாவது சுடசுட துணியில் தடவி தொண்டைக்குழியில் போடலாம்.

(2) சோடியம் பைகார்போனஸ் (Sodium Bicarbonas)	- டிராம்	1
லைக்கர் பிஸ்மத் (Liquor Bismuth)	"	2
சிரப் டுலு (Syrup Tolu)	"	■
இன்பியூஷன் குவாஷியா (Infusion Quassiae)	"	1
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(3) சோடியம் பைகார்போனஸ் (Sodium Bicarbonas)	கிரான்ஸ்	6
பல்விஸ் ரீலய (Pulvis Rhei)	"	6

ஒன்று சேர்த்து, 6-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 4-மணி நேரத்திற் கொருதரம் ஒரு பாகத்தைக் கொடுத்து வரலாம்.

(4) டிஞ்சர் கைனோ கோ (Tincture Kino Co)	துளி	16
சிரப் சிம்பிள் (Syrup Simple)	"	40
ஆக்குவா சின்னமோனி (Aqua Cinnamononi)	டிராம்	4

ஒன்று சேர்த்துக் கலக்கிக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணிக்நேரத்திற் கொருதரம் கொடுத்து வரலாம்.

கணையினால் முக்கல் வயிற்றுக் கடுப்பு:—

இதைப்பற்றி “கணை இரத்தபேதி” என்ற தலைப்பின்கீழும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. கணைரோகத்தினால் திரோகத்தில் மிகுதியான உஷ்ணம் தங்கி, இரப்பை, ரூடல் முதலியவைகளில் அழிவைக்கண்டு, அடிக் கடி மலம் வருவதைப்போன்ற உணர்ச்சியேற்படும். அந்தச் சமயத்தில் மலம் கழிக்க முக்கலேற்படும். மலம் கொஞ்சமாகவும், சீதம் இரத்தம் கலந்தும் கழியும்; ஆசனவாய் நெருப்பால் சுட்டதைப்போலெரியும்; இரத்தச் சமயத்தில் ஆகாரம் காரமற்றதாகக் கொடுத்து வரவேண்டும்.

சிகிச்சை

(1) சிற்றமணக்கெண்ணெய்	நிலக்குமிழும்வேர்பட்டை
அவுன்ஸ் 24	ரூபாயெடை ■
வெந்தயம்	ரூபாயெடை 8

பொடித்து எண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்)

(2) எருமைத்தயிர்	அவுன்ஸ் 1	மணித்தக்காளியிலைச்சாறு	அவுன்ஸ் 1
ஒன்றுசேர்த்து	காலைநேரங்களில்	மட்டும்	கொடுத்துவரலாம். (பத்தியம்)

(3) சேகம் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ பருத்திப்பிஞ்சு ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
பசும்பால் விட்டரைத்துக் கலக்கி, 1, 1 $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை
கொடுத்து வரலாம்.

(4) வெந்தயம் ரூபாயெடை 10 நல்லவெல்லம் ரூபாயெடை 5
பசுநெய் அவுன்ஸ் 10

முதலில் வெந்தயத்தைப் பசும்பாலில் வேகவைத்து அரைத்து, பின்
ஒன்று சேர்த்து வேகியம்போல் கிண்டி, காலை மாலை ஒரு கொட்டைப்பாக்
குப் பிரமாணம் கொடுத்து வரலாம்.

(5) நாவற்பட்டை ரூபாயெடை 5 ஆலம்விழுதின்கொழுந்து
நாவற்கொழுந்து ,, 5 ரூபாயெடை 5
விடத்தலாப்பட்டை ,, 5 அத்திப்பட்டை ,, 5
விடத்தலாயிலை ,, 5 அத்திப்பிஞ்சு ,, 5
கருவேலம்பட்டை ,, 5 சாதிக்காய் ,, 5
கருவேலங்கொழுந்து ,, 5 மாசிக்காய் ,, 5
ஆவாரம்பட்டை ,, 5 கிராம்பு ,, 5
ஆவாரங்கொழுந்து ,, 5 சேகம் ,, 5
ஆலம்பட்டை ,, 5 அதிவிடயம் ,, 5

முதலில், பட்டை, விலை, கொழுந்து, பிஞ்சு இவற்றை இடித்து 48-அவுன்ஸ்
தண்ணீரில் போட்டு, 12-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், இதர
சரக்குகளை இளம்வறுப்பாய் வறுத்துப் பொடித்துப்போட்டுக் கலக்கி வடி
கட்டி, காலை மாலை 1, 1 $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம். பத்தியம்.

(6) பல்விஸ் கைனோ கோ (pulvis Kino Co) கிரைன்ஸ் 6
பல்விஸ் கிரீட்டா அரோமார்டிக் கம் ஒபியம் (P lvis Creta
Aromatic Cum Opium) ,, 6
பிஸ்மத் சப்ரைடர்ஸ் (Bismuth Subnitrates) ,, 6

ஒன்று சேர்த்து, 4-பாகமாகப் பிரித்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தை
களுக்கு, 4-மணிநேரத்திற் கொரு பாகம் தேனில் குழப்பிக் கொடுத்துவரலாம்

(7) டோவர்ஸ் பவுடர் (Dover's Powder) கிரைன்ஸ் 5
ஆலிட் காலிக் (Acid Gallic) ,, 5
பிஸ்மத் சப்ரைடர்ஸ் (Bismuth Subnitrates) ,, 5

ஒன்று சேர்த்து, 4-பாகமாகப் பிரித்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தை
களுக்கு, 4-மணிநேரத்திற் கொருபாகம் தேனில் குழப்பிக் கொடுத்துவரலாம்

கூணையினால் வெள்ளைப் படுதல்:—

இது பெண் குழந்தைகளுக்குமட்டுமே சம்பவிக்கும். பிரமேக ரோகமுள்ள
தாய், தந்தையர்க்குற்பத்தியான குழந்தைகளுக்கும், மெலிந்த சரீர பிர

சிறுதியுள்ள குழந்தைகளுக்கும், கணை ரோகத்தால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளுக்கும், கணை ரோகத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கும் இது ஏற்படுவதுண்டு. பெண்குறியிலிருந்து தயிரைப்போல் வெளியினை பதார்த்தம் கசிந்துகொண்டேயிருக்கும். இது சிறு குழந்தையிலே ஏற்பட்டவிட்டால் பின்னர் சதகாலமு மிருந்து கொண்டே இருக்கும். இரவில் ஊங்கி எழுந்தவுடன் பார்த்தால் தொடைகளில் ஒடி வெண்மையாகக் காய்ந்துபோயிருக்கும். இதற்குப் பிரமாதமான சிகிச்சைகளை நொன்றுமில்லை. குழந்தைகளுக்குக் குளிர்ச்சியான போஷணையுள்ள ஆகாரங்களைக் கொடுத்து வரவேண்டும். குளிர்ந்த தண்ணீர் ஸ்நானம், சூரிய ஒளியில் திரேகாப்பியாசம் முதலியவைகளால் நன்மையுண்டாகும். இரும்பு சேர்ந்த மருந்துகள், மீன் எண்ணெய் முதலியவைகளைப் பிரயோகித்து வரலாம்.

கணை வயிற்றுப் பொறுமல்:—

கணை ரோகத்தினால் ஜீரணக்கருவிகள் களைப்பட்டு, ஆகாரத்தைச் சரியான விதமாய் ஜீரணிக்கச் செய்ய சக்தியற்று, அஜீரணத்தை யுண்டு பண்ணி வயிற்றை ஊதச் செய்துவிடும். ஆகாரம் ஒன்றும் உட்கொள்ளாமலிருக்கும்போதே வயிறு பெருத்து, காற்று நிறைந்திருப்பதைப்போல்தோன்றி, சுவாசிக்கக் கஷ்டப்படும்; மூச்சுத் திணறல் ஏற்படும்.

சிகிச்சை

(1) தேசாவரம் ரூபாயெடை 1 சாரணத்திவோர் ரூபாயெடை 1 ஒன்று சேர்த்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2)	தைவேளையிலை	ஒருபிடி	செம்முள்ளியிலை	ஒருபிடி
	துளசி	„	கஞ்சாங்கோரை	„
	தும்பை	„	சேகம்	„

ஒன்றுசேர்த்திடித்து, பிழிந்த சாறு அவுன்ஸ் 1, 1½-வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(3)	பல்விஸ் ரீயை (Pulvis Rhei)	கிரான்ஸ்	2
	சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb)	„	5
	ஒலியம் அனிவி (Oleum Anisi)	துளி	1

ஒன்று சேர்த்து, 4-பாகமாகப் பிரித்துக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 3-மணிநேரத்திற் கொரு பாகம் தேனில்கலந்து கொடுத்து வரலாம்.

- (4) சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb) கிரான்ஸ் 1
 டிஞ்சர் கார்டம் கோ (Tincture Cardamom Co) துளி 8
 ஆக்குவா மெந்தாபிப் (Aque Menthapip) அவன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து நன்றாகக் குலுக்கிக்கொண்டு 1-முதல் 3-வயதக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற் கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

களை வாய்நாற்றம்:—

கணைரோகத்தால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு வாய்நாற்ற மேற்படுவதுண்டு. வாயிலிருந்துவரும் சவாசமோ, காற்றோ, சுண்ணாம்பு அல்லது புண் நாற்றமாயிருக்கும்; இது கணைரோகத்திலேற்படும் ஜீரண உருப்புகளின் பெலஹீனத்தினாலேயே ஏற்படுகிறது. களைச் சூடுள்ள குழந்தைகளுக்கு, வாய்நாற்றம் முதல் அறிகுறியாகவிருக்கும்.

சிகிச்சை

- (1) எலம் ருபாயெடை $\frac{1}{2}$ வெங்காயம் ருபாயெடை 1
 வெந்தயம் ,, 1 மணித்தக்காளியிலு ஒருபிடி

ஒன்றாகத் தட்டி சிவக்க வறுத்து, 24-அவன்ஸ் தண்ணீர்விட்டு 8-அவன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒரு அவன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

- (2) காலோமல் (Calomel) கிரான்ஸ் 11
 சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb) ,, 8

ஒன்று சேர்த்து 4-பாகமாகப் பிரித்து, நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுதடவை 1-முதல் 3-வயதக் குழந்தைகளுக்கு ஒருபாகம் வீதம் வாயில் கொட்டி யெச்சில் கூட்டி விழுங்கச் செய்யலாம்.

குறிப்பு:—இந்த மருந்தை இந்தவிதமாக 3, 4-நாள் கொடுத்து நிறுத்திக்கொண்டு பின், 8-நாள் கழித்து கொடுத்து பின் நிறுத்தி, இந்தவிதமாகவே செளகரியமாகும் வரை கொடுத்துவரலாம்.

வயிற்றோட்டம் DIARRHOEA

இதைக் கழிச்சல், வயிற்றுப்போக்கு, பேதி என்றெல்லாம் சொல்லுவர். இது குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி உண்டாகக்கூடியதோர் சாதாரண வியாதி. வயிற்றோட்டம் பெரியவர்களுக் கேற்படுவதைப்போலல்லாமல், குழந்தைகளுக்கு வயிற்றோட்டத்தில் சிலது தனிப்பட்டதாகவேயிருக்கும். பல் முனைக்கும்போதும், கணை ரோகத்திலும், தோஷம், மந்தம் முதலிய

வியாதிகளிலு மேற்படும் வயிற்றோட்டங்கள் குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான், தாக்கக்கூடியதாக விருக்கின்றன.

வயிற்றோட்டம் அஜீரணத்தினாலும், தொத்துவிஷக் கிருமிகளின் சேர்க்கையாலும், ஜீரண உற்புதளின் பலஹீனம், சிறுகுடல் பெருங்குடல் வழற்சி, மண் முதலிய ஜீரணியாத பொருட்களைத் தின்றல் முதலியவற்றாலும் ஏற்படலாம். வயிற்றோட்டம் கோடை காலங்களிலும், மழை காலங்களிலும் விசேஷமாக ஏற்படலாமென்று, டாக்டர் ரூடாக் (Dr. Ruddock) அபிப்பிராயப்படுகிறார். குழந்தைகளுக்குக் கோடை காலங்களில்தான் தொத்து விஷக் கிருமிகளா லுண்டாகும் வயிற்றோட்டம் யேற்படலாமென்றும், வெப்பம் எவ்வளவுக் கெவ்வளவு கொரோமா யிருக்கிறதோ அவ்வளவுக் கவ்வளவு வயிற்றோட்டமும் உண்டாகலாமென்று, டாக்டர் ரூடாகை யறுசரித்தே டாக்டர் ஹுட்சின்சனும் (Dr. Hutchinsou) அபிப்பிராயப்படுகிறார்.

கோடைக் காலங்களில் தண்ணீர் நிலையங்களில் தண்ணீர்வற்றி, அதில் கிருமிகள் பெருகிவிடுவதாலும்; மழைக்காலங்களில் அருகியான வற்றை மழை வெள்ளம் அடித்துக்கொண்டுவந்து பல நீர் நிலையங்களிலும் தொத்தவிஷக் கிருமிகளைப் பரப்பிவிடுவதாலுமே, இக் காலங்களில் மற்ற காலங்களோவிட வயிற்றோட்டமிருக்கும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள போதிய காரணங்களாக விருக்கின்றன.

வயிற்றோட்டம் பலதிரப்பட்டதாக விருக்குமென்றாலும், அடிக்கடி மலம் கழிவதாகிய குணத்தை புண்டிபண்ணும் வியாதிக்கு, வயிற்றோட்டமென்று பொதுவாகக் கூறப்படும். மண் சாம்பல் முதலிய ஜீரணிக்காத வஸ்துக்களா லேற்படும் வயிற்றோட்டம் குழந்தை நடக்க வாரம்பிக்கும் காலங்களில் மட்டும்தானேற்படும். மேலும் குழந்தைகள் நடக்க வாரம்பிக்கும் காலங்களிலும் இயற்கையான வயிற்றோட்டமும் வாரம்பிப்பதுண்டு.

இதன்கீழ் கூறப்பட்டுள்ள வேறுபட்ட வயிற்றோட்டங்களுக்கு அவ்வ வற்றின் தலைப்பின்கீழ் காரணங்களும், குறி, குணங்களையும் கூறப்பட்டிருப்பதால், இவ்விடம் அதை விளக்காது விடப்படுகிறது. குழந்தைகளுக்குண்டாகும் வயிற்றோட்டங்கள் பலவாயிருப்பினும், அவற்றுள் அடிக்கடி புண்டாகும் வயிற்றோட்டங்களைமட்டும் இதன்கீழ் கூறப்படுகிறது. அவையாவன:—

அதிசாரம்	தோஷக்கழிச்சல்	டாகும் கழிச்சல்
ஆமக்கழிச்சல்	நான்பட்டக்கழிச்சல்	பால்போல்கழித்தல்
இரத்தக்கழிச்சல்	பச்சிலைச்சாறுபோல்	மாந்தக்கழிச்சல்
கணைக்கழிச்சல்	கழிதல்	முட்டை யுடைத்ததை
சலக்கழிச்சல்	பலவிதமாய்கழிதல்	போல் கழிதல்
கூக்கழிச்சல்	பல்முனைக்கும்போதுண்	வெப்பக்கழிச்சல்

அத்சாரம்—Dyspepsia

அத்சாரம் அஜீரணத்தினு லேற்படுகிறது. குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுக்கும் தாய்மரர்கள் இலகுவில் ஜீரணியாத பதார்த்தங்களைப் பசித்தால் பால் குடிக்கும் குழந்தைகளுக்கு அத்சார மேற்படலாம்.

பழங்கறிகள், மிருகத் தண்ணெய்; கொழுப்புள்ள ஆகாரங்கள் ; அறை குறை வேக்காடுள்ள பதார்த்தங்கள் ; மீன் கருவாடு சேர்ந்த கறி வகைகள் ; பட்டாணி, மொச்சை, கடலைப்போன்ற தானியங்கள் ; புளிப்பேறிய பால் ; அதிக மாவுசத்துள்ள திண்பண்டங்கள் முதலிய வற்றைப் பசிப்பதினாலேயே அத்சார முண்டாகின்றது அத்சார ரோகத்தை அஜீரண வயிற்றோட்டம், அஜீரணக்கழிச்சல், அஜீரண பேதி, செரியாக் கழிச்சல் என்றும் சொல்லப்படும்.

சிறு குழந்தைகளுக்குத் தாய், பால் கொடுக்கும்போது சரியான விதமாய் முலைக்காம்பைக் கழுவி, பீச்சுவிட்டுப் பால் கொடுக்காததினால் (33-ம் பக்கம் பார்க்க) முலைக்காம்புகளிலுள்ள அழுக்காலும், முலையில் அதிக நேரம் தங்கி கேடுற்றிருந்த பாலாலும், சிறு குழந்தைகளுக்கு அத்சார மேற்படுகிறது.

அத்சாரம் கண்டால், இருந்தாப்போலிருந்து வயிற்றைந்து, மலம் தண்ணீ ராகக் கழியும். பால் குடிக்கும் குழந்தைகளுக்கானால், பால் திரண்டு புளிப்பு நாற்றத்துடன் தண்ணீர் கலந்து கழியும் ; வயிற்றோட்டம் அதிகமாயிருக்கும் ; வாந்தியும் மயக்கமு முண்டாகும் ; நாவில் மாபடித் திருக்கும் ; திரேகம் உஷ்ணித்திருக்கும் ; சில சமயங்களில் வயிறு பொருமும் ; உண்ட ஆகாரம் அரை குறையாய்க் கழியும் ; வயிறு மடமடவென்றிரையும் ; மலம் சில சமயம் தண்ணீராகவும், சில சமயம் மாவைக் கரைத்ததைப்போலும், அறை குறையாக ஜீரணித்த ஆகாரங் களாகவும் கழியும் ; மலத்தில்திகமான புளிப்பு நாற்றமிருக்கும் ; நாவரச்சி காணும்.

சிகிச்சை

- (1) அத்திக்காயை இடித்துப் பிழிந்த சாற்றால், ஓமத்தை மைபோ லரைத்து, ஒரு கழற்சிக்காயளவாக 1, 1½-அவுன்ஸ் பசுந்தயிரில் கலக்கி காலையில் மட்டும் கொடுத்து வரலாம்.
- (2) ஒரு முத்தின சாதிக்காயைத் துளைத்து, அந்தத் துளையில் மிளகளவு அபினியைத் திணித்து அரைத்த மஞ்சளால் ஜாதிக்காய்க்கு ஒரு விரல் கனத்தில் கவசம் செய்து நெருப்பிலிட்டுப் புறட்டி மஞ்சள் கறும் சமயம் எடுத்து மஞ்சள் கரியை நீக்கிவிட்டு, சாதிக்காயையும் அபினி யையும், முலைப்பால்விட்டு ஒருமணிநேரம் மைபோலரைத்துக் கடுகள வாச மாத்திரைகள் செய்து காயவைத்துக் கொண்டு, காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் முலைப்பாலில் ஒரு மாத்திரை வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (3) காட்டாத்திப்பூ ரூபாயெடை 1 வில்வக்கொழுந்து ரூபாயெடை 1
கருங்காவிவேர்ப்பட்டை ,, 1 திப்பிலி ,, 1

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து, 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

- (4) சிறுநாகப்பூ ரூபாயெடை 1 வில்வவேர் ரூபாயெடை 1
கொத்தமல்லி ,, 1 வில்வப்பட்டை ,, 1
திப்பிலி ,, 1 கோரைக்கிழங்கு ,, 1

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து, 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

- (5) ஒமம் ரூபாயெடை 3 காட்டாத்திப்பூ ரூபாயெடை 1
ஒமத்தை முதலில் இளவறுப்பாய் வறுத்துத் தேய்த்த உமியை நீக்கி
பின் னிரண்டையும் ரூரணித்து, காலை மாலை $\frac{1}{2}$ -ரூபாயெடை ரூரணத்தை
இஞ்சிச் சாற்றில் கொடுத்துவரலாம்.

- (6) ஒமம் ரூபாயெடை 1 பிரண்டை ரூபாயெடை 1
ஒன்று சேர்த்துத்தட்டி 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்
ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம்
கொடுத்துவரலாம்.

- (7) தைவேளையிலை ரூபாயெடை 1 வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை 1
வசம்பு ,, 1

ஒன்றுசேர்த்துத் தட்டிப் பிழிந்தசாறு, அவுன்ஸ் 1, $1\frac{1}{2}$ -வீதம் காலை
மாலைக் கொடுத்துவரலாம்.

- (8) கீழ்க்காய்நெல்லிவேரை அரைத்து, ஒரு கழற்சிக்காயளவு ஒரு அவுன்ஸ்
முலைப்பாலில் கலக்கி வடிகட்டி இந்த விதமாய் காலை மாலை கொடுத்து
வரலாம்.

- (9) வேலிப்பருத்தியிலை முடக்கொத்தானிலை ரூபாயெடை 1
ரூபாயெடை 1 வெங்காயம் ,, 1

ஒன்றுசேர்த்து வதக்கித் தட்டிப் பிழிந்த சாற்றில் காலை மாலை ஒரு
தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

- (10) காகசுக்கட்டி ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$ கோரோசனை ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$
களிப்பாக்கு ,, $\frac{1}{4}$ சோகம் ,, $\frac{1}{4}$

ஒன்றுசேர்த்து, எலுமிச்சம் பழச்சாறுவிட்டு மைபோலரைத்து, காலை மாலை ஒரு தழற்சிக்காய்நாவு 1, 1½-அவுன்ஸ் முலைப்பாலில் கலக்கிக் கொடுத்துவரலாம்.

- (11) தைவேளாவேர் ரூபாயெடை 1 செம்முள்ளி ரூபாயெடை 1
 பொடுதலை ,, 1 வேலிப்பருத்தி ,, 1
 மாவுலிங்கப்பட்டை ,, 1 எருமைவெண்ணெய் ,, 5
 சங்கனிலை ,, 1

ஒன்றாகத்தட்டி வெண்ணையில் போட்டுக் காய்ச்சி வடிக்கட்டி காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்து வரலாம் (பத்தியம்)

- (12) அரைவீசை மூத்ததை மெல்லிய துணியில் முடித்து, ஒரு பாத்ஜிரத்தில் பத்து டம்ளர் தண்ணீர்விட்டு முடிச்சயானது சட்டியின் அடிபாகத்தில் படாதபடி ஒரு தூலில் கட்டித் தொங்கவிட்டு அடுப்பிலேற்றி, தண்ணீர் 5-டம்ளராகச் சுண்டும்வரை நீ எரித்து, அதில் மிதக்கும் தைலத்தை கோழியிறகால் ஒன்றுசேர்த்து எடுத்துக் கொண்டு காலை, மாலை அந்த மூத்ததைலத்தில் கால் அவுன்சும், தண்ணீர் ஒரு அவுன்சுமாகக் கலந்து கொடுத்துவரலாம்.

- (18) மரமஞ்சள் ரூபாயெடை 3 சிறுகாகப்பூ ரூபாயெடை 3
 கடுக்காய்ப்பூ ,, 3 போஸ்தக்காய் ,, 3
 அகிலியம் ,, 3 சடாமாஞ்சில் ,, ½

இவற்றை ஒன்றுசேர்த்துத் தூன்செய்து, 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-மணிநேரம் ஊறவைத்து, வடித்தத் தண்ணீரில் 4-மணி நேரத்திற் கொருதரம் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (14) வாழைப்பூ ரூபாயெடை 1 புளியரை ரூபாயெடை 2
 ஒன்றுசேர்த்து திடித்து, பிட்டலிப்பதைப்போல் அவித்துப் பிழிந்த சாற்றில் ஒரு அவுன்சும், தேன் கால் அவுன்சும் ஒன்று சேர்த்துக் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

- (15) காட்டாத்திப்பூ ரூபாயெடை 1 வெள்ளிலோத்திரம் ரூபாயெடை 1
 வில்வப்பழம் ,, 1 யானைத் திப்பிவி ,, 1
 ஒன்றாகப் பொடித்து, 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸ் ஸாகச சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

- (16) காட்டாத்திப்பூ ரூபாயெடை 1 கன்னாரிவேர் ரூபாயெடை 1
 மஞ்சிஷ்டி கிழங்கு ,, 1 வெள்ளிலோத்திரம் ,, 1

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து, 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(17) அதிவிடயத்தைச் சூரணித்து, காலை மாலை $\frac{1}{2}$ -ரூபாயெடையாகத் தேனில் கலந்து கொடுத்துவரலாம்.

(18) அதிசார மாத்திரையில் காலை மாலை, ஒரு மாத்திரைவீதம் தேனில் கொடுக்கலாம். லகு அதிசார மாத்திரையில் காலை மாலை $\frac{1}{2}$ -மாத்திரை வீதம் கொடுத்து வரலாம். ஜாதிபலாதிச் சூரணம் $\frac{1}{2}$ -ரூபாயெடை கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் காண்க.

(19) ஆலிட் சல்பியூரிக் டில் (Acid Sulphuric Dil)	டிராம்	$\frac{1}{2}$
சர்க்கரை (Sugar)	"	1
டிஞ்சர் கார்டம்ம் கோ (Tincture Cardamom Co)	"	1
ஆக்குவா மெந்தாபிப் (Aqua Menthapip)	அவுன்ஸ்	1 $\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்து, ஒன்றுமுதல் மூன்றுவயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 4-மணி நேரத்திற்கொரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(20) பல்விஸ் காட்டிகியூ (Pulvis Catechue)	கிரைன்ஸ்	10
பல்விஸ் சின்னமோனி (Pulvis Cinnamoni)	"	10

ஒன்றுசேர்த்து, 4-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு, ஒன்றுமுதல் மூன்றுவயதுக் குழந்தைகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுதடவை, ஒருபாகம் வீதம் தேனில் குழப்பி காச்சிலில்லாத அதிசார ரோகத்திற்குக் கொடுக்கலாம்

(21) அமோனியம் குளோரைட் (Ammonium Chloride)	கிரைன்ஸ்	1
சிரப் ரோவி (Syrup Rosae)	டிராம்	■
ஆக்குவா மெந்தாபிப் (Aqua Menthapip)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்றுசேர்த்துக் குலுக்கிக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தை களுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுதடவை, தடவை யொன்றுக்கு ஒரு தேக் கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(22) ஒலியம் ரெசினி (Oleum Ricini)	டிராம்	2
ஒலியம் அமிக்டாலி டுல்விஸ் (Oleum Amygdalae Dulcis)	"	2
சக்காரியம் (Saccharum)	"	2
கம் அக்கேஷியா (Gum Acacia)	"	1
ஆக்குவா சின்னமோனி (Aqua Cinnamoni)	அவுன்ஸ்	3

முதலில் ஒலியம் ரெசினியையும், ஒலியம் அமிக்டாலி டுல்வியையும், கம் அக்கேஷியா சேர்த்துப் பசையாக்கிக்கொண்டு பிறகு மற்றவைகளையும் சேர்த்து, நன்றாய்க் கரைத்துக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தை களுக்கு 3-மணிநேரத்திற்கொரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(23) மெக்னீஷியா கார்போனஸ் (Magnesia Carbonas)	கிரான்ஸ்	3
பிஸ்மத் சப்நைட்ரஸ் (Bismuth Subnitras)	"	1
பல்விஸ் ரூபார்ப் (Pulvis Rhubarb)	"	5

ஒன்று சேர்த்து, 3-பாகமாகப் பிரித்து, மடித்துக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயது குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற் கொருமுறை, ஒருபாகம் வீதம் தேனில் கலந்து கொடுத்து வரலாம்.

(24) டிஞ்சர் காட்டிகு (Tincture Catechue)	துளி	1
பல்விஸ் கிரீட்டா அரோமாட்டிக் (Pulvis Creta Aromatic)	கிரான்ஸ்	1
ஸ்பிரிட் குளோரோபார்ம் (Spirit Chloroform)	துளி	1
தண்ணீர்	டிராம்	3

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்துகொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணிநேரத்திற் கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(25) சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarbonate)	டிராம்	1
லேக்கர் பிஸ்மத் (Liquor Bismuth)	"	2
ஆக்குவா கரூய் (Aqua Carici)	அவுன்ஸ்	2

ஒன்று சேர்த்து நன்றாய்க் குலுக்கிக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 4-மணிநேரத்திற் கொரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(26) ஆயில் ஒலீவா (Oil Olivae)	அவுன்ஸ்	1
ஐயோடைன் (Iodine)	கிரான்ஸ்	20

ஒன்று சேர்த்தரைத்து வெளிப்பிரயோகமாக வயிற்றின்மேல் தடவி வரலாம்.

(27) மிக்சர் ஒலியம் ரெசினி (Mixture Oleum Ricini)	டிராம்	4
கிளிசரின் ஆலிட் கார்பாலிக் (Glycerine Acid Carbolic)	துளி	2
டிஞ்சர் காம்ப்ர் கோ (Tincture Champhore Co)	"	15

ஒன்றுசேர்த்துக் கலந்துகொண்டு 1 முதல், 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணிநேரத்திற் கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

(28) மிக்சர் ஒலியம் ரெசினி (Mixture Oleum Ricini)	டிராம்	2
கிரியோ சோட் (Creasote)	துளி	1
டிஞ்சர் காம்ப்ர் கோ (Tincture Camphore Co)	"	10
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	1

ஒன்றுசேர்த்து 1-முதல், 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4 மணிநேரத்திற் கொருமுறை தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

- (29) எக்ஸ்டிராக்ட் ஒபியம் லிக்ஞட் (Extract Opium Liquid) துளி 15
பெர்ரி சல்பஸ் (Ferri Sulphus) கிரைன்ஸ் 15
லைக்கர் மாக்னிஷ் (Liquor Magnesia) அவுன்ஸ் 1
சிரப் சிஞ்ஜிபர் (Syrup Zingiber) ,, 1

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல், 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத் திற் கொருத் தேக்கரண்டிவீதம் கொடுத்து வரலாம்.

அதிசார வயிற்றுப்பொருமல் :—

இதை அஜீரண வயிற்றுப்பொருமல், பொருமல் கழிச்சல் என்றும் சொல் லப்படும், அதிசார ரோகத்தில் வயிறு ஊதி, இரைந்து, சப்தத்தடன் மலம் கழியும்; அதிசாரத்தில் காணும் சகல குறிகளும் இதிலும் காணப்படும்.

சிகிச்சை

- (1) அதிவிடயம் ரூபாயெடை 1 மிளகு ரூபாயெடை 1
ஆமையோடு ,, 1 பாவட்டையிலை ,, 1
ஒமம் ,, 1 வட்டத்திருப்பி ,, 1
சுக்கு ,, 1

ஒன்றுசேர்த்து சுடுதண்ணீர்விட்டு 6-மணி நேரம் மைபேரலரைத்து குன்றி மணியல்வளவு பெரிய மாத்திரைகள்செய்து உலர்த்திக்கொண்டு காலை, மாலை ஒரு மாத்திரை வீதம் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

- (2) பெர்ரி சல்பஸ் (Ferri Sulphus) கிரைன்ஸ் 16
எக்ஸ்டிராக்ட் ஒபியம் லிக்ஞட் (Extract Opium Liquid) துளி 15
லைக்கர் மாக்னிஷியா (Liquor Magnesia) அவுன்ஸ் 2
சிரப் சிஞ்ஜிபர் (Syrup Zingiber) ,, 1

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல், 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத் திற் கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

- (3) சோடியம் பைகார்ப் (Sodium Bicarbe) டிராம் 1
லைக்கர் பிஸ்மத் (Liquor Bismuth) ,, 2
சிரப் டோலு (Syrup Tolu) ,, 2
ஆக்குவா கரூய் (Aqua Carui) அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு 1-முதல், 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற் கொருத் தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

அஜீரணவயிற்றுப் பொருமல் :—

அதிசாரவயிற்றுப் பொருமலென்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

அஜீரண வயிற்றோட்டம் :—

அதிசாரமென்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

குழந்தைகளுக்கு இரண்டாவது பற்கள்முளைக்கும்போது இது சாதாரணமாக உண்டாகலாம். சீதபேதியானது கிருமிகளின் செயற்கையினாலும், திரேகம் மிகுதியும் வெப்பங்கொண்டு விடுவதினாலும், ஆகாரங்களில் சர்க்கரையும், மாவும் அதிகமாக உபயோகிப்பதினாலும், சீனி, வெல்லப்பாருகளினால் தயாரிக்கப்படும் மிட்டாய்களை எதேஷ்டமாக உட்கொள்ளுவதினாலும் ஏற்படக்கூடியதாக விருக்கிறது.

சீதபேதியிலும், சிறுகுடல், பெருங்குடல் புண்பட்டு அடிக்கடி மலம் கழியும்; கழியும் மலத்துடன், இரத்தம் கலந்தும், சீதமென்றுச் சொல்லப்பட்ட மூக்குச்சளிப்போன்ற பிசுபிசுப்பான வெண்ணிற பதார்த்தம் கலந்து மிருக்கும்; முதலில் ஆசனவாய்க்கடுப்புடன் மலம் கொஞ்சமாகக்கழிந்து பின் தொப்புளையும் அடிவயிற்றையும் பிசைந்து வலித்து, சீதமும் இரத்தமும், விழுதும், சிலசமயம் மலத்துடன் சீதமும் இரத்தமும், மாமிசம் கழுவி யிணை நீர்போலும் கலந்து கழிவதுமுண்டு. இதனால் பசி, மந்தம், அரோசிகம் ஏற்படலாம்; நாவில் வெண்ணிற மாவு படிந்திருப்பதுமுண்டு இவ்வியாதியில் காரம் சேர்க்காத ஆகாரங்களே கொடுத்து வரவேண்டும் தயிர் மோர் இவைகளை எதேஷ்டமாகச் சேர்க்கலாம்.

சிகிச்சை

(1) சீரகம் ரூபாயெடை 3 கொட்டைக்காரத்தை ரூபாயெடை 3

ஒன்று சேர்த்து மைபோலரைத்து கால் ரூபாயவ்வளவு பெரிய பில்லை களாக்கி பசுநெய்யில் வறுத்து காலை மாலை ஒரு பில்லை வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) சீரகம் ரூபாயெடை 1 கடுக்காய்ப்பூ ரூபாயெடை 4
வெங்காயம் ,, 2

ஒன்று சேர்த்து இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூரணித்து காலையில்மட்டும் ½-ரூபாயெடை சூரணத்தை 1½, 2-அவுன்ஸ் எருமைத் தயிரில் கலக்கிக் கொடுத்துவரலாம்.

(3) சீரகம் ரூபாயெடை 7 சீனாகற்கண்டு ரூபாயெடை 1

முதலில், சீரகத்தை இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூரணித்துக்கொண்டு பின் கற்கண்டையும் சூரணித்துச்சேர்த்து காலை மாலை அரை ரூபாயெடைச் சூரணம் வீதம் பசுநெய்யில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

(4) ஒத்தை வெள்ளைப்பூண்டை அதிகமாயெடுத்து ஒவ்வொன்றிற்கும் தனித்தனியே கறியுப்பை அரைத்துக் கனமாகக் கவசம்செய்து உயிர் காந்தலில் வெதுப்பி யெடுத்து, உப்புக்கவசத்தை நீக்கி வெள்ளைப் பூண்டை மட்டும் அரைத்து, காலையில்மட்டும் கழற்சிக்காய்ப் பிரமாணம் 1, 1½-அவுன்ஸ் எருமைத் தயிரில் கலக்கிக் கொடுத்து வரலாம்.

(5) வெந்தயம்	ரூபாயெடை 1	மாதளம்பழத்தோல்	ரூபாயெடை 1
நெல்லிவற்றல்	„ 1	கறிவேப்பிலை	„ 1
சுண்டைவற்றல்	„ 1	ஓமம்	„ 1
மாம்பருப்பு	„ 1		

ஒன்றுசேர்த்து உலர்த்தி இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூரணித்து காலை யில் மட்டும் $\frac{1}{2}$ -ரூபாயெடைச் சூரணத்தை எருமைத் தயிரில் கலக்கிக் கொடுத்து வரலாம்.

(6) புளியாரை	ரூபாயெடை 8	வாழைப்பு	ரூபாயெடை 8
--------------	------------	----------	------------

ஒன்றுசேர்த்து பிட்டவியலாய் அலித்துப் பிழிந்தசாறு அவுன்ஸ் 1, 1½-ல் அரைத் தேக்கரண்டி தேன் சேர்த்து இந்த அளவாகக் காலை மாலை கொடுத்துவரலாம்.

(7) சுக்கு	ரூபாயெடை 8	கண்டத்திப்பிலி	ரூபாயெடை 1
கிராம்பு	„ 1		

ஒன்றுசேர்த்து எருமைத் தயிரில் மைபோலரைத்து சுத்தமான வெள்ளைத் துணிகளில் சிறு சிறு முடிச்சாக முடித்து, ஒரு சட்டியில் 24-அவுன்ஸ் எருமை மோர்விட்டு அதில் முடிச்சுகளைப்போட்டு எரித்து, முடிச்சுகள் வெந்து மேலேயிதக்கும் சமயம் எடுத்து, அத்துடன் தேன் ரூபாயெடை 1-ம், நெய் ரூபாயெடை 1½-ம் சேர்த்துக் குழப்பி, கழற்சிக்காய்ப் பிரமாணமாகக், காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

(8) மாம்பருப்பு	ரூபாயெடை 1	கறிவேப்பிலை	ரூபாயெடை 1
-----------------	------------	-------------	------------

ஒன்றுசேர்த்தரைத்துப் பிழிந்தசாற்றில் 4-மணி ரோத்திற் கொருத் தேக்கரண்டிவீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(9) மாசிக்காயைப் பொடித்து, நெய்யில் வறுத்துத் தூள்செய்துவைத்துக் கொண்டு நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை, 5, 10-கிரான்ஸ் வீதம் தேனில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.	
---	--

(10) காய்த்த வில்வப்பழத்தின் ஒடு, ரூபாயெடை மூன்றரைப் பொடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுதடவை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.	
--	--

(11) கடுக்காப்பு	ரூபாயெடை 3	கோகம்	ரூபாயெடை 1
வெங்காயம்	„ 1		

ஒன்று சேர்த்து இளவறுப்பாய் வறுத்து, 6 அவுன்ஸ் எருமைத் தயிரில் அரைத்துக் கலக்கி காலையில்மட்டும் 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (12) மாதுளம்பிஞ்சு ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$ சேகம் ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$
கொத்தமல்லி ,, $\frac{1}{4}$ கீழ்க்காய்நெல்விவேர் ,, $\frac{1}{4}$

ஒன்று சேர்த்துச் சுடுதண்ணீர் விட்டரைத்துக் கால மாலே கழற்சிக்காயளவாகக் கொடுத்து வரலாம். தயிரன்னம் கொடுக்கவும்.

- (13) இளநீர்த் தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1 சுக்கு ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$
எலுமிச்சம்பழச்சாறு ,, 1 சேகம் ,, $\frac{1}{8}$
தாழைவிழுந்தின்சாறு ,, 1

சுக்கையும், சேகத்தையும் இளவறுப்பாய் வறுத்துத் தூள்செய்து சாற்றுடன் சேர்த்துக் கலந்து, கால மாலே 1, 1½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (14) லகுக்கிராணி மாத்திரை; லகு சங்குவடி; அயச்செந்தூரம்; மகா தாளிச் சப்பத்திரிச் சூரணம்; ராஜ அம்ஸபோடலி மாத்திரை; ஜாதி பலாதிச் சூரணம் முதலியவைகளை லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம் செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

- (15) பல்விஸ் கைனோ (Pulvis Kino) கிரைன்ஸ் 6
பல்விஸ் கிரீட்டா அரோமாட்டிக்கம் ஒபியம் (Pulvis
Creta Aromaticum Opium) ,, 9
பிஸ்மத் சப்நைட்ரஸ் (Bismuth Subnitras) ,, 6

ஒன்று சேர்த்து, 3-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 4-மணி நேரத்திற் கொருபாகம் வீதம், தேனில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

- (16) டோவர்ஸ் பவுடர் (Dover's powder) கிரைன்ஸ் 1½
பல்விஸ் கிரீட்டா அரோமாட்டிக் (Pulvis Creta
Aromatic) ,, 9

ஒன்று சேர்த்து, 3-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணிகேரத்திற் கொருதடவை ஒரு பாகத்தை தேனில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

- (17) மன்னா ஆப்டிமா (Mannae Optima) கிரைன்ஸ் 15
சிரப் சென்னா (Syrup Sennae) துளி 15
சிரப் டோலு (Syrup Tolu) ,, 15
லைக்கர் மாக்னிஷி கார்போனஸ் (Liquor Magnesi
Carbonas) டிராகம் 4

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 3-தடவை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(18) டிஞ்சர் ஒபியம் (Tincture Opium)	துளி	4
அக்கேஷியா கம்மி (Acasia Gummi)	அவுன்ஸ்	$\frac{1}{2}$
தண்ணீர்	"	1

ஒன்று சேர்த்து, அதிகமான இரத்தமும் சீதமும் கழிவதற்கு பீச்சாக் குழலால் ஆசனத்தின் வழியே சிரஞ் செய்யலாம்.

உஷ்ணக் கழிச்சல்:—

வெப்பக்கழிச்சலென்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

சுரணைக் கழிச்சல்:—

இது கணைரோகத்தி லேற்படக்கூடிய கழிச்சல் வியாதி. இதிலும் கணை ரோகக் குறிகளுமிருக்கும். சுரம் இலேசாகக்கூடியும்; கை கால் குளிரும்; மலம் மாமிசம் கழுவியத் தண்ணீர்ப்போன்று சிறிது கருப்பாயும்; மாமிசம் கரைந்ததுபோலும் கழியும். சில சமயங்களில் மலமானது தயிர்க் கட்டிகளைப்போலும், சீதம் சலந்தும் கழிவதுண்டு.

சிகிச்சை

(1) வெந்தயம்	ரூபாயெடை $\frac{3}{4}$	வெங்காயம்	ரூபாயெடை 1
சேகம்	"	$\frac{1}{2}$ கருவேலம் ஈர்க்கு	" 1

இவற்றைப் பொடித்து, 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 8-அவுன்ஸ் லாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், காலை மாலை 1, 1 $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) முத்திருக்கஞ்சாறு	அவுன்ஸ் 32	ஒரிலைத்தாமரைச்சாறு	அவுன்ஸ் 32
சாரணத்திச்சாறு	" 32	செந்நெருஞ்சிச்சாறு	" 24
முடக்கொத்தான்சாறு	" 32	சிற்றாமணக்கெண்ணெய்	" 32
மூக்குரெட்டைச்சாறு	" 32	மயிலிறகு	ரூபாயெடை 4

ஒன்று சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து, காலையில் மட்டும் 1, 1 $\frac{1}{2}$ -தேக் கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(3) நாரத்தை ஈர்க்கு ரூபாயெடை 1	இலந்தை ஈர்க்கு ரூபாயெடை 1
நெல்லி ஈர்க்கு " 1	கணைப்பூண்டு " 1
புளியீர்க்கு " 1	

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து, 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸ் லாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் காலை மாலை, 1, 1 $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(4) ஆவிக் காலிக் (Acid Gallic)	கிரைன்ஸ்	10
வைனம் ஒபியம் (Vinum Opium)	துளி	4

ஸ்பிரிட் வைனம் ரெக்டிபைட் (Spirit Vinum

Rectified)

டிபராம் 1½

ஆக்குவா குளோரோபாரம் (Aqua chloroform)

அவுன்ஸ் 1½

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல், 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு மூன்று தடவை ஒரு தேக்காண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

கழிச்சலு மிருமலும்:—

சில சமயங்களில் குழந்தைகளுக்கு வயிற்றோட்டத்துடன் இருமலு மிருப்பதாண்டு எந்தவிதமான வயிற்றோட்டத்துடனும் மிருமலு மிருந்தால் கீழ்க்கண்ட மருந்துகள் பிரயோசனமுள்ளதாக விருக்கும்.

சிகிச்சை

(1)	கடுக்காய்	ரூபாயெடை 1	சிறுதேக்கு	ரூபாயெடை 1
	நெல்லிக்காய்	,, 1	கோஷ்டம்	,, 1
	தான்றிக்காய்	,, 1	கோரைக்கிழங்கு	,, 1
	சுக்கு	,, 1	ஆடுதின்னாப்பாளையிலை	,, 1
	வசம்பு	,, 1	ஆடுதின்னாப்பாளேவர்	,, 1
	மிளகு	,, 1	இன்புரூயிலைச்சாறு	அவுன்ஸ் 82
	அதிமதுரம்	,, 1	பசுநெய்	,, 24

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்துப்போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து காலை மாலை ஒரு தேக்காண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்

(2)	எருமைவெண்ணெய்	வேலிப்பருத்திச்சாறு	அவுன்ஸ் 5
	ரூபாயெடை 5	கருஞ்சீரகம்	ரூபாயெடை 5

ஒன்றுசேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து காலை மாலை ஒரு தேக்காண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(3)	பெப்ஸின் (Pepsin)	கிரைன் 1
	ஆவியட் ஐட்ரோகுளோரிக் டில் (Acid Hydrochloric Dil)	துளி 3
	சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti)	,, 80
	இன்பியூஷன் குவாஷியா (Infusion Quassiae)	டிபராம் 5

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல், 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஆசாரத்திற்குப் பின் ஒரு தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

கழிச்சலும் வாந்தியும்:—

சில சமயம் குழந்தைகளுக் கேற்படும் வயிற்றோட்டத்துடன் வாந்தியு மிருப்பதாண்டு. வாந்தி இலேசாக விருந்தால் தனிப்பட்ட சிகிச்சைகள் ஒன்றும் தேவையில்லை. வாந்தி யதிகமாகவிருக்கும் படித்தில் சிகிச்சை செய்யவேண்டிய தவசியமாகும்.

சிகிச்சை

- (1) அரசம்பட்டை ரூபாயெடை 1 பருத்திப்பிஞ்சு ரூபாயெடை 1
 அத்திப்பட்டை ,, 1 அத்திக்கொழுந்த ,, 1
 நெல்லிப்பட்டை ,, 1 பருத்திவிரைப்பருப்பு ,, 1
 மாம்பட்டை ,, 1

ஒன்று சேர்த்திடித்து, 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸ் ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

வயிற்றோட்டத்திற்குண்டான மருந்துகளி் லொன்றையும் கொடுத்து வரலாம்.

கழிச்சல் :—

வயிற்றோட்டமென்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

சலக் கழிச்சல் :—

அடிக்கடி மலம் தண்ணீராகவே கழியும்; சில சமயம், மலம் கலந்திருக்கும் ஆகாரம் தின்றவுடன் மலம் கழிந்தால், தின்ற ஆகாரம் உருக்குலையாமல் தண்ணீருடன் கலந்து வெளிப்படும்.

சிகிச்சை

- (1) அத்திப்பால் ரூபாயெடை ½ வெள்ளைக்குன்றிமணிபருப்பு
 புளியங்கொட்டை ரூபாயெடை ½
 மேற்றோல் ,, ½

ஒன்று சேர்த்து மைபோலரைத்து, காலை மாலை ஒரு கழற்சிக்காயளவு சமன் எருமை வெண்ணெயுடன் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) ஒரு முத்தின சாதிக்காயை துளைத்து, அதில் ஒரு மிளகளவு அபினி பைச் செலுத்தி, முழு சாதிக்காய்க்கும், அரைத்த மஞ்சளால் ஒரு விரல் கனத்துக்குக் கவசம் செய்து, உயிக்காந்தலில் போட்டுப் புரட்டி மஞ்சள் தீய்ந்தது மெடுத்து, மஞ்சட்கரியை நீக்கிவிட்டு, சாதிக் காயையும், அபினியையும் அப்படியே முலைப்பால் விட்டு 2-மணிநேரம் மைபோலரைத்து, கடுகுக்குஞ் சற்றுப் பெரிய மாத்திரைகள் செய்து, காலை மாலை ஒரு மாத்திரை முலைப்பாலில் கொடுத்து வரலாம்.

- (3) மிக்சர் ஒலியம் ரெவினி (Mixture Oleum Ricini) டிராம் 2
 லைக்கர் பிஸ்மத் (Liquor Bismuth) துளி 15
 டிஞ்சர் ஒபியம் (Tincture Opium) ,, ■
 ஷக்குவா மெந்தாபிப் (Aqua Menthapip) அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 4-மணி நேரத்திற் கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(4) எக்ஸ்ட்ராட் ஒபியம் லிக்டுட் (Extract Opium Liquid) துளி	20
பெர்ரி சல்பஸ் (Ferri Sulphus) கிரைன்ஸ்	16
லெக்கர் மாக்கினிஷியா (Liquor Magnesia) அவுன்ஸ்	2
சிரப் சிஞ்ஜிபர் (Syrup Zingiber) "	1

ஒன்றுசேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 3-மணி நேரத்திற் கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

சன்னிபாத சுரத்திலுண்டாகும் கழிச்சல்—Diarrhoea in Typhoids

சன்னிபாத சுரத்தில் வயிற்றோட்ட மிருப்பது இபற்கையாகும். மலம் அடிக்கடி குழம்பாகவும், கெட்ட நாற்றத்துடனும் கழியும். சில சமயம் மாமிசம் கழுவியத் தண்ணீர்போலவும் கழியும். மலம் அதிகமாய்க்கழிந்தால், மலப்பிரவர்த்தியை சமனப் படுத்தவேண்டும்.

சிகிச்சை

(1) எக்ஸ்ட்ராட் ஹெமாடாக்ஸிலி (Extract Hematoxyli) கிரைன்ஸ்	20
வைனம் இப்பிக்காக் (Vinum Ipecac) துளி	25
வைனம் ஒபியம் (Vinum Opium) "	15
இன்பியூஷன் கலம்பா (Infusion Calumbae) அவுன்ஸ்	2

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 4-மணி நேரத்திற்கொரு தேக் கரண்டியளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

சீத பேதி:—

இரத்தக் கழிச்ச லென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

சுரக்கழிச்சல்:—Febrile Diarrhoea

திரேகோஷ்டணம் அதிகப்பட்டு, அடித் தொடையும், ஜீல்களும், புண் வலியாக விருக்கும். உடலாதிவந்தமு மெரிச்சலுண்டா யிருக்கும். ஓயாத வயிற்றோட்டமும், மயக்கமு முண்டாகும். மலம் குழம்பாகவும், தண்ணீராகவும் கழியும். இரும்பும், நாவரசியும், நீரடைப்புங் காணும்.

சிகிச்சை

(1) அத்திபட்டை ரூபாயெடை	10	அதிவிடையம் ரூபாயெடை	$\frac{1}{4}$
மாதளங் சொழுந்தி "	10	அபினி "	$\frac{1}{4}$
சாதிக்காய் "	$\frac{1}{4}$	சேகம் "	$\frac{1}{4}$
சாதிபத்திரி "	$\frac{1}{4}$	மிளகு "	$\frac{1}{4}$

கடுக்காய்	„	$\frac{1}{4}$ கருஞ்சீரகம்	„	$\frac{1}{4}$
தான்றிக்காய்	„	$\frac{3}{4}$ ஏலம்	„	$\frac{1}{2}$

முதலில், அத்திப்பட்டையையும், மாதளங் கொழுந்தையும் பொடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சி ஒரு மவ்ரு பாத்சிரத்தில் வடிகட்டிவைத்துக்கொண்டு, இதர சர்க்குளே மைபோலரைத்து பில்லையாகத்தட்டி அந்த பில்லையின் இருபுறமும் அரசனிலையால் சுற்றி ஞாலால் கட்டி, ஒரு புதுமண்சட்டியை அடுப்பின்மேல் கவிழ்த்து, தீயெரித்து, அந்தப் பில்லையைச் சட்டியின்மேல் வைத்து தீய்ந்துபோகாத படி, கஷாயத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவிட்டு ஒரு மணிநேரம் வேகவைத் தெடுத்து பின் இலையைக்கி, மறுபடியும் அந்தக் கஷாயத்தை விட்டு மைபோலரைத்து, பட்டாணிக் கடலையளவாக மாத்திரைகள் செய்து உலர்த்தி, காலையில் எருமைத்தயிரை வடிகட்டிய தண்ணீர் 1-அவுன்ஸில் ஒரு மாத்திரைவீதமும், சாயந்திரத்தில் 1-அவுன்ஸ் சுடுதண்ணீரில் ஒருமாத்திரை வீதமும் கொடுத்து வரலாம்.

(2) எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஹெமாடாக்ஸிலி (Extract)

Hematoxyli)	ஹைரன்ஸ்	20
வைனம் இப்பிக்காக் (Vinum Ipecac)	துளி	25
வைனம் ஒபியம் (vinum Opium)	„	15
இன்பியூஷன் கலம்பா (Infusion Calumbae)	அவுன்ஸ்	■

ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 4-மணிநேரத்திற்கொரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்து இடை நேரங்களில் சுரத்தை மட்டுப்படுத்தும்படியான சுரப் பொதுமருந்துகளி லொன்றையும் கொடுத்துவரலாம்.

தோஷக் கழிச்சல்:—

தோஷரோகத்தில் சாதாரணமாகக் கழிச்சலுமிருக்கு மென்றாலும், அதிகமானக் கழிச்சலேற்பட்டால், தோஷரோகத்தின் வீரியத்தை யதிகரிக்கச் செய்யுமாயினால், கழிச்சல் அதிகமாயிருந்தால் மட்டுப்படுத்த வேண்டியது.

சிகிச்சை

(1) மஞ்சள்	ரூபாயெடை 1	கோரைக்கிழங்கு	ரூபாயெடை 1
வசம்பு	„ 1	தேவதாரு	„ 1
அதிமதுரம்	„ 1	கடுக்காய்	„ 1

ஒன்று சேர்த்து, பொடுதலைச்சாற்றில் மைபோலரைத்து, பட்டாணிக் கடலையவ்வளவு பெரிய மாத்திரைகள் செய்து உலர்த்திக்கொண்டு, காலையில் ஒரு மாத்திரை வீதம் தேனில் சூழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) கால்வரி பாஸ்பஸ் (Calcii Phosphas)	கிரைன்ஸ்	9
கம் அக்கேஷியா (Gum Acasia)	"	15
சிம்பிள் சிரப் (Simple Syrup)	துளி	45
தண்ணீர்	டிராம்	3

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(3) டிஞ்சர் காஸ்காரில்லா (Tincture Cascarillae)	துளி	25
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti)	டிராம்	1
கம் அக்கேஷியா (Gum Acasia)	கிரைன்ஸ்	30
தண்ணீர்	டிராம்	8

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை, ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

நாள்பட்டக் கழிச்சல்—Chronic Diarrhoea

விடாக் கழிச்சலென்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

நீர்க் கழிச்சல்:—

சலக் கழிச்சலென்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

பச்சிலைச்சாறுபோல் கழிதல்—Green Motion Diarrhoea

குழந்தைகள் பச்சிலையைக் கசக்கிப் பிழிந்த சாறுபோலவே கழிவதுண்டு மலம் தண்ணீராகவும், பச்சையாகவும், நுரைக் கலந்துமிருக்கும்; மலம் கழிக்கும்போது சப்தமுண்டாகும்; இது தோஷ ரோகத்தினாலாவது, கணரோகத்தினாலாவது யேற்படலாம்.

சிகிச்சை

(1) அதிமதுரம்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	சகஸ்திரபேதி	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
ஏலம்	"	$\frac{1}{2}$	

ஒன்று சேர்த்து, 2-அவுன்ஸ் நீராகாரம் (பழயசாதத்தின் நீர்) விட்டு அரைத்துக் கலக்கிக் காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) ஆவிரிட் லாக்டிக் (Acid Lactic)	துளி	18
கிளிசரின் (Glycerine)	அவுன்ஸ்	1
தண்ணீர்	டிராம்	8

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 2-மணிநேரத்திற் கொருதரம், ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(3) டிஞ்சர் ஒபியம் (Tincture Opium)	துளி	8
பெர்ரி சல்பஸ் (Ferri Sulphus)	கிரைன்ஸ்	4

சிரப் சிஞ்ஜிபர் (Syrup Zingiber)	டி.ராம்	1
லைக்கர் மாக்னிஷி கார்போனஸ் (Liquor Magnesi Carbonas)		8

ஒன்றுசேர்த்து 1-முதல், 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 3-தடவை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

பலவிதமாய்க் கழிதல்—Polychromatic Diarrhoea

குழந்தைகளுக்குக் கேற்படும் கழிச்சலில் இது ஒரு வகையானது. சில சமயம் மலம் தண்ணீராகவும், மாவு கரைத்ததைப்போல் வெண்மையாகவும், நுரையாகவும், மஞ்சளாகவும், முட்டையை உடைத்து ஊற்றியதைப் போலும், கழிவதுண்டு. இந்தக் கழிச்சல் அநேகமாக தோஷவியாதியிலேற்படுவ தென்றாலும், கணைரோகத்திலும், மாந்தரோகத்திலும் இத்தக் கழிச்சலிருப்பதுண்டு. குழந்தைகள் திரேகம் ஸ்வேணிக்கும்; திரேகம் சதகதப்பாகவு மிருக்கும்; நாவாண்டு கண்கள் குழிவிழுந்திருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) வெங்காயச்சாறு	அவுன்ஸ் 1	அதிமதூரம்	ரூபாயெடை 1
பருத்திபிஞ்சுச்சாறு	„ 1	குப்பைக்கீரை	„ 1
அரசம்பட்டைச்சாறு	„ 1		

குப்பைக்கீரையையும், அதிமதூரத்தையும் ஒன்றுசேர்த்து சாற்றை விட்டரைத்து காலு மாலு ஒரு கழற்சிக்காயளவு 2-அவுன்ஸ் வெள்ளாட்டுப் பாலில் கரைத்த வடிகட்டிக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) சோடியம் பைகார்ப் (Sodium Bicarb)	கிரான்ஸ் 10
பல்விஸ் ரீயை (Pulvis Rhei)	„ 1
ஆக்குவர அனிதி (Aqua Anithi)	டி.ராம் 4

ஒன்றுசேர்த்து 1-முதல், 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணிநேரத்திற்கொருமுறை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

பல் முளைக்கும்போதுண்டாகும் கழிச்சல்—Diarrhoea in Dentition

குழந்தைகளுக்கு முதற் பல் முளைக்கும்போதும், இரண்டாம் பல் முளைக்கும் போதும் வயிற்றோட்டம் காண்பதுண்டு. அடிக்கடி அஜீரணக் கழிச்சலைப்போல் மலம் தண்ணீராயும், குழம்பாயும் கழியும்.

சிகிச்சை

- (1) வாழைப்பூவையும், புளியாரையையும் சமமாக இடித்து, பிட்டவியலாக அவித்து பிழிந்தெடுத்த சாற்றில் காலு மாலு ஒரு அவுன்ஸ் சாற்றில் ஒரு தேக்கரண்டி தேன் சேர்த்துக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) பிஸ்மத் கார்போனஸ் (Bismuth Carbonas)	கிரைன்ஸ்	12
சாலல் (Salol)	"	3
பல்விஸ் டிராககன் கோ (pulvis Tragacanth Co)	"	18
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti)	டிராம்	1
ஆக்குவா அனித்தி (Aqua Anithi)	"	5

ஒன்று சேர்த்து, 3-மணி நேரத்திற்கொருத் தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(3) பொட்டாஸியம் புரோமைட் (potassium Bromide)	கிரைன்ஸ்	10
சிரப் டோலு (Syrup Tolu)	டிராம்	1½
ஆக்குவா அனித்தி (Aqua Anithi)	"	5

ஒன்று சேர்த்து, 4-மணி நேரத்திற்கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

பாற்போற் கழிதல்:—

குழந்தைகளின் ஆகாரக் கேடுகளினால், பாற்போல் கழிவதேற்படலாம். மலம் அடிக்கடி மாவைக்கரைத்ததைப்போல் வெண்ணிறமாகக்கழியும்.

சிகிச்சை

(1) பெருந்தும்பையிலை	ஒருபிடி	கஸ்தூரிமஞ்சள்	ரூபாயெடை ½
பிரண்டையிலை	"	கருஞ்சீரகம்	" ½
கோரோசனை	ரூபாயெடை ½		

முதலில் பெருந்தும்பை யிலையையும், பிரண்டை யிலையையும் மூலைப் பால் விட்டிடித்துப் பிழிந்த சாறு அவுன்ஸ் 1, 1½-ல் மூன்று சரக்கையும் சேர்த்து பொடித்த குரணம் ரூபாயெடை ½-போட்டுக் கலக்கி காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

(2) டிஞ்சர் ரீயை கோ Tincture Rhei Co)	துளி	20
அமோனியம் குளோரைட் (Ammonium Chloride)	கிரைன்ஸ்	8
சோடா சாலிசிலஸ் (Soda Salycilas)	"	6
சிரப் சிம்பிள் (Syrup Simple)	துளி	20
ஆக்குவா அனிவி (Aqua Anisi)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 2-மணி நேரத் திற்கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

பொருமற் கழிச்சல்:—

அகிசார வயிற்றுப் பொரும வென்றத் தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

பொருமற் வயிற் றோட்டம்:—

அகிசார வயிற்றுப் பொருமவென்றத் தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

மாந்தக் கழிச்சல் :—

மாந்தரோகத்திலேற்படும் கழிச்சலில், மலம் பலவிதமாயிருக்கும்; சில சமயம் துரையாகவும், குழம்பாகவும், தண்ணீராகவும், பாசிபோலும், முட்டை வெண்கருவைப்போலு மிருக்கும்; திரோகோஷ்டம் மிகுதிப் பட்டிருக்கும். உள்ளங்கை, உள்ளங்கால் இவற்றில் குழிவிழுந்து இழுக்கும். வாய் உலர்ந்து குரல் கம்பிவிடும்; வார்தியும் மயக்கமு முண்டாகும்.

சிகிச்சை

(1) ஓமம்	ரூபாயெடை	1½	கடுக்காய்	ரூபாயெடை	5
சுக்கு	„	1½	வசம்பு	„	1
மிளகு	„	1½	சாரணத்திவோர்	„	2
திப்பிலி	„	1½	வேலிப்பருத்தியிலை	„	1
வெள்ளைப்பூண்டு	„	1½	பொடுதலைக்கொழுந்து	„	1
பெருங்காயம்	„	1½	பெருந்தும்பையிலை	„	1
கருஞ்சீரகம்	„	1½			

இவற்றை யெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து, இளவறுப்பாய் வறுத்து பொடுதலைச்சாற்றால் ஒருமணிகோமும், பெருந்தும்பைச் சாற்றால் 2-மணி கோமும், அரைத்து, சுண்டக்காயளவாக மாத்திரைகளாகச் செய்து உலர்த்திக்கொண்டு, காலை மாலை ஒரு மாத்திரைவீதம் சுடுத்தண்ணீரில் கரைத்துக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

(2) வேலிப்பருத்தியிலை	ஒருபிடி	அகத்திப்பழுப்பு	ஒருபிடி
குப்பைமேனியிலை	„	வெள்ளைப்பூண்டு	ரூபாயெடை ½
தைவேளையிலை	„	வசம்பு	„ ½
நாய்வேளையிலை	„		

ஒன்று சேர்த்துத் தட்டிப்பிழிந்த சாற்றில் காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் உள்நுக்கும் கொடுத்து உடம்பிலும் பூசிவரலாம்.

(3) டிஞ்சர் காட்டிகியூ (Tincture Catechu)	துளி	15
பல்விஸ் கிரிட்டா அரோமாட்டிக் (pulvis Creta Aromatic)	கிரைன்ஸ்	■
ஸ்பிரிட் குளோரோபாரம் (Spirit Chloroform)	துளி	■
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 4-மணி கோத்திற் கொரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(4) மெக்னிஷியம் கார்போனஸ் (Magnesium Carbonas)	கிரைன்ஸ்	3
பிஸ்மத் சப்நைட்ரஸ் (Bismuth Subnitras)	„	4½
பல்விஸ் ரூபார்ப் (pulvis Rhubarb)	„	3

ஒன்று சேர்த்து, 3-பாகமாகப் பிரித்து ழடித்துக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக்குழந்தைகளுக்கு 4 மணிநேரத்திற்கொருபாகம், தேனில் குழப்பிக் கொடுத்துவரலாம்.

முட்டை உடைத்ததைப்போல் கழிதல்:—

இக்கழிச்சல் அநேகமாய் தோஷரோகத்தில்தான் ஏற்படலாம். கழியும் மலமானது, முட்டையின் வெள்ளைக் கருவைப்போன்று, வருவழுப் பாகவும், கொக்கின் மலம்போன்றுமிருக்கும்.

சிகிச்சை

- (1) அவரையிலே ஒருபடி வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை 1
வேலிப்பருத்தியிலே ,, எருமைவெண்ணெய் ,, 3

ஒன்று சேர்த்து, வெண்ணெயில் போட்டு, இலைகள் வறுபட்டதும் நெய்யை வடித்து, காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் முலைப்பாலுடன் ஒரு தேக்கராண்டி நெய் சேர்த்துக் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) டிஞ்சர் ஒபியம் (Tincture Opium) துளி 1
பெர்ரி சல்பஸ் (Ferri Sulphus) கிரைன்ஸ் 4
சிரப் சிஞ்சிபர் (Syrup Zingiber) டிராம் 1
லைக்கர் மாக்னிஷியா கார்போனஸ் (Liquor Magnesia Carbonas) ,, 3

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒரு தேக்கராண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

- (3) டிஞ்சர் நக்ஸ் வாமிகா (Tincture Nux Vomica) துளி 1
சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb) கிரைன்ஸ் 6
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti) டிராம் 1
இன்பியூஷன் ஜென்ஷன் கோ (Infusion Gentian Co) ,, 3

ஒன்றுசேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 3-தடவை ஒரு தேக்கராண்டிவீதம் கொடுத்து வரலாம்.

வயிற்றுவலியுடன் வயிற்றோட்டம்:—Colic Diarrhoea

ஜீரணியாத ஆகாரம் வயிற்றிலிருந்து புளிப்பேறி யிருந்தாலும், வயிற்றுள் நாகுப்பூச்சிகள் விசேஷித்திருந்தாலும், ஜீரணிக்கக்கூடாத கல், மண் போன்ற இதர பொருட்கள் வயிற்றுள்ளிருந்தாலும், வயிற்றோட்டமும், வயிற்றுவலியு முண்டாகலாம். திரோகத்தில் அதிக உஷ்ணம் யேற்பட்டிருந்தாலும், வயிற்றுவலியோடு வயிற்றோட்டமுமுண்டாகும்.

ஜீரணியாத ஆகாரம் வயிற்றுள்ளிருந்து புளிப்பேறியதானால் வயிறு பொருமி வயிற்றை இலேசாகப் பிசைந்து வலித்து இரைச்சலுடன் மலம்

* விஷமானது; ஜாக்கிரதையாக உபயோகிக்க வேண்டும்.

கழியும் மலம் கழிந்ததும் வயிற்றுவலி நின்றவிடும். இவ்விதமாகவே ஒவ்வொரு தடவையும் மலம் கழியும்போது வயிற்றுவலி புண்டாகும் நாக்ரூப்பூச்சி, கிரோப்பூச்சி இவைகள் வயிற்றுள் விசேஷித்துவிட்டால் மெது மெதுவாக இரைப்பையிலும் ஏறி, அவற்றின் வாயிலிருந்து கசியும் ஒருவிதப் பதார்த்தத்தினால் வயிற்றோட்டத்தை யுண்டுபண்ணும். கிருமிகளாலுண்டாகும் வயிற்றோட்டத்தில் ஒக்காளமு யிருக்கும். கிருமிகள் ஒன்றுசேர்ந்து குடலில் சுருண்டு புரளுவதினால் வயிற்றைச் சுருட்டி இழுத்து வலியுண்டாகிறது. இந்த வயிற்றோட்டத்தில் மலம் அடிக்கடி கழிந்தாலும், வயிற்றுவலிமட்டும் இருந்துகொண்டே யிருக்கும். சிலசமயம் மலத்துடன் நாக்ரூப்பூச்சிகளும், கிரோப்பூச்சிகளும் விழுவதுமுண்டு.

கல், மண் போன்ற ஜீரணிக்கக்கூடாத இதரப் பதார்த்தங்கள் வயிற்றுள்ளிருக்குமானால், வயிற்றுப்பிசியில்லாமலே வயிறு நிறைந்திருப்பதைப் போலும், கல்போலு யிருக்கும்; மலம் தண்ணீராய்க் கழியும்; வயிற்றில் சிறு வலியிருக்கும்.

காங்கையினால் வயிற்றுவலியும், வயிற்றோட்டமுமேற்பட்டால், வயிற்றைப் பிசைத்து வலித்து, ஆசனவாய் கடுத்து புருபுருவென்ற சிப்தத்துடன் மலம் கபிலகிறமாக நுரைக்கலந்து கழியும்; அடிக்கடி வயிற்றில் வலி புண்டாகி மலம் குழம்பாகவே கழியும்; ஆசனவாய் அதிகம் கடுக்கும்.

சிகிச்சை

(1) அதிவிடயம் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	கோரைக்கிழங்கு ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
தேவதாரு ,, $\frac{1}{2}$	மிளகு ,, $\frac{1}{2}$
வட்டத்திருப்பி - ,, $\frac{1}{2}$	வெட்பாலையரிசி ,, $\frac{1}{2}$
வாய்விளக்கம் $\frac{1}{2}$	

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 8-அவுன்ஸாகச் சுண்டடக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) ஒலியம் ரெசினி (Oleum Ricini)	டிராம் 2
ஒலியம் கரியோபில்லம் (Oleum Caryophyllum)	துளி 3
கம் அக்கேஷியா (Gum Acasia)	டிராம் $1\frac{1}{2}$
சிரப் சிஞ்ஜிபர் (Syrup Zingiber)	2
ஆக்குவர மெந்தா பிப் (Aqua Mentha Pip)	அவுன்ஸ் 1

முதலில் ஒலியம் ரெசினியையும், ஒலியம் கரியோபில்லத்தையும், கம் அக்கேஷியா சேர்த்து அரைத்துக்கொண்டு பின் மற்றவைகளைச் சேர்த்துக் கலக்கி, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற்கொரு தரம் ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

விடாக் கழிச்சல்—Chronic Diarrhoea

இது நாட்பட்ட கழிச்சல். கழிச்சலுக்கு சிகிச்சைகள் செய்தும் நிற்காமல் பேரய்க் கொண்டிருந்தாலும், அற்பமாக நினைத்து சிகிச்சை ஒன்றும் செய்யாமல் நீடித்த நாட்களாக வயிற்றோட்டம் இருந்துவந்தாலும் விடாக் கழிச்சலென்று சொல்லப்படும்.

சிகிச்சை -

(1) ஒரு முற்றிய சாதிக்காயைத் துளைத்து, அதனுள் ஒரு குன்றிமணியல் வளவு அபினியைச் செலுத்தி, மஞ்சளை யரைத்து முழு சாதிக்காய்க்கும் ஒரு விரல் கனத்தில் கவசம்செய்து உயிர்காந்தலில் போட்டுப் புரட்டி, மஞ்சள் தீய்ந்தவுடன் எடுத்து, மஞ்சள்கரியை போக்கிவிட்டு, சாதிக்காயையும், அபினியையும் ஒன்றாக முலைப்பால்விட்டு ஒருமணி ரேரம் மைபோலரைத்து; கடுகவ்வளவு பெரிய மாத்திரைகள் செய்து காலை மாலை ஒரு மாத்திரை வீதம் முலைப்பாலில் கொடுத்து வரலாம்.

(2) அதிவிடயம் ரூபாயெடை 1	வெட்பாலேவிரை ரூபாயெடை 1
சுக்கு ,, 1	கொத்தமல்லி ,, 1
சீமைநிலவேம்பு ,, 1	சீந்தில்தண்டு ,, 1
கோரைக்கிழங்கு ,, 1	தாமரைவளையம் ,, 1
வில்வப்பிஞ்சு ,, 1	வெட்டிவேர் ,, 1
குருவேர் ,, 1	செஞ்சந்தனம் ,, 1

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து, 24 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் ஒரு அவுன்ஸ்வீதம் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளைக் கொடுத்துவரலாம்.

(3) காச்சுக்கட்டி ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	கோரோசனை ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
கனிப்பாக்கு ,, $\frac{1}{2}$	சீரகம் ,, $\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்து எலுமிச்சம்பழச் சாற்றால் மைபோலரைத்து காலை மாலை கழற்சிக்காயளவு முலைப்பாலில் கலந்து கொடுத்து வரலாம்.

(4) அதிசார மாத்திரை; லகு அதிசார மாத்திரை; லகு கட்டுவாங்க மாத்திரை; பயிர்வவடி; ஜாதிபலாதிச் சூரணம்; அயச்செந்தூரம்; மகாதாளிசபத்திரிச் சூரணம்; ராஜ அம்ஸபோடலி மாத்திரை; முதலியவை கனிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம்பாகம் பார்க்கவும்.

(5) எக்ட்ராக்ட் ஹெமாடாக்ஸ்லி (Extract Hematoxly)	கிரைன்ஸ்	20
வைணம் இப்பிக்காக் (vinam Ipecac)	துளி	25
வைணம் ஒபியம் (vinum Opium)	,,	15
ஆக்குவா சின்னமோனி (Aqua Cinnamoni)	அவுன்ஸ்	3

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக்குழந்தைகளுக்கு 4-மணிநேரத்திற் கொரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(6) ஆவிட் காலிக் (Acid Gallic)	கிரைன்ஸ்	10
வைனம் ஒபியம் (Vinum Opium)	துளி	8
ஸ்பிரிட் வைனம் ரெக்டிபைட் (Spirit Vinum Rectified)	டிராம்	1½
ஆக்குவா குளோரோபாரம் (Aqua Chloroform)	அவுன்ஸ்	1½

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணிநேரத்திற் கொரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(7) டிரூசர் ஒபியம் (Tincture Opium)	துளி	8
பெர்ரி சல்பஸ் (Ferri Sulphus)	கிரைன்ஸ்	4
சிரப் சிஞ்ஜிபர் (Syrup Zingiber)	டிராம்	1
லேக்கர் மாக்னிஷி கார்போனஸ் (Liquor Magnesi Carbonas)	டிராம்	■

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, நாள் ஒன்றுக்கு 3-தடவை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(8) சோடியம் பைகார்போனஸ் (Sodium Bicarbonas)	கிரைன்ஸ்	20
லேக்கர் பிஸ்மத் (Liquor Bismuth)	டிராம்	2
■ டிரூசர் நாக்ஸ் வாமிகா (Tincture Nux Vomica)	துளி	12
டிரூசர் கார்டமம் கோ (Tincture Cardamom Co)	டிராம்	1
லேக்கர் மார்பைன் ஐட்ரோகுளோரைட் (Liquor Marphin Hydrochloride)	துளி	4
ஆவிட் ஐட்ரோசினியாக் டில் (Acid Hydrocyniac Dil)	"	5
ஆக்குவா குளோரோபாரம் (Aqua Chloroform)	அவுன்ஸ்	2

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, நாள் ஒன்றுக்கு 3-தடவை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

வெப்புக் கழிச்சல்—Febrile Diarrhoea

இது உஷ்ணத்தினாலேற்படும் கழிச்சல், தினேகம் மிகுதியும் உஷ்ணமடைந்து விடுவதினால், குடல்களிலுள்ள வழுவுழுப்பான ஊசல்கள் வரண்டு இது யேற்படுகிறது. மலம் கழிக்கும்போது, குடல், ஆசனவாய் இவைகள் யெரியும். மலம் நெகிழ்த்தியாய் புருபுரு வென்ற சப்தத்துடனும், கபில நிறமாயும் கழியும். சில சமயம் மலம் இருகிணை மஞ்சள் நிறமாகவு மிருக்கும். மலம் கழிந்தவுடன் மறுபடியும் மலம் வருவதைப் போலிருக்கும் ஆசனவாய்கடுப்பும், ஆயாசமும் படபடப்புமுண்டாகும்; ஆகாரவெறுப்பும், அடிவயிற்றில் கடுப்பும் வலியுமிருக்கும்.

■ விஷமானது; ஜாக்ரதையாக உபயோகிக்க வேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) அதிவிடயம் ரூபாயெடை 1 - சீரகம் ரூபாயெடை 1
அதிமதுரம் ,, 1 மாதளம்பூ ,, 1
சாதிக்காய் ,, 1

ஒன்று சேர்த்து, புளியாரச்சாற்றால் மைபோலரைத்து, சுண்டக் காயளவு மாத்திரைகளாகச் செய்து, காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் மாதளம் பழச் சாற்றிலாவது, காய்ந்த மாதளம் பழத்தோல் கஷாயத்திலாவது கொடுத்து வரலாம்.

- (2) சதையுடன் காய்ந்த வில்வப்பழத்தோடு ரூபாயெடை ஒன்றை 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம். இரத்தக் கழிச்சலுக்குச் சொல்லிய மருந்துகளி லொன்றையும் கொடுத்து வரலாம்.

- (3) சோடியம் கிரிஸோடேட் (Sodium Cresotate) கிரைன்ஸ் 12
ஸ்பிரிட் அமோனியம் அரோமாட்டிக் Spirit
Ammonium Aromatic) துளி 24
எக்ஸ்ட்ராக்ட் கிளிசிரிஸா லிக்குட் (Extract Glycyrrhiza
Liquid) டிராம் 1½
ஆக்குவா அனித்தி (Aqua Anithi) ,, 3

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத் திற் கொரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

- (4) மன்னா ஆப்டிமா (Mannae Optima) கிரைன்ஸ் 20
சிரப் சென்னா (Syrup Sennae) துளி 80
சிரப் டோலு (Syrup Tolu) ,, 80
லாக்சர் மாக்னீஷியம் கார்போனஸ் (Liquor Magnesium
Carbonas) டிராம் 4

ஒன்று சேர்த்து 6-மாதமுதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நாள் ஒன் றுக்கு 3-தடவை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

கரப்பான்—செவ்வாப்பு
ERUPTIONS—DERMATITIS

கரப்பான் சர்மத்தைப்பற்றிய வியாதி. அது தொத்தும் குணமுடை யது. கரப்பான் சொறியிலிருந்து கசியும் நீர் இதர குழந்தைகளுக்குப் பட் டால் அவர்களுக்கும் கரப்பான் சொறி உண்டாகிவிடும். கரப்பான் சொறி களையும், புண்களையும் சுத்தமாய் வைத்துக்கொள்ளாதி னாலேயே, அது

சீக்கிரம் ஆராமலு மிருப்பதுந் தவிர; அந்த நீர்பட்ட விடங்களிலெல்லாம் மறுபடியும் சிரங்குகளை உற்பத்தியாக்கிவிடுகிறது.

கரப்பான் குழந்தைகளுக் கேற்படும் சாதாரண சர்மவியாதியாக விருந்தாலும், சீக்கிரத்தில் குணமாகாமல் உபத்திரவத்தைக் கொடுக்கக் கூடியதாக விருக்கிறது. கரப்பானில் புண்ணுகள் காய்ந்தபின் தழும்புகளிருப்பதில்லை. இது 5-வயதுக் குட்டப்பட்ட குழந்தைகளுக்கே அதிக முண்டாகிறது.

ஆரம்பத்தில் சர்மம் சிவந்து சிறு நமச்சல்கள்போல லுண்டாகி, நமச்சல்களில் நீர் சேர்ந்து சொறிவதினால் தோல் எடுபட்டு சிவந்து வீங்கி புண்ணாகி விடும். பின் அதிலிருந்து நீர் கசிந்துகொண்டே யிருக்கும். சில நாள் நீர் வடிந்தபின் பக்குக்கட்டி காய்ந்துவிடும். பக்கை பெயர்த்துவிட்டால் மறுபடியும் அதில் வெள்ளைப்பக்குகள் கட்டிக்கொண்டு நமச்சல்திகரிக்கும். நமச்சல் தாங்கமாட்டாமல் சொறிய, மறுபடியும் நீர்க்கோத்து, நீர் கசிந்து பக்கங்களிலும் பரவ ஆரம்பித்துவிடும்.

கரப்பான் தொத்தும் கிருமிகளால் (Acarus Scabies) சர்மத்தில் ஸ்திரம்பெற்று யேற்படுகிறது. இது விசேஷமாக அஜீரணரோகங்களிலும், பல் முளைக்கும்போதும் ஏற்படலாம். மேலும் கரப்பான் அதி பலயீனமான குழந்தைகளையே அதிகம் உபத்திரவிக்கும். முதல் கரப்பான் ஆரம்பத்திலிருந்து 15-தினத்தில் அது காய்ந்து மறுபடியும் பக்கத்திலேற்படும். இவ்விதமாகவே காய்ந்து காய்ந்து புண்ணுகள் சினைக்கும்.

கரப்பான் புண்ணுகளைத் துடைத்தத் துணியில் கரப்பான் கிருமிகள் தொத்திக்கொண்டு பிறருக்காவது, பிற இடங்களிலாவது துடைக்கும்போது அங்கும் கரப்பான் பரவி விடும். விசேஷமாகக் கரப்பான் துடைக்கும் துணியின் உதவியால் தொத்திக்கொள்வதா யிருப்பதால் இதைத் "துவாலிச் சிரங்கு" (Napkin Rash) என்று ஆங்கிலேயர்கள் கூறுகிறார்கள்.

கரப்பான் ரோகம் 18-வகையென்று தமிழ் வைத்திய நூற்கள் கூறுகின்றன; ஆனால், அத்தனைவிதமாக ஆங்கில வைத்திய சாஸ்திரம் ஒருமித்துக் கூறாமல் தனித்தனி வியாதியாகவே கூறுகின்றது. நாம் இந்நூலில் கூறியுள்ள சர்ம ரோகங்களின் எண்ணிக்கையைக் கீழ்கூறப்பட்டவிதமாகப் பிரித்து, ஒவ்வொன்றிற்கும் சிகிச்சைகளைத் தனித்தனியே கூறிவந்திருக்கிறோம்.

கரப்பான் வகையாவன :—

அக்கி	ஊமைச்சிரங்கு	கால்கடுவன்
அரைக்கரப்பான்	எச்சிறற்றழம்பு	கால்கரப்பான்
அழுக்கச்சிரங்கு	எளிகரப்பான்	கொள்ளிக்கரப்பான்
■ திரக்கரப்பான்	கபாலக்கரப்பான்	சிறுசிரங்கு
ஊதுகரப்பான்	கருங்கரப்பான்	சூலைக்கரப்பான்

செங்கரப்பான்	காய்முள்	பொரிகரப்பான்
செந்தி	படர்தாமரை	மண்டைக்கடுவன்
சொறிகரப்பான்	பாலகரப்பான்	மண்டைக்கரப்பான்
சொறிரங்கு	புடைகரப்பான்	யானைச்சிரங்கு
தாடைச்சிரங்கு	பூதக்கரப்பான்	வரட்சிக்கரப்பான்
தேமல்	பெருஞ்சிரங்கு	விஷவாதக்கரப்பான்
நமட்டுச்சிரங்கு	பேய்சொறி	வீங்குக்கரப்பான்

அக்கி:—

கொள்ளிக் கரப்பானென்றத் தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

அரைக்கரப்பான்:—Vulva Eczema

இது பெண்குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே யேற்படும். வயிற்றிலுள்ள கிரைப் பூச்சியென்று சொல்லப்படும். அரை அங்குல நீளமுள்ள வெள்ளிய கிருமிகள், எதேஷ்டமாகப் பெருகி, இரவில் நித்திரை செய்யும்போது ஆசனவாய் வழியே வெளியேறி, யோனித் துவாரத்தின் வழியே உட் சென்று, குடைவதினாலாவது, அக்கிருமிகளின் மலகிரைக் கக்குவதி னாலாவது, பொறுக்கமுடியாத நமச்சல் யேற்பட்டு, சொறிவதினால் சிறுவியர்க்குருபோன்று உண்டாகி, சொறியச் சொறிய புண்ணாகி விடும்.

கடிதடத்திலும் (1-ம் பக்கம் பார்க்கவும்) யோனித்துவாரத்திலும் இந்நீர் கோர்வைகள் அதிகமாகி புண்பட்டு, பக்குக் கட்டிக்கொண்டு ஆராம லிருக்கும். ஓயாத நமச்சலுண்டாகி எப்போதும் சொறிந்தகொண் டிருக்கும்படியான நிலமை ஏற்பட்டுவிடும்; இது பெருந்துடையிலும், அடிவயிற்றிலும் படருவதுமுண்டு. இந்தக்கரப்பான் சொறி உண்டா யிருக்கும், குழந்தைகளுக்கு யோனியிலிருந்து தயிர்போன்ற வெண் ணிறமான பதார்த்தம் கசிந்துக்கொண்டிருப்பதுமுண்டு. இதையே வெள்ளை (206-ம் பக்கம் பார்க்கவும்) வடிதவென்று சொல்லப்படும்.

சிகிச்சை

- (1) வேலிப்பருத்திவேர்ப்பட்டை எருக்கம்பேர்ப்பட்டை ரூபாயெடை 1
ரூபாயெடை 1 வெள்ளைப்பூண்டு ,, 1
வட்டக்கிலுகிலுப்பைவேர் கடுக்காய் ,, 1
பட்டை ,, 1 நல்லெண்ணெய் அவுன்ஸ் 12
மதுக்காரைவேர்ப்பட்டை ,, 1

இவற்றைப் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி, காலை மாலை சுட்ட இலுப்பை அரப்பினால் நன்றாகத் தேய்த்துக் கழுவியபின்னர் வெளிப்பிர யோகமாகத் தடவிவரலாம். (பத்தியம்)

(2) கொட்டைக்காரந்தேவர்		வேலிப்பருத்திவேர் மேல்தோல்	
ரூபாயெடை 2		ரூபாயெடை 2	
சிறுசெருப்படிவேர்	,,	மின்காணை வேர்மேல்தோல்	,,
வல்லாரைவேர்	,,	கோடகசாலைவேர்மேல்தோல்	,,
கரிசலாங்காணிவேர்	,,	பெருங்கிளாவேர்மேல்தோல்	,,
பொன்னாங்காணிவேர்	,,	அவுரிவேர்மேல்தோல்	,,
பெய்மருட்டிவேர்	,,	தரைப்பசலை	,,
சிறுகீரைவேர்	,,	வசம்பு	,,
வட்டத்திருப்பிவேர்	,,	நெருமணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 12
சதுரக்கள்ளிவேர்	,,	2	

பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, காலை மாலை 2-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

கார்பான்மேற் பிரயோக மருந்துகளையும், உட்பிரயோக மருந்துகளையும் கொடுத்து வரலாம்.

வெளிப்பிரயோகமாக சுத்திசெய்ய கார்பாலிக் லோஷன்:—
(Carbolic Lotion)

(3) கார்பாலிக் ஆவீட் (Acid Carbolic)	அவுன்ஸ்	1
சுடுத்தண்ணீர்	,,	50

ஒன்றுசேர்த்து நன்றாகக் கலக்கிக்கொண்டு தினம் 2, 3-முறை நன்றாகப் புண்ணைச் சுத்திசெய்து தண்ணீரில்லாமல் ஒற்றியபின் கீழ்க்கண்ட மருந்துகளிலொன்றை மேல் பூசி வரலாம்.

(4) போரிக் காவீட் (Acid Boric)	டி.ராம்	1
பிரிபேர்ட் சாக் (Prepared Chalk)	,,	1
ஒன்றுசேர்த்து மேல்பிரயோகமாகப் புண்ணின்மேல் தூற்றி வரலாம்.		

(5) ஐட்ரார் ஜரி கம் கிரீட்டா (Hydrargeri Cum Creta)	டி.ராம்	1
சிங் ஆக்ஸைட் (Zinc Oxide)	,,	
ஒன்று சேர்த்து மேல் பிரயோகமாகப் புண்ணின்மேல் தூற்றிவரலாம்.		

அழுசச் சிரங்கு:—

யானைச் சிரங்கென்ற தலைப்பின்பீழ் பார்க்கவும்.

உதிரக் கரப்பான்:—

இந்தக் கரப்பான் ரோகத்தில் சுரமும் இலேசாய்க் காயும்; உடலிலெந்த பாகத்திலாவது சொறிக்கண்டு புண்பட்டுவிடும். அதில் பக்குக்கட்டி இரத்தம்போன்ற ஊன்னீர் வடிந்துகொண்டே விரும்பும்; சொல்ல முடியாத நமச்சலேற்படும்.

சிகிச்சை

(1) எருக்கம்பழுப்புச்சாறு	நல்லெண்ணெய்	அவுன்ஸ்	24
அவுன்ஸ்	12	சுக்கு	ருபாயெடை 8
தைவேளையிலைச்சாறு	12	திப்பிலி	3
மணித்தக்காளியிலைச்சாறு	24	மிளகு	3
வெற்றிலைச்சாறு	24	வசம்பு	3

பொடிக்க வேண்டியவற்றைப் பொடித்துப்போட்டு காய்ச்சி வடித்துவைத்துக்கொண்டு சாலை மாலை புண்ணைச் சுட்ட இலுப்பை அரப்பால் தேய்த்துக் கழுவியபின் இந்த எண்ணெயை வெளிப்பிரயோகமாக மேல் தடவி வரலாம்.

தினம் சாலை மாலை ■ கார்பாலிக் லோஷனாலும், (Carbolic Lotion) கரப்பான் கழுவுநீராலும் † சுத்திசெய்துவிட்டுக் கீழ்க்கண்ட மருந்துகளை மேல் பிரயோகமாகத் தடவி வரலாம்.

(2) சந்தன எண்ணெய் (Sandal Wood Oil) யை மேல்தடவி வரலாம்.

(3) சிங் ஆக்ஸைட் (Zinc Oxide)	டிராம்	1
லனோலின் (Lanolin)	"	4
சல்பர் பிரிசிபிட்டேட் (Sulphur precipitate)	கிரான்ஸ்	15
வாசலின் (Vaseline)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்றுசேர்த்து மேல் பிரயோகமாகத் தடவி வரலாம்.

ஊதுக்கரப்பான்:—

அற்பசுரத்துடன் குளிர் நடுக்கம் கண்டு உடல்வீங்கும்; உடலில் எந்தப் பாகத்திலாகிலும் சிறு கழலைகள்போன்ற கொப்புளங்கள் உண்டாகி, அவற்றில் நீர்க்கோர்த்து வெடித்து புண்ணாகும்; ஊதுக்கரப்பான் விசேஷமாக மூக்கில்தான் அதிக முண்டாகும். மூக்குத் துவாரங்கள் மேல் உதடு முதலியவைகள் சீழ்ப்பிடித்துப் பக்குக்கட்டி புண்ணாக விருக்கும்.

சிகிச்சை

கருநொச்சியிலை	ருபாயெடை 3	கொடிவேலி	ருபாயெடை 3
கழற்சியிலை	" 3	வெள்ளை அறுகு	" 8
முடக்கொத்தானிலை	" 3	சிவனார்வேம்பு	" 1
செங்கத்தாரிப்பட்டை	" 1	கண்டங்கத்திரிவேர்	" 8
கிரந்திராயகம்	" 8	வேம்பாடம்பட்டை	" 8
சிறுசெருப்படை	" 8	சீதகரப்பன்ப்பட்டை	" 3
சுங்கனவேர்	" 8	சிவதைவேர்	" 3

■ 236-வது பக்கம் 3-வது இலக்கம் பார்க்கவும்.

† கரப்பான் பொது கழுவுநீரைப் பார்க்கவும்.

சங்கன்குப்பிவேர்	„	3	கருஞ்சேகம்	„	3
சிறுசின்னி	„	■	சேகம்	„	3
வேலிப்பருத்தி	„	3	சிறுமணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ்	48
முதியார்க்கூந்தல்	„	3			

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, காலை மாலை ஒரு தேக்காண்டியளவுவாகக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

கர்ப்பான் பொது மேல்பூச்சு மருந்துகளி் லொன்றையும், உட்பிரயோ^{சு} மருந்துகளி் லொன்றையும் உபயோகித்து வரலாம்.

ஊமைச் சிரங்கு—Psoriasis

இந்தச் சிரங்குக் கிருமிகள் முதல் முதல் கைவிரல்களின் இடுக்குகளில் ஆதிக்கம் பெற்று சிறுநகம்சல்லை உண்டாக்கும். நகம்சல்கள் வியர்க்குறுபோலிருக்கும்; ஆனால், நீர் கோர்த்திருக்காது நகம்சல் தாங்க முடியாதபடி யிருக்கும். சொரிய கையைவைத்து விட்டால் கையை எடுக்க மனதில்லாதிருக்கும். கைவிரல்கள் இடுக்குகளிலிருந்து மெது மெதுவாகக் கைமுழுமையும் திரோகத்திலும் பரவிவிடும். ஊமைச் சிரங்கு உண்டானதிலிருந்து உருவில் பெருப்பது மில்லை. சீழ் கொள்ளுவதுமில்லை. அழுத்திச் சொறிந்தால் சற்று நீர் கசியும்.

சிகிச்சை

- (1) அரிதாரம் ரூபாயெடை 1 தருசு ரூபாயெடை 1
கெந்தகம் „ 1 தேங்காய்ப்பால் அவுன்ஸ் 12

இவற்றைப் பொடித்துத் தேங்காய்ப்பாலில்போட்டு எண்ணையாகும் வரை காய்ச்சி வைத்துக்கொண்டு காலை மாலை சிரங்கை சுட்ட இலுப்பை அரப்பால் நன்றாகத் தேய்த்துக் கழுவி இந்த எண்ணையை மேல்தடவி வரலாம்.

- (2) சந்தனம் ரூபாயெடை 1 ரோடிமுத்து ரூபாயெடை 1

ஒன்று சேர்த்துத் தண்ணீர்விட்டு மைபோலரைத்துக் கொண்டு, காலை மாலை சிரங்கை சுட்ட இலுப்பை அரப்பால் தேய்த்துக் கழுவியபின் பூசி வரலாம்

- (3) அங்குவண்டம் ஜட்ராஜரி (Unguentum Hydrargeri) டிராம் ½
சிங் ஆக்ஸைட் (Zinc Oxide) „ 1
டைலியூட்டட் சிட்ரின் ஆயன்ட்மென்ட் (Dilluted Citrin Ointment) அவுன்ஸ் ½
வாசலின் (Vaseline) „ 1

ஒன்று சேர்த்து, காலை மாலை சிரங்கை * கார்பாலிக் லோஷனால் கழுவி சுத்திசெய்து, மேல்பிரயோகமாகத் தடவி வரலாம்.

* 236-வது பக்கம் 3-இலக்கம் பார்க்கவும்.

(4) ஆவிர்ட் கார்பாலிக் (Acid Carbolic) துளி ■
 பிஸ்மத் சப்நைட்ரஸ் (Bismuth Subnitrates) டிராம் ½
 அங்குவண்டம் ஐட்ரார்ஜரி (Unguentum Hydrargeri) அவுன்ஸ் 1
 ஒன்று சேர்த்து காலை மாலை * கார்பாலிக் லோஷனில் சுத்தி செய்த
 பின் மேல்பிரயோகமாகத் தடவி வரலாம்.

(5) லனோலின் (Lanoline) அவுன்ஸ் 1
 ஆயில் ஒலிவ் (Oil Olive) டிராம் 1
 ஒன்று சேர்த்து, ஒன்றுவிட்டொருநாள் * கார்பாலிக் லோஷனில்
 சுத்தி செய்தபின் மேல்பிரயோகமாகத் தடவி வரலாம்.

(6) ஐட்ரார்ஜரி அமோமாத் (Hydrargeri Ammomat) கிரான்ஸ் 15
 லைக்கர் பிகிஸ் கார்போனஸ் (Liquor picis Carbonas) டிராம் 1
 வாசலின் (vaseline) அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து குழம்பாக்கி * கார்பாலிக் லோஷனில் காலை மாலை
 சுத்தி, செய்து மேல் பிரயோகமாக மட்டும் சிரங்கின் மேல் தடவி வரலாம்.

(7) பொட்டாஷியம் ஐயோடைட் (Potassium Iodide) கிரான்ஸ் 8
 கிளிசரின் (Glycerine) துளி 45
 தண்ணீர் அவுன்ஸ் ½

ஒன்றுசேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 3-
 வேளை, வேளைஒன்றுக்கு ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் உள்ளுக்குக் கொடுத்து:—

லைக்கர் பிகிஸ் கார்போனஸ் (Liquor picis Carbonas) டிராம் 1
 அங்குவண்டம் சாலிஸிலிக் (Unguentum Salicylic) அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து காலை மாலை * கார்பாலிக் லோஷனில் சுத்திசெய்து
 மேல் பிரயோகமாக மட்டும் சிரங்கின் மேல் தடவி வரலாம்.

எச்சிற்றழும்பு:—

தேமலென்றத் தலைப்பின்மீழ் பார்க்கவும்.

எரிகரப்பான்:—

இது முழங்காலின் கீழ்பாகமாகிய கிரண்டைக்காலிலும், கணுக்கைக்கு
 மேல் பாகத்திலுமட்டும் உண்டாகக்கூடியதோர் வியாதி. இந்தச் சிரங்கு
 திரேகத்தின் இதரபாகங்களில் உண்டாவதில்லை.

ஆரம்பத்தில் திரேகோஷ்ணம் சற்று அதிகமாக விருக்கும்; நாசியிலிருந்து
 நீர் வடிந்துகொண்டே விருக்கும்; கிரண்டைக்காலிலும், முன் கையி

* 236-வது பக்கம் 3-இலக்கம் பார்க்கவும்.

லும் கொசுக்கடிப்போன்ற நமச்சல்கள் உண்டாகி பின் ஏகமாய் புண்ணாகி விடும். புண் திச்சட்டதைப்போன்ற எரிச்சலுள்ளதா யிருக்கும்.

கிரண்டைக்காலிலும், முன்கையிலும் ஏகத்திற்குப் பரவி சர்மமே இல்லாமல் புண் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து புண் மயமாகவே யிருக்கும்; ஆனால் புண்ணும் ஆழமாவது மில்லை. இதில் எரிச்சலும் வலியும் அதிகமாக யிருக்கும்.

சிகிச்சை

கரப்பான் பொது மேற் பிரயோக மருந்துகளையும், உட்பிரயோக மருந்துகளையும் உபயோகித்து வரலாம்.

கபாலக் கரப்பான்—Porrigo Favosa

இது தலை மயிர்க்கால்களுக்குள் சிறு நமச்சல் கொப்புளங்களாக உண்டாகி சினைத்து அதிலிருக்கும் நீர் வியர்வைபுடன் கலந்து தலைமுழுவதிலும் பரவி பக்குக்கட்டி பெரும்புண்ணாகி தலைமயிரை ஒன்றோடொன்று சேர்த்துத் துர்நரற்றத்தை புண்டாக்கும். சில சமயங்களில் முகங்களிலும், அதிலிருந்து உடல் முழுவதும் கூட பரவிவிடும்.

புண்ணுகள் மிருதுவாகவும், மஞ்சள் வெள்ளை முதலிய நிறங்களில் பக்குக் கட்டிக்கொண்டு யிருக்கும்; புண்ணைச்சுற்றிலும் சிவந்து தடித்திருக்கும்; திரேகம் சுற்றுக் கதகதப்பாகவே யிருக்கும்; கண்ணில் நமச்சலுடன் நீர் வடிந்துக்கொண்டிருக்கும்; காகியிலிருந்தும் நீர்வடியும்; புண் அதிகமான அரிப்புள்ளதாகயிருக்கும்; இதில்தலைமயிர் இருப்பதால்புண் ஆறுவதற்கு அறுகூலமின்றி யிருக்கும்; ஆதலால், கபாலக் கரப்பானுக்குச் சிகிச்சை செய்யுமுன் தலைமயிரை சுத்தமாக வெட்டி எடுத்துவிடவேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) இரவில் நெற்றாமணக்கிலையை வதக்கி புண்ணுகளில் வைத்துக் கட்டி யிருந்து, காலை யில் கட்டை அவிழ்த்து; சுட்ட இலுப்பை யரப்பினால் சுத்தமாகத் தேய்த்துக்கழுவி சுத்தமான தேங்கா யெண்ணெயைத் தடவி அதன்மேல் பீனரிச்சல்களிலையைச் சட்டியில் போட்டு வறுத்த சாம்பலை தூவிவரலாம். அத்துடன் கீழ்க்கண்ட எண்ணெயையும் உள் ளுக்குக் கொடுத்து வரலாம்.

பாவட்டையிலே ரூபாயெடை	■	வசம்பு	ரூபாயெடை	5
இலுப்பைப்பட்டை	,,	5	நெற்றாமணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 24
வெங்காயம்	,,	5		

ஒன்று சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து, காலை மாலை ஒரு தேக்காண்டி வீதம் உள் ளுக்குக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்)

(2) பொன்னாக்காணிவேர்	மலைத்தாங்கிவேர்	ரூபாயெடை	8
ரூபாயெடை 3	அதிமதுரம்	„	1
சூதுவேளைவேர் „	3 கடுக்காய்	„	1
செவ்வல்லிக்கிழங்கு „	3 கடுகுரோகணி	„	1
ஒரிலைத்தாமரைவேர் „	3 கருஞ்சேரகம்	„	1
நரிமுருக்கன்வேர் „	3 சுக்கு	„	1
சங்கன்வேர் „	3 திப்பிலி	„	1
கொன்றைவேர் „	3 மிளகு	„	1
நிலவேம்பு „	3 வெள்ளைப்பூண்டு	„	1
சிவஞர்வேம்பு „	3 வசம்பு	„	1
குப்பைமேனிவேர் „	3 வெளிச்சிப்பிசின்	„	1
கோரைக்கிழங்கு „	3 கல்லெண்ணெய்	அவுன்ஸ்	32

ஒன்றுசேர்த்துப் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, காலை மாலை ஒருதேக்கரண்டி யளவாக உள்நுக்கும்கொடுத்து, காலைமாலை சுட்டிலுப்பை அரப்பினால் சுத்தமாகத் தேய்த்துக் கழுவி புண்ணிலும் தடவிவரலாம்.

(8) ஆலிட் பிக்ரிக் (Acid Picric)	கிரான்ஸ்	8
காம்பர் (Camphor)	டிராம்	4
ஆல்கோஹால் (Alcohol 90 o/o)	„	4

ஒன்று சேர்த்து வெளிப்பிரயோகமாகப் புண்ணின்மேல் காலை மாலை தடவி வரலாம்.

குறிப்பு:—இந்த மருந்தை தடவி வருவதால், திராவகம் ஆவிடாய்ப் போனபின் புண்ணின்மேல் மஞ்சளான வஸ்து காய்ந்துபோ யிருக்குமாதலால், வாரத்திற்குநதரம் ■ கார்பாலிக் லோஷ்னிஸூலாவது † கரப்பான் பொது கழுவுரீராலாவது சுத்திசெய்து வரவும்.

(4) அமோனியேட்டட் மெர்குரி (Ammoniated Mercury)	கிரான்ஸ்	8
ரெட் ஆக்ஸைட் ஆப் மெர்குரி (Red Oxide of Mercury),	„	6
ஒலியம் அமிக்டாலி (Oleum Amygdalae)	துளி	4
பென்ஸோடேட் லார்ட் (Benzoated Lard)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்து களிம்பாகச் செய்துகொண்டு, மாலை மாலை ■ கார்பாலிக் லோஷ்னூலாவது, † கரப்பான் பொது கழுவுரீராலாவது, சுத்தி செய்தபின் மேல்பிரயோகமாக மட்டும், தடவி வரலாம்.

* 236-ம் பக்கம் 3-இலக்கம் பார்க்கவும்.

† கரப்பான் பொது கழுவுரீரைப் பார்க்கவும்.

கருங்கரப்பான்:—Black Eczema

இது அக்கி இனத்தில் சேர்ந்த ஒரு சொறிப்புண்ணாகும். திரேகம் சிறிது கதகதப்பாகவும்; கிறம் மாறியுமிருக்கும்; திரேகத்திலுள்ள பச்சை நரம்புகளெல்லாம் நன்றாகக் கண்ணுக்குத் தெரியும்; முகத்திலும் முழங்கால்களுக் கடிபாகத்திலும் நமச்சல்களேற்பட்டு சொறிவதினால் புண்ணுண்டாகும்; புண் கருநிறமாயும், அதிலிருந்து வடியும் ஊன்னீர் கரு நிறமாகவுமிருக்கும்.

சிகிச்சை

கரப்பான் பொது உள்பிரயோக மருந்துகளையும், வெளிப்பிரயோக மருந்துகளையும் உபயோகித்து வரலாம். செக்கரப்பானுக்குச் சொல்லியுள்ள எண்ணெய், கெய் இவைகளி லொன்றையும் கொடுத்து வரலாம்.

கால்கடுவன்:—

இது குழந்தைகளுக்கு பாதத்தின் மேலும், முழங்கால்களுக்குக் கீழு முள்ள, கிரண்டை யென்ற பாகத்தில்மட்டும் வரக்கூடிய ஒருசொறிப் புண்; இதரபாகங்களில் இது உண்டாவதில்லை; சில குழந்தைகளுக்கு ஒரேபக்கத்துக் காலிலும், மற்றும் சில குழந்தைகளுக்கு இரண்டு கால் களிலுமே யேற்படுவதுண்டு.

முதல் முதல் புண்ணுண்டாகும் அறிகுறிகள் ஒன்றும் வெளிக்குத் தோற்றது. குழந்தை அடிக்கடி சொறிந்துகொண்டிருக்கும்; சொறிவதனால் சர்மம் வறண்டு அதிலிருந்து, சிறு நமச்சல் கொப்புளங்களுண்டாகி பின் சர்மமேயில்லாது "முழங்காலிலிருந்து கணுக்கால்வரை யேகத் திற்கும் ஒரே புண்ணாகவிருக்கும்.

சிகிச்சை

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| (1) வெங்காயம் ரூபாயெடை 2 | சதுரக்கள்ளிப்பட்டை ரூபாயெடை 2 |
| வசம்பு | 2 |
| " | பாலமரத்துப்பட்டை |
| இலுப்பைப்பட்டை | 2 |
| " | சிறுமணக்கெண்ணெய் அவுன்ஸ் 12 |

இவற்றைத் தண்ணீர் விட்டு மைபோலரைத்து எண்ணெயுடன் கலக்கிக் காய்ச்சி வடித்து, காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டிவீதம் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்)

- (2) சுட்ட இலுப்பை அரப்பினால் காலை மாலை தேய்த்து சுடுதண்ணீர் விட்டுக்கழுவி, செம்மரத்தை யுரைத்துப் பூசுவரலாம்.
- (3) சுட்ட இலுப்பை அரப்பினால் காலை மாலை தேய்த்து சுடுதண்ணீர் விட்டுக் கழுவி, கோவைத் தண்டை சிறுதுண்டுகளாக வெட்டிவைத் திருக்க அதிலிருந்து வரும்பாலுத் தடவிவரலாம்.

- (4) சுட்ட இலுப்பை அரப்பினால் காலை மாலை தேய்த்து சுடுதண்ணீர் விட்டுக் கழுவி சந்தனமும் நீரடிமுத்தும் சமன் சேர்த்தரைத்துப் பூசி வரலாம்.
- (5) இரவில் சிற்றாமணக்கிலையை வதக்கி வைத்துக்கட்டி யிருந்து காலையில் சுட்ட இலுப்பை அரப்பினால் தேய்த்து சுடுதண்ணீரால் கழுவிய பின்னர் சுத்தமான தேங்காபெண்ணெயைத் தடவி அதன் மேல் சட்டியில் போட்டுக் கறுக்கிய சங்கங்குப்பியிலே சாம்பலைத் தூற்றி வரலாம்.

கபாலக் கரப்பானுக்குச் சொல்லியுள்ள மேல்பூச்சு மருந்துகளிலொன்றையும், உட்பிரயோக மருந்துகளிலொன்றையும், கரப்பான் பொது உட்பிரயோக மருந்துகளிலொன்றையும், மேல்பிரயோக மருந்துகளி லொன்றையும் உபயோகித்து வரலாம்.

கால் கரப்பான்:—

கார்க்கடுவனென்றத் தலைப்பின்பீழ் பார்க்கவும்.

கொள்ளிக் கரப்பான்—Erysipelas—St., Anthony's Fire

இதை அக்கி, செந்தி என்று சொல்லுவர். அக்கி முகத்தில் நாசுத்தண்டின் பேரிலாவது, காதுகளின் பக்கங்களிலாவது முகவாய்க்கட்டையி (தாடை)லாவது மட்டுமுண்டாகும். வேறிடங்களில் உண்டாவதில்லை, அக்கியுண்டாவதற்கு சில மணிநேரங்களுக்கு முன்னாவது சில நாட்களுக்கு முன்னாவது சுரம்பீ உண்டாகும். சுரமுண்டானபின் தான் அக்கி முகத்தில் நாசுத்தண்டின்பேரிலாவது, காதுகளின் பக்கங்களிலாவது, முகவாய்க் கட்டையிலாவது, சிவந்து வீங்கி பின் சிறுநாமச்சல்கள் தோன்றி இரண்டு மூன்று நாட்களில் நீர்க்கோர்த்து, கொப்புளங்களாக மாறி முகம் முழுவதுமே பரவி புண்ணாக்கி பக்குக் கட்டிக் கொண்டுவீடும்.

அக்கியுண்டான ஆரம்பத்தில், கண்ணிரப்பைகள் வீங்கி யிருந்து பின் வீக்கம் வற்றிவிடும். முதலு வலியும், சில சமயம் மலச்சிக்கலும் வாந்தியு மேற்படும். அக்கியில் வலி அதிகமாயிருந்தால் சில குழந்தைகளுக்கு இழுப்பு காண்பதுமுண்டு. அக்கிக்குச் சிகிச்சை செய்யுமுன் விரேசன காரிகளை (cathartics)க் கொடுத்து மலசுத்தி செய்யவேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) செம்மரத்தைத் தண்ணீர்விட் டுரைத்துப் பூசி வரலாம்.
- (2) காவிக்கட்டியைக் கரைத்துப் பூசி வரலாம்.
- (3) தரைபசுலைக் கீரையை ஆரைத்துத் தடவி வரலாம்.
- (4) சந்தன எண்ணெயைத் தடவி வரலாம்.

- (5) படுவனிலையை அரைத்து சமன் வெண்ணெய்யுடன் குழப்பிப் பூசி வரலாம்.
- (6) எலும்புச் சாம்பலுடன் வெண்ணெய் சேர்த்துக்குழப்பிப் பூசி வரலாம்.
- (7) பழயத்தோலை சுட்ட சாம்பலுடன் வெண்ணெய் சேர்த்துக் குழப்பிப் பூசி வரலாம்.
- (8) விழுதியிலைச்சாறு அவுன்ஸ் 24 தூதுவேளைச்சாறு அவுன்ஸ் 24
 சிற்றமணக்கெண் சிறுபூனைக்காஞ்சொறிசாறு ,, 24
 வெண் ,, 24 கரிசலாங்காணிச்சாறு ,, 24
 வெள்ளறுருச்சாறு ,, 24 சாரணத்திச்சாறு ,, 24
 சங்கங்குப்பியிலைசாறு ,, 24 கழற்சியிலைச்சாறு ,, 24
 சிவஞர்வேம்புச்சாறு ,, 24 கருநொச்சியிலைச்சாறு ,, 24
 பொடுதலைச்சாறு ,, 24 வெங்காயம் ரூபாயெடை 3
 நுணு (மஞ்சளெந்தி) இலைச் சருஞ்சேகம் ,, 3
 சாறு ,, 24

வெங்காயத்தையும், கருஞ்சேகத்தையும் பொடித்துப் போட்டு ஒன்று சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து, கால மாலை ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்து வரலாம். (கடுமபத்தியம்.)

- (9) டிஞ்சர் பெர்ரிபெர் குளோரைட் (Tincture Ferri perchloride) துளி 10
 கிளிசரின் (Glycerine) டிராம் 1
 தண்ணீர் ,, 3

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதிக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணிநேரத்திற்கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டியீதம் கொடுத்து 1 கார்பான் பொதுகழுவுநீரி லாவது * கார்பாலிக் லோஷனாலாவது வாயில்படாமல் கழுவி கீழ்க்கண்ட மேல் பூச்சு மருந்தகனி லொன்றையும் உபயோகித்து வரலாம்.

- (10) சாண்டல் வுட் ஆயில் (Oil Sandal Wood) டிராம் 1
 ஆயில் ஒலிவ் (Oil Olive) ,, 1

ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு முதலில் * கார்பாலிக் லோஷனாலாவது சந்தன சோப்பி (Soap) னாலாவது 1 கார்பான் பொது கழுவு நீரிலொன்றாலாவது வாயில்படாமல் சுத்தி செய்தபின் மேல் பிரயோகமாகத் தடவி வரலாம்.

- (11) ஆவிக் கார்பாலிக் (Acid Carbolic) டிராம் 1
 டிஞ்சர் ஐயோடின் (Tincture Iodine) ,, 1

† கார்பான் பொது கழுவு நீரைப் பார்க்கவும்.

* 248-பக்கம் 1-இலக்கம் பார்க்கவும்.

ஸ்பிரிட் வைனம் ரெக்டிபைட் (Spirit Vinum Rectified)	„	1
ஆயில் டிரிபிந்த் (Oil Terebinth)	„	2
கிளிசரின் (Glycerine)	„	5

ஒன்று சேர்த்து ■ கார்பாலிக் லோஷன் அல்லது சந்தன சோப்பினு (Soap) லாவது † கரப்பான் பொது கழுவு நீரிலொன்றாலாவது சுத்தி செய்தபின், காலை மாலை வெளிப்பிரயோகமாக மட்டும் மேல்தடவி வரலாம்.

சிறு சிரங்கு—Itch

சிரங்கு, கிருமிகளாலேற்படும் ஒரு தொத்து நோய். சிரங்குரோகக் கிருமிகள் சர்மத்தின் கீழ் தங்கி முட்டையிட்டுப் பெருகி புண்ணை விருத்தி செய்கிறது. பெருஞ் சிரங்கிற்குமிதற்கும் அதிகம் வித்தியாசமில்லை. சிறு சிரங்கு விசேஷமாய் இடுக்கான பாகங்களில் தான் அதிக நாள் தங்கி தொந்தரவு செய்யும். கைவிரல்களின் இடுக்குகளே சிரங்குக் கிருமிகள் வாசம் செய்ய ஏற்றஸ்தானமா யிருக்கிறது. சிறு சிரங்கு உள்ளங்கையிலும், புறங்கையிலும், தொடை முதலிய பாகங்களிலும் அதிகமாக புண்டாகும்.

சிறு சிரங்கு ஆரம்பத்தில் வியர்கூருபோன்று சிறு நமச்சலுண்டாகி, அதி விரைவில் சீழ்கொண்டு மிளகு பெரிய சீழ் கொப்புளங்களாகிவிடும். அந்தக் கொப்புளங்களைக் குத்தினால் வெளிரின மஞ்சள் நிறமான சீழ் வெளிப்படும் அந்தச் சீழ் பட்டவிடங்களெல்லாம் சிரங்குண்டாகும்.

சிரங்குக்குச் சிகிச்சை செய்யுமுன் சிரங்கு சீழ் தண்ணீரை சுத்தம்செய்து, சிரங்கு இதரவிடங்களிலும், வியாபியாமலிருக்கும்படியான உபாயங்கள் செய்யவேண்டும். சிரங்குள்ளவர்கள் அணிந்திருக்கும் துணிகளை நாள் தோறும் மாற்றி, சுடுதண்ணீரில் போட்டு வேகவைக்கவேண்டும். சிரங்குள்ளவர்கள் படுக்கைகளைத் தனிமையாக வைத்திருப்பதுத் தவிர, இரண்டு படுக்கையாக வைத்துக்கொண்டு, ஒன்றை கடுமையான வெயிலில் மாற்றி மாற்றி காயவைத்து உபயோகிக்கவேண்டும். இவ் விதமெல்லாம் சிரங்கை தடுக்கக் கூடியவிதமாக உப பிரயத்தினங் களும் செய்துவந்தால் சிரங்கு சீக்கிரத்தில் சொஸ்தமாகும்

சிகிச்சை

- (1) அரிதாரம் ரூபாயெடை 1 கெந்தகம் ரூபாயெடை 1
துருசு „ 1 தேங்காய்ப்பால் அவுன்ஸ் 32

ஒன்று சேர்த்து தூள் செய்து போட்டு எண்ணெயாகும் வரை காய்ச்சி வைத்துக்கொண்டு காலை மாலை, சுட்ட இலுப்பை அரப்பினால் சுத்தமாய்த் தேய்த்துக் கழுவிப்பின் தடவி வரலாம்.

■ 236-பக்கம் 3-இலக்கம் பார்க்கவும்.

† கரப்பான் பொது கழுவு நீரைப் பார்க்கவும்.

(2) நீரடிமுத்து	ரூபாயெடை 1	துருசு	ரூபாயெடை 1
கெந்தகம்	,,	1 பாதரசம்	,,
கல்லெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 12		

முதலில் நீரடிமுத்து, கெந்தகம், துருசு, பாதரசம் இவைகளை எலுமிச்சம் பழச்சாறு விட்டு, ரசம் மறைபும்வரை அரைத்து பின் எண்ணெயில் கலக்கிக் காய்ச்சி, காலை மாலை நன்றாய் சுத்தி செய்தபின் வெளிப்பிரயோகமாகத் தடவி வரலாம்.

(கழுவுகீர்—Lotion)

(3) ஆவர்ட் கார்பாலிக் (Acid Carbolic)	டி.ராம்	1
வினிகர் (காடி—Vinegar)	அவுன்ஸ்	1½
தண்ணீர்	,,	25

ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு, காலை மாலை இந்த லோஷன (Lotion) ல் சிரங்கை சுத்தமாய் கழுவியபின்னர் கீழ்க்கண்ட மருந்துகளிலொன்றை மேல் தடவி வரலாம்.

(4) சல்பர் சப்ளிமெண்ட் (Sulphur Subliment)	டி.ராம்	2
பொட்டாஷியம் கார்போனேட் (Potassium Carbonate)	,,	1
வாசலின் (Vaseline)	,,	1

ஒன்று சேர்த்து காலை மாலை 3-ம் இலக்க கழுவுகீரால் சுத்தம் செய்த பின்னர் மேல் பிரயோகமாகச் சிரங்கின்மேல் பூசி வரலாம்.

பெருஞ் சிரங்கிற்குச் சொல்லிய எல்லா மருந்துகளையும் உபயோகித்து வரலாம்.

குலைக்கரப்பான்:—

இந்தக் கரப்பான்ரோகத்தில் மூட்டுகளில் (Joints) வீக்கம் கண்டு முரடு கட்டி புண்ணுண்டாகும்; சுரமும் இலேசாய் காயும்; கை கால் மூட்டுகளில் நமச்சலுண்டாகி புண்ணாக மாறும்; முகம் வாடி கால் நீட்ட மடக்க வியலாம விருக்கும்.

சிகிச்சை:

(1) நெற்றாமணக்கெண்ணெய்	கடுகுரோகிணி	ரூபாயெடை 1
அவுன்ஸ் 24	ஆதண்டைவேர்	,,
முடக்கொத்தான்சாறு	,,	3 சங்கனவேர்
வெங்காயச்சாறு	,,	6 புங்கனவேர்
		,,

இவற்றைப் பொடித்துப்போட்டு சாற்றையும் விட்டு ஒன்று சேர்த்து 6-மணிகேரம் கடும்பெயிலில் வைத்திருந்து காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

ஆங்கிலத் தமிழ் கரப்பான் பொது மேல் பூச்சு மருந்துகளையும், உள் பிரயோக மருந்துகளையும் உபயோகித்து வரலாம்.

செங்கரப்பான்:—Red Eczema

இது கருங்கரப்பான் ரோகத்தைச் சேர்ந்ததென்றாலும், புண்களும், சிலை நீரும் இரத்தச் சிகப்பாகவிருக்கும்; உடல் முழுவதும் சிவந்திருக்கும்; உடலில் எந்தப் பாகத்திலாவது நமச்சல்களேற்பட்டுப் புண்ணுகளாக மாறி எரிச்சலும், வலியுமுண்டாக்கும்; இதில் தலைவலி யேற்படும்; மூத் திரத்தாரை கடுப்பும், நீர்க்கட்டு மேற்படும்.

சிகிக்கை

(1) வல்லாரைவேர் ரூபாயெடை 3 வேலிப்பருத்திவேர் மேல்
சிறுசெருப்படிவேர் ,, 3 தோல் ரூபாயெடை 3
கொட்டைகரந்தைவேர்,, 3 மிளகரணைவேர்மேல்தோல் ,, 3
சிறுகிரைவேர் ,, 3 கோடகசாலைவேர்மேல்தோல்,, 3
வட்டத்திருப்பிவேர் ,, 3 பெருங்கிளாவேர்மேல்தோல் ,, 3
சதுரக்கள்ளிவேர் ,, 3 தரைபசிலை ,, 3
அவுரிவேர்மேற்றோல் ,, 3 வசம்பு ,, 3
சிறுமணக்கெண்ணெய் அவுன்ஸ் 12

பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்துக் காலை மாலை ஒரு தேக் கண்டியளவாக கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்)

(1) பூவரசம்பட்டை ரூபாயெடை 1 கொஞ்சில் ரூபாயெடை 1
முடக்கொத்தன் ,, 1 முதியார்க்குத்தல் ,, 1
ஆதண்டைவேர் ,, 1 வெங்காயம் ,, 1
முருங்கையிலை ,, 1 பசுநெய் அவுன்ஸ் 12

பொடித்துப்போட்டுக் காய்ச்சிவடித்து, காலை மாலை ஒரு தேக்காண்டியளவாகக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

கரப்பான் பொது மேல் பூச்சு மருந்துகளையும், உள் பிரயோக மருந்து களையும் உபயோகித்து வரலாம்.

செந்தி:—

கொள்ளிக் கரப்பா எனன்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

சொறிகரப்பான்:—

சொறிகரப்பா எனன்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

சொறியிரங்கு:—

ஊமைச்சிரங் கென்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

தாடைச்சிரங்கு:—Impetigopustular Eczema

இது விசேஷமாக தாடையிலும், கடைவாயிலுமே உண்டாகும். பொதுவாகக் காப்பான் ரோகத்திற்கே தொத்தும் தன்மை யுண்டென்றாலும், தாடைச் சிரங்குக்கு அதிகமான தொத்தும், சந்தர்ப்பங்களும், தன்மையுமுண்டா யிருக்கிறது. குழந்தைகள் ஒன்றோடொன்று கொஞ்சுவதாலும், முத்தம் கொடுப்பதினாலும், ஒரு குழந்தையின் எச்சில் பட்ட பதார்த்தங்களை ஏனைய குழந்தைகள் தின்பதாலும், தாடைச் சிரங்கு விரைவில் குழந்தைகளுக்குள் பரவ யேதுவா யிருக்கிறது.

முகத்தில் சிவந்த தடிப்புகளுண்டாகி அதன்மத்தியில் சிறுகொப்புளங்கள் காணப்படும். அந்தீக்கொப்புளங்கள் சீழ்ப்பிடித்து, மிளகவ்வளவு பெரிதாகி மஞ்சள்நிறமாக வாகிவிடும்; ஆனால், இது சர்மத்திலிருந்து உயர்ந்திருப்பதில்லை. சீழ்ப்பிடித்தவுடன் கொப்புளங்கள் நசுங்கி சலம் வெளிப்பட்டு வடிந்து, அந்தச்சலம் பட்டவிடமெல்லாம் சிரங்குண்டாகும்.

சிகிச்சை

(கழுவுநீர்—Lotion)

(1) ஆயுரீட் கார்பாலிக் (Acid Carbohic)	துளி	10
கிளிசரின் (Glycerine)	அவுன்ஸ்	1
ஆக்குவா ரோஸா (Aqua Rosae)	"	1

ஒன்று சேர்த்து, தாடைச் சிரங்குகளைக் காலை மாலை சுத்தம் செய்து, பின்னர் கீழ்க்கண்ட மருந்துகளைத் தடவி வரலாம்.

(2) சல்பர் சப்ளிமென்ட் (Sulphur Subliment)	டிராம்	2
பொட்டாஷியம் நைட்ரேட் (Potassium Nitrates)	கிரான்ஸ்	10
கிளிசரின் (Glycerine)	டிராம்	$\frac{1}{2}$
லனோலின் (Lanoline)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்துக் களிம்பாகச் செய்துகொண்டு, காலை மாலை 1-ம் இலக்க கழுவு நீரால் வாயில்படாமல் சுத்திசெய்து பின் மேல் பிரயோகமாக மட்டும் தடவி வரலாம்.

(3) ஃலக்கர் ஆர்ஸனிக்கரலிஸ் (LiquorArsanicalis)	துளி	■
சோடியம் பைகார்போனேட் (Sodium Bicarbonate)	கிரான்ஸ்	5
ஸ்பிரிட் குளோரோபாரம் (Spirit Chloroform)	துளி	■
டிஞ்சர் ஜென்ஷன் கோ (Tincture Gentain Co)	"	15
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	1

■ விஷமானது ஜாக்ராதையாக உபயோகிக்க வேண்டும்,

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக்கு குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒவ்வொரு தேக்காண்டி யளவாக உண்டுக்குக் கொடுத்து வரலாம்.

சிரங்குக்குச் சொல்லிய மருந்துகளிலொன்றை உபயோகித்து வரலாம்.

தேமல்—Tinea Tonsurans—Ringworm

இதை எச்சிற்றழுப்பு; படர்தாமரை என்று சொல்லப்படும். காப்பான் ரோகத்தைப்போல் இதில் புண்ணுகள் ஒன்றும் உண்டாவதில்லை. இது சர்மத்திலிருந்து உயரமாயிருக்கும்; மத்தியில் பள்ளமாகவு் யிருக்கும். தேமல் வட்ட வட்டமாக ஓரங்கள் மட்டும் கனத்துப் பார்வைக்கு விகாரமாகத் தெரியும்; ஓரத்திலுள்ள தடிப்புகள் சிவந்திருக்கும்; இது சரீரத்தின் எந்தப்பாகத்திலுமுண்டாகும்; நமச்சல் சகிக்கக்கூடாததாயிருக்கும்.

சிகிச்சை

- (1) வெற்றிலையையும், வெள்ளைப்பூண்டையும் சமமாக வெடுத்து அரைத்துப் பூசி வரலாம்.
- (2) பால் துத்தத்தை விளக்கெண்ணெயில் அரைத்துத் தடவி வரலாம்.
- (3) தகரைவிரையை எலுமிச்சம்பழச் சாற்றிலரைத்துத் தடவிவரலாம்.
- (4) புரசன் விரையை எலுமிச்சம்பழச் சாறுவிட்டரைத்துத் தடவிவரலாம்.
- (5) ஆவிட் அமிலிக் கிளாசியல் (Acid Acetic Glacial) கிரைன்ஸ் 4
வாசலின் (Vaseline) அவுன்ஸ் 1
ஒன்று சேர்த்து, களிம்பாகச் செய்து காலை மாலை தடவிவரலாம்.
- (6) பார்மோலின் (Farmolin) டிராம் 1
லானோலின் (Lanolin) அவுன்ஸ் 3
தண்ணீர் டிராம் 2
ஒன்று சேர்த்து, மேல்பிரயோகமாகத் தடவிவரலாம்.
- (7) டிஞ்சர் ஐயோடின் (Tincture Iodine) டிராம் 2
ஆயில் காடினி (Cadini) அவுன்ஸ் 1
ஒன்று சேர்த்து மேல்பிரயோகமாகத் தடவிவரலாம்.
- (8) கிரிசரோபைனம் (கோவாபவுடர்—Chrysorobinum) டிராம் 1
ஆவிட் கார்பாலிக் (Acid Carbolic) துளி 3
வாசலின் (Vaseline) டிராம் 4
ஒன்று சேர்த்து களிம்பாக்கிக்கொண்டு, மேல்பிரயோகமாகத் தடவி வரலாம்.

நமட்டுச் சிரங்கு:—

பேய்ச்சொறி யென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

நாய்முள்—Urticaria—Nettle Rash

சர்மத்திற்குமேல் உயர்ந்து கூர்மையாக உண்டாகி சுருக்கு சுருக்கென்று
தைக்கும் தன்மையுள்ள ஒரு சர்மரோகத்தையே நாய்முள்ளென்றுக்
கூறுவர். இது சர்மத்திலிருந்து மேடாக ஒரு பாசிபயறு பெரிய தடிப்பு
உண்டாகி அதன் மத்தியில் முன்போன்ற ஒரு வஸ்துவிருக்கும். இது
குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி யுண்டாவதாயும், உண்டானது நீடித்து
யிருக்கும் தன்மையுடையதாய் யிருக்கிறது.

ஒழுங்கில்லாத ஆகாரவகைகளினாலும், பிரதானமாய் இலகுவில் ஜீரணித்
தக் கூடாத ஆகாரங்களினாலும், மீன் முதலியவற்றை அதிகமாய்
புசித்து வருவதினாலும், சிதோஷ்ணமாற்றத்தினாலும், குழந்தை
களுக்கு நாய்முள் ரோக மேற்பட்டாம்.

சிகிச்சை

(1) சுண்ணாம்புத் தண்ணீரையும், தேங்காய் யெண்ணெயையும் சமன்
கலந்து மத்தித்துத் தடவி வரலாம்.

(2) * ஐட்ரார் ஜரி பெர்குளோரைட் (Hydrargeri Perchlo-
ride) கிரான்ஸ் 2
ஆவியட் ஐட்ரோகுளோரிக் டில் (Acid Hydrochloric Dil) துளி 8
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 2½

ஒன்றுசேர்த்துக் கரைத்துக்கொண்டு மேல் பிரயோகமாக மட்டும்
அடிக்கடி தடவி வரலாம்.

(3) சிங் கார்போனேடிஸ் பிரிவிபிடேட் (Zinc Carbonatis
precipitate) டிராம் 1
சிங் ஆக்ஸைட் (Zinc Oxide) " ½
கிளிசிரின் (Glycerine) " ½
ஆக்குவா ரோஸா (Aqua Rosae) அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்த்து மேல் பிரயோகமாக மட்டும் நான் ஒன்றுக்குப் பல
தடவை தடவி வரலாம்.

படர்தாமரை:—

தேமலென்றத் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

பாலகரப்பான்—Struma—Infantile Scrofula

இது குழந்தைப் பருவத்திலேற்படும் ஒருவித கண்டமாலே ரோகம். குழந்
தைகளின் தொண்டைக்கும், நாடிக்கு மிடையிலுள்ள சர்மத்தில் கழலைப்

* விஷமானது ஜாக்கிரதையாக உபயோகிக்க வேண்டும்.

போலுண்டாகும். பால கர்ப்பான்ரோகம் தாய் தந்தையர்களிடமிருந்து, திரோகத்திலுறி இரத்தத்தை விஷமிக்கச்செய்து உண்டாகுமொரு துர்நீர் வியாதி.

ஆரம்பத்தில் கைகால் மூட்டுகளில் வீக்கம் கண்டு, பின் கழுத்தில் வீக்கம் காணும். இந்த வீக்கம் வலியில்லாமல் சிவந்திருக்கும். பின் இந்த வீக்கம் வாதுமைக் கொட்டையைப்போல் வெளிக்குத் தோன்றி சீழ் பிடித்து வெடித்துப் புண்ணாகும். அந்தப் புண்ணிலிருந்து விஷநீர் வடிந்து கொண்டேயிருக்கும். இந்த பால கர்ப்பான் ரோகத்தில் திரோகாதியந்தமும் சொறிசொறியாகக் கிளம்பி அரிப்பையுண்டாக்கும். திரோகம் ஒருவித நாற்றமடிக்கும். சிகிச்சையினால் ஒரு கழலையை குணம் செய்தால் அதற்கடுத்து ஒரு கழலையேற்படும். அதுவும் இதே விதமாக புண்ணாகி உபத்திரவிக்கும்.

பாலகர்ப்பான் ரோகத்திற்கு ஆரம்பத்திலேயே தகுந்த சிகிச்சைகள் செய்யப்படாவிட்டால், திரோகமுமுமையும் துர்நீர் வியாபித்து; புண்ணிலிருந்து வடியும் சிலநீரும் இரத்தம்போல் ஓயாமல் ஒருகிக் கொண்டேயிருக்கும்.

ஆரம்பவீக்கத்திலேயே இது பாலகர்ப்பானென்று தெரிந்துகொண்டவுடன் சஸ்திரச் சிகிச்சைச் செய்வதால் மிகுந்த நன்மையுண்டாகும்.

சிகிச்சை

(1) சிற்றமணக்கெண்ணெய்	எலம்	ரூபாயெடை	6
அவுன்ஸ் 32	கிராம்பு	,,	6
பூவரசம்பட்டைச்சாறு,, 32	சடாமாஞ்சில்	,,	6
பசும்பால் ,, 32	சேகம்	,,	6
கருஞ்சேகம் ரூபாயெடை 6	கறிப்பாலேவோர்	,,	6
கார்போகவரிசி ,, 6	நுணுவோர்	,,	6

முதலில் சாற்றையும் எண்ணெயும் பாிலையும் ஒன்று சேர்த்துக் காய்ச்சி மெழுகுபோல் திரண்டுவரும் சமயமிறக்கி, அதில் இதரச் சாக்குகளைத் தனித் தனியே குரணித்துப்போட்டு கடும்வெப்பியில் 6-மணி நேரம் வைத்திருந்து, காலை மாலை ஒரு தேக்கண்டி வீதம் கொடுத்தும் எண்ணெயில் தக்கியிருக்கும் அடி வண்டலைப் புண்ணின்மேல் தடவியும் வரலாம் (பத்தியம்)

(2) ஐட்ரார் ஜரி ஓவியம்; (Oleum Hydrargeri) இதை நான் ஒன்றுக்கு 3, 4-தடவை கட்டியின் பேரில் மேல்பிரயோகமாக மாத்திரம் தடவிவந்தால் கட்டிப்பழுத்து உடையும் உடைந்தபின் கர்ப்பானுக்குச்சொல்லிய மேற்பூச்சுக் களிம்புகளில் லொன்றைத் தடவி புண்ணை ஆற்றி வரலாம்.

(3) லினிமென்ட் ஐயோடின் (Liniment Iodine) இதை நான் ஒன்றுக்கு 2, 3-தடவை கட்டியின்பேரில் தடவிவந்தால், கட்டி பழுத்து உடை

யும்; உடைந்தபின், கர்ப்பானுக்குச் சொல்லிய மேல்பிரயோக கனிம்பு களி லொன்றைத் தடவி ஆற்றிவரலாம்.

- | | | |
|---|---------|---|
| (4) காயவைத்த பசும்பால் (சூட்டுடன்) | அவுன்ஸ் | 2 |
| ஸ்காட்ஸ் எமுல்ஷன் காட் லிவர் ஆயில் (Scott's Emulsion Cod Liver Oil) | டிராம் | 1 |
| சிரப் பெர்ரி ஐயோடைட் (Syrup Ferri Iodide) | துனி | 4 |

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதக் குழந்தைகளுக்கு, இந்த அளவாகக் காலையிலும், இரவில் படுக்கைக்குப் போகுமுன்னும், நீடித்துக் கொடுத்து வந்தால், பால் கர்ப்பானிருக்கும் சமயத்திலும், சொஸ்தமான பின்பும், இரத்தத்திலுள்ள வீஷத்தன்மையை நீக்கி, இரத்தத்தை விருத்தி செய்யும்.

கர்ப்பான் பொது உட்பிரயோக மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம். கட்டி உடைந்து புண்ணானால், கர்ப்பான் உட்பிரயோக, வெளிப் பிரயோக மருந்துகளையும் உபயோகித்து வரலாம்.

புடைக்கரப்பான்:—

ஊது கர்ப்பானென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

பூதக்கரப்பான்:—

ஊது கர்ப்பானென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

பெருஞ்சிரங்கு—Scabies

அஹாருஸ் ஸ்காபீஸ் என்ற (Acarus Scabies) யுண்ணியதொத்து வியாதி கிருமிகளால் சிரங்கு உண்டாகிறது. சிரங்கில் சிறுசிரங்கு, பெருஞ்சிரங்கு, ஊமைச்சிரங்குகள் பலவிதம் கூறுவதுண்டு. இது தொத்துவயாதி இனத்தைச் சேர்ந்ததாக விருப்பினும், மக்களிடையில் நெலுங்கிப் பழகி விருப்பதால், சாதாரண வியாதியாகவே பாவிக்கப் படுகிறது. இந்த யுண்ணிய கிருமிகளானது, சர்மத்திலேயே ஜீவிக்க ஆரம்பிக்கிறது. ஆண், பெண் கிருமிகள் சம்பந்தப்பட்டு கெற்பமுண்டாகி தன் முட்டைகளைப் பிச்சுவதற்காகச் சதைபாகத்தில் சற்று பிரவேசிக்க ஆரம்பிக்கும்போதுதான் வலியும், நமச்சலும் அதிகமாய் உண்டாகிறது. அழுக்கு மிகுதியும் உள்ள பாகங்களில்தான் இந்தக் கிருமிகளும் வசிக்கின்றன. இக் கிருமிகளுக்கு தகுதியான வாசஸ்தலம் கைவிரல்களின் இடக்கு, கைமடிப்புதள், தொடை, புட்டம், (பிரிஷ்டம்) அடிவயிற்றின் கீழ்மடிப்பு முதலிய இடங்களே. கொப்புளங்கள் முத்துபோல் உண்டாகி அதில் நீர்போன்ற பதார்த்தம் நிரைந்திருக்கும் கிருமிகள்கூடி முட்டையிடவேதே சீழ் என்று சொல்லுவதாகும். இந்த முட்டைகள் 15-களில் மறுபடியும் புழுவாக மாறிவிடுகின்றன. இப்படி கிருமிகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க சிரங்கும் உடல் முழு

வதம் பரவ ஆரம்பிக்கிறது. சற்றுகுணமாகிவிட்டது என்று அசட்டை செய்தால், சர்மத்துள் எச்சரிக்கையுடன் பதுங்கியிருக்கும் பெண்கிருமிகள், மறுபடியும் முட்டையிட்டு புண்படசெய்துவிடும். மக்களுள் சிரங்கு கேவலமாக மதிக்கப்படுவதைப்போலவே, சிரங்குக்கிருமிகளும் வைத்தியர்களைக் கேவலமாக மதிக்கின்றன. எப்போதும் சிரங்குக்குச் சிகிச்சை செய்ய முன்வந்தால், மருந்து சோப்புகளினாலாவது, சல்பர் சோப் (Sulphur Soap) குட்டிச்சூர் சோப் (Cuticura Soap) மர்கோ சோப் (Murgo Soap) கிரிமால்ட்ஸ் சோப் (Grimalts Soap) அல்லது சுட்ட இலுப்பை அரப்பினாலாவது, நன்றாகச் சுத்திசெய்யவேண்டும். எவ்வளவுக்கெவ்வளவு சுத்தம் செய்து வைத்துக்கொள்ளுகிறோமோ அவ்வளவு சடுதியில் சிரங்கு புண்கள் ஆறிவிடும்.

முக்கியமாகச் சிரங்குக்குச் சிகிச்சை செய்யும் முறை சுசீகரமா யிருப்பதில் அடங்கியிருக்கிறது. சிரங்குக்கு மேல்பூச்சுமருந்துகளை இரண்டு மூன்று நாளைக்குக் காலைிலும், இரவு படுக்கைக்குப் போகும்போதும் தடவிக் கொண்ட 12-மணி நேரத்திற்குப் பின் ■ கார்பாலிக் லோஷனிலாவது, சுட்ட அரப்பினாலாவது, மருந்து சோப்பு (Medicinal Soaps) களினாலாவது சுத்தமாய் புண்ணுகளைத் தேய்த்தும், சுடுதண்ணீரில் ஸ்நானம் செய்துகொண்டும், புதுத்துணியை உடுத்திக்கொள்ளவேண்டும். படுக்கை ■ இரண்டாக வைத்துக்கொண்டு, முன் படுத்திருந்த படுக்கையை, 2, 3-நாளைக்கு வெய்யிலில் காயப்போடவேண்டும். கட்டியிருந்தத் துணியை சுடுதண்ணீரில் போட்டு அவித்து, பின் துவைத்துக் காயப் போட்டுக்கொண்டு இவ்விதமாகவே மாற்றி மாற்றி செய்து வரவேண்டும். இப்படிச் சுசீகரமான முறைகளைக் கையாளாவிட்டால், சிரங்கு பிறருக்கு முண்டாவதோடுங்கூட, ஆறினமாதிரியாக விருந்த சிரங்கும், துணியிலும், படுக்கையிலுமிருந்த கிருமிகளால் மறுபடியும் உற்பத்தியாகிவிடும்.

சிரங்கு ஒன்றிரண்டு கண்டவுடன், கொப்புளங்களைக் கத்திரித்துவிட்டு, கார்பாலிக் காஸிட் (Carbolic Acid) 15-துளியும், தண்ணீர் அரை டிராழும் சேர்த்துக் குலுக்கிக்கொண்டு ஒரு குச்சியில் தொட்டு அந்தக் கொப்புளங்களில் விட்டால், சிரங்கு அற்றுப்போகும்.

சிகிச்சை

- (1) நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு தடவை, சுட்ட இலுப்பை அரப்பினால் நன்றாகத் தேய்த்துக் கழுவியபின்னர், நீரடிமுத்தம், சந்தனமும் சமமாக வரைத்துப் பூசிவரலாம்.

(2) கெந்தகம்	ரூபாயெடை 1	துருசு	ரூபாயெடை 1
குங்கிலியம்	"	1	"

ஒன்று சேர்த்து, சிறுமணக்கெண்ணெய் விட்டு மைபோலரைத்து, காலே மாலை நன்றாகச் சுத்தம் செய்தபின் தடவி வரலாம்.

(3) கஸ்தூரிமஞ்சள்	ரூபாயெடை 1	நீரடிமுத்து	ரூபாயெடை 1
கார்போகவரிசி	"	1 ஏலம்	" 1
காட்டுச்சீரகம்	"	1 மிளகு	" 5
கடுக்காய்	"	1 தேங்காயெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 24

ஒன்று சேர்த்துத் தூள்செய்து, ஊமத்தங் காய்களைக் குடைந்து அதற்குள் தூளைச் செலுத்தி ஒவ்வொரு ஊமத்தங் காயையும் தனித்தனியே 1½-வாட்டி (எருவு)யில் புடம் போட்டுட்டுத்து, மைபோலரைத்து, தேங்காயெண்ணெயில் கலக்கி, மூன்றுநாள் கடும்வெய்யிலில் வைத்திருந்து, சிரங்கு களைக் காலையில் நன்றாய்த் தேய்த்துக் கழுவியபின்னர், ஒரு நாளைக்குப் பல தடவை மேல்பிரயோகமாகப் பூசி வரலாம்.

(4) கருஞ்சீரகம்	ரூபாயெடை 1	மாமஞ்சள்	ரூபாயெடை 1
கல்லுப்பு	"	1 மிளகு	" 1
தேங்காய்ப்பால்	அவுன்ஸ் 48		

ஒன்று சேர்த்துப்பொடித்துப்போட்டுக் காய்ச்சி, புண்ணின்மேல் தடவியிருந்து சாயந்திரம் இலுப்பை அரப்பும் வேப்பிலையையும் சமனாயரைத்துத் தேய்த்துக் கழுவி மறுபடியும் எண்ணெயைத் தடவி வரலாம்.

(5) பச்சைக்கற்பூரம்	ரூபாயெடை ½	வெள்ளைக்குங்கிலியம்	ரூபாயெடை 1
மிர்தார்சிங்கி	"	1 பூங்காவி	" 1
இரசக்கற்பூரம்	"	1 காட்டுக்கற்பூரம்	" 1½
பசுவெண்ணெய்	"	15	

ஒன்று சேர்த்து மைபோலரைத்து, 7-தரம் குளிர்ந்த தண்ணீர் விட்டுக் கழுவி வைத்துக்கொண்டு புண்ணின்மேல் தடவியிருந்து சாயந்திரம் சுட்ட இலுப்பை அரப்பால் தேய்த்துக் கழுவி மறுபடியும் மேல் தடவிவரலாம்.

(சிரங்கு கழுவுநீர்—Lotion)

(6) சல்பர் சப்ளிமேட் (Sulphur Sublimatè)	அவுன்ஸ் ■
நீற்றின சுண்ணாம்பு (Slaked Lime)	" 4
காட்டுச்சவர்க்காரம் (Country Soap)	" 1
தண்ணீர்	" 35

ஒன்று சேர்த்து, 20-அவுன்ஸாகும்வரை சுண்டவைத்து சிரங்குகள் கழுவு உபயோகிக்கலாம்.

- (7) சல்பர் பிரிசிபிடேட்டம் (Sulphur Precipitatum) டிராம் 1
வாசலின் (Vaseline) " 1

ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு ■ கார்பாலிக் லோஷனினாலாவது † சிரங்கு கழுவு ரோலாவது, சோப்பினாலாவது, காலை மாலை சுத்தம் செய்த பின் மேல் பிரயோகமாகத் தடவி வரலாம்.

- (8) சுட்ட சுண்ணாம்பு (Slaked Lime) அவுன்ஸ் 4
சல்பர் சப்ளிமேட் (Sulphur Sublimate) " 4
தண்ணீர் " 35

ஒன்று சேர்த்து, 20-அவுன்ஸாகச் சுண்டுவரை காய்ச்சவும் அப்போது கருநிறமான அழுக்குபடியும் அதை மெதுவாக வழித்து எடுத்துவிட்டு, மஞ்சள் நிறமான தைலத்தைமட்டும் எடுத்துக்கொண்டு, காலை மாலை † சிரங்கு கழுவு ரோலாவது ■ கார்பாலிக் லோஷனாலாவது, சோப்பினாலாவது சுத்தம் செய்த பின் வெளிப்பிரயோகமாகத் தடவிவரலாம்.

- (9) அங்குவண்டம் சல்பரிஸ் (Unguentum Sulphuris) அவுன்ஸ் 1
டிஞ்சர் லவண்டுலா கோ (Tincture Lavendulae Co) டிராம் 1

ஒன்று சேர்த்துக் காலை மாலை † சிரங்கு கழுவு ரோலாவது, ■ கார்பாலிக் லோஷனாலாவது, சோப்புகளினாலாவது சுத்தம் செய்தபின் மேல்பிரயோகமாகத் தடவிவரலாம்.

- (10) இக்தியால் (Ichthyol) டிராம் 1
சல்பர் (Sulphur) " 1
லனோலின் (Lanoline) " 8

ஒன்று சேர்த்து, காலை மாலை † சிரங்கு கழுவு ரோலாவது, ■ கார்பாலிக் லோஷனாலாவது, சோப்பினாலாவது சுத்தம் செய்தபின் மேல்பிரயோகமட்டும் தடவிவரலாம்.

- (11) ரிசார்வின் (Resorsin) கிரைன்ஸ் 15
வாசலின் (vaseline) அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்த்து, † சிரங்கு கழுவுரோலாவது ■ கார்பாலிக் லோஷனாலாவது, காலை மாலை சுத்தி செய்தபின் மேல்பிரயோகமாக மட்டும், தடவிவரலாம்.

பேய் சொறி—Prurigo Pruritus

பேய் சொறியானது; முன்னறிகுறிகள் ஒன்றுயில்லாதிருக்கும்போதே திடீரென்று, திரேகாதியத்தமும், சகிக்கக்கூடாத நமச்சலையுண்டாகும். நமச்சலை சகிக்கக்கூடாமல் கடினமாய் சொறிவதால் சர்மத்திலு

■ 236, 246-ம் பக்கம் 3-ம் இலக்கம் பார்க்கவும்.

† 254-ம் பக்கம் 6-ம் இலக்கம் பார்க்கவும்.

தடிப்புகளேற் பட்டுவிடும். கம்பளிப் பூச்சியாவது, பூனைக்காஞ்சொறி
பிடியாவது உடம்பில் பட்டால் எவ்விதம் நமச்சலுண்டாகுமோ, அவ்
விதமே பேய் சொறிவிலும் நமச்சல்களேற்படும்; மயிர்க் கூச்சமுண்
டாகி, சர்மம் வரண்டிருக்கும்; இரத்தம் வருந்தினையும் சொறிந்தாலும்
இன்பமாகவே யிருக்கும்.

பேய் சொறி, நீடித்திருக்கக்கூடிய தொன்றல்ல; சொறிகண்ட ஒன்றிரண்டு
நாட்களுக்கு மட்டுமிருக்கும்; நமச்சலைத் தாங்கிக்கொண்டிருக்க முடியு
மானால் சிகிச்சையே செய்யவேண்டியதில்லை; நமச்சல் தாக்காமல்
சொறிந்து விடுவதால் சர்மம் வழன்று புண்பட்டுவிடும்.

சிகிச்சை

(1) கார்போகவரிசி ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ கசகசர்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
கோடிமுத்துப்பருப்பு ,, $\frac{1}{2}$ கெத்தகம்	,, $\frac{1}{2}$
கொப்பரைத்தேவகாய் ,, $\frac{1}{2}$	

ஒன்றுசேர்த்து புளித்த மோசிலரைத்துக் கலக்கி, உடம்பெல்லாம் பூசி யிரு
ந்து, சாயந்திரம் இலுப்பை அரப்பைத் தேய்த்துக் குளிக்கச் செய்தவரலாம்.

(2) இத்தப்பு ரூபாயெடை 1 பசுரெய்	அவுன்ஸ் 32
---------------------------------	------------

தான்செய்து போட்டு, கடும் வெய்யிலில் வைத்திருந்து உடம்பெல்லாம்
தேய்த்துக்கொண்டு, சாயந்திரம் இலுப்பை அரப்பால் தேய்த்துக் குளிக்கச்
செய்த வரலாம்.

(3) சீந்தில்தண்டு ரூபாயெடை 5 நெல்லிவற்றல்	ரூபாயெடை 1
வேம்பாடம்பட்டை ,, 5 செஞ்சந்தனம்	,, 1
பேய்ப்புடல்வேர் ,, 5 மரமஞ்சள்	,, 1
கடுக்காய் ,, 1 தக்கோலம்	,, 1
கோஷ்டம் ,, 1 விலாமிச்சைவேர்	,, 1
தேவதாரு ,, 1 மஞ்சள்	,, 1
தான்றிக்காய் ,, 2 பசுரெய்	அவுன்ஸ் 24

முதலில், வேம்பாடம்பட்டை, பேய்ப்புடல்வேர், சீந்தில்தண்டு இம்
மூன்றையும் பொடித்து, 32-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 6-அவுன்ஸாகச்
சுண்டக்காய்ச்சி அத்துடன் இதர சரக்குகளையும், வெய்யையும் சேர்த்துக் கடும்
வெய்யிலில் மூன்றுநாள் வைத்திருந்து பின் காய்ச்சி வடித்து, காலே மாலை
ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் உள்ளுக்குக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

(4) லைசர் பிளம்பி சப்அலிடேட் (Liquor plumbi Sub- acetate)	டிசராம் 4
ஆலிட் ஐட்ரோவீனியாக் டில் (Acid Hydrocyanic Dil),,	2
தண்ணீர்	அவுன்ஸ் 3

ஒன்று சேர்த்துக் கலக்கிக்கொண்டு சொறியுள்ளவிடத்தில் வெளிப் பிரயோகமாகத் தடவி வரலாம்.

- (5) ஆவீட் ஐட்ரோவினியாக்டில் (Acid Hydrocyanic Dil) டிராம் 1
சோடியம் போராவியஸ் (Sodium Borasis) „ ½
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 4

ஒன்று சேர்த்துச் சொறியுள்ளவிடத்தில் வெளிப்பிரயோகமாகத் தடவி வரலாம்.

- (6) சோடா சாலிவிலஸ் (Soda Salicylas) கிரான்ஸ் 10
தண்ணீர் டிராம் 5

ஒன்றுசேர்த்துச் சொறியுள்ள விடத்தில் வெளிப் பிரயோகமாகத் தடவி வரலாம்.

பொரிக்கரப்பான்:—

உடலாதியுந்தமும், கொசுக்கடிப்போல் சர்மத்தைத் தடிக்கச்செய்து, பின் கீழ்க் கோர்த்து, சிறுசிறு கொப்புளங்களாக்கி, புண்பட்டு, படை படையாய் ஒன்று சேர்த்துக் கொள்ளும் ஒரு சர்மவியாதி.

சிகிச்சை

கரப்பான் உட்பிரயோக மேல் பிரயோக மருந்துகளை உபயோகித்து வரலாம்.

மண்டைக்கடுவன்:—

கபாலக் கரப்பானென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

மண்டைக் கரப்பான்:—

கபாலக் கரப்பானென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

யானைச் சிரங்கு:—

பெருஞ்சிரங் கென்றத் தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

வரட்ச்சிச் சரப்பான்:—

சர்மத்தில் அதிகமான அரிப்பு உண்டாகி, சிறு சிரங்கைப்போன்ற கொப்புளங்கள் திரோகாதியந்தமு முண்டாகும். கொப்புளங்களில் சீழில்லாமல் வரண்டு தடித்திருக்கும். நமச்சலதிகமா யிருக்கும்.

சிகிச்சை

- (1) ஒரிஸைத்தாமரைவோர் நல்லெண்ணெய் - அவுன்ஸ் 12
ரூபாயெடை 1 கார்போகவரிசி ரூபாயெடை 1
வெள்ளெருக்கன்வோர் „ 1 கருஞ்சிரகம் „ 1

கூதுவேலிவேர்	„	1	சீரகம்	„	1
கொடிவேலிவேர்	„	1	ஒமம்	„	1
அவுரிவேர்	„	1	கந்தகம்	„	1

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி காலை மாலை ஒரு தேக்காண்டி வீதம் உள்ளாக்கும் கொடுத்து, உடம்பு முழுதும் தேய்த்தும் வரலாம். (பத்தியம்.)

(2) போராக்ஸ் (Borax)	டிபிரம்	1
மார்பியா சல்பஸ் (Marphia Sulphus)	கிரைன்ஸ்	1
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்துக் கரைத்து உடம்பெல்லாம் தடவியிருந்து சாயந்திரம் மருந்து சோப்பு (Medicinal Soap) களினால் சுடுதண்ணீரில் குளிப்பாட்டி வரலாம்.

(3) ஆலிட் கார்பாலிக் (Acid Carbolic)	துளி	5
மார்பியா சல்பஸ் (Marphia Sulphus)	கிரைன்ஸ்	1
ஆலிட் போரிக் (Acid Boric)	„	12
வாசலின் (Vaseline)	டிபிரம்	2

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து உடம்பில் தடவியிருந்து சாயந்திரங்களில் சோப்புத் தேய்த்துக் குளிப்பாட்டி மறுபடியும் தடவி வரலாம்.

(4) காம்ப்ர் (Camphor)	டிபிரம்	1
குளோரல் ஹைட்ரேட் (Choloral Hydras)	„	1
வாசலின் (Vaseline)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து மேல் பிரயோகமாகத் தடவியிருந்து சாயந்திரம் சோப்பினால் குளிப்பாட்டி மறுபடியும் தடவி வரலாம்.

கர்ப்பான் பொது உட்பிரயோக, வெளிப்பிரயோக மருந்துகளையும் உபயோகித்து வரலாம்.

விஷவாதக் கர்ப்பான்:—

இது இதர கர்ப்பான் ரோகத்தைப்போல் சிரங்குகள் வெடிக்காமல் சர்மன் கள் வீக்கம் கண்டு வெடித்துப் புண்பட்டுப்போகும். ஆரம்பத்தில் இலே காய் சுரம் காயும்; உடம்பெல்லாம் நச்சுவலியாயும், நமச்சலாகவு மிருக்கும். காய், அடிவயிறு, தொடைச் சந்துகள், இவைபோன்ற விடங்களில் சர்மன் வீக்கம் கண்டு வெடித்துப் புண்பட்டுவிடும்.

கிச்சை

(1) தாழைவேர்	ரூபாயெடை	15	கற்கண்டு	ரூபாயெடை	1
ஒரிலைத்தாமரைவேர்	„	15	கோரைக்கிழங்கு	„	1

வேலிப்பருத்திவேர்	15	கொடிமூச்சிரிப்பழம்	1
வெள்ளையறுகம்புல்	15	பேரிச்சம்பழம்	1
நத்தைச்சூரிவேர்	15	சுக்கு	1
நாயக்கொடுவேர்	15	திப்பிலி	1
நாயுருவிவேர்	15	மிளகு	1
நன்னூரிவேர்	15	கடுக்காய்	1
சிறியாநங்கைவேர்	15	தான்றிக்காய்	1
சுருந்தும்பைவேர்	15	கெல்லிவற்றல்	1
சிற்றமுட்டிவேர்	15	தேங்காய்ப்பால்	அவுன்ஸ் 48
பேராமுட்டிவேர்	15	சிற்றமுணக்கெண்ணெய்	82
மாவிலிக்கம்பவேர்	15		

முதலில் வேர்வகைகளை இடித்து 96-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டுப்பாதி யாகச் சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயம் அவுன்ஸ் 48-ஓடும் பால், எண்ணெய் யும் சேர்த்து, இதர சரக்குகளையும் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, காலை மாலை ஒரு தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம் (கடும்பத்தியம்)

(2) பூவரசம்பூவைக்கறுக்கிய	வசம்பு	ரூபாயெடை	1
சாம்பல்	ரூபாயெடை	2	கெல்காயம்
கெல்லிவற்றல்	2	கல்லெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 12
மிளகு	1		

எண்ணெயைத் தவிர்த்து மற்றவைகளை, ஆடுதீண்டாப்பாளைச் சாறு விட்டரைத்துப் பின் எண்ணெயுடன் கலக்கிக் காய்ச்சி வெளிப்பிரயோக மாகத்தடவிவரலாம்.

கரப்பான் பொது மருந்துகளி லொன்றைக்கொடுத்து வரலாம்.

வீங்குக்கரப்பான்:—

புடை கரப்பானென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்வவும்.

கரப்பான் பொது உட்பிரயோகமருந்துகள்:—Internal Medicines

(1) சிறுகுறிஞ்சாவேர்	ரூபாயெடை	10	மிளகாணவேர்	ரூபாயெடை	10
கொடிப்பாலவேர்	10	ஆகாசக்கருடன்கிழங்கு	10		
காட்டுமல்லிகைவேர்	10	வசம்பு	10		
குட்டிவிளாவேர்	10	சிற்றமுணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 24		

முதலில் எண்ணெயை நீக்கி, மற்றவைகளைப் பொடித்து 48-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 24-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சி வடித்து, அத்துடன் எண்ணெயைச் சேர்த்துக் காய்ச்சி காலை யில் மட்டும் ஒரு தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம். (உப்பு புளி தள்ளி பத்தியம்.)

(2) செம்முள்ளிச்சாறு	அவுன்ஸ் 12	சிற்றமணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 32
செந்தொட்டிச்சாறு	„ 12	சங்கனிலைச்சாறு	„ 12
கண்டங்கத்திரிச்சாறு	„ 12	சங்கங்குப்பிச்சாறு	„ 22
சோற்றுக்கற்றாழைச்		இண்டங்கொழுந்துச்சாறு	„ 12
சாறு	„ 12	கருநொச்சிச்சாறு	„ 12
துதுவேளைச்சாறு	„ 12	நிலவகைச்சாறு	„ 12
மணித்தக்கரளிச்சாறு	„ 12	வெங்காயச்சாறு	„ 12
கருஞ்சேரகம்	ரூபாயெடை 1	செங்கத்தாரிப்பட்டை	ரூபாயெடை 1
வாதமடக்கிவேர்	„ 1	கடுக்காய்	„ 1

ஒன்று சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து, காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்)

(3) அவுரிவேர்மேல்தோல்	வல்லாரைவேர்	ரூபாயெடை	6
ரூபாயெடை	சிறுசெருப்படைவேர்	„	6
கோடகசாலையேர்மேல்	பொன்னுங்காணிவேர்	„	6
தோல்	6 கரிசலாங்காணிவேர்	„	6
மிளகாணையேர்மேல்	பேய்மருட்டிவேர்	„	6
தோல்	வட்டத்திருப்பிவேர்	„	6
பெருங்கிளரவேர்மேல்	சிறுகிரையேர்	„	6
தோல்	தரைப்பசிலை	„	6
வேலிப்பருத்தியேர்மேல்	வசம்பு	„	6
தோல்	6 கொட்டைக்காந்தையேர்	„	6
இண்டம்வேர்	சிற்றமணக்கெண்ணெய் அவுன்ஸ்	32	

ஒன்று சேர்த்தரைத்து எண்ணெயுடன் கலக்கிக்காய்ச்சி வடித்தடி, காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

(4) நிலவாகைவேர்	ரூபாயெடை 10	பூதக்காப்பான்பட்டை	
செங்கத்தாரிப்பட்டை	„ 10	ரூபாயெடை 10	
பூவரசம்பட்டை	„ 10	கண்டங்கத்திரிவேர்	„ 10
வசம்பு	„ 1	பறங்கிப்பட்டை	„ 1
வெள்ளைப்பூண்டு	„ 1	மிளகு	„ 1
வலம்புரிக் காய்	„ 1	சதகுப்பை	„ 1
கார்போகவரிசி	„ 1	சிற்றமணக்கெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 24
கருஞ்சேரகம்	„ 1	வென்னாட்டுப்பால்	„ 24

முதலில் வேர்களுையும், பட்டைகளையும்பொடித்து 48-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 24-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சியுடையத்துடன், எண்ணெயில் மற்சேரக்குளையும் பொடித்துச் சேர்த்துக் காய்ச்சிவடித்து காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டிவீதம் உள்ளுக்கும்கொடுத்து, மேலுக்கும்பூசிவரலாம்.(பத்தியம்)

(5) கரப்பான் எண்ணெய்; கிரந்தி எண்ணெய்; செளந்தரிய கிருதம்; உலகோத்தம செந்தூரம் முதலியவற்றி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம். செழுமுறை 6-ம் பாகம் பரர்க்கவும்.

(6) ஐட்ரார்ஜரி கம் கிரீட்டா (Hydrargerri Cum Creta) கிரைன்ஸ் 1½

இதை 3-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை, வேளை ஒன்றுக்கு ஒரு பாகம் வீதம் தேனில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

தறிப்பு:—இந்த மருந்து முதல் 3-நாளிக்கு, நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளைக் கொடுத்து, பின் இரவில் மட்டும் 3-நாளிக்குக் கொடுத்து, 3-நாளிக்கு மருந்தை நிறுத்தி பிறகு 3-நாளிக்குப்பின் மருந்தை ஆரம்பித்து மறுபடியும் இந்த விதமாகவே மாற்றி மாற்றி நிறுத்தி நிறுத்திக் கொடுத்து வரலாம்.

கரப்பான் பொது கழுவுநீர்கள்—Lotions

(1) இக்தியால் (Ichthyol)	டிராம்	1
டிஸ்டில்ட் வாட்டர் (Distilled Water)	அவுன்ஸ்	2

ஒன்று சேர்த்துக் கரப்பான் புண்ணுகளைக் கழுவி வரலாம்.

(2) சிங் ஆக்ஸைட் (Zinc Oxide)	டிராம்	1
லைக்கர் பிளம்பி சப் அஸிடேட் (Liquor plumbi sub-acetate)	"	2
ஆக்குவா ரோலி (Aqua Rosae)	அவுன்ஸ்	10

ஒன்று சேர்த்துக் கரப்பான் புண்ணுகளைக் கழுவி வரலாம்.

(3) கார்பரலிக் ஆஸிட் (Acid Carbolic)	டிராம்	1
சுதெண்ணீர்	அவுன்ஸ்	10

ஒன்று சேர்த்துக் கரப்பான் புண்ணுகளைக் கழுவி வரலாம்.

(4) பொட்டாஷியம் பெர்மாங்குனேட் (Potassium Permanganate)	டிராம்	½
டிஸ்டில்ட் வாட்டர் (Distilled Water)	அவுன்ஸ்	10

ஒன்று சேர்த்துக் கரப்பான் புண்ணுகளைக் கழுவி வரலாம்.

கரப்பான் பொதுமேல்பூச்சு மருந்துகள்—External Oils & Ointments

(1) மருக்கர்ரைவேர் ரூபாயெடை	1	வேலிப்பருந்திவேர். ரூபாயெடை	1
வட்டக்கிலுகிலுப்பை.		வெள்ளைப்பூண்டு	" 1
ஷூர்	" 1	சடுக்காய்	" 1
எருக்கம்வேர்	" 1	கல்லெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 12

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி, புண்ணின்மேல் தடவி யிருந்து சாயந்திரம் இலுப்பை அரப்பால் தேய்த்துக் கழுவி மறுபடியும் தடவி வரலாம்.

(2) திருகுக்கள்ளிச்சாறு அவுன்ஸ் 12	சிற்றமணக்கிலைச்சாறு அவுன்ஸ் 12
இண்டுச்சாறு „ 12	நொச்சியிலைச்சாறு „ 12
இலைக்கள்ளிச்சாறு „ 12	எருமைச்சாணிப்பால் „ 12
விடத்தலாச்சாறு „ 12	நல்லெண்ணெய் „ 24
சுதரக்கள்ளிச்சாறு „ 12	கோரைக்கிழங்கு ரூபாயெடை 3
சங்கனிலைச்சாறு „ 12	கடுகு „ 3
மாவிலிங்கப்பட்டைச்சாறு „ 12	கிரகம் „ 3
தாழைவிழுதின்சாறு „ 12	கருஞ்சீரகம் „ 3
ரூப்பைமேனிச்சாறு „ 12	சுக்கு „ 1
கொம்மட்டியிலைச்சாறு „ 12	திப்பிலி „ 3
பொடுதிலைச்சாறு „ 12	மினகு „ 3
அவுரிச்சாறு „ 12	குங்கிலியம் „ 3
நிலக்கடம்புச்சாறு „ 12	

சாற்றையும், எண்ணெயையும் ஒன்றுசேர்த்து, இதர சீரக்குகளையும் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி, புண்ணின்மேல் பூசியிருந்து சாயந்திரங்களில் இலுப்பை அரப்பால் தேய்த்துக் கழுவிய பின் மறுபடியும் தடவிவரலாம்.

(3) பீத்தாபத்தால் (Betanaphthol)	டி.ராம் 1
சல்பர் (sulphur)	„ 1
பரல்சம் பெரு (Balsam Peru)	„ 2
பெட்ரோலாட்டம் (Petrolatum)	„ 1

ஒன்று சேர்த்து * கழுவு நீரால் புண்களைச் சுத்திசெய்த பின் மேல்பிர யோகமாக மட்டும் காலை மாலை தடவி வரலாம்.

(4) சிங் ஆக்ஸைட் (Zinc Oxide)	அவுன்ஸ் 1
அடிபிஸ் லானா (Adipis Lanae)	டி.ராம் 2
ஒலியம் ஒலிவா (Oleum Olivae)	„ 1
ஆக்குவா கால்வீஸ் (Aqua Calcis)	அவுன்ஸ் 4

ஒன்றுசேர்த்து நன்றாய்க் கலந்துகொண்டு, காலை மாலை* கழுவி நீர்களைப் புண்களைக் கழுவியபின், மேல் பிரயோகமாக மாத்திரம் தடவி வரலாம்.

* 261-ம் பக்கம் பார்க்கவும்.

(5) லைக்கர் பிளம்பி சுப் அலிட்டேட் (Liquor Plumbi

Subacetate)	அவுன்ஸ்	1
கிளிசரின் (Glycerine)	"	$\frac{1}{2}$
தண்ணீர்	"	8 $\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்துக் காலை மாலை ■ கழுவு நீரால் புண்களைச் சுத்தம் செய்த பின் மேல் பிரயோகமாக மட்டும் தடவி வரலாம்.

(6) நாப்தால் (Naphthol)	கிரான்ஸ்	10
காம்பர் (Camphor)	"	10
ரிசார்வின் (Resorcin)	"	10
சல்பர் (Sulphur)	டிராம்	1
வாசலின் (Vaseline)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்துக் களிம்பாகச் செய்துகொண்டு காலை மாலை ■ கழுவு நீரால் புண்களைச் சுத்தம் செய்தபின்னர், மேல் பிரயோகமாக மட்டும் தடவி வரலாம்.

(7) பிஸ்மத் சுப்நைட்ரேட் (Bismuth Subnitras)	டிராம்	■
சிங் ஆக்ஸைட் (Zinc Oxide)	"	$\frac{1}{2}$
ஆலிட் கார்பாலிக் (Acid Carbolic)	துளி	20
வாசலின் (Vaseline)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்துக் களிம்பாகச் செய்துகொண்டு காலை மாலை ■ கழுவு நீரால் புண்களைச் சுத்தம் செய்த பின் மேல் பிரயோகமாக மட்டும் தடவி வரலாம்.

(8) பிளம்பி அலிட்டேட் (Plumbi Acetate)	கிரான்ஸ்	10
சிங் ஆக்ஸைட் (Zinc Oxide)	"	20
காலோமல் (Calomel)	"	20
வாசலின் (Vaseline)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்துக் களிம்பாகச் செய்துகொண்டு காலை மாலை ■ கழுவு நீரால் புண்களைச் சுத்தம் செய்த பின்னர் மேல் பிரயோகமாக மட்டும் தடவி வரலாம்.

(9) ஆலிட் சாலிசிலிக் (Acid Salicylic)	கிரான்ஸ்	3
சிங் ஆக்ஸைட் (Zinc Oxide)	டிராம்	$\frac{1}{2}$
மாவு (Starch)	"	$\frac{1}{2}$
வாசலின் (Vaseline)	"	1

ஒன்று சேர்த்துக் களிம்பாகச் செய்துகொண்டு காலை மாலை ■ கழுவு நீரால் புண்களைச் சுத்தம்செய்த பின்னர் மேல் பிரயோக மாகமட்டும் தடவி வரலாம்.

(10) கரம்பர் (Camphor)	கிரான்ஸ்	20
சிங் ஆக்ஸைட் (Zinc Oxide)	டிராம்	4
பல்விஸ் அமைல் (pulvis Amyli)	"	4

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்துகொண்டு காலை மாலை புண்களை கழுவு நீரால் சுத்தம்செய்த பின்னர் மேல் பிரயோகமாகமட்டும் தடவி வரலாம்.

(11) பிஸ்மத் சப் நைட்ரஸ் (Bismuth Subnitrates)	டிராம்	2
சிங் ஆக்ஸைட் (Zinc Oxide)	"	1½
கிளிசரின் (Glycerine)	"	2
ஆலிட் கார்பாலிக் (Arid Carbolie)	துளி	20
அங்குவண்டம் சிம்பிளக்ஸ் (Unguentum Simplex) அவுன்ஸ்		1

ஒன்றுசேர்த்துக் களிம்பாகச் செய்துகொண்டு காலை மாலை புண்களைக் கழுவு நீரால் சுத்தம்செய்த பின்னர் மேல் பிரயோகமாக மட்டும் தடவி வரலாம்.

கரப்பான் புண்ணிலுள்ள அதிகமான அசுடைநீக்கி:—

கரப்பான் சுடுதியில் பக்குக்கட்டி அதிகமான அசுடை (அசுடு அல்லது அழுக்கு) உண்டாக்கிகொண்டே யிருக்கும். அந்த அசுடை கழுவு நீர் களினால் போக்குவது முடியாதவிதமாக விருக்கும். அந்த அசுடுகளை நீக்காமல் மேல்பிரயோகமாக மருந்துகளை உபயோகிப்பதும் பயன்படா திருக்கும். ஆகையால், கரப்பான் புண்ணில் அசுடு அதிகமாக யிருந்தால் மேற்கண்ட விதமாக அசுட்டை நீக்கி, பின்னர் கழுவு நீரால் சுத்தம் செய்து வெளிப்பிரயோக மருந்துகளைத் தடவி வரலாம்.

சிகிச்சை

ஆலிட் போரிக் (Acid Boric)	டிராம்
பச்சரிசி மாவு (Starch)	"

ஒன்று சேர்த்துப் பசைபோலாகப் போதுமான சுடுதண்ணீர்விட்டு பசையாக்கி, ஒரு மெல்லிய வெள்ளைத் துணியின்பேரில் கனமாகத் தடவி, இரவு படுக்கைக்குப் போகும்போது, புண்ணுள்ள பாகத்தின்மேல் அப் படியே போட்டுக் கட்டிவிடவேண்டும். காலை யில் கழுவு நீரால் கழுவினால் புண் சுத்தமாக விருக்கும். புண்ணில் அசுடு இன்னும் நீங்காமலிருந்தால் மறுகாரும் கட்டலாம்.

குறிப்பு:—இந்த முறை புண்ணைச் சுத்தம்செய்யுமே யல்லாது. புண்ணை ஆற்றாது.

அச்சரம்—வாய்க்கிரந்தி THRUSH—APHTHA

அச்சரமென்பது வாயிலுண்டாகும் ஒருவிதப் புண். அருகியான விடங்களில் வசிப்பதினாலாவது, தூர்வாடையான காற்றைச்சுவாசிப்பதினாலாவது; காற்றோட்டமற்ற அறையில் நித்திரை செய்வதினாலாவது, ஒரே அறையில் பலர் படுத்தி நித்திரைசெய்வதினாலாவது, அஜீரணரோகத்தினாலாவது இந்த வாய்ப்புண்ணு ரோகம் எல்லா வயதினர்களுக்கு முண்டாகலா மென்றாலும், 2-முதல் 5-வயதுக்குழந்தைகளுக்கே அதிகம் அச்சாவியாதிபுண்டாகின்றது. புட்டிப்பால் பருகும்குழந்தைகளுக்கு விசேஷமாக அச்சரம் ஏற்படுவதுண்டு;

ஆரம்பத்தில் பல்லீறுகளின் ஓரங்களில் எரிச்சலுடன் சிவந்த வீக்கம் காணும்; பல்லீறு வெளுத்துப் பஞ்சைப்போல் மிருதுவாயிருக்கும்; ஆரம்பத்தில் சிவந்து தெரிந்தவிடத்தில் குழியாக விழுந்து அந்தக் குழி அகண்டு கொண்டே வரும்; அந்தக்குழியில், தயிராடைப்போன்று வெள்ளிய மாசுப் பிடித்திருக்கும்; அதைச்சுற்றிலும் சதை சிவந்த சற்று உயர்ந்திருக்கும்; தயிராடைபோன்ற அந்த வெள்ளிய வஸ்துவை அப்புறப்படுத்தினால் இரத்தம் கசியும்; வாழைத்திறப்பதினாலும், பேசுவதினாலும் எரிச்சலும் வலியுமதிகரிக்கும்; அச்சரமேற்பட்டிருந்தால், திசேகோஷணம் சற்று அதிகரிக்கும்; குளிர் நடுக்கமுண்டாகியு மிருக்கும்; தலைநோயுண்டாகும்; நாசியிலிருந்து நீர்வடிந்து கொண்டே இருக்கும்.

அச்சரம் பல்லீறுகளிலும், காக்கு, உதடு, கன்னத்தின் உட்புற மிருதுவான சதை முதலியவிடங்களில் உண்டாகும்.

தமிழ் வைத்திய நூற்கள் அச்சரம் 8 என்று கூறுகின்றன. ஆங்கில வயித்திய நூல்கள் இதை “காண்கரம் ஓரீஸ்” (Cancerum Oris) என்ற ஒரே பெயருடன் கூறுகின்றன. தமிழ் வைத்திய நூற்கள் கூறும் வண்ணம் அச்சரங்களுக்குத் தனித்தனிப் பெயர்களைக் கீழே கூறி, அவற்றிற்கான சிகிச்சா முறைகளைத் தனியாகவும், பொதுவாகவும் இத்தலைப்பின்கீழ் கூறப்படுகிறது.

அச்சர வகைகள்

உள் அச்சரம்	சூலியச்சரம்
கபாலியச்சரம்	சோதியச்சரம்
குண்டியச்சரம்	நீலியச்சரம்
குமரியச்சரம்	வீமியச்சரம்

உள்ளச்சரம்:—

அச்சரோகக் குறிகளுடனும், நாவில் மாவுபடிந்து, நாவாட்சியுண்டாகும். வாய் உவர்மண் நாற்றமடிக்கும். முகம் வெளுத்து மூக்கிலிருந்து நீர்

வடித்துகொண்டே விருக்கும். உதடுகளினுட்புறம் புண்களுண்டாயிருக்கும். தூக்கமதிகமேற்படும்.

சிகிச்சை

புங்காங்கொட்டைப்பழச்சதை அநிமதரம் ரூபாயெடை 2
ரூபாயெடை 2 பசுரெய் அவுன்ஸ் 12

முலைப்பால் விட்டரைத்து, நெய்யில் கலக்கிக் காய்ச்சி வடித்து, காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டியளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

அச்சரப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

கபாலி யச்சரம்:—

அச்சரரோகக் குறிகளுடனும், திரேகம் கனத்திருக்கும்; வயிற்றோட்டமேற்படும்; தலைவலியும், நெஞ்சுவலியுமிருக்கும்; சூரம் காயும்; இழுப்பு உண்டாகும்; தொண்டையும் நாக்கும் புண்பட்டிருக்கும்.

சிகிச்சை

அச்சரப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

குண்டி யச்சரம்:—

அச்சரரோகக் குறிகளுடனும், இடுப்புக்குமேல் குடு அதிகமாயிருக்கும், உடல்முழுவதும் நச்சுவலியாக விருக்கும்; திரேகம் வெளுத்து இளைத்திருக்கும்; நெஞ்செரிவும், நெஞ்சுவலியும், வார்தியும், வயிற்றோட்டமுமுண்டாகும்; தொண்டையில் வலியேற்படும்; விலாப்பக்கங்களில் மிகுந்த வலியிருக்கும்; நாவு சிவந்து புண்பட்டிருக்கும்; மூத்திரம் மஞ்சளாக்கரைத்ததைப்போலிறங்கும்; ஆசனவாயில் ஊசியால் குத்துவதைப்போலிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) சேகந்தையும், கரிசலாங்காணியும் சமமாயெடுத்தரைத்ததில், காலை மாலை கால் ரூபாயெடை யவ்வளவு, சமன் பசு ரெய்யுடன் குழப்பிக் கொடுத்துவரலாம்.

(2) வேப்பங்காயும், சுண்டைவேரும் சமமாயரைத்ததில், காலை மாலை கால் ரூபாயெடை யவ்வளவு சமன் பசுரெய்யில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

அச்சரம் பொதுமருந்துகளி லொன்றைக்கொடுத்து வரலாம்.

குமரி யச்சரம்:—

அச்சரரோகக்குறிகளுடனும் நாவுதடித்து, மாவுபடித்து வெடித்திருக்கும்; சூரம்காயும்; வாய்கசக்கும்; இரத்தக்கழிச்சலும்; வார்தியும், கண்ணெரிச்

சலு முண்டாகும்; பற்கள் மஞ்சணித்திருக்கும்; சில சமயம் மூக்கி
லிருந்து இரத்தம் சொட்டும்; உன்நாக்கு ஊர்ந்திருக்கும்.

சிகிச்சை

அச்சரப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

குலை யச்சரம் :—

அச்சரோகக்குறிகளுடனும், நாவில் மாவு படிந்து, வெடித்தப் புண்ணு
யிருக்கும்; வெள்ளைநிறமான வாந்திபுண்டாகும்; வாய் உவர்மண் நாற்ற
மடிக்கும்; எச்சில்பெருக் கதிகமா யிருக்கும்; இடுப்பு வலி யதிகமா
யிருக்கும்.

சிகிச்சை

அச்சரப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

சோதி யச்சரம் :—

அச்சரோகக் குறிகளுடனும், வாந்தியும், வயிற்றோட்டமு யிருக்கும்;
வாயில் புண்களுண்டா யிருக்கும்; நாவும், பல்லும் அழுக்கு நிறமாக
விரும்பும்; காச்சலும், தலைவலியு முண்டாகும்; அடிவயிறும், முதுகும்
ளரிச்சலாக விரும்பும்.

சிகிச்சை

அச்சரப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

ரீலி யச்சரம் :—

அச்சரோகக் குறிகளுடனும், உடல் கறுத்திருக்கும்; உட்தொண்டை
யும், ஈரலும், புண்பட்டு வாய் புண்ணுற்றமடிக்கும்; குளிர் நடுக்கத்
துடன் சூரம் காயும்; மயிர் சிலிர்த்திருக்கும்; கொஞ்சம், தலையும் அதிக
வலியா யிருக்கும்.

சிகிச்சை

அச்சரப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

அச்சரப் பொது மருந்துகள் :—

- | | | | |
|---|----------------|--------------------|---------------|
| (1) வெங்காயம் | ரூபாயெடை 3 1/2 | தேன் | அவுன்ஸ் 1 1/2 |
| ஒன்றா யரைத்து வாயில் புண்ணுள்ளவிடங்களில் தடவி வரலாம். | | | |
| (2) சந்தனம் | ரூபாயெடை 1/2 | வட்டத்திருப்பிவேர் | ரூபாயெடை 1/2 |
| கொத்தமல்லி | " 1/2 | மாதாளும்பிஞ்சு | " 1/2 |
| கடுக்காய் | " 1/2 | அத்திப்பட்டை | " 1/2 |
| செவ்வல்லிக்கிழங்கு | " 1/2 | கொட்டைப்பாக்கு | " 1/2 |
| நரயுருவிவேர் | " 1/2 | வல்லாரையிலை | " 1/2 |
| துதுவேளவேர் | " 1/2 | இலந்தையிலை | " 1/2 |

ஒன்று சேர்த்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 12-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், காலை மாலை ½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(3) வல்லாரை	ரூபாயெடை 1	அதிமதுரம்	ரூபாயெடை 1
கற்பூரவல்லி	” 1	ஒமம்	” 1
வெங்காயம்	” 1	சீரகம்	” 1

ஒன்றுசேர்த்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச்சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில், காலை மாலை 1-அவுன்ஸ்வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(4) ஆடாதோடையிலை	ரூபாயெடை 1	அக்ரகாரம்	ரூபாயெடை ½
வட்டத்திருப்பி	” 1	ஏலம்	” ½
நாயுருவி	” 1	கிராம்பு	” ½
கண்டங்கத்திரி	” 1	மாசிக்காய்	” ½
கொடிவேலி	” ½	திப்பிலி	” ½
கொத்தமல்லி	” ½	சீரகம்	” ½
நெல்லிவற்றல்	” ½	செஞ்சந்தனம்	” ½
அதிமதுரம்	” ½		

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 4-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், காலை மாலை 1-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(5) நட்சத்திரமாணிக்கக்கிருதம்; வேம்பாடழி பட்டையெண்ணெய்; தேற்றுகொட்டை மாத்திரை இவைகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(6) போரிக் ஆமிட் (Boric Acid)	டிராம் 1
சுடுதண்ணீர்	அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து ஆகாரம் சாப்பிட்டவுடன் வாயில் ஊற்றிக் கொப்புளிக்கலாம்.

(7) போரிக் ஆமிட் (Boric Acid)	டிராம் 1
சுடுதண்ணீர்	அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து நான் ஒன்றுக்கு பலதடவை ஊற்றிக் கொப்புளிக்கவும்.

(8) ஆமிட் போரிக் (Acid Boric)	டிராம் 1
கிளிசரின் (Glycerine)	” ½
டிஞ்சர் மர் (Tincture Myrrh)	” ½
ஆக்குவா காம்ப்ர் (Aqua Comphor)	அவுன்ஸ் 2

ஒன்று சேர்த்து, நான் ஒன்றுக்கு 3-தரம் விழுங்கிவிடாமல் வாயை மட்டும் கொப்புளிக்கச் செய்து வரலாம்.

(9) ஆஸிட் சாலிஸிலிக் (Acid Salicylic)	கிரான்ஸ்	30
ஸ்பிரிட் வைனம் ரெக்டிபைட் (Spirit Vinum Rectified)	டி.ராம்	3
ஆக்ரவா கரம்பர் (Aqua Comphor)	அவுன்ஸ்	8

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்துகொண்டு நான் ஒன்றுக்கு 3-தடவை விழுங்கி விடாமல் வாய் மட்டும் கொப்புளிக்கச் செய்து வரலாம்.

காமாலை JAUNDICE

காமாலேரோகம், பித்தப்பை விகல்பத்தினாலுண்டாவதா யிருக்கிறது. கல்லீரலின் (Liver) வீக்கத்தினால், பித்தப்பையின் சவ்வு நசுங்கி, பித்தநீர் உடலில் வியாபித்து, நுண்ணிய உருப்புகளை மஞ்சளாகச் செய்துவிடுகிறது. முக்கியமாக கண் வெள்ளைவிழியையும், நகக்கண்களையும், மஞ்சள் நிறமாக்கி விடும். அடுத்தபடியாக முகத்தையும், கழுத்தையும் மஞ்சளாக மாற்றி, ஈர டைவில் உடல் முழுவதும் மஞ்சளாக்கிவிடும். மூத்திரமானது இறுகிய ஆரஞ்சு நிறமாக அதாவது, தேனைவிட சற்று வெளுரின் நிறமாகவோ அல்லது கருங்காலிமரத்தின் நிறமாகவோ இறங்கும். மலம் வெளுரின் மஞ்சள் நிறமாகவேணும், களிமண் நிறமாகவேணும் யிருக்கும். மலச்சிக்கலோ, வயிற் றோட்டமோ ஏற்படுவதுண்டு. சதா புளித்தேப்பமும், வாய்ச்சுப்பும் உண்டா கும்; சில சமயங்களில் சுரம் காய்வதுமுண்டு; முகவலியும், விலாவில் ஏதோ ஒரு பரம் அழுத்திக்கொண்டிருப்பதைப் போன்ற உணர்ச்சியுமேற்படும். சில சமயங்களில் வயிற்றுப் பொருமலும் பசிமந்தமு மேற்படுவதுமுண்டு. கல்லீரலானது வீங்கியிருப்பதினால், இருதயநடைக்கு இடைஞ்சலேற்பட்டு நாடி ஓட்டம் மெதுவாகத் தணிந்திருக்கும்.

காமாலேரோகம் மரணத்திற்கேதுவாகும் ரோகவகையில் சேர்ந்ததல்ல. வயதுவந்தவர்களுக்கானால் காமாலேரோகம் கிரந்திரோகம் தாக்கியதினாலேற் பட்டதா யிருக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு இவ் வியாதி குளிர் மிகுதியாலும்; ஆகார விகல்பத்தினும்; வரட்சியான காரற்றாலும் வரக்காரணமாயிருக்கலாம்.

குழந்தைகளுக்குப் பிறந்த இரண்டு மூன்று தினத்திற்குப் பின் மஞ் சட் காமாலை (Icterus Neonatorum) வருவதுண்டு; ஆனால், இது குழந்தை களுக்குச் சாதாரணமாக சம்பவிப்பதல்ல பிறந்த குழந்தைகளுக்கு மஞ்சட் காமாலை வருமானால், வியாதியாகப் பாவிப்பதாயில்லை;

காமாலை 13-என்று தமிழ் சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன; ஆனால், காமாலையோகம், பித்தப்பை விகல்பத்தினால்மட்டும் வருவதாயிருப்பதால், அத்தனையையும் இங்குக்குறிப்பிடாமல், ஊது காமாலை; மஞ்சட் காமாலை; வரட் காமாலை; இவைகளுக்கும்மட்டும் வியாதி விவரணம் கூறப்பட்டிச் சகல காமாலை ரோகத்திற்கும் அவுஷதப்பாகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஊதுகாமாலை:—

காமாலையோகக்குறிகளுடனும், முழங்கால்வீங்கியிருக்கும்; பசி, காசடைப்பு இழுப்புக்காணும்; பசியுண்டான இரண்டொரு நிமிஷத்தில் பசி மந்தமேற்படும்; கால் அசதியாக விருக்கும்; நாவு புண்பட்டிருக்கும்.

சிகிச்சை

* சுத்திசெய்த † அரப்பொடி	முருங்கையிலை	ரூபாயெடை	½		
ரூபாயெடை ½	கரிசலாங்காணி	„	½		
‡ மண்டுரம்	„	½	முற்றின தேங்காய்	„	½
வெள்ளைப்பூண்டு	„	½			

ஒன்று சேர்த்து, இளநீர் தண்ணீரால் மைபோலரைத்து, காலை மாலை கால் ரூபாயெடை மருந்தை ஒரு அவுன்ஸ் நீர்முள்ளிக்கடியத்தில் கலக்கிக் கொடுத்து வரலாம்.

காமாலைப் பொது மருந்துகனி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

மஞ்சட் காமாலை:—

காமாலை ரோகக் குறிகளுடனும், முகம், கைகால் வீக்கமாகத் தெரியும்; மலச்சிக்கலுண்டாகும்; மூத்திரம் கடுத்து, மஞ்சளாக் கரைத்ததைப் போலிறங்கும்; கண் வெள்ளை விழிகளும், நகக்கண்களும் மஞ்சள் நிறமாகத்தெரியும்.

சிகிச்சை

(1) சங்கனவேர்ப்பட்டை ரூபாயெடை 3 அதிமதுரம் ரூபாயெடை 1

ஒன்று சேர்த்து, எலுமிச்சம்பழச் சாற்றால் 3-நாள் அரைத்துச் சுண்டக்காய்வவளவு பெரிய மாத்திரைகள் செய்து காயவைத்துக்கொண்டு, காலை மாலை பசும்பாலில் 1-மாத்திரை வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

■ அரப்பொடியை 3-மணி நேரம் எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் ஊறவைத்து பின் பலதடவை சுத்தமான தண்ணீர் விட்டுக் கழுவி எடுத்துக்கொள்ளவும்.

† இரும்பை ராவியத் தூள்.

‡ கொல்லன் உலைக்கிட்டம்.

- (2) நாட்டுக்காட்டாமணக்கிலையை மைபோல் அரைத்து, நாளொன்றுக்கு 3-தடவை அரை ரூபாயெடை யளவாகவெடுத்து, சமன் எருமை வெண்ணையில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

காமாலைப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக்கொடுத்து வரலாம்.

வரட் காமாலை:—

காமாலை ரோகக் குறிகளுடனும், உடம்புமெலிந்து வரட்சியாக விருக்கும்; நாவாட்சிக் காணும்; கண் மஞ்சளாக விருக்கும்.

சிகிச்சை

கீழ்க்காய்நெல்லி, மணித்தக்காளி இவைகளின் டீ சமூலத்தைச் சமமாக வெடுத்து, எலுமிச்சம்பழச் சாற்றால் மைபோலரைத்து, காலை மாலை அரை ரூபாயெடை யளவு எருமைத்தயிரில் கலக்கிக் கொடுத்து வரலாம்.

காமாலைப் பொது மருந்துகளி லொன்றைக்கொடுத்து வரலாம்.

காமாலைப் பொது மருந்துகள்:—

(1) கடுக்காய்	ரூபாயெடை 1	சீமை நிலவேம்பு	ரூபாயெடை 1
தான்றிக்காய்	,, 1	சீந்தில்தண்டு	,, 1
நெல்லிவற்றல்	,, 1	கடுகுரோகிணி	,, 1
ஆடாதோடையிலை	,, 1	மரமஞ்சள்	,, 1

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) மண்ரோச்செந்துரம்	ராஜாமிர்த சஞ்சீவி லேகியம்
அயக்காந்தசெந்துரம்	மகாகுழ்பாண்ட லேகியம்
வீரசூதசிந்தாமணி	வில்வாதி லேகியம்
திரிபுவனச்செந்துரம்	கரிசலாய்கண்ணிச் சூரணம்
துருகபஸ்பம்	சூரிசாலை எண்ணெய்
மகாகுழ்பாண்டக்கிசுதம்	

இவற்றி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(3) பல்விஸ் ரீயை (Pulvis Rhei)	கிரைன்ஸ்	10
பொட்டாஷியம் டார்ட்ரேட் (Potassium Tartarate)	டிசாம்	1
ஆக்குவா மெந்தாபிப் (Aqua Menthapip)	அவுன்ஸ்	2

டீ வேர், தண்டு, இலை, பூ, காய்.

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒரு தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (4) அமோனியம் குளோரைட் (Ammonium Chloride) கிரான்ஸ் 2
எக்ஸ்டிராக்ட் கிளிச்சரிஸா லிக்குட் (Extract
Glycyrrhiae Liquid) அவுன்ஸ் ½
ஆக்குவா டிஸ்டில் (Aqua Distill) ,, 1

ஒன்றுசேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒரு தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

குறிப்பு—இந்த மருந்து கொடுப்பதற்கு முதல் நான் இரவில் ஒரு டிராம் சிற்றாமணக்கெண்ணெய் கொடுக்கவும்.

- (5) சோடியம் பைகார்போனேட் (Sodium Bicarbonate) கிரான்ஸ் 9
ஸ்பிரிட் குளோரோபாரம் (Spirit Chloroform) துளி 10
■ டிஞ்சர் நக்ஸ் வாமிகா (Tincture Nux Vomica) ,, 2
ஆக்குவா கரூய் (Aqua Carui) டிராம் 9

ஒன்றுசேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு தேக்காண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

குறிப்பு:—இதுவரையில் குழந்தைகளுக்குண்டாகும் கூட்டு வியாதிகளை (Group)ப் பற்றிக் கூறிவந்தோம். இனி, அடுத்த மூன்றாம் பாகத்தில் குழந்தைகளுக் கேற்படக்கூடிய தனித்தனி வியாதிகளையும் அதற்குத்தக்க சிகிச்சை முறைகளையும் கூறுகிறோம்.

இந்த இரண்டாவது பாகத்தில் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கும்படியாக சொல்லியுள்ள இல்லிஸ் மருந்து அளவுகள் 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரு தேக்காண்டியானால், அதிலிருந்து 3-வயதுவரையில் அதாவது 3-முதல் 6-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 2-தேக்காண்டியாக, இந்த விதமாய் ஒவ்வொரு 3-வயதுக்கும் ஒவ்வொரு தேக்காண்டி அதிகமாகக்கொடுக்கலாம். நான் மருந்துகளை 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒருபாகம் கொடுக்கச் சொல்லியிருந்தால் அதிகமாகும் ஒவ்வொரு 3-வயதிற்கும் ஒருபாகம் அதிகமாகவே கொடுத்துவரலாம். இந்த அளவுமுறையையே 3-ம் பாகத் திற்கும் கையாளவும்.

மூன்றாம் பாகம்

THIRD PART

ஸ்திரீ பால சிகிச்சை

முன்றும் பாகம்

பற்பல பாலர் ரோகங்கள்

MISCELLANEOUS DISEASES OF
INFANTS & CHILDREN

அடிக்கடி பால் எடுத்தல்:—

தாய்ப் பாலாவது, புட்டிப் பாலாவது குடிக்கும் குழந்தைகள் அடிக்கடி பால் எடுப்பதுண்டு. குழந்தை அழும்போதெல்லாம் பால் புகட்டுவதினால், பால் அளவுக் கசிகமாகி இரைப்பையில் அதிகநேரம் தங்கி புளிப்பேறுவதாலும், அஜீரணத்தாலும் இது ஏற்படுவதாயிருக்கலாம். அப்படி வாந்திசெய்த பாலானது முறிந்துத் தயிர்கட்டியைப்போலும், புளித்த நாற்றத்துடனு மிருக்கும். அஜீரணத்தினாலானால், குழந்தைக்கு வயிறு பொருமி வாந்தியாகும்.

சிகிச்சை

- (1) வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை ½ ஓமம் ரூபாயெடை ½ ஒன்றுசேர்த்து 6-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 2-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 1, 2-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்துவரலாம்.

வயிறு பொருமியிருந்தால்:—

- (2) வயிறு பொருமியிருந்தால், முதல் இலக்கமுள்ள கஷாயத்தை உள் ளுக்குக் கொடுத்து, அதிமதுரத்தைக் காடியிலரைத்துத் தொப்புளைச் சுற்றிலும் பூசலாம்.
- (3) வாந்தி நிற்கும்வரை கொடுக்கும் ஒவ்வொரு அவுன்ஸ் பாலுடனும், ஒரு கிரான்ஸ் சோடியம் சிட்ரேட் (Sodium Citrate) கலந்து கொடுத்து வரலாம்.
- (4) பெப்டோனைசிங் பவுடரை (Peptonizing powder) அளவுப் பிரகாரம் உபயோகித்து வரலாம்.

அண்ட வீக்கம்:—Hybrocelle

குழந்தைகளுக்கு விரை வீக்கம் இரண்டு வகையாக வருவதுண்டு. அடிவயிற்று சவ்வின்பேரில் அடிக்கடி குடல்கள் சரிவுண்டாகிக் குடலைப்

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, காலே மாலை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

(4) சவரிக் கொடி	ரூபாயெடை	■	வெள்ளைப்பூண்டு	ரூபாயெடை	$\frac{1}{2}$
முடக்கொத்தான்வேர்	,,	■	சுக்கு	,,	$\frac{1}{2}$
தைவேளைவேர்	,,	5	திப்பிலி	,,	$\frac{1}{2}$
சாரணத்திவேர்	,,	5	மிளகு	,,	$\frac{1}{2}$
மூக்குரட்டைவேர்	,,	5	கழற்சிப்பருப்பு	,,	$\frac{1}{2}$
ஒமம்	,,	$\frac{1}{2}$	தேங்காய்ப்பால்	அவுன்ஸ்	■
			சிற்றுமணக்கெண்ணெய்	,,	12

முதலில் வேர்களைப் பொடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 12-அவுன்ஸாகச் சுண்டிய கஷாயத்துடன், இதர சரக்குகளைத் தூள்செய்து போட்டு, பாலையும் எண்ணெயையும் சேர்த்துக்கலந்து காய்ச்சிவடித்து, காலே மாலை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் 3-நாளைக்குக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்)

(5) சிற்றுமணக் கிலையில், சிற்றுமணக் கெண்ணெயைத் தடவி வதக்கி பீஜத்தின்மேல் வைத்துக் கட்டி வரலாம்.

(6) தைவேளையிலேயையும், மணித்தக்காளியிலேயையும் ஒன்று சேர்த்து வதக்கி பீஜத்தின்மேல் வைத்துக் கட்டி வரலாம்.

(7) நவாச்சாரம் (Salammoniac)	அவுன்ஸ்	1
ஸ்பிரிட் ரெக்டிபைட் (Spirit Rectified)	■	1
தண்ணீர்	,,	2

ஒன்றுசேர்த்துக் கரைத்துக்கொண்டு ஒரு துணியில் நனைத்து, மேல் பிரயோகமாக பீஜத்தின்மேல் போட்டு வரலாம்.

(8) அண்டச்சண்ணம்; முடக்கொத்தான் எண்ணெய்; அகஸ்தியர் குழம்பு; வாதராஷச எண்ணெய் முதலியவைகளிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(9) அமோனியம் குளோரைட் (Ammonium Chloride)	டிராம்	1 $\frac{1}{2}$
ஸ்பிரிட் வைனம் ரெக்டிபைட் (Spirit Vinum Rectified)	,,	4
ஆலிட் அலிபிக் அிட் (Acid Acetic Dil)	,,	4
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	10

ஒன்றுசேர்த்துக் கரைத்துக்கொண்டு ஒரு துணியில் நனைத்து மேல் பிரயோகமாக மட்டும் பீஜத்தின்மேல் போட்டு வரலாம்.

(10) பிஸ்மத் சப்நைட்ரஸ் (Bismuth Subnitrates) இதை வேண்டிய அளவு யெடுத்து தண்ணீர்விட்டுக் குழப்பி மேல் பிரயோகமாக மட்டும் பீஜத் தின்மேல் தடவி வரலாம்.

(11) டிஞ்சர் புல்ஸாட்டில்லா (Tincture Pulsatillae)	துளி	3
■ டிஞ்சர் அக்னோனைட் (Tincture Aconite)	,,	2
சிரப் சிம்பிள் (Syrup Simple)	டிராம்	1
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	1

ஒன்றுசேர்த்துக் கலக்கிக்கொண்டு 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணிசேரத்திற்கு ஒருமுறை ஒரு தேக்காண்டிவீதம் கொடுத்து வரலாம்.

அபானவெடிப்பு:—Anal Fissure

குழந்தைகள் மலம் நழித்தவுடன் சுத்திசெய்யாமல் காயவிட்டு விடுவதினாலாகிலும், மலக்குடவில் கிரைப்பூச்சி அதிகரித்து, ஆசனவாயில் நமச்சூல யுண்டுபண்ணி சதா சொறிந்துகொண்டிருப்பதினாலாகிலும்; ஆசன வெடிப்புண்டாகலாம். வெடிப்புகள் அதிகமுண்டாயிருந்தால் சிலசமயம் இரத்தம் கசிவதுமுண்டு.

சிகிச்சை

- (1) வேப்பெண்ணெயை ஆசனவாயில் தடவி வரலாம்.
- (2) மாசிக்காயைப் பசுவெண்ணெயில் குழைத்துப் போடலாம்.
- (3) எக்ஸ்ட்ராக்ட் பெல்லடோனா வெர்டி (Extract Belladonnae Verdi)
டிராம்
அங்குவண்டம் பிளம்பி அலிட்டஸ் (Unguentum plumbi Acetas)
அவுன்ஸ்
ஒன்று சேர்த்து வெளிப் பிரயோகமாக மட்டும் தடவி வரலாம்.

அமரம்:—

கண்கட்டி பென்ற துலப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

அம்மைக்கட்டு:—Mumps Parotitis

இதைக் கூடைவீக்கம்; கூடைக்கட்டு; பொன்னுக்கு வீக்கி; புட்டாளம்மை; பொன்னி; நடைக்குவீக்கி; தன்னக்கட்டு என்றெல்லாம் சொல்லப்படும், எச்சலூறும் கோளங்களில் (Parotid Glands) வீக்கம் காணுவதால் அம்மைக்கட்டுண்டாகிறது. அம்மைக்கட்டும் ஒருவரிடமிருந்து மற்றவர் களுக்குத் தாவும் தன்மையுள்ளதாக விருக்கிறது. இது ஒரு கிருமியினாலேற்படுவதாகும். ஐந்து வயதிற்குமேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கும், வயது வந்தவர்களுக்கும் மட்டுமே அம்மைக்கட்டுண்டாகலாம் அம்மைக்கட்டு விசேஷமாக மழைக்காலத்திலும், குளிர்காலத்திலுமே வாக்கடியதாக விருக்கிறது.

* விஷமானது ஜாக்கையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

ஆரம்பத்தில் இலேசான காய்ச்சலுடன், தாடையை அசைக்கும்போதும் பேசும்போதும் ஏதோ பிடிப்பாகவும், வலியிருப்பதாகவும் தோன்றும். சாப்பிடும்போதும் தண்ணீர் குடிக்கும்போதும் பெரிய வலியுண்டாகும், பின் காதின் கீழ் சற்று வீக்கித் தெரியும்; இருக்க இருக்க கழுத்து காதோரமாகவும் வீங்கும். சில சமயங்களில் வீக்கம் நெஞ்சக்குழிமட்டு மிருக்கும், ஆரம்பத்தில் வீக்கம் ஒரு பக்கந்தான் யேற்படும். இரண்டு மூன்று தினத்திற்குப் பின் அந்தப்பக்கம் மறைந்து மறுபக்கம்வீங்கும். சிலருக்கு ஒருபக்கம் வீக்கம் கண்ட இரண்டு மூன்று தினத்தில் எதிர் பக்கத்திலும் வீக்கம் காணுவதுண்டு. சிலருக்கு காச்சலில்லாம வேற் படுவது முண்டு. சிலருக்குத் தலைவலி யிருக்கும்.

சிகிச்சை

- (1) வேப்பங்கொழுந்தையும், மஞ்சளையும் சமமாயரைத்துப் பூசி வரலாம்.
- (2) லைக்கர் அமோனியம் அவிடேடிஸ் (Liquor Ammonia Acetatis) டிராம் 1½
பொட்டாஷியம் சிட்ரஸ் (Potassium Citras) கிரான்ஸ் 5
ஆக்குவா சின்னமோனி (Aqua Cinnamoni) அவுன்ஸ் 1
ஒன்று சேர்த்து, 4-மணி நேரத்திற் கொருதரம் 5-முதல் 12-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு இரண்டு தேக்கரண்டி யளவாகக்கொடுத்து வரலாம்
- (3) *லினிமென்ட் பெல்லடோனா (Liniment Belledonnae) இதைப்பஞ் சில் நனைத்து, காலை மாலை வெளிப்பிரயோகமாக வீக்கத்தின்மேல் தடவி வரலாம்.
- (4) *டிஞ்சர் ஐயோடின் (Tincture Iodine) டிராம் 1½
*டிஞ்சர் அக்கோனைட் (Tincture Aconite) ,, 1½
டிஞ்சர் ஒபியம் (Tincture Opium) ,, 1
லினிமென்ட் குளோரோபாரம் (Liniment Chloroform)அவுன்ஸ் 3
ஒன்று சேர்த்து, வெளிப்பிரயோகமாக மட்டும் வீக்கத்தின்மேல் தடவி வரலாம்.

அரண் கட்டுதல்:—

நர்ப்புண் என்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

அழுகை:—Crying

குழந்தைகள் பேசும்படியான நிலைமையையடையும் வரையில், தங்களுக்குத் தேவையானவைகளை யடைவதற்கு அழுகையே தங்கள் பாவையாக

■ அதிக நஞ்சானதால், வாயில் படாமல் வெளிப்பிரயோகம் மட்டும் செய்து வரவேண்டும்.

வைத்திருக்கின்றன. குழந்தைகளுடைய சுவாசாசயங்கள் வளர்ச்சி யுடைய அழுக்கையே பிரதானமானதாயிருக்கும்.

அநேகமாய் குழந்தைகள் அழுவதற்கு வெளிக்காரணங்களே முக்கியமானதாக விருக்கலாம். அதிகமான துணிகளைச் சுற்றிவைத்திருப்பதனால் குழந்தை தன் கைகால்களை உதறி, தன் இஷ்டப்படி இருக்கமுடியாததனாலும், குழந்தைக்குப் போர்த்தியிருக்கும் துணிகள் குழந்தையை அழுத்திக்கொண்டிருப்பதனாலும், மூத்திரம் பெய்து துணிகள் நீண்டுபோயிருப்பதனாலும், அரை குறையான ஆகாரத்தினாலும், அதிகமான ஆகாரத்தினாலும் குழந்தைகள் அடிக்கடியழலாம்.

மேலும் குழந்தைகள் வியாதியின் காரணமாகவும் அழும்படியாகவிருக்கிறது வியாதியின் காரணமாக குழந்தைகள் அழுமானால், அது தணிப்பட்டவிதமாக நன்றாய்த் தெரிந்துகொள்ளும்படியாக விருக்கும். மூளை நரம்புவலியினால் குழந்தையழுமானால், அது திடீரென்றும், நீட்டியல்லாமல் குறைந்தவிதமாக அழும்; ஆனால், சப்தம் மட்டும் அதிகமாயிருக்கும்.

வயிறு, அடிவயிறு முதலியவற்றில் வலியோ இதரக்கோளாறுகளோ உண்டானால்; குழந்தை நீட்டியழும். தொண்டை நாளங்களின்கோளாறுகளினாலாவது, தொண்டைவலியினாலாவது, குழந்தையழுமானால், புகைந்த இருபியழுவைதப்போ விருக்கும். மேலும், ஒரு ஊது சப்தமு முண்டாகும். கடுமையான தோஷவியாதியினாலாகிலும்; நெஞ்சு வீக்கத்தினாலாகிலுமானால் குழந்தை சரியானவிதமாய் அழுமுடியாமல், சுவாசத்தடைபட்டு, அதனால் கஷ்டப்பட்டு அழுவது நன்றாகத் தெரியும்.

குழந்தைகள் அழும்போதெல்லாம், மூலக்கொடுப்பது கெட்டதொரு வழக்கமாகும். குழந்தைகளுக்குக் குறிப்பிட்ட நேரங்களில் பால் புகட்டி வந்தால், குழந்தை பாலுக்காக அழவேண்டிய திருக்காது. அப்போது குழந்தை அழுமானால் வேறு காரணத்தால் அழுகிறதென்று தெரிந்து கொள்ளவியலும். தாசிப்பாலும், புகட்டுப்பாலும் குடித்துவரும் குழந்தை அடிக்கடி வயிற்று வலியும், வயிற்றுப்பொருமலும், அஜீரணமும் கண்டு அழுவதுண்டு.

குழந்தை பசியினாலல்லாமல், இதர காரணங்களினால் அழுவதாயிருந்தால், அந்தக் காரணத்தைச் சரியாய் அறிந்துகொள்ள வேண்டுமானால், சமீபத்தோஷமுள்ள ஒரு அறையில் உடைகளொன்று மில்லாதுசெயனிக்கச் செய்து உற்று கவனித்தால் நன்றாகத் தெரிந்துகொள்ள முடியும். நெஞ்சுவீக்கத்தினாலாவது, வயிற்றுப்பொருமலினாலாவது குழந்தை உபத்திரவப்பட்டால் நெஞ்சும், வயிறும் ஊதியிருப்பது நன்றாகத் தெரியும். துணிகளினால் கஷ்டப்பட்டு அழுததாகவிருந்தால் துணிகளை நீக்கியவுடன்

குழந்தை நிம்மதியாக விருக்கும் குளிரினாலோ உஷ்ணத்தினாலோ பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், சமசீதோஷ்ண நிலைமையிலிருப்பதால் அதன் அழுகை ஒய்ந்துவிடும். பின்னர் அதன் காரணங்களைத் தெரிந்து கொண்டு சிகிச்சைகள் செய்து வரலாம்.

அறைவீட்டில் குழந்தைகளுக்குக் கழுத்துவீங்கி யழுதல்:—

குழந்தைப் பிறந்த இரண்டு மூன்று நாட்களுக்குப் பின், அதிகமான குளிர் வாடையினாலாவது, சீதளம் கொள்வதினாலாவது குழந்தையின் புறங்கழுத்து வீங்கி முழங்கால், முழங்கை சில்லிட்டிருக்கும். அத்துடன் வயிற்று வலியும் உண்டாகி சதா குழந்தை ரச்சரச்சென் றழுது கொண்டிருக்கும்.

சிகிச்சை

- (1) ஒரு தேக்கரண்டி வெற்றிலைச்சாற்றில் இரண்டு அரிசியெடை கஸ்தூரி யைக் கரைத்துக் கொடுத்து வரலாம்.
- (2) ஒரு தேக்கரண்டி வெற்றிலைச்சாற்றில் இரண்டு அரிசியெடை கஸ்தூரி யையும் 6-அரிசியெடை திப்பிலித் தூளையும் சேர்த்துக் கொடுத்து வரலாம்.
- (3) கஸ்தூரிமாதிரை கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-பாகம் பார்க்கவும்

ஆகார வெறுப்பு—Anorexia.—Loss Of Appetite

குழந்தைகளுக்கு ஆகார வெறுப்பேற்பட, திரேக அசதியும் சூரமும், மலச் சிக்கல், பல் முளைக்கும்போதுண்டாகும் வலி இவைகள் காரணமாயிருக்க லாம். சில குழந்தைகள் பாரக்குப் பார்த்துக்கொண்டுகூட பால் குடியா மலும், சூதும் உட்கொள்ளாமலு மிருக்கலாம். அக்க மிகுதியினாலும் குழந்தை ஆகாரமுண்ணாமலிருக்கலாம். ஆதலால், தக்கக் காரணம் தெரிந்துதான் குழந்தைகளின் ஆகாரவெறுப்புக்குச் சிகிச்சைகள் செய்யவேண்டும்.

மலச்சிக்கலிருந்தால், மலச்சிக்கலைப் போக்கவேண்டியது. வேடிக்கைப் பார்த்துக்கொண்டு பால் குடியாமலோ, சோறு தின்னாமலோ விருந்தால், வேடிக்கைக் காண்பித்துக்கொண்டே ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டியது. அசதி, சூரம் இவைகளினால் குழந்தை ஆகாரம் உட்கொள்ளாவிட்டால், அசதி, சூரம் இவைகளுக்குத் தக்க சிகிச்சைகள் செய்யவேண்டும். பல் முளைக்குவ் காலத்திலுண்டாகும் நோயினால் ஆகாரம் உட்கொள்ளா விட்டால் அதற்குத் தக்க சிகிச்சைகள் செய்யவேண்டும்.

சிகிச்சை

பால் குடிக்கும் குழந்தைகள் எக்காரணத்தினாலாவது பால் குடிக்காம லிருந்தால்:—

(1) அதிமதுரத்தை முலைப்பாலிலரைத்து, முலைக்காம்புகளில் தடவி குழந்தையின் வாயில் வைத்து கொஞ்சகேரம் பிடித்துக்கொண்டிருந்தால்; குழந்தை வேடிக்கையினாலாவது இதர காரணங்களினாலாவது பால் குடிக்காவிட்டாலும், அதிமதுரத்தின் உருசி வாயில் பட்டவுடன் பால் குடிக்கும்.

(2) அமுக்சிராவேர்	ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$	பறங்கிப்பட்டை	ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$
சத்திச்சாரணாவேர்	" $\frac{1}{8}$	சுக்கு	" $\frac{1}{8}$
முக்காட்டைவேர்	" $\frac{1}{8}$	மிளகு	" $\frac{1}{8}$
அவுரீவேர்	" $\frac{1}{8}$	திப்பிலி	" $\frac{1}{8}$
மிளகாரணாவேர்	" $\frac{1}{8}$	கடுகு	" $\frac{1}{8}$
கருங்காவியிலை	" $\frac{1}{8}$	சீரகம்	" $\frac{1}{8}$
கஞ்சாங்கோரை	" $\frac{1}{8}$	பேரத்தை	" $\frac{1}{8}$
சன்னலவங்கப்பட்டை	" $\frac{1}{8}$	பசும்பால்	அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்துப் பசுபால் விட்டரைத்து வடிகட்டி, காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(3) காட்டாத்திப்பூ	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	வெள்ளிலோத்திரம்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
வில்வப்பழம்	" $\frac{1}{2}$	யாணத்திப்பிலி	" $\frac{1}{2}$
வெட்டிவேர்	" $\frac{1}{2}$		

ஒன்றுசேர்த்துப் பொடித்து, 6-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 2-அவுன்ஸ் ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

மலச்சிக்கலினால் குழந்தை ஆகாரம் உட்கொள்ளாவிட்டால் 1, 2, 3. இலக்க மருந்துகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

(4) ஐட்ராஜரி கம் கிரீட்டா (Hydrargeri Cum Crete) கிரைன்ஸ்	2
சோடியம் பைகார்ப் (Sodium Bicarb)	" 4

ஒன்றுசேர்த்து 4-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு, காலை மாலை பிறந்தது முதல் ஒரு வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒருபாகம் வீதமும் 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 2-பாகம் வீதமும், தேனில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

(5) பெனாஸ்ப்தாலின் (Phenolphthalein)	கிரைன்ஸ் $\frac{1}{2}$
சக்கரின் லாக்டிஸ் (Saccharine Lactis)	" 1

ஒன்றுசேர்த்து 4-பாகமாகப் பிரித்து, பிறந்ததுமுதல் ஒரு வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரு பாகம் வீதமும்; 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 2-பாகம் வீதமும், காலை மாலை தேனில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

(6) சிரப் ஐப்போ பாஸ்பேட் கோ (Syrup Hypophosphate Co)	தளி	40
மால்டின் (Maltine)	"	45
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	½

ஒன்றுசேர்த்து பிறத்தது முதல் ஒரு வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரு தேக்கரண்டி வீதமும், 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 2-தேக்கரண்டி வீதமும் நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை கொடுத்து வரலாம்.

பல் முளைப்பதினால் குழந்தைகளுக் குண்டாகும் ஆகார வெறுப்புக்கு, 1, 2, 3, ■ இலக்க மருந்துகளிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

(7) அன்டிபைரின் (Antipyrin)	கிரான்ஸ்	½
-----------------------------	----------	---

இதை இரவில் படுக்கைக்குப் போகுமுன் வாயில் சொட்டி விழுங்கச் செய்து கொஞ்சம் தண்ணீரைக் குடிக்கக் கொடுத்து வரலாம்.

ஆசனவெடிப்பு:—

அபாண வெடிப்பென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

இரத்தக்குறைவு:—

பாண்டு யென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

இருமல்:—Cough

இருமலென்பது ஒருதனிப்பட்ட வியாதியல்ல. பிறருக்குத்தெரியும்படியாக சப்தம் உண்டுபண்ணும் குணத்திலிருந்து, இது ஒரு வியாதியென்று தீர்மானம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இருமல்தரையீரல்(Lungs)வியாதி களுக்கு முன் அறிவிப்பதான செயலுடையதாக விருக்கிறது.

சளிக் கோளங்(Mucous Membrane)புண்பட்டு விடுவதினாலாகிலும்,சுவாசிக்கும்போது உட்செல்லும் தூசிகள், சுவாசப்பாதையிலுள்ள சளிக் கோளங்களில் பேரய்ப் படிவதினாலாகிலும், வயிற்றுக்கோளாறுகளினாலாகிலும் இருமலேற்படலாம். தொண்டையின் கீழ்ப்பாகம் வீக்குவதினாலும் இருமல் ஏற்படலாம். இருமலுண்டாயிருக்கும்போது தடிமன் பிடித்திருக்கும்; அல்லது தடிமன் பிடித்ததைப்போல் முக்கில் சளி வடியலாம். நெஞ்சிலும், தொண்டையிலுமுள்ள கோளை (Mucous) களை வெளியேற்றி சுவாசத்திற்கு இடைஞ்சலின்றி சுவாசப்பாதைகளை (Respiratory Passages) சுத்திசெய்து நுரையீரலின் வேலையைச் சரியான விதமாகச்செய்யும்படியாக இருமலானது உதவியாக விருக்கிறது.

சாதாரண இருமலைப்பற்றி அலகியமரகவிரந்தால் பின் பல கெடுதலுள்ள ரோகங்களைச் சம்பவீக்கும்படியாகச் செய்து விடும்.

சிகிச்சை

- (1) இண்டம்வேர் ரூபாயெடை 3 திப்பிலி ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$
 துதுவேளேவேர் ,, 3 வெந்தயம் ,, $\frac{1}{4}$
 சுக்கு ,, $\frac{1}{4}$

ஒன்றுசேர்த்துப் பொடித்து, 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில், நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை ஒரு அவுன்ஸளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) மாதளம்பழச்சாறு இஞ்சிச்சாறு தேக்கரண்டி $\frac{1}{2}$
 தேக்கரண்டி $\frac{1}{2}$ தேன் ,, $\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்து இந்த அளவாகக் காலே மால கொடுத்து வரலாம்.

- (3) பயிரவவடி மாத்திரை; லகுக்கட்டுவாங்க மாத்திரை; சுவர்ண கோரோ
 சனை மாத்திரை; லகுதுதுளைச் சூரணம்; மகாதுதுளைச் சூரணம்;
 திப்பிலி ரசாயணம்; மகாதுதுளைக் கிருதம்; வஜ்ஜிரவல்லி லேகியம்;
 இராஜ கேசரிச் சூரணம்; இவைகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.
 செய்யுறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

- (4) *டிஞ்சர் பெல்லடோனா (Tincture Belladonnae) துளி 5
 வைனம் இப்பிக்காக் (Vinum Ipecac) ,, 5
 சீரப் டோலு (Syrup Tolu) ,, 18
 தண்ணீர் டிராம் 8

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 4-மணி நேரத் திற்கொரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (5) லைக்கர் அமோனியா அவிடேடிஸ் (Liquor Ammonia
 Acetatis) டிராம் 1
 வைனம் அன்டி மோனியாலிஸ் (Vinum Antimonialis) ,, $\frac{1}{2}$
 சிரப் டோலு (Syrup Tolu) ,, $1\frac{1}{2}$
 தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற் கொரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

இரைப்பூச்சி:—Roundworm

இதையே “நாக்குப்பூச்சி, குடர்கிருமி” என்று சொல்லப்படும். இரைப் பூச்சிநிலத்திலுள்ள நாக்குப்பூச்சியைப்போல், நீளமாக விருக்கும். இது நான்கங்குல முதல் பதினைந்தங்குல நீளமுள்ளதாய், தவிட்டு கிறமாக மலக்குடலில் சஞ்சாரம் செய்யும். இரைப்பூச்சி சாதாரணமாககுழந்தை

* விஷமானது ஜாக்ரதையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

களுக்கோ, வயது வந்தவர்களுக்கோ 30-முதல் 40-வரையில் குடலி
லிருப்பதண்டு. விசேஷமாக இக் கிருமி 12-வயதிற்குட்பட்ட சிறு
வர்களிடமே அதிகமாக வாசம் செய்கின்றன.

அசுத்தமான விடங்களிலுள்ள இப் பூச்சிகளின் முட்டைகள் ஆகாரத்தின்
வழியாக உட்சென்று, கிருமியாகி, ஆணும் பெண்ணும் கலந்து, அதி
லிருந்து கிருமிகள் பரவி விடுகின்றன. அதிகமாகப் பூச்சிகள் பெருகி
விட்டால் மலத்தோடாகிலும், வாந்தியோடாகிலும் வெளிப்பட்டுவிடும்.
சமயா சமயங்களில் நசித்துவாரங்களின் வழியாக வெளிப்பட்டு விடு
வதுமுண்டு. இப் பூச்சிகள் சில சமயங்களில் ஒன்றுசேர்ந்து சுருண்டுக்
கொண்டு தொண்டையின் அடிபாகத்தையாவது, ஆசனத் துவாரத்தை
யாவது அடைத்து ஆபத்தை விளைவிக்கும்.

இப் பூச்சிகள் பெருக்கத்தினால், இரப்பையிலும் வாசம் செய்ய ஆரம்பிப்ப
தினாலும், இயற்கையிலேயே இப் பூச்சிகள் ஒருவித நீரைக் கக்குவதினா
லும், வயிற்று வலியும், வாந்தியும் உண்டாகும். மேலும் இப் பூச்சிகளின்
விஷத்தால் இரக்காச்சலும், ஆகார வெறுப்பும், வயிற்றுப் பொருமலும்,
அரோகமும், வயிற்றோட்டமும் இழப்பு முண்டாகும். சில சமயங்
களில் புழுக்கள் குடலைப் பிண்ணிக்கொள்ளுவதால், வயிற்றைப் பிசை
ந்து சொல்ல முடியாத வயிற்றுவலியை உண்டு பண்ணும்.

இரைப்பூச்சி அதிகம் உள்ளவர்களுக்கு முகம் வெளுத்திருக்கும்; ஆசன
வாயிலும், மூக்குத் துவாரங்களிலும் பசுபசுவென்று நமச்சலிருந்துக்
கொண்டே யிருக்கும்; ஓயாத நித்திரையுண்டாகும்; தூக்கத்தில் பற்
கடிப்பு யேற்படும்; அயர்ந்த நித்திரையில் குழந்தை திடுக்கிட்டெழுந்
திருக்கும்; அடிவயிறு திரண்டு கற்போலிருக்கும்; சில சமயம் வயிற்
றோட்ட மேற்படும்.

சிகிச்சை

- (1) பிரண்டைதண்டு ரூபாயெடை 1 ஓம் ரூபாயெடை 1
பேய்ப்பீர்க்குவோர் ,, 3 புரம்வினா ,, 3
ஒன்று சேர்த்துத் தூள்செய்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 6-
அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ்
வீதம் 3-நாள்களுக்குக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

- (2) சிற்றாமணக்கண்ணெய் இரசகற்பூரம் ரூபாயெடை 1
அவுன்ஸ் 12 சுக்கு ,, 1
கழற்சியிலைச்சாறு ,, 6 வசம்பு ,, 1
பாகலிலைச்சாறு ,, வெள்ளைப்பூண்டு ,, 1
சிவகரந்தை ரூபாயெடை 1

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, 3-நாள்
காலையில் மட்டும் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

தறிப்பு:—இந்த மருந்தினால் கிருமி வெளிப்படவில்லையானால் மறு வாரத்தில் 3-நாளான்குக் கொடுக்கலாம்.

(3) சாண்டோனின் (Santonine)	கிரான்ஸ்	2
சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb)	"	8
பல்விஸ் ரீயை (Pulvis Rhei)	"	8

ஒன்று சேர்த்து, 8-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒருபாகம் வீதமும், 3-முதல் 6-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 2-பாகம் வீதமும், 6-முதல் 12-வயதுச் சிறுவர்களுக்கு 4-பாகம் வீதமும் ஒரே ஒரு நாளான்குமட்டும் காலைிலும் மாலைிலும் சமன் சீனியுடன் சேர்த்துக் கொடுத்து மறுநாள் காலைில் 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரு தேக்கரண்டி சிற்றமணக் கெண்ணெயும், 3-முதல் 6-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 2-தேக்கரண்டி சிற்றமணக்கெண்ணெயும், 6-முதல் 12-வயதுச் சிறுவர்களுக்கு 3, 4-தேக்கரண்டி சிற்றமணக்கெண்ணெயும் கொடுக்கலாம்.

(4) சாண்டோனின் (Santonine)	கிரான்ஸ்	2
சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb)	"	8

ஒன்று சேர்த்து 8-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு இரவு படுக்கைக்குப் போகும்போது 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 3-தேக்கரண்டி சிற்றமணக்கெண்ணெயில் ஒருபாகம் வீதமும்; 3-முதல் 6-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரு தேக்கரண்டி சிற்றமணக்கெண்ணெயில் 2-பாகம் வீதமும், 6-முதல் 12-வயதுச் சிறுவர்களுக்கு ஒரு தேக்கரண்டி சிற்றமணக்கெண்ணெயில் 4-பாகம் வீதமும் குழப்பிக் கொடுத்து, மறுநாள் காலைில் 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரு தேக்கரண்டி சிற்றமணக்கெண்ணெயில் ஒருபாகம் வீதமும், 3-முதல் 6-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 2-தேக்கரண்டி சிற்றமணக்கெண்ணெயில் 2-பாகம் வீதமும், 6-முதல் 12-வயதுச் சிறுவர்களுக்கு 3-தேக்கரண்டி சிற்றமணக்கெண்ணெயில் 4-பாகம் வீதமும் கலந்து கொடுக்கலாம்.

தறிப்பு:—இம் மருந்துகளைக் கொடுத்ததில் பூச்சிகள் விழவில்லையானால், 3-நாளான்குப் பிறகு இதேவிதமாகக் கொடுக்கலாம்.

(5) ஆவிரிட் ஐட்ரோகுளோரிக் அமிலம் (Acid Hydrochloric Dil)	துளி	15
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti)	"	10
இன்பியூஷன் குவாஷியா (Infusion Quassiae)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்றுசேர்த்து 4, 5-இலக்க மருந்துகளால் கிருமிகள் விழுந்த பின் நாள் ஒன்றுக்கு 2-தடவை 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் 3-நாள் கொடுத்து வந்தால் மறுபடியும் கிருமிகளுண்டாகாமலிருக்கும்.

இழுப்பு—Convulsions

இதைப்பற்றி, 80-வது பக்கம் சவிஸ்தாரமாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

சுரல் பெருக்கும்:—

சரக்கட்டி யென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

சுர்ப்புண்—Dum Boil—Parulis

அஜீரணத்தினாலாவது பற்களைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளாததினாலாவது, பல்லீருகளில் வீக்கம்கண்டு சீழ்ப்பிடித்து புண்ணுக்கும். இதை அரண்கட்டுதல், பல்லரணையென்றும் சொல்லுவர். பல்லீருகளிலிருந்து இரத்தம் கசிவதுமுண்டு.

சிகிச்சை

(1) பச்சை நன்னூரிவேர் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$, இரண்டவுன்ஸ் சுடுதண்ணீரில் அரைத்துக் கலக்கி வடிகட்டி காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) பொட்டாஷியம் குளோரைஸ் (Potassium Chloras)	கிரான்ஸ்	5
சுடுதண்ணீர்	அவுன்ஸ்	10
படிகாரம் (Alum)	டிராம்	1
பன்னீர் (Rose Water)	அவுன்ஸ்	2
குளிரவைத்த சுடுதண்ணீர்	"	2

முதலில், பொட்டாஷியம் குளோரைசைச் சுடுதண்ணீரில் கரைத்துக் கொண்டு பின்னர் காயவைத்து ஆரவைத்த தண்ணீருடனும் சேர்த்துப் படிகாரத்தையும் கரைத்து, நான் ஒன்றுக்குப் பல தடவை வாயில் ஊற்றிக் கொப்புளிக்கச் செய்யலாம்.

(3) குளோரோபாரம் (Chloroform)	டிராம்	1
ஆவிட்டானிக் (Acid Tannic)	"	1
மெந்தால் (Menthol)	"	$\frac{1}{2}$
டிஞ்சர் கராமெரியா (Tincture krameria)	அவுன்ஸ்	1
தண்ணீர்	"	■

ஒன்று சேர்த்து அதிகமான இரத்தம், வடிந்தால் நான் ஒன்றுக்குப் பல தடவை வாய் கொப்புளிக்கச் செய்து வரலாம்.

சுளை இருமல்—Phthisis

இது தொத்துநோய் இனத்தில் சேர்ந்தது இதை க்யுரோகமென்றும் சொல்லப்படும். க்யுரோகஸ்தர்களுடைய எச்சிலிலிருந்தும், மலத்திலிருந்தும், சுவாசத்திலிருந்தும் கிருமிகள் பிறர்க்குத் தொத்திக்யுரோகத்

தைப் பரப்புகின்றது. தாய் கூயரோகியா யிருந்து கர்ப்பம் தரித்துப் பிறந்தாலொழிய, ஒருவயதுக் குழந்தைகளுக்குச் கூயரோகம் உண்டாவ தில்லை. குழந்தைகள் நடக்கவாரம்பித்தபிறகே கூயரோகிகளின் மலம், எச்சில், சுவாசம் இவைகளினால் வெளிப்படும் கிருமிகள் தொத்துகின்றன.

மூக்கில் சதை வளர்வதினாலும், தொண்டை வீங்குவதினாலும் குழந்தை களுக்கு இன்னோய் உண்டாகலாம். மூச்சுவிடும்போது நெஞ்சில் ஒருவித மான சத்தமுண்டாகும். இதைச் சத்தவேணுவால் (Stethoscope) அறிந் துக்கொள்ள முடியும். ஈளை இருமலுண்டானால், நெஞ்சில் வலியும், நடு முதுகு வலியும் உண்டாகி சாயந்திரவேளைகளில் இருமல் அதிகமாயும், திரேகோஷ்டம் மிகுந்துமிருக்கும். இருமும் சமயம் நெஞ்சு பிளந்து போவதைப்போன்ற வலி யேற்பட்டுச் சளிக்கட்டிகள் மஞ்சள் நிறமாக வேணும், அத்துடன் இரத்தம் கலந்தேனும் வெளிப்படும் கூயரோகம், சரீரத்தைவெகு துரிதத்தில் ஷீணிக்கச் செய்துவிடுவதால், ஷீணிக்கச் செய்யும் ரோகமென் (Consumption-Wasting Disease) றும் சொல் லப்படும். இருமலுக்குப் பின் வெளிப்படும் சளியானது துற்றாற்றத்துட னும், அதிகமான இரத்தம் கலந்ததாய் மிருக்குமானால் அசாத் தியமான தென்றே யெண்ணலாம். கூயரோகிகளுக்கு மாணம் உண்டாகும் அரை மணி நேரத்திற்கு முன்னும் ஒருவித மாணக் குறிகளுமின்றி இருப் பார்கள்.

சிகிச்சை

(1) அநிமதுரம்	ரூபாயெடை 1	மிளகு	ரூபாயெடை 1
கோஷ்டம்	„ 1	கடுகுரோகிணி	„ 1
கிராம்பு	„ 1	அக்காரம்	„ 1
இலவங்கப்பட்டை	„ 1	வெளுச்சிப்பிளி	„ 1
நாகேசரம்	„ 1	தேத்தாவிசை	„ 1
சுக்கு	„ 1	சிறந்ததை	„ 1
திப்பிலி	„ 1	இந்துப்பு	„ 1

ஒன்றுசேர்த்து, ஆடாதோடையிலேச்சாறுவிட்டு 9-மணிநேரம் மைபோ லரைத்து, ஒரு பெரிய பட்டாணிக்கடலைப் பிரமாணம் மாத்திரைகள்செய்து, காலை மாலை ஒரு மாதத்திரைவீதம் தேனில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) கண்டங்கத்திரிவேர்	இண்டங்கொழுந்து	ரூபாயெடை 1
ரூபாயெடை ½	திப்பிலி	„ ½
„ துதுவேளைவேர்	„ ½	வெள்ளைப்பூண்டு
		„ ½

ஒன்றுசேர்த்து, 2½-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 3-அவுன்ஸ்கச் சுண் டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில் காலை மாலை 1-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(3) ஆடாதோடையிலே	செம்முள்ளியிலே	ரூபாயெடை	1½
ரூபாயெடை	1½	சூதுவேளையிலே	1½
கண்டங்கத்திரியிலே	1½	சங்கனிலே	1½

ஒன்று சேர்த்துப் பிட்டவியலாக அவித்துப் பிழிந்தசாறு அவுன்ஸ் ஒன்றில்:—

சுக்கு	ரூபாயெடை ½	திப்பிலி	ரூபாயெடை ½
மிளகு	½	இந்துப்பு	½

இவற்றை இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூரணித்த சூரணத்தில் 4-ரூன்றி மணியிடை போட்டுக் கலக்கி, காலை மாலை இந்த அளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(4) கபாங்குசு லேகியம்; அப்பிரகக்கோரோசனை மாத்நிரை; ராஜ அப்ரகச் செந்திரம்; சிங்கிபஸ்பம்; ராஜமார்தாண்ட லேகியம்; சந்திரகாசத் தைலம்; பவனபஸ்பம்; தருசுபஸ்பம்; மகாவீல்வாதி லேகியம்; வஜ்ஜிர வல்லி லேகியம்; திரிலோகரஷாமணி மாத்நிரை; திரிவிக்ரம ரசச் செந்திரம்; முதலியவைகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய் முறை 6-ம் பாதம் பார்க்கவும்.

(5) டார்டார் எமட்டிக் (Tartar Emetic)	கிரைன்ஸ்	1
வைணம் இப்பிகாக் (Vinum Ipecac)	டிராம்	4
சிரப் சிம்பிள் (Syrup Simple)	அவுன்ஸ்	1
ஆக்குவா டிஸ்டில் (Aqua Distilled)	”	6

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு வார்தியுண்டா கும் வரை 15-நிமிஷத்திற்கு ஒருதரம், 2-தேக்கரண்டிவீதம் கொடுத்து, வார்தியான பின் 2-மணி கோத்திற் கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி யள வாகக் கொடுத்து வரலாம்.

குறிப்பு:—இதை அதிகமான சளிக்கட்டி உபத்திரவம் செய்யும் சமயம் கொடுத்து வரலாம்.

(6) பொட்டாஷியம் ஐயோடைட் (Potassium Iodide)	கிரைன்ஸ்	4
■ லைக்கர் ஆர்சனிக் காலிஸ் (Liquor Arsenicalis)	துளி	2
எக்ஸ்ட்ராக்ட் கிளிரிசரிசா லிக்குட் (Extract Glycyrrhizaa Liquid)	”	15
ஆக்குவா குளோரோபாரம் (Aqua Chloroform)	டிராம்	4

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு காலையிலும், மத்தியானத்திலும் ஒவ்வொரு தேக்கரண்டி வீதம் கொஞ்சம் தண்ணீருடன் சேர்த்துக் கொடுத்து இரவு படுக்கைக்குப் போருமுன்:—

■ விஷமானது ஜாக்காயாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

பல்விஸ் ரீயை கோ (Pulvis Rhei Co) கிரைன்ஸ் 10
தண்ணீர் டிராம் 2
ஒன்று சேர்த்துக் கொடுத்து வரலாம்.

- (7) அதிகமாக கடுகிறதண்ணீரில் 10, 15-துளி டர்பென்டைனை (Oil Turpentine) போட்டு, அந்த ஆவியை வாயினால் சுவாசித்து வந்தால் உபசாந்தியாக விருக்கும்.
- (8) கடுகெண்ணெயை (Oil Mustard) கடு முதலில் குடுபறக்க தேய்த்து வந்தால் கெஞ்சுவலி, முதலுவலி, சற்று சார்தப்படும்; கோழையும் இளகி இருமும்போது சளி இலகுவில் வெளிப்பட்டுவிடும்.

உண்ணாக்கு வளர்தல்—Uvula Elongated—Uvulitis

வயது வந்தவர்களுக்கும் உண்ணாக்கு வளர்தல் உண்டென்றாலும், குழிற் றைகளுக்கே விசேஷமாக யேற்படுகிறது. தொண்டை ஆரம்பத்தில், நாசியின் அடிவாரத்துளைக்கு மேல் தொங்கிக்கொண் டிருக்கும். சிறு நாக்குக்கே உள்நாக்கு, உண்ணாக்கு (Uvula) என்று சொல்லப்படும். வாயைத் திறந்துகொண்டு பார்த்தாலும் வெளித்தோற்றத்திற்கு உள் நாக்கு நன்றாகத் தெரியும்.

அந்த உள் நாக்கின் றுணியானது சில சமயங்களில் வளர்ந்து நீண்டு, நாக்கின் அடித்தண்டில் தொடுவதால், அரோகிசமான இருமல் ஓயாம லுண்டாகும்; இருமல் வரட்சியாக விருக்கும். சளிவராது.

சிகிச்சை

- (1) ஒரு சிறுதுண்டு காசுக்கட்டியை வாயில் அடக்கி வைத்திருக்கச் செய்யலாம்.
- (2) கற்சண்ணும்பையும், ஏவாகூரத்தையும் சமயெடையாக வெடுத்து எலு மிச்சம்பழச்சாறுவிட்டு மைபோலரைத்து உள்நாக்கில் தடவி வரலாம்.
- (3) சில்வர் நைட்ரேட் (Silver Nitrate) கிரைன்ஸ் 8
ஆக்குவா டிஸ்டில் (Aqua Distilled) டிராம் 1
ஒன்றுசேர்த்துக் கரைத்துக்கொண்டு, காலை மாலை ஒரு மெல்லிய ருச்சி யில் பஞ்சை சுற்றிக்கொண்டு, அதில் நனைத்து உள்நாக்கில் தடவி வரலாம்.

உரம்விழுதல்:—

சிசுக்களுக்குக் கழுத்துச் சுளுக்கிக்கொள்வதையே உரமென்று சொல்லு வார்கள். ஆறுமாத வயதிற்குட்பட்ட குழிற்சைகளுக்குத் தலையின் பாரத்தைத் தாங்கும்படியான சக்தி கழுத்துக்கு இருப்பதில்லை. அத னால், குழிற்சைகளை அஜாக்ரதையாக எடுப்பதினால், கழுத்துப் பின்புற மாக சாய்ந்து சுளுக்கு உண்டாகிவிடுகிறது. இதனால் குழிற்சைக்கு

ஓயாத வலியுண்டாகி, முக்கி முனைவிக்கொண்டே யிருக்கும்; பால் குடியாதது; கழுத்தில்பின்புறம் சிவந்து வீங்கியிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) கடுகு ரூபாயெடை 20 வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை 20

ஒன்றுசேர்த்து அரைகுறையாக அரைத்து ஒரு மண் கலயத்தில் போட்டு, அதன் வாயை மூடி சீலைமண்ணெய்து, கலயத்தின் கீழ் பாகத்தில் பல சிறு துளிகளைப் போட்டு, அந்தத் துளிகளுக்கு நேராக ஒரு மங்கு பாத் திரத்தை வைத்து, கலயத்தின் கழுத்துமட்டும் தெரியும்படியாக ஒரு குழித் தேரண்டிப் புதைத்து, அந்தக்கலயத்தைச் சுற்றிலும், மேலும் எருவாட்டிகளை அடுக்கித்திட்டு எரிக்க கலயத்தின் கீழுள்ள மங்குபாத்திரத்தில் தைலம் வடிந்திருக்கும். அந்தத் தைலத்தை வெளிப்பிரயோகமாக உடம்பெல்லாம் தடவி வரலாம்.

(2) டிஞ்சர் ஆர்னிகா (Tincture Arnece) மெல் பிரயோகமாக மட்டும், சிவந்திருக்குமிடங்களில் கால மால தடவி வரலாம்.

(3) அன்டிபிளாஜெஸ்டைன் (Antiphlogistine) என்னு மருந்தை டின் னுடன் சுடுதண்ணீரில் வைத்து குண்டாக்கி துணியில் தடவி, கழுத் தின் பேரில் போட்டு வரலாம்.

உள்ளாக்கு வளர்தல்:—

உண்ணாக்கு வளர்தலென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

எண்ணெய்த் தொங்கல்:—

சில குழந்தைகளுக்கு விரோசனத்திற்காகச் சிற்றமணக்கெண்ணெயைக் கொடுத்தால் பேதி ஆகாமல், எண்ணெய் வயிற்றுள் தங்கிவிடுவதுண்டு; மேலும், எண்ணெய் சேர்ந்த பலகாரங்களைக் குழந்தைகளுக்குக் கொடுப்பதினால் எண்ணெய்த் தொங்கலேற்படலாம்; எண்ணெய்ச் சேர்ந்த பலகாரங்களினால் எண்ணெய்த் தொங்கலேற்பட்டால் வயிற் றோட்ட முண்டாகும்.

சிகிச்சை

(1) வெந்தயத்தைக் கஷாயமிட்டுக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) ஆவாராவேரைக் கஷாயமிட்டுக் கொடுத்து வரலாம்.

(3) செம்மண் கட்டியைச் சட்டியில் போட்டு, நெருப்பாக காய்ந்திருக்கும் சம யம் தண்ணீர்விட்டு வடிவட்டி அந்தத் தண்ணீரைக் கொடுத்துவரலாம்.

(4) சிற்றமணக்கின் வேரைக் கஷாயமிட்டுக் கொடுத்து வரலாம்.

(5) சியக்காயைப் பொடித்துச் சற்றுநேரம் தண்ணீரில் போட்டிருந்து அந் தத் தண்ணீரை வடிவட்டிக் கொடுத்து வரலாம்.

(6) நாயுருவி வேணாக் கஷாயமிட்டுக் கொடுத்து வரலாம்.

எலிக்கடி—Rat Bite

குழந்தைகள், ஆகாரம் உட்கொண்டபின், வாய், கை முதலியவைகளை நன்றாகச் சுத்தி செய்து விடவேண்டும். அசுத்தமாக வைத்திருந்தால் இரவில் எலிகள் அந்த வாசனைக்காகக் கடிக்கும்படி நேர்ந்துவிடும். பால் குடிக்கும் குழந்தைகளின் வாயை நன்றாய்த் துடைக்காவிட்டாலும், அந்த பால் மணத்திற்காக எலி கடித்துவிடுவதுமுண்டு. எலியில் பல வகையான விஷத்தன்மை கொண்டவைகளிருக்கின்றன.

எலிக்கடிக்கு ஆரம்ப சிகிச்சையொன்றும் செய்யாவிட்டால், பின்னர் மிகுந்த உபத்திரவத்தை யுண்டுபண்ணும். எலிக்கடியின் விஷத்தன்மை, உடலில் வியாபித்திருந்து வயதாக வயதாக தாளமுடியாத மூர்ச்சத்திணரலையும், இளைப்பையும் உண்டுபண்ணும்; குளிர் நடுக்கமும், அடிக்கடி சரமும் காணும்.

சிகிச்சை

- (1) பலவனிலையை அரைத்துக் கடிவாயில் தடவியிருந்து கொஞ்சமேன் சென்றபின் சுடு தண்ணீரால் கழுவுவாம்.
- (2) பச்சை நன்னூரிவேரை அரைத்துப் பசும்பாலில் கலக்கிக் கொடுத்து வரலாம்.
- (3) வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை ½ கொடிக்கள்ளிப்பட்டைரூபாயெடை ½ ஒன்று சேர்த்தவைத்து நீராகாரத்தில் (பழஞ்சோற்றுத் தண்ணீரில்) 3-நாள் காலையில் மட்டும் இந்த அளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.
- (4) கார்பாலிக் ஆவிக் (Acid Carbolic) துளி
தண்ணீர் " 4
ஒன்று சேர்த்து, கடிவாயில் ஒரு குச்சியில் தொட்டு வைக்கலாம்.
- (5) பொட்டாஷியம் பெர்மாங்கேனேட்டை (Potassium permanganate) கடிவாயில் சற்றுநேரம் தேய்க்கலாம்.

ஓயாத சளி—Catarrh

நாகியின் மிகுதுவான சதை கோளங்களில், வீக்கம் கண்டுவிடுவதினால், மூக்கில் ஓயாமல் தண்ணீர்போன்று சளி வடிந்துகொண்டே யிருக்கும்; இதனால் குழந்தைகள் முலையுண்ணவும், சுவாசம் விடவும் மிகுதியும் கஷ்டப்படும்.

நாமரைத் தரையில் குழந்தைகளைச் சயனிக்கச் செய்வதினாலும், விளையாட விடுவதினாலும், சீதோஷ்ணமாற்ற மேற்படுவதினாலும், குழந்தைகளுக்கு

உடம்பிலும், விசேஷமாகத் தலையிலுமேற்படும் வியர்வையை, அவ்வப் போது துடைக்காதினாலும் குழந்தைகளுக்கு ஓயாத சளி, மூக்கி விரூந்து தண்ணீர்போல் வடிந்துகொண்டிருக்கும் குழந்தைக்குப் பால் கொடுக்கும் தாய்க்குத் தடுமன் பிடித்திருந்தாலும், அதிகமான வியர்வையினால் கஷ்டப்பட்டாலும், சீதளமான வஸ்துக்களை அருந்துவதினாலும், குழந்தைக்கு தடிமன் யேற்படலாம்.

ஆரம்பத்தில் தண்ணீர்போல் வடிந்துகொண்டிருக்கும் சளி பின்னர் தடித்துச் சவாசிக்கக்கூடாததை உண்டாக்கும். இதனால் குழந்தைவாய் வழியாகவே சவாசிக்கவேண்டியதாக விருக்கும். ஓயாத தும்மலுண்டாகும்; கண்ணில் நீர்வடிந்துகொண்டிருக்கும். சவாசமிடும்போது கர் புர் என்றுகேட்கும். திரோகம் கத்தப்பாசவும் கண்ணிவந்து மிருக்கும் தலைவலியும், தலையிலேயேதோ, பாரமிருப்பதுபோற்றோன்றும். சிலகுழந்தைகளுக்குப் பல்முளைக்கும் சமயத்திலும் இவ்வித சளி யேற்படுவதுண்டு. இந்தச் சளி வியாதி நீடித்திருப்பதில்லை. இரண்டு மூன்று நாட்களில் சளி மறைந்தவிடும் அல்லது தொண்டைப் புடைச்சலையாகிலும் தொண்டைப் புண்ணாகிலுமுண்டாகிவிடும். ஆதலால், ஆரம்பத்திலேயே சளிக்குத் தகுந்த சிகிச்சை செய்யவேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) துதுவேனைச் சாற்றில் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.
- (2) துளசிவிலைச் சாற்றில் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.
- (3) வெற்றிலைச்சாற்றில் குங்குமத்தைக் குழைத்துக் கொதிக்க வைத்து நெற்றி, மூக்கு, மூக்கந்தண்டு இவற்றில் பற்றுப்போட்டு வரலாம்.
- (4) செம்மரத்தைத் தண்ணீர்விட்டு உரைத்துக் கொதிக்கவைத்து நெற்றி, மூக்கு, மூக்கந்தண்டு இவைகளில் பற்றுப்போட்டு வரலாம்.
- (5) சீமைஒட்டை தண்ணீர்விட்டு உரைத்துக் கொதிக்கவைத்து நெற்றி, மூக்கு, மூக்கந்தண்டு இவைகளில் பற்றுப்போட்டு வரலாம்.
- (6) ஜாதிக்காயை முலைப்பாலி லுரைத்துக் கொதிக்கவைத்து நெற்றி மூக்கு, மூக்கந்தண்டு இவைகளில் பற்றுப்போட்டு வரலாம்.
- (7) கோரோசனை மாத்திரையை வெற்றிலைச் சாற்றில் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

■ செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(8) வெற்றிலையில் வேப்பெண்ணெயைத் தடவி அனலில் வாட்டி, தலை, உச்சி, நெற்றி இவைகளில் ஒற்றிடம் கொடுத்து வரலாம்.

(9) டர்பென்டைனை (Turpentine) கடுமுதுகு, நெற்றி இவைகளில் இலேசாகத் தடவலாம்.

(10) ஸ்பிரிட் ஈதர் ஈதரோவரி (Spirit Aether Nitrosi) துளி 16
 ஸ்பிரிட் அமோனியம் அரோமாட்டிக் (Spirit Ammonium
 Aromatic) " 16
 டிஞ்சர் ஆரண்டி (Tincture Auranti) " 12
 ஆக்குவா குளோரோபாரம் (Aqua Chloroform) டிராம் 4
 ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 4-மணி நேரத்
 திற்கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(11) அமோனியம் கார்போனஸ் (Ammonium Car-
 bonas) கிரான்ஸ் 12
 வைனம் இப்பிக்காக் (Vinum Ipecac) டிராம் 1½
 கிளிசரின் (Glycerine) " 4
 ஆக்குவா காம்பர் (Aqua Camphor) அவுன்ஸ் 1½

ஒன்றுசேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 3-மணி நேரத்திற்
 கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக்கொடுத்து வரலாம்.

ஓயாத வாந்தியும், வயிற்றோட்டமும்:—

210-ம் பக்கம் அதிசார மென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

கக்கிருமல்:—

கக்குவானென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

கக்குவான்—Whooping cough-Pertusis

இதைக் கக்கிருமல், குக்கல்நோய், தூத்தல் என்றும் சொல்லப்படும். கக்கு
 வான் விசேஷமாக மூன்று வயதிற்குட்பட்ட இளவ் குழந்தைகளுக்கே
 அதிகமாகத் தாக்கக்கூடியதொரு நொத்து வியாதியாக விருக்கிறது.
 பத்து வயதிற்குப் பின்னர் இவ்வியாதி அநேகமாய் ஏற்படுவதேயில்லை.
 குழந்தை எவ்வளவு வயதிற் குறைந்ததாக விருக்கிறதோ, அவ்வளவு
 விற்கு கக்குவானின் குணம் பயங்கரமாயிருக்கும்; அம்மையோடு முண்
 டாயிருக்கும்போதும் கக்குவா னிருமலு முண்டாவதுண்டு. இந்த
 வியாதி குழந்தைகளுக்கு எல்லாக் காலங்களிலும் தாக்கக்கூடியதாக
 விருப்பினும், விசேஷமாகக் காற்றுக் காலங்களிலும், வசந்த காலங்களி
 லும், சற்று மட்டாகவே பரவுகின்றதென டாக்டர் ரூடாக்ஸ் (Dr.
 Ruddocks) அபிப்பிராயப் படுகிறார்

கக்குவான் குழந்தைகளுக் குண்டாகக்கூடிய வியாதிகளில் மிகவும் கொடுமையுள்ளது. இது கொத்துவியாதி இனத்தில் சேர்ந்தது. இருமும் போது, நெஞ்சில் வீணை வாசிப்பதைப்போன்றதொரு தொனியுண்டாகி, நெடுநேரம் இழுத்து இருமப்படுவதால் இழுப்பும் யேற்பட்டு விடும். கக்குவானிருமல் இரண்டு மூன்று வாரங்களுக்கோர்தரம் குணத்தில் பேதப்பட்டு, அநேக மாதம்வரையில் நீடித்திருப்பதண்டு. விசேஷமாக மூன்று மாதம் வரையில்தான் கக்குவானிருமல் நீடித்திருக்கலாமென பலர் அபிப்பிராயப் பட்டாலும், இலேசான இருமலோடு ஆறு மாதம்வரையும் இருப்பதண்டு; ஆனாலும், குழந்தையின் திரோகத்திடத்தையும், சீதோஷ்ண ஸ்திதியையும் சார்ந்ததாக விருக்கிறது. கக்குவான் கொத்துரோகக் கிருமிகளால் ஏற்படுவதென்று மட்டும் சொல்ல முடிகிறதேயன்றி; இன்ன கிருமியினாலென்பதைச் சொல்ல வியலாம விருக்கிறது.

கக்குவானிருமல் ஆரம்பத்தில் சாதாரணத் தடிமியைப் போலவே காணப்பட்டு, இரண்டு மூன்று தினத்திற்கு பின்னர் இழுத்து இருமும் குணமேற்படும்; இலேசான சுரத்துடன் நாளியில் நீர் ஒழுக்கிக்கொண்டிருக்கும்; கண் சிவந்து, கண் பட்டைகள் சற்று வீங்கியிருக்கும்; ஒரு வாரத்துக்குப் பிறகே இருமும்போது இழுப்பு அதிகரித்து, நெஞ்சில் கர் முர் பென்ற சப்தமுண்டாகும்; ஒவ்வொரு இருமலுக்குப் பின்னும் வார்தி யுண்டாகும்; வார்தி கக்குவது மாதிரியாக நெடுநேரம் உபத்திரவம் செய்து, பின் கோழை வெளிப்படும். வெளிப்படும் கோழையானது இழுக்க இழுக்கக் கம்பிபோல் வடியும். பசுவிலிட இரவிலேயே இருமலும், கக்கலு மதிக் கிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) மினசுசாம்பல் ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$ மயிலிறகுசாம்பல் ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$ ஒன்று சேர்த்து இந்த அளவாக காலை மாலை பசுவெண்ணெய்யில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) ஊதுவேளைச்சாறு கோஷ்டம்தூள் ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$
தேக்கரண்டி 1 பசுவென் தேக்கரண்டி 1
முதலில் சாற்றையும், நெய்யையும் ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு பின் கோஷ்டம் ஊனைச் சேர்த்துக் குழப்பி இந்த அளவாகக் காலை மாலைக் கொடுத்து வரலாம்.

(3) லுகுட்டு வங்கமாத்திரை; வியாக்கிரியாதி ரசாயணம்; இவைகளிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(4) ஆலம் (Alum) கிரைன்ஸ் 4
லைக்கர் அட்ரோபைன் சல்பஸ் (Liquor Atropin)
Sulphus) துளி 1

கிளிசரின் (Glycerine)	„	30
ஆக்குவா பெனிகுலி (Aqua Feniculi)	டிபாம்	4

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்குக் காலை மாலை 2-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(5) பியூட்டல் குளோரல் ஹைட்ரஸ் (Butyl Chloral Hydras)	கிரான்ஸ்	8
டிஞ்சர் கார்டமம் கோ (Tincture Cardamom Co)	துளி	12
கிளிசரின் (Glycerine)	„	12
ஆக்குவா டிஸ்டில் (Aqua Distilled)	டிபாம்	4

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, நான் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

கக்குவான் ஆரம்பத்தில் கொடுக்க :—

(6) எக்ஸ்ராக்ட் சின்கோனா லிக்விட் (Extract Cinchonae Liquid)	துளி	8
லைக்கர் ஆர்சனிக்காலிஸ் (Liquor Arsenicalis)	„	4
சிரப் டோலு (Syrup Tolu)	டிபாம்	½
ஆக்குவா புலோரா ஆரண்டி (Aqua Florae Auranti)	„	■

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, நான் ஒன்றுக்கு மூன்று தடவை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

கக்குவானின் இரண்டாம் நிலைமையில் கடுமையான இருமலிருக்கும் சமயம் கொடுக்க:—

(7) பல்விஸ் இப்பிக்காக் கோ (Pulvis Ipecac Co)	கிரான்ஸ்	½
பல்விஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் கோனி (Pulvis Extract Conii)	„	1
பல்விஸ் சின்னமோனி (Pulvis Cinnamon)	„	■
சாக்கரின் ஆல்புமின் (Saccharine Albuemin)	„	8

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, இரவு படுக்கைக் குப் போகுமுன் ஒரேதடவையாகத் தேனில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

கடுமையான வாத்நிலிருந்தால் கொடுக்க :—

(8) சீரி ஆக்ஸாலிடீஸ் (Cerii Oxalitis)	கிரான்ஸ்	½
சாக்கரின் லாக்டிஸ் (Saccharine Lactis)	„	■

ஒன்று சேர்த்து 4-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 4-மணி நேரத்திற் கொருதாம், ஒருபாகம் வீதம் தேனில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

■ விஷமானது ஜாக்கிரதையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

கடுப்போடு நீரிறங்கல்—Anuria

இதை நீர்க்கடுப்பு; நீர்கட்டு என்றும் சொல்லலாம். நீர் குறைந்து மஞ்சள் நிறமாகி எரிச்சலுடன் இறங்கும்; அல்லது, மூத்திரம் சொட்டுச்சொட்டாகவே இறங்கும். சிலசமயம் மூத்திரம் தடைப்படுவது முண்டு.

குழந்தைகளுக்குத் திரேக உஷ்ணம் மிகுதிப்படுவதினாலாகிலும், ஆகாசத்திற்கு போதியவிதமாய் தண்ணீர் குடியாததினாலாகிலும், மூத்திரத்தை வெகு நேரம் அடக்கிக்கொண் டிருப்பதினாலாகிலும், மூத்திரத்திலுள்ள யூரிக் அமிலம் (Uric Acid) என்றும் உப்பு அதிகரித்துப் போவதினாலாகிலும், இந்த நீர்க்கடுப்பு யேற்படலாம்.

நீர்க்கடுப்பில் மூத்திரம் தடித்த மஞ்சளாகவும் கொஞ்சமாகவயிற்ற்கும்; மூத்திரம் பெய்யும்போதும் பெய்தவுடனும், நீர்த்தாரைக் கடுப்புடன் எரிச்சலாக விருக்கும்; சிலசமயம் மூத்திரம் கடுத்துச் சொட்டுச் சொட்டாக விறங்கும்; அல்லது மூத்திரம் தடைப்பட்டுபோவது முண்டு. பெரியவர்களுக்கு நீர்க்கடுப்பேற்பட்டால் சிலாகையைச் (Catheter) செலுத்தி நீரை வெளிப்படுத்துவதுண்டு அவ்விதமாகச் சிறு குழந்தைகளுக்குச் சிலாகையைச் செலுத்தக்கூடாது. எதேஷ்டமான தண்ணீரும், பாலும் கொடுத்து வரவேண்டும் அடிவயிற்றில் குடான ஒற்றி டங்ஙன் கொடுக்கவேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) பொரித்த வெங்காயம் முலைப்பால் அவுன்ஸ் 2
ரூபாயெடை ½
ஒன்று சேர்த்துக் கொடுத்து:—
வெள்ளரிவிரை ரூபாயெடை 1 எலி புழுக்கை ரூபாயெடை 1
ஒன்று சேர்த்துத் தண்ணீர் விட்டரைத்துத் தொப்புளச்சுற்றிலும் அடி வயிற்றிலும் பூசலாம்.
- (2) வெடிப்புப்பைக் கரைத்துத் துணியில் நனைத்து ஆண்குறியின்மேல் போடலாம்.
- (3) மகாவல்லாரைக்கிருதம்; புளியாரைக்கிருதம்; மாத்துவெள்ளை நவநீதம்; பவளபஸ்பம் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்த்தல்.
- (4) நெருஞ்சில்சாறு அவுன்ஸ் 1
இளநீர்த்தண்ணீர் " 1
கற்கண்டுபொடி ரூபாயெடை 1½
ஸ்பிரிட் ஈதர் ஐதரோஸி (Spirit Aether Nitrosi) துளி 25
ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத் திற் கொருதரம் ½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(5) லைக்கர் பொட்டாஷ் (Liquor Potassh)	டிபாஸ்	1½
பொட்டாஷியம் நைட்ரேட் (Potassium Nitrate)	"	1½
ஸ்பிரிட் ஈதர் நைட்ரோஸி (Spirit Aether Nitrosi)	"	1½
டிஞ்சர் சில்லி (Tincture Scillae)	"	1½
சுடுதண்ணீர்	அவுன்ஸ்	1½

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத் திற் கொருதரம் ½-தேக்கரண்டி வீதம் 2-தேக்கரண்டி தண்ணீருடன் சேர்த்துக் கொடுத்து வரலாம்.

(6) டிஞ்சர் ஐயோவியாமஸ் (Tincture Hyoscyamus)	துளி	3
லைக்கர் பொட்டாஷ் (Liquor potassh)	"	3
டிஞ்சர் பக்கு (Tincture Buchu)	"	6
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	1½

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

கட்டி—Abscess

இதைச் சிலந்தி, விப்புருதி, கட்டு என்றெல்லாம் சொல்லப்படும். சரீரத்தின் சதைக்கோளங்களிலாகிலும், கொழுப்பு யிருந்தவிடங்களிலாகிலும், சீழ் கொண்டு வீங்கி, உருண்டையாகப் புறப்படுவதே 'கட்டி' எனப்படும். கட்டிகன் புறப்படும் இடங்களுக்குத் தகுந்தாப்போல் அவைகளுக்கும் தனிப்பட்ட பெயருண்டு. ஆசனவாயின் ஓரங்களில் புறப்பட்டால் அதற்கு விப்புருதி, ஆசனபவுத்திரம், பக்கப்பவுத்திரமெ (Fistula in Ano) என்றும், நடுமுதுகில் வந்தால் ராஜப்பிளவை (Carbuncle) என்றும் சொல்லப்படும்.

கட்டி, சர்மத்தின் உள்சதைக் கோளங்களில், அன்னிய வஸ்துக்கள் சேர்ந்த விடுவதினாலும், செட்ட இரத்தம் தங்கி விடுவதினாலும், அங்குள்ள இரத்தம் விஷயித்து, சதை வீங்கி சர்மத்தின் மட்டத்திற்குமேல் வீங்கித் தெரியும்; ஆரம்பத்தில் சர்மம் சிவந்து கல்போல் வீங்கி மேடாக விருக்கும்; பின்னர் அந்த மேடானபாகத்தின் மத்தியில் முளையாக புறப்பட்டு, அதில் சீழ்க்கொண்டு வெண்மையாக விருக்கும். அதையே 'ஆணி, முளை' என்று சொல்லப்படும்.

கட்டிக்கு ஆங்கில வைத்தியத்தில் ரண சிகிச்சையே செய்யப்படும். தமிழ் வைத்தியத்திலும் ரண சிகிச்சை செய்வதுண்டு. மேல் பிரயோகமருந்துகளை உபயோகிப்பதால், கட்டிப் பழுத்து உடைந்து முளை வெளிப்படும். பின்னர் ரணசிலைகளால் (பிளாஸ்திரி) (Plaster) புண்ணை ஆற்றிவரலாம்.

சிகிச்சை

- (1) கட்டி ஆரம்பத்தில் நன்றாகப் பெருத்திருக்கும் சமயம், எருக்கம்பாலில் மஞ்சளை உரைத்து கட்டியின் மத்தியில் ஒரு சிறு பொட்டு மாதிரி கால மால வைத்துவந்தால் கட்டி அதிகரிக்காமல் அப்படியே அமுங்கிப்போகும்.
- (2) அவரையிலேச்சாற்றைப் பஞ்சியில் ஏதேஷ்டமாகவிட்டு கட்டியின்மேல் போட்டுவந்தால் கட்டிப்பழுத்து உடையும் உடைந்தபின், ■ ஈயப் பிளாஸ்திரியைத் துணியில் தடவி போட்டுவந்தால் புண் ஆறும்.
- (3) இலைக்கள்ளியிலையைச் சிற்றமணக்கெண்ணெய்த் தடவி அனலில் வாட்டி கால மால கட்டியின்மேல் வைத்துக் கட்டி வந்தால், கட்டிப் பழுத்து உடையும், *பின் ஈயப்பிளாஸ்திரியால் புண்ணை ஆற்றிவரலாம்.
- (4) வெங்காயத்தைச் சுட்டு அரைத்து கட்டியின்மேல் கனமாய் தடவி யிருந்தால் கட்டிப் பழுத்து உடையும் உடைந்த பின் ■ ஈயப்பிளாஸ்திரியால் புண்ணை ஆற்றிவரலாம்.
- (5) பச்சரிசுமாவைக் களிக்கிண்டி சிற்றமணக்கெண்ணெய்த் தடவி கட்டி யில் வைத்துக் கட்டிவந்தால், கட்டிப்பழுத்து உடையும் பின்னர் ■ ஈயப்பிளாஸ்திரியால் புண்ணை ஆற்றிவரலாம்.
- (6) சாம்பிராணி ரூபாயெடை 1½ படிசாரம் ரூபாயெடை 6 கற்பூரம். ■ 1

ஒன்று சேர்த்தரைத்து ரொட்டி உன்சதையுடனாவது மாவுக் களியுடனாவது பிசைந்து வைத்துக் கட்டிவந்தால் கட்டி பழுத்து உடையும் பின்னர் ■ ஈயப்பிளாஸ்திரியால் புண்ணை ஆற்றி வரலாம்.

- (7) இரசப்பிளாஸ்திரி; கால்போனம் பிளாஸ்திரி; மிருதாரசிங் பிளாஸ்திரி முதலியவைகளைத் துணியில் தடவிப் போட்டு வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.
- (8) எக்ஸ்ட்ராக்ட் பெல்லடோனா (Extract Belladonnae) அவுன்ஸ் 1
இக்தியல் (Ichthyol) டிராம் 2
கிளிசரின் (Glycerine) போதுமானது.

போதுமான கிளிசரின்விட்டுச் சுற்று செகிழ்தியாகச் செய்துகொண்டு, ஒரு துணியில் தடவி கட்டியின்மேல்போட்டு வரலாம். இதனால் கட்டி அமுங்கினாலும் அமுங்கும்; கட்டி உடைந்து சீழ் வெளிப்பட்டால், † கார்பரிக் லோஷனல் நன்றாகச் சுத்தி செய்துவிட்டு, போரிக் காஸிட் (Acid Boric) ஆற்றி பஞ்சுவைத்து கட்டி ஆற்றிவரலாம்; அல்லது, ■ ஈயப்பிளாஸ்திரி போட்டு ரணத்தை ஆற்றலாம்.

† 236-ம் பக்கம் 3-ம் இலக்கம் பார்க்கவும். ■ செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்

- (9) டிஞ்சர் ஐயோடின் (Tincture Iodine) அவுன்ஸ் 1
 லினிமென்ட் ஐயோடின் (Liniment Iodine) ,, 1

ஒன்றுசேர்த்துக் கட்டியின்மேல் காலை மாலை தடவிவந்தால் கட்டி உடையும். பின்னர் † கார்பாலிக் ஸோலூஷன் சுத்திசெய்து போரிக் காஸிட் (Acid Boric) தூற்றி பஞ்சவைத்துக் கட்டி ஆற்றிவரலாம்; அல்லது, ■ சயப் பிளாஸ்திரியால் ரணத்தை ஆற்றிவரலாம்.

கட்டு:—

கட்டி யென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்

சுண்ணெக்குரு:—

சுண்ணெக்குருமென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

கண் கட்டி—Stye

கண் இரப்பைகளில், நுண்ணிய விஷக்கிருமிகளால் யேற்படும் சிறு கட்டி களைக் கண் கட்டியென்று சொல்லப்படும்; இவைகளினால், நமச்சலும், எரிச்சலும் வலியு மதிக்கியிருக்கும்; சில சமயங்களில் சுரம் ஏற்படுவது முண்டு.

சிகிச்சை

- (1) முலைப்பாலில் சங்கை உரைத்துப் போடலாம்.
- (2) திருநீற்றுப் பச்சைபிலை (உருத்திரசடை) சாற்றில் சங்கை யுரைத்துப் பூசலாம்.
- (3) கறிவேப்பிலைச் சாற்றில் சங்கை யுரைத்துப் பூசலாம்.
- (4) கடுக்காய்த்துளை ஒரு துணியில் முடிந்து சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் போட்டு, கொஞ்சகேரம் வெயிலில் வைத்திருந்து, இரண்டொரு துளி கட்டியில் விடலாம்.
- (5) சிறகோவேர் ரூபாயெடை 3 புனியம்பூ ரூபாயெடை 3
 பொன்னாங்காணியேர் ,, 3 திப்பிலி ,,
 துத்தம் (மயில்துத்தம்),, 3

ஒன்றுசேர்த்து, எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் மைபோலரைத்து, பென்சல் (Pencil) மாதிரியாக நீண்ட மாதிரிசெய்து காயவைத்துக்கொண்டு காலை மாலை எலுமிச்சம்பழச்சாற்றி லுரைத்துக் கட்டியில் தடவி வரலாம்.

- (6) பால்துத்தம் ரூபாயெடை 3 வெள்ளைச்சங்கு ரூபாயெடை 3
 துத்தம் (மயில்துத்தம்),, 3

† 236-ம் பக்கம் 3-ம் இலக்கம் பார்க்கவும்.

• செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

ஒன்று சேர்த்து எலுபிச்சம்பழச்சாற்றால் மைபோலரைத்து, பெனிசல் மாகிரியாக நீண்ட மாதநிறைச் செய்துக் காயவைத்துக்கொண்டு காலை மாலை முலைப்பாலி லுரைத்துக் கட்டியில் தடவி வரலாம்.

(7) கொக்கோயின் பியூரிப் (Cocainae Purif)	கிரைன்ஸ்	4
ஐட்ராட்ஜரி ஆக்ஸைட் (Hydrargeri Oxide)	"	8
வாசலின் (Vaseline)	டிராம்	4

ஒன்று சேர்த்துக் களிம்பாக அரைத்துக்கொண்டு நாள் ஒன்றுக்கு 8-வேளை கட்டியின்மேல் தடவி வரலாம்.

கண்ணிமைவீக்கம்—Ophthalmia Simplex

கண் சற்றே சிவந்து மேலிரைப்பைகள் வீங்கியிருக்கும்; கண் கூசும்; கண் எரிச்சலேற்படும்; கண்ணில் சதா நீர் வழிந்துகொண்டே யிருக்கும்; இது ஈ, கொசு, முதலிய சத்துருக்கள் கண்ணில்வந்து உட்கார்ந்து கிருமிகளைத் தொத்தச்செய்து அதிலுண்டாகிறது. அல்லது அதிக சூட்டினாலும், சிறு கல், மண், அசிமுதலிய அன்னியபதார்த்தங்கள் கண்ணில் விழுவதினாலும் ஏற்படலாம்.

சிகிச்சை

- (1) - அரப்பொடியைச் சங்கணிலச்சாறுவிட்டு 2-மணி நேரமும், சோற்றுக்கற்றாழைச் சாறுவிட்டு 2-மணி நேரமும், சங்கம்பழச்சாறுவிட்டு 2-மணி நேரமும் அரைத்துக் காயவைத்துப் பின் வேண்டிய அளவு எடுத்து எல்லெண்டெனையுடன் சேர்த்துக் களிம்பாக்கி கண்ணிரப்பை யின் மேல் புறத்தில் மட்டும் பற்று போட்டு வரலாம்.
- (2) பசும்பாலைக் காய்ச்சி சுட்ட துணியில் நனைத்து ஒற்றிடம் கொடுத்து வரலாம்.
- (8) 12-அவுன்ஸ் மழைத் தண்ணீரில் ஒரு டிராம் ஆலிட் போரிக்ளை (Acid Boric) கரைத்துப் பஞ்சில் தொட்டுக் கண்ணிரப்பைகளை நன்றாகச் சுத்தம் செய்துவிட்டுப் பின்னர்:—

ஒரு அவுன்ஸ் மழைத்தண்ணீரில் 5-கிரைன்ஸ் அர்ஜெண்டம் நைட் ரைஸ் (Urgentum Nitras)க் கரைத்து நீலகிற சீசாலிலடைத்துக்கொண்டு கண்ணிரப்பைகளை மடித்து விரலால் பிடித்துக்கொண்டு, பிருதுவான மயிர் பிரஷால் (Brush) காலையில் மட்டும் இமைகளில் தடவி வரலாம்.

கண்ணோய்—Catarrha Ophthalmia

கண்ணோய் தொத்துரோகக் கிருமிகளால் ஏற்படுவதாகும். ஈ, கொசு முதலியவைகள் விஷக்கிருமிகளைத் தங்கள் அசுத்தக்கால்களில் ஒட்டிக்

கொண்டு வந்து கண்ணில்சேர்த்துக் கண்ணேறையை உண்டாக்குகின்றன கண்ணேய் அதிகமான குளிரினாலு முண்டாகலாம்.

கண்ணிமைகள் வீங்கி சிவந்திருக்கும் வெள்ளைவிழி செந்நிறமாக விருக்கும்; கண்ணீர்வடிந்துகொண்டே யிருக்கும். கண் குழியில் மஞ்சள் நிறமான பூழை சேர்த்திருக்கும்; கண்ணில் நமச்சலும் மண்விழுந்ததைப் போன்ற உறுத்தலும் உண்டாகும்; கண்கூச்சமதிசமாயிருக்கும்; கருவிழியும் இயற்கைக்குச்சற்று சிறுத்தே தெரியும்; காலையில் படுக்கையிலிருந்து விட்டெழுந்திருக்கும்போது கண்ணிரப்பைகளை ஒன்று சேர்த்துப் பிடித்துக்கொள்ளும்; இதனால் சில குழந்தைகளுக்குச் சாரம் காய்வது முண்டு.

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு பிறந்த 2, 3-நாட்களுக்குப்பின் ஒருவித கண்ணோய் புண்டாவதுண்டு; அதைப்பற்றி “சூடு குத்திதல்” என்றத் தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

கண்ணோய் தொத்தும் தன்மைபுள்ளதினால் இதர குழந்தைகளுக்கும் பரவாதிருக்கும்படியான எச்சரிக்கை செய்து கொள்ளவேண்டும். கண்ணோயில் வடியும் பூழையைத் துடைத்துத் அத்துணியால் இதர குழந்தைகளுக்கு முகம் துடைக்கக்கூடாது. கண்துடைப்பதற்கென்று அப்போதைக்கப்போது புதிய மிருதுவான வெள்ளைத்துணியை வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். ஒரே துணியை வைத்துக்கொண்டு துடைத்து வந்தால் அந்தத் துணியில் இருமிகன்தொத்தி கண்ணேறையைச் சூடுதலில் சொஸ்தம் செய்யாதபடி செய்துவிடும். கண்ணோயில் கண்களை சுத்தம் செய்தவர்கள் தங்கள் கைகளை மிக சுத்தமாகக் கழுவி விடவேண்டும்.

கண்களில்படியும் பூழையை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து விடவேண்டும். அவ்வாறு சுத்தம் செய்யப்படாவிட்டால் பூழைகள் அநேக மணிநேரம் கண்ணில் தங்கி விஷமித்து கண்பார்வையைக் குறையச்செய்து விடுவதுத் தவிர கண்குழிகளிலும் இமைகளிலும் புண்படச்செய்து இலகுவில் சொஸ்தமாகாமல் உபத்திரவிக்கும்.

சிகிச்சை

கண் கழுவுகீர் (Eye Lotion)

- | | | |
|-------------------------------|-----------------|------------|
| (1) மழைத்தண்ணீர் (Rain Water) | அல்லது டிஸ்டில் | |
| வரட்டர் (Distilled Water) | | அவுன்ஸ் 12 |
| போரிக் காவிட் (Acid Boric) | | டிராம் 1 |

ஒன்று சேர்த்துக் கரைத்து வைத்துக்கொண்டு, கண்களைச் சுத்தம் செய்த பின்னர் கீழ்க்கண்ட மருந்துகளை புய்யோகித்து வரலாம்.

- | | | |
|---|---------|---------------|
| (4) லேக்சர் அமோனியம் அவரீடேடிஸ் (Liquor Ammonia Acetatis) | அவுன்ஸ் | 1 |
| டிஞ்சர் ஓபியம் (Tincture Opium) | டி.ராம் | $\frac{1}{2}$ |
| பன்னீர் (Rose Water) | அவுன்ஸ் | 6 |

(5) சிவ சல்பஸ் (Zinc Sulphus)	கிரான்ஸ்	1
போரிக் காஹிட் (Acid Boric)	"	10
கிளிசரின் (Glycerine)	துளி	40
மழைத்தண்ணீர் (Rain Water) அல்லது		
ஆவித்தண்ணீர் (Distilled Water)	அவுன்ஸ்	1

(6) இரவில் கண்ணிமை ஒட்டிக்கொள்ளாதபடி இரவு படுக்கைக்குப் போகு முன் 2, 3-வது சிற்றாமணக்கெண்ணெயை கண்ணில் விடலாம்.

இதை எரிபுழு, எரிபூச்சி, மயிர்பூச்சி என்றெல்லாம் சொல்லப்படும். இப் புழுக்கள் மயிரடாந்து 1½, 2-அங்குல னீளத்தில் பூவாசைமாம்; முருங்கை மாம்; முதலிய மரங்களில் படையாக அப்பிக்கொண்டிருக்கும். இப் புழுக்கள் சரீரத்தில் பட்டால் தாங்கமுடியாத அரிப்பை யுண்டிபண்ணும்; சொறியச் சொறிய தடித்து நமச்சலு மதிகரிக்கும்; இப்புழுவின் ரோமம் மிகவும் விஷத்தன்மைபுள்ளது.

சிகிச்சை

- (1) புகையிலையை ஊற்றவைத்தத் தண்ணீரால் பட்ட இடத்தைக் கழுவலாம்.
- (2) மூத்திரத்தையும் சாம்பிலையும் கரைத்துத்தடவியிருந்து குளிப்பாட்டலாம்.
- (3) வெந்நீரால் ஸ்நானஞ் செய்தவுடன் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயைத் தடவலாம்.

கன்னக்கட்டு:—

அம்மைக் கட்டென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

காச்சல் கட்டி:—

சூரக் கட்டியென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

காதில் ஈ புகுதல்:—

குழந்தைகளின் காதுகளைச் சுத்தமாய் வைத்தில்லாததினால், ஈ எரும்பு முதலியவைகள் காதில் றுழைந்துவிடலாம்; சில சமயங்களில் மாட்டு ஈ என்று சொல்லப்பட்ட ஒருவித ஈ காதில் புகுந்துவிட்டால் இலகுவில் வெளிப்படாமல், காதின் துளையிலுள்ள ஈரத்தில் முட்டையைப் பீச்சி ஈக்களை விருத்தி செய்துவீடும்; அதனால் ஓயாத வலியும், குடைச்சலு மெற்பட்டுக் காது வீங்கி புண்பட்டுவிடும்.

சிகிச்சை

- (1) குப்பைமேனிச்சாறு அவுன்ஸ் 1 கோழியவரைச்சாறு அவுன்ஸ் 1 ஒன்றுசேர்த்து காதில் 10-துளி வீட்டு பஞ்சால் அடைத்து வைக்கலாம்.
- (2) குப்பைமேனிச்சாறு அவுன்ஸ் 1 மூத்திரம் அவுன்ஸ் 1 ஒன்று சேர்த்து, 10-துளி காதில் வீட்டு வைக்கலாம்.
- (3) காதில் எரும்பு புகுந்துகொண்டால், கொஞ்சம் தண்ணீரையாவது, நல்லெண்ணெயையாவது காதில் வீட்டிருந்தால், எரும்பு செத்து மிதந்து வெளிப்பட்டுவிடும்.

காதில் சீழ்வடிதல்—Otorrhoea

உட்காதில், சிறு சிரங்குகள் உண்டாயிருப்பதினாலாவது, உட்காதின் மெல்லிய சப்த சவ்வு (Drum) வெளித் தள்ளிப்போவதினாலாவது, கபாலக் கரப்பான் ரோகத்தினாலாவது, மண்டையோட்டில் ஏற்பட்டிருக்கும் ஏதாவது ஒரு விகலப்பத்தினாலாவது, காதிலிருந்து சீழ் வடியலாம். சில சமயங்களில் காதிலிருந்து இரத்தம் வடிவதுண்டு. காதிலிருந்து இரத்தம் வடிந்தால், அது காதின் உட்பாக றுண்ணிய சவ்வு வெளித் தள்ளப்பட்டிருப்பதினாலாவது, மண்டையோட்டின் கோளாறினாலாவது இருக்கலாம். காதிலிருந்து வடியும் சீழ் தற்கந்தமுடையதாக விருந்

தால் அது உட்காகில் சீழ் புண்ணுகளுண்டாயிருக்கும் காரணத்தினாலிருக்கலாம், அம்மைரோகத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்குக் காதிலிருந்து சீழ்வடிதல் சாதாரணமாயுண்டாகும்.

சிகிச்சை

(1) இந்துப்பு	ருபாயெடை $\frac{1}{2}$	கோல்டம்	ருபாயெடை $\frac{1}{2}$
கோரைக்கிழங்கு	” $\frac{1}{2}$	வெள்ளைப்பூண்டு	” $\frac{1}{2}$
சுக்கு	” $\frac{1}{2}$	வசம்பு	” $\frac{1}{2}$
திப்பிலி	” $\frac{1}{2}$	பேரிச்சவகாய்	” $\frac{1}{2}$
நல்லெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 6		

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்துக் காலை மாலை காதில் 5, 6-துளி விட்டு வரலாம்.

காது கழுவுதல் (Ear Lotion)

(2) ஆவரிட் போரிக் (Acid Boric)	டிராம் 1
இளஞ்சூடானதண்ணீர்	அவுன்ஸ் II

ஒன்று சேர்த்துக் கரைத்துக்கொண்டு காலை மாலை காதுக்குள் பிச்சாய் குழலால் (Syringe) அடித்துச் சுத்தம்செய்த பின் சீழ்கண்ட 3, 4-இலக்க மருந்துகளைக் காதுக்குள் விட்டு வரலாம்.

(3) டிஞ்சர் ஓபியம் (Tincture-Opium)	டிராம் 1
தேங்காயெண்ணெய் (Cococanute Oil)	” 1

ஒன்று சேர்த்து, 2-வது இலக்க நீரால் சுத்திசெய்த பின் காலை மாலை காதுக்குள் 5, 6-துளி விட்டு வரலாம்.

(4) ஆவரிட் கார்பாலிக் (Acid Carbolic)	டிராம் $\frac{1}{2}$
கிளிசரின் (Glycerine)	” 9

ஒன்று சேர்த்து, 2-வது இலக்க கழுவு நீரால் சுத்தம்செய்த பின் காலை மாலை 5, 6-துளி காதில் விட்டுப் பஞ்சாலடைத்து வரலாம்.

காது குத்து:—

காதுவலி யென்ற நிலப்பின் சீழ் பார்க்கவும்.

காதுவலி—Otalgia—Earache

உட்காதுக்குள் அதிகமாக குரும்பி (Cerumen) சேர்ந்துவிடுவதினாலாவது அதிகமான அசுபடிந்திருப்பதினாலாவது, உள்காது கவ்வு வீக்கம்கண்டு விடுவதினாலாவது, காதுக்குள் கட்டிக்கொளும்பி வீருப்பதினாலாவது, மிகுந்த குளிரினாலாவது, காதுவலியுண்டாக்கலாம். மேலும், பல்வலி யண்டானாலும், பல்முளைக்கும் வேதனையினாலும், அம்மைரோகம் தாக்குவதினாலும், மாந்தம், கக்குவான் விஷச்சந்திகரயினைவகளுண்டாவதாலும்;

காதுவலியுண்டாவதுண்டு. சிறுமுளை வீக்கத்தினாலும், அதிர்ச்சியினாலும் காதுவலி யேற்படலாம்.

சாதாரண காதுவலியானால், கடுமையான வலியும், காதடைப்பும், காதுக்குள் பேதோ ஒன்று அடைந்திருப்பதுபோன்ற உணர்ச்சியு மேற்படும்; பசுவிலிட இரவில் உபத்திரவம் மிகுதியாக விருக்கும்; குழந்தைகள் காதுவலியினால் பாதிக்கப்படுமானால், தன்னைகளால் காதை தேய்த்துக்கொண்டு அழும்; கண்கள் சிவக்காமல் பூழைமட்டும் சேரும்; காதுவலி குழந்தைகளுக்கேற்படுமானால், சுரம் 101, 103-டி.சி.பி. வரையிலும் சுரம்காய்வதுண்டு. மேலும், அதனால் வலிப்பும், வாந்தியும்கூட ஏற்படலாம்.

சிகிச்சை

- (1) பட்டைச்சாராயம் அவுன்ஸ் 1 பெருங்காயம் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ ஒன்று சேர்த்துக் காதுக்குள் 5, 6-துளி வீட்டுவாராம்.
- (2) டிஞ்சர் ஒபியம் (Tincture Opium) துளி 15
ஆவலிட் சார்பாலிக் (Acid Carbolie) ,, 15
கிளிசரின் (Glycerine) அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து 305-பக்கம் 2-வது இலக்க கழுவுகிரால் காதுக்குள் அடித்து சுத்தம் செய்த பின்னர் 5, 6-துளி வீட்டு வாராம்.

கிருமி:—

கோர்ப்பூச்சி யென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

கோர்ப்பூச்சி—Thread worm

கால் அங்குலத்திற்குமேல் அரைஅங்குல நீளத்திற்குள்ளாக நூலிழையைப் போன்று வெண்மையாக மலக்குடலில் வாசம்செய்யும் இப் பூச்சிகளைக் கோர்ப்பூச்சி, நெல்வால்பூச்சி, தானப்பூச்சி யென சொல்லுவார்கள். தண்ணீர் வழியாக உட்சென்று, ஆசனத்திற்கு 3, 4-அங்குல தூரத்தில் அதாவது, மலக்குடல் இறுதியில் தங்கி வாசம்செய்து, வலுத்துப் பெருகி தொத்திரவை விளைவிக்கும். அதிகமாகிவிட்டால் மலத்துடன் வெளியாகி வரும்.

நான்பட்ட மலச்சிக்கலுள்ளவர்களுக்கு ஆசன பவுத்திரத்தை உண்டாக்கும்; இவைகள் ஆசனவாயில்வந்து நெளிவதனால் ஆசனவாய் நமைச்சலும், புண்ணும் உண்டாகிவிடும். இராக்காலங்களில் ஆசனத்துவாரத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு யோனியில் பிரவேசித்து அசுத்தப் படுவதினாலேயே சிலபெண்களுக்கு வெள்ளை பிரமேகமும், (206-பக்கம் பார்க்கவும்) அரைகரப்பான் போன்ற சரம் புண்வியாதினும் உண்டாகின்றன. இப் பூச்சிகளின் உபாதையினால் ஆசனவாய்ப்புண், பசி மந்தம், வாய் நாற்றம், மூக்கரிப்பு, பக்கடிப்பு, குடலேற்றம், தூக்கமின்மை, சோகை, மலம் கழிக்கும்போது முக்கல் முதலியவைகளேற்படலாம்.

சிகிச்சை

- (1) கடுக்காய் ரூபாயெடை 1 முருங்கைவேர் ரூபாயெடை 1
தான்றிக்காய் ,, 1 எலிச்செவியிலை ,, 1
நெல்லிவற்றல் ,, 1

ஒன்று சேர்த்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில், காலே மாலை 3-அவுன்ஸ் வீதம் 3-நாள்களுக்குக் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) அமோனியம் குளோரைட் (Ammonium Chloride) கிரைன்ஸ் 72
இன்பியூஷன் சென்னா (Infusion Sennae) டிராம் 4
இன்பியூஷன் ஜென்டைன் கோ (Infusion Gentian Co) அவுன்ஸ் 3

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஆகாரத்திற்குப்பின் ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் ஒரு நாள்க்கு மட்டும் கொடுத்து மறுநாள் காலையில்:—

- காலோமல் (Calomel) கிரைன்ஸ் 1
ரெவின் ஜாலப் (Resin Jalap) ,, 1
பல்விஸ் ஸ்காமோனி (pulvis Scammoni) ,, 3

ஒன்று சேர்த்து, ஒரே தடவையாக வாயில் கொட்டி, எச்சில் கூட்டி வீழ்க்கும்படிச் செய்யலாம்.

- (3) 235-ம் பக்கம் நாகுப்பூச்சிக்குச் சொல்லிய 1, 2, 3, 4-வது இலக்க மருந்துகளையும் கொடுக்கலாம்.

கிரைப்பூச்சி அதிகரிப்பினால் ஆசனவாய்ப் புண்ணும், நமைச்சலு மேற்பட்டால்:—

- (1) வேப்பெண்ணெயைத் தடவி வரலாம்.
(2) அக்குவண்டம் ஐட்ராஜரி (Unguentum Hydrargeri) டிராம் 4
ஒலியம் கோகாயோ (Oleum Cacao) ,, 1

ஒன்று சேர்த்துப் படுக்கைக்குப் போகுமுன் வெளிப்பீரயோகமாக மட்டும் ஆசன வாயில் தடவி வரலாம்.

கிரைப்பூச்சி அதிகரிப்பினால் இரத்தக்குறை வேற்பட்டிருந்தால்:—

- பெர்ரி சல்பஸ் (Ferri Sulphus) கிரைன்ஸ் 5
எக்ஸ்டிராக்ட் கிளிரிசரினா லிக்குட் (Extract Glycyrrhiza Liquid) டிராம் 4
இன்பியூஷன் ஆலோஸ் கோ (Infusion Aloes Co) அவுன்ஸ் 3

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, நாள் ஒன்றுக்கு 3-தடவை ஆகாரத்திற்குப் பின் ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

குக்கல் நோய்:—

கக்குவான் என்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

குடல் வாத ரோகம்:—

அண்டவாதம் என்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

குடல் வீப்புருதி—Appendicitis

குடலின் கீழ் நுனியுடன் சம்பந்தப்பட்டுப் புழுவைப்போல் நீண்டு ஒரு புரம் அடைப்பட்டிருக்கும் 'உபக்குடல்' (Appendix) என்னும் ஒரு குழலில் புண் படுவதே குடற்படுவன், குடற்கிளை, குடற்புற்று, குடல் வீப்புருதி எனச் சொல்லப்படும்.

ஆகாரத்துடன் செல்லும் ஜீரணிக்காத கல், மண் முதலியவைகள் இந்த உபக்குடலில் சேர்ந்து வீங்கி விடுவதனாலேயே குடற்படுவன் உண்டாகிறது. முக்கிய காரணம், நுண்ணிய ரோகக் கிருமிகளேயாகும். மற்றபடியாகக் குளிச்சியினாலும், உபக்குடல் நீருவதனாலும், ஜீரணிக்கக்கூடாத ஆகாரங்கள் போய் தங்குவதனாலும் உண்டாகலாம்.

குடற்படுவன் உண்டாகியிருந்தால், 10-முதல் 10.5-டிகிரி வரையில் சூரம்காயும். வயிற்று வலி, வாந்தி, ஓயாத அரோசிகம் உண்டாகும். ஆரம்பத்தில் இரைப்பையில், அதாவது, கொஞ்சக்கும் கீழ் வலியுண்டாகி, தொப்புளைச் சுற்றியும் வலித்துப் பின் தொப்புளுக்கு வலப்புறமாக பிணைதலைப் போன்ற வலி ஏற்படும். வலி முதல் உண்டாகி, பின் அடுத்தபடியாக வாந்தி உண்டாகும். மூன்று நாட்களுக்கும் குச் சூரம் காய்ந்தபின், படிப்படியாகச் சூரம் குறையும்; நாடி நடையும் சமரசமாகும்; அப்படிக்கின்றி, திடீரென சூரமானது சம சீதளமடையுமானால் (Normal Temperature) உபக்குடல் புண்பட்டு மிகத் தீவகை விளைவிக்கும் என்று அஞ்சவேண்டியதாகும். திரேகோஷ்ணமானது மிகுதியும் குறைந்த அதே சமயத்தில் நாடி நடைத் துரிதப்பட்டால் கெட்ட அறிகுறி என்றே சொல்லவேண்டும்; ஆனால், நாடி நடையும், திரேகோஷ்ணமும் திடீரெனச் சமரசப்பட்டு; வியாதியால் தன் வலிகளிலிருந்து விடுபட்டு நிம்மதியுடன் இருப்பதாகக் கருதினாலும், உபக்குடல் புண் அதிகரித்திருப்பதாகவே நம்பலாம்.

இடது விலாவில் பொருமி விரும்பதைப்போன்று தோன்றுமானாலும், மறுபடியும் வாந்தி ஆரம்பித்த அடிக்கடி வாந்தி உண்டாகுமானாலும், சிறகுடலும் அதனால் பாதிக்கப்படுவதாகக் கருதவேண்டும். இவைகளுக்குச் சஸ்திர சிகிச்சை உடனே செய்யவேண்டியது.

குடற்படுவனால் அதிகமான ஹிம்ஸை ஏற்பட்டிருக்கும் சமயத்தில் ரோகியை நிம்மதியாகப் படுக்கவைத்து, ஐஸ் (Ice) ஒற்றிடம் கொடுத்து இவ்வுலையில் ஜீரணிக்கும் ஆகாரங்களைக் கொடுத்து வாலாம் முக்கிய மாயப் பட்டினி போடுவதே குடற்படுவனுக்குக் கேற்றதாகும். விரேசன காரிகளொன்றும் கொடுக்கக்கூடாது; ஆனால், ஆசனவழியே நீரேற்றம்

செய்து (Enema) குடலைச் சுத்தி செய்யலாம். அல்லது காலோமல் (Calomel) 1-முதல் 3-வயதக் குழந்தைகளுக்கு 1-கிரான் வீதம் கொடுக்கலாம்.

உபசார்தியாகக் கீழ்க்கண்ட மருந்துகளைக் கொடுத்து வரலாம்.

சிகிச்சை

(1) கோரோசனை	ரூபாயெடை 3	சகஸ்திரபேதி	ரூபாயெடை 3
கோஷ்டம்	" 3	வெட்டிவேர்	" 3
செண்பசப்பு	" 3	விலாயிச்சம்வேர்	" 3
அகிமதுரம்	" 3	மாசிப்பத்திரி	" 3
ஏலம்	" 3		

ஒன்று சேர்த்து, ஆடாதோடையிலைச் சாறுவிட்டு, 3-மணிநேரம் அரைத்து பட்டாணிக் கடலை யவ்வளவு பெரிய மாத்திரைகளாகச் செய்து உலர்த்திக் கொண்டு, காலை மாலை ஒரு மாத்திரை வீதம் முலைப்பாலில் கரைத்துக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) சோடியம் சல்பஸ் (Sodium Sulphus)	டிபாம் 1
ஆக்குவா மெந்தா பிப் (Aqua Mentha Pip)	" 6

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

குடல் விருத்தி ரோகம்:—

அண்டவாதம் என்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

குடற்கிளை; குடற்படுவன்; குடற்புற்று:—

இவைகளுக்கு குடல் விப்புருதி என்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

குத்திருமல்—Horseness

சுவாசக்குழலின் மேல்பாகமாவது, சளிக்குளங்களாவது, சப்த நாதங்களாவது வீக்கம் கண்டாலும், அதிகமான குளிரில் நடமாடினதினாலும், அசுகனை யதிகமாகச் சுவாசிக்கப்பட்டதினாலும் தொண்டைப்புடைச்சலேற்படலாம்.

தொண்டையில் கரகரப்பும், குறு இருமலும் ஓயாது உண்டாகும். இருமுவதால் சளி வராது; ஆனால், கொஞ்சமளவு யண்டாகலாம்.

சிகிச்சை

(i) ஆடாதோடையிலைச்சாறு	சக்குத்துள்	ரூபாயெடை 3
அவுன்ஸ் 3	திப்பிவித்துள்	" 3

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து, அதில் ஒரு இரும்புத்தண்டைப் பழுக்கக் காயவைத்து நனைத்து, அந்தச் சாற்றில், 2, 3-தேக்கரண்டி வீதம் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

- (2) இஞ்சிச்சாறு தேக்கரண்டி 1 தேன் தேக்கரண்டி $\frac{1}{2}$
மாதளம்பழச்சாறு „ 1

ஒன்று சேர்த்து, காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

- (3) அப்ரகக் கோரோசனை மாதத்திரை; கோரோசனை மாதத்திரை இவைகளி
லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

- (4) அமோனியம் புரோமைட் (Ammonium Bromide) கிரான்ஸ் 8
வைனம் இப்பிக்காக் (Vinum Ipecac) துளி 8
டிஞ்சர் சில்லி (Tincture Scillae) „ 10
டிஞ்சர் செனிகா (Tincture Senegae) „ 10
சிரப் டூலு (Syrup Tolu) „ 30
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 3-மணி கோத்
திற கொருநாம் ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

குழந்தைகள் பால் குடிக்காவிட்டால்:—

ஆகார வெறுப்பு என்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

குழந்தைக் கட்டி:—

சுரக்கட்டி என்றதன் தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

குளவிக் கொட்டு—Wasp Stings

தேனீ, குளவீ முதலியவைகள் கொட்டினால், அதிகமான கடுப்பேற்படும்.
கொட்டினவிடம் சிவந்திருக்கும். அதன் கொடுக்கின் முள் உடைந்
திருந்தால், சிராவணத்தால் (Pinchers) எடுத்துவிட வேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) பழம், புளியையும்; சுண்ணாம்பையும் சமமாகச் சேர்த்துக் குழப்பித்
தடவலாம்.

- (2) நாயுருவியிலையை அரைத்துப் பூசலாம்.

- (3) பல்விஸ் இப்பிக்காக் (Pulvis Ipecac) டிராம் 1
தண்ணீர் „ $\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்துக் குழம்பித் தடவலாம்.

- (4) ஸ்பிரிட் அமோனியம் அரோமாட்டிக் (Spirit Ammonium
Aromatic) இதைக் கடிவாயில் தடவி வரலாம்.

குளிர்ச்சிரங்கு—Chilblaih

குளிர்ச்சிரங்கானது, குளிர்காலத்திலாவது, குளிரில் நடமாடுவதினால்
வது, குழந்தைகளுக்கு கால் விரல்களிடுக்குகளிலும், கரது மூக்கு இவை

களிலும் சிறு சிரங்குபோ லுண்டாகும். வியர்க்குறுபோன்று சிறு நமைச்சல்களுண்டாகி, சீழ் பிடியாமல் சற்றுப் பெருத்து அப்படியே நசுங்கிவிடும். நசுங்கிய பின்னர், கீர் வடியாமல் வாட்சியாகவே சிரங்குபோலிருக்கும்.

சிகிச்சை

- (1) சந்தன எண்ணெயைத் தடவி வரலாம்.
- (2) அர்ஜெண்டம் நைட்ரஸ் (Urgentum Nitras) இரான்ஸ் 16
ஸ்பிரிட் ஈதர் நைட்ரோஸி (Spirit Aether Nitrosi) அவுன்ஸ் 1
ஒன்றுசேர்த்து, காலிலுள்ள சிரங்குக்கு மட்டும் கோழியிறகில் தொட்டு தடவி வரலாம்.

கூகைக்கீட்டு:—

அம்மைக் கட்டென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

கூகைவிகீக்கம்:—

அம்மைக் கட்டென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

கோடைக்கீட்டி:—

இதுவேளிர் காலங்களில் மிகுதியும் குழந்தைகளுக்கு வருவதுண்டு. இக் கட்டிகள் தலையிலும் முகத்திலுமே யதிகமுண்டாகும். வெக்கை மிகுதியினால் வியர்த்து வியர்க்குருக ளுண்டாகி அதிலிருந்து பெருத்து கட்டிகள் ளாகிவிடும். ஒருகுழந்தைக்கே பலகட்டிகளுண்டாகும். கட்டிகள் சிவந்து வலியுள்ளதாகவிருக்கும். இதற்குச் சஸ்திர சிகிச்சையே யேற்றதாகும்.

சிகிச்சை

- (1) பளிங்குச்சாம்பிராணி கற்பூரம் ரூபாயெடை 1
ரூபாயெடை 1 சாதிவிங்கம் " ½

முதலில் சாம்பிராணியைத் துள்செய்துக்கொண்டு கற்பூரத்தைச்சேர்த்து நரைக்க மெழுகுபோல் வரும் அப்போது லிங்கத்தையும் சேர்த்து எர்த்து அனலில் வாட்டி துணியில் தடவிப்போட கட்டியுடையும். கட்டி யுடந்த பின் போரிக் கரலிடைத் (Boric Acid) னுற்றியாவது இதேபிளாஸ்திரியை மறுபடியும் போட்டாவது அல்லது * ஈயப் பிளாஸ்திரியையாவது போட்டு இரணத்தை ஆற்றலாம்.

- (2) அவரைவிலையையும், அல்லியிலையையும் சமமாகடுத்து, அரிசி கழுவிய தண்ணீர் விட்டரைத்துப் பூசிவரலாம்.

சளி:—

ஓயாத சளி யென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

* செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

சளி:—

நெஞ்சத் தடிமனென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

சாம்பல் மண் திண்ணல்:—

சிறுக்குழந்தைகள் சாம்பல், மண் முதலியவைகளைத் தின்று விடுவது வழக்கம். இவைகளை அதிகமாய் புசிக்கவாரம்பித்தால் சிறு குடலுடன் சம்பந்தப்பட்டுத் தொங்கும் உபக்குடலில் (Appendix) போய்ச்சேர்ந்து குடல் வீப்புருதியை (Appendicitis) உண்டாக்கிவிடும். அல்லது, இவைகள் ஜீரணமாகாமல் வயிற்றுப்பொருமலையும், வயிற்றோட்டத் தையுமுண்டாக்கும். சாம்பல், மண் தின்பதினால் இரைப்பையில் கட்டி போல் திரண்டு உபத்திரவத்தையுண்டாக்கும்: ஆதலால் சாம்பல், மண் தின்னும் குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி மலத்துடன் அவைகள் கழிந்து போகும்படி சிகிச்சைகள் செய்து வரவேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) கத்திரிக்காய்ச்சாறு தேக்கரண்டி-2, சுட்டபெருங்காயம் ரூபாயெடை 1/16 ஒன்று சேர்த்துக் கொடுத்து வரலாம்.
- (2) முள்ளங்கிச்சாறு தேக்கரண்டி-2, சுட்டபெருங்காயம் ரூபாயெடை 1/16 ஒன்று சேர்த்து கொடுத்து வரலாம்.
- (3) மிளகு ரூபாயெடை 1 கீழ்க்காய்கெல்லிவேர் ரூபாயெடை கடுக்காய்த்தோல் ,, கீ

ஒன்று சேர்த்துப் புளித்தமோர் விட்டனாத்து 2-அவுன்ஸ். மோரில் 3-ரூபாயெடை மருந்தைக் கரைத்துக் கொடுத்து வரலாம்.

சிகிக்கண்ணாய்:—

குடுகுத்துதல் என்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

சிலந்தி:—

கட்டி யென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்

சிறுநீர்க்கட்டு:—

கடுப்போடு நீரிறங்க வென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

கீழ்க்கண்ணாய்:—

குடுகுத்துதல் வென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

சுகபேதி—Aperient

குழந்தைகளுக்குமாதமொருமுறை அல்லது மூன்றுமாதத்திற்கொருமுறை யாவது மலபிரவர்த்தி செய்யும்படியான சுகபேதி மருந்துகளைப் பிரயோ

கம் செய்யவேண்டும். குழந்தைகளின் கிரோவவளர்ச்சிக்கும் கிருமிகளின் உபத்திரவங்களிலிருந்தும், துர்நீர்வியாதிகளிலிருந்தும், தப்பித்துக் கொள்வதற்கு சுசுபேதி மருந்துகளைக் கொடுக்கவேண்டியது. அவசியமாகும்.

சுசுபேதி மருந்துகள்

- (1) சிற்றமணக்கெண்ணெய் (Castor Oil) அல்லது வேப்பெண்ணெய் (Neem Oil) இவைகளிலொன்றில் 6-மாதமுதல் ஒரு வயதுக்குழந்தைகளுக்கு 3-தேக்கராண்டி வீதமும்; 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 1½-தேக்கராண்டி வீதமும்; 3 முதல் 6-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 3-தேக்கராண்டி வீதமும்; 6-முதல் 12-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4, 6-தேக்கராண்டி வீதமும் காலை நேரங்களில் மட்டும் கொடுத்து வரலாம்.

- | | | | |
|----------|------------|----------------------|------------|
| (2) எலம் | ருபாயெடை ½ | செண்பகப்பு | ருபாயெடை ½ |
| கிராம்பு | ” ½ | சுருரோகினி | ” ½ |
| கோவட்டம் | ” ½ | சுத்திசெய்தநேர்வாளம் | ” 1½ |

ஒன்று சேர்த்துச் சுடுதண்ணீர் விட்டு மைபோலவைத்து, 12-மாத கிரைகளாகப் பிரித்து, உருட்டி காயவைத்து காலையில் சுக்கு சஷாயத்தில் ஒரு மாத்திரையைக் கொடுக்கலாம்.

- (3) எப்சம் சால்ட் (Epsom Salt) அவுன்ஸ் 1
டிஞ்சர் சிஞ்ஜிபீஸ் (Tincture Zingiberis). டிராம் 1
தண்ணீர் 2-அவுன்ஸாகப் போதுமானது

முதலில் எப்சம் சால்ட்டை ஒரு அவுன்ஸ் தண்ணீர்விட்டு வடிக்கடி அத்துடன் டிஞ்சர் சிஞ்ஜிபீரும், மொத்தத்தில் 2-அவுன்ஸாகப் போதுமான தண்ணீர் விட்டுக் கலந்து, ½-முதல் 1-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 1, 1½-தேக்கராண்டி யளவும்; 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 2, 3-தேக்கராண்டி வீதமும்; 3-முதல் 6-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-தேக்கராண்டி வீதமும் கொடுத்து வரலாம்.

குறிப்பு:—டிஞ்சர் சிஞ்ஜிபரிஸுக்குப் பதிலாக டிஞ்சர் சின்னோனுவாவது (Tincture Cinchonae) அல்லது, இன்பியூஷன் சென்னா (Infusion Senna) வாவது சேர்த்துக் கொள்ளலாம். இன்பியூஷன் சென்னாவானால், தண்ணீரை நீக்கி 2-அவுன்ஸ் அளவாகச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

- (4) எப்சம் சால்ட் (Epsom Salt) அவுன்ஸ் 1
ஆக்குவா மெந்தா பிப் (Aqua Mentha pip) ” 3
மெக்னிஷியா கார்போனஸ் (Magnesia Carbonas) கிரான்ஸ் 30

ஒன்று சேர்த்து ½-முதல் 1-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 1½-தேக்கராண்டி யளவாகவும்; 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 2, 2½-தேக்கராண்டி வீதமும்; 3-முதல் 6 வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-தேக்கராண்டி யளவாகவும்; 6-முதல் 12-வயது சிறுவர்களுக்கு 6-தேக்கராண்டி யளவாகவும் கொடுத்து வரலாம்.

† 60-ம் பக்கம் பார்க்கவும்.

சுரக்கட்டி—Splenitis

இதைக் காய்ச்சல் கட்டி, குலைக்கட்டி, குழந்தைக் கட்டி என்று சொல்லப் படும். இது பீலிக்மென்ற மண்ணீரல் (Spleen) வீக்கம் கண்டதாலாவது, (Enlargement of Spleen) அதில் கட்டிப் புறப்படுவதாலாவது யேற்படுகிறது.

அடிக்கடி விஷசுரங்களுண்டாவதினாலேயே, மண்ணீரலின் - இரத்தப் பசைக்குன்றி வீக்கமேற்படுகிறது. சுரக்கட்டி விசேஷமாக மலேரியா (Malaria) வென்ற விஷசுரத்தில்தான் அதிகம் உண்டாகிறது. இதை மலேசுரக்கட்டி (Malarial Splenitis) என்று சொல்லுவர். சாதாரண முறை சுரத்தினாலும் மண்ணீரல் பெருத்தும் காண்பதுண்டு.

சுரக்கட்டி ஏற்பட்டு விட்டபின்பும் காய்ச்சல் ஸ்திராமாகவே யிருக்கும்; சரீர மிளைத்து எலும்பும் தோலுமாகி, தலையும், வயிறுமட்டும் பெருத்திருக்கும்; மலச்சிக்கலேற்படும்; சர்மம் மண்ணிறமாக விருக்கும்; வயிற்றுக்குள் ஏதோ ஒன்று உருருவதைப்போற் றேன்றும்; ஆகாச வெறுப்பும்; ஒக்காளமும், ஏப்பமும் உண்டாகி அகாலமரணத்திற் கேதுவாக்கும்.

சிகிச்சை

(1) திப்பிலிமூலம்	ரூபாயெடை 1	சுக்கு	ரூபாயெடை 1
வெட்பாலைப்பட்டை	” 1	மிளகு	” 1
தேவதாரு	” 1	திப்பிலி	” 1
பாஸ்கம்பிராணி	” 1	கொடிவேலி	” 1
வாய்விளங்கம்	” 1	மதுக்காரை	” 1
கண்டுபாரங்கி	” 1	கோவட்டம்	” 1
கரிசலாங்காணி	” 1	சிறந்தாத்தை	” 1
கடுக்காய்த்தேரல்	” 1	ஓமம்	” 1
சிறுவழுதலை	” 1	கருகொச்சி	” 1
பெருவழுதலை	” 1	நிலவேம்பு	” 1
வசம்பு	” 1	செவ்வியம்	” 1
பொன்முசுட்டை	” 1		

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை 1-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) ருத்திர சென்னாரம்; பஞ்சாக்ஷர சென்னாரம் || முதலியவைகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய்யுறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(3) கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine Sulphus) இரைன்ஸ் 1
 ஆலிட் சல்பியூரிக் டில் (Acid Sulphuric Dil) துளி 8
 பெர்ரி எத் அமோனியம் சிட்ரஸ் (Ferri et Ammonium Citras) இரைன்ஸ் 4

† லைக்கர் ஆர்சனிக்காவின் (Liquor Arsenicalis)	துளி	3
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	2

ஒன்றுசேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஆகாரத்திற்குப்பின் ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

குடுகுத்துதல்—Ophthalmia Neonatorum

குழந்தைப் பிறந்த இரண்டு தினத்திற்குப்பின் ஏழு தினத்திற்குள்ளாகச் சிசுக்களுக்கு இந்நோய் வருவதுண்டு. தாய்க்கு வெள்ளைப் பிரயோகம், அரைக்கரப்பான் முதலிய வியாதிகள் இருப்பதினாலும், அவ்விதவியாதியுள்ள ஸ்திரீ பிரசவிக்கும் சமயம் சிசுவின் சிரசு உதயமாகிநெடுநேரம் பிரசவமாகாமல் யோனிப்பாதையில் சிரசு தாமதித்து நின்றதினாலும், பிரசவமாகும் சமயம் சிசுவின் கண்களில் யோனியிலிருந்து கசியும் துற்றீர் படுவதினாலும், சிசுக்களுக்கு இக்கண்ணோய் புண்டாகக் காரணமாயிருக்கிறது. பிரசவமானவுடனே சிசுவின் கண்ணைப்பற்றி மிக்க வேலையுடனும் சுகாதாரவிதிபுடனும் மருத்துவச்சி, (36-ம் பக்கம் பரீர்க்கவும்) கண்களைச் சுத்தம் செய்யாமல் விட்டு விடுவதினாலும், அருசியும், துற்கந்தமுமுள்ள அறைகளில் பிரசவம் நடப்பதினாலும் கொசு, ஈ முதலியவைகளைக் கண்ணில் மொய்க்கும்படி அலகடியமாய் விட்டு விடுவதினாலும், சிசுக் கண்ணோ புண்டாகலாம். இச் சிசுக் கண்ணோயினால் சாஸ்வத குருடு உண்டாகலாம். பிரசவிக்கும் ஸ்திரீக்குப் பிரமேக ரோகமிருந்தாலும் சரி, யில்லையானாலும் சரி பிரசவ வலிகண்டவுடன் யோனிப்பாதையைச் சுடுதண்ணீரிலுள் சுத்தமாகக் கழுவி விடவேண்டும். இவ்விதம் செய்தால் சிசுக் கண்ணோபுண்டாவதற்குக் காரணமதிக மிருக்க முடியாது.

கண்ணிமைகள் வீங்கி பூழை சேர்ந்திருக்கும்; கண்ணிவந்து கூச்சமும், மணல் கொட்டியதைப் போல் உறுத்தலுமிருக்கும்; தூங்கும்போது கண்ணிமைகள் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக்கொண்டு வலியைக் கொடுக்கும்; சீழ் போன்ற மஞ்சள்நிறமான பூழைகள் குழிகளில் நிறைந்திருக்கும்; கருவிழிகள் சிறுத்துத் தெரியும். இதனால் சில சமயம் சிசுவுக்குத் திரோசம் உஷ்ணமா யிருக்கலாம்.

முதலில், “கழுவதலும் குளிப்பாட்டலும்” என்ற தலைப்பின் கீழ் 36-வது பக்கம் சொல்லியபிரகாரம் கண்களை சுத்திசெய்ய வேண்டியது. கண்களைச் சுத்தம் செய்ய கீழ் கண்ட கண் கழுவுநீரை உபயோகிக்கலாம். ஒருதரம் கழுவுநீரில் நனைத்து துடைத்த துணியை மறுதரம் உபயோகிக்கக்கூடாது.

கீகீகை

கண் கழுவுநீர்—Eye Lotion

(1) ஆவரீட் போரிக் (Acid Boric)	டிபிராம்	1
மழைத்தண்ணீர் (Rain Water) அல்லது		
ஆவித்தண்ணீர் (Distilled Water)	அவுன்ஸ்	12

† விஷமானது ஜாக்ரதையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

ஒன்று சேர்த்துக் கரைத்துக்கொண்டு, யிருதுவான வெள்ளைத் துணியில் நனைத்துக் கண்ணைச் சுத்தம் செய்யலாம்.

(2) பன்னீரில் Rose Water) 2-துளி கண்ணில் வீதலாம்.

(3) கற்கண்டைப் பொடித்து ஒரு வெள்ளைத் துணியில் முடிந்து, புளிப்பு மாதளம்பழச் சாற்றில் ஊறவைத்து 2-துளி கண்ணில் பிழியலாம்.

(4) சிங் சல்பஸ் (Zinc Sulphus)	கிரைன்ஸ்	1
ஆவரிட் போரிக் (Acid Boric)	"	5
கிளிசரின் (Glycerine)	துளி	80
டிஸ்டில் வாட்டர் (Aqua Distilled)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்து 1-வது இலக்க கண் கழுவுநீரால் கண்ணைச் சுத்தம் செய்து பின் 2-துளி வீட்டு வரலாம்.

கண்ணிரப்பைகள் கித்திரையின்போது ஒட்டிக்கொள்ளாம லிருக்க, சுத்தமீன பன்றிக் கொழுப்பையாவது (Lard) பச்சைவெண்ணெயையாவது, சைதூண் எண்ணெயையாவது தூங்கப்போகும் சமயங்களில் கண் மடலினோரத்தில் கொஞ்சமாகத் தொட்டு தடவி வைக்கலாம்.

செவ்வாப்புக் கட்டி:—

இது குழந்தைகளுக்கு குண்டாகும் ஓர்வித தூர்நீர்க்கட்டி, செவ்வாப்புக் கட்டியும் வேனால் கொப்புளங்களைப்போலவே, அநேகமாக சிரசிலும், முகத்திலும் தானுண்டாகும்; எல்லாவிதத்திலும் இது வேனால் கொப்புளத்தை யொத்த தாகவே யிருக்கும்; இதற்கு ஸ்திரீ சிகிச்சையே மேலானது.

சிகிச்சை

கோடைக் கட்டிக்குண்டான சிகிச்சையே செய்யலாம்.

தடிமன்:—

ஓயாத சளி யென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

தானப்பூச்சி:—

கிரைப் பூச்சி யென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

தீப்பட்ட புண்—Burns

அகஸ்மாத்தாய் குழந்தைகளுக்கு நெருப்பாவது, சுடுதண்ணீராவது பட்டு விட்டால் கீழ்க்கண்ட சிகிச்சைகள் பயனுள்ளதாயிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) நெருப்பாவது சுடுதண்ணீராவது பட்டவுடன் கறியுப்பைத் தண்ணீரில் கரைத்துத் தடவி விட்டால் கொப்புளம் கண்டு, புண்ணாகாது.

(2) தேனைப் பூசலாம்.

(3) வாழை மட்டைச் சாற்றைப் பூசலாம்.

(4) ஒரு தேக்காண்டி சோடா உப்பை (Washing Soda-Sodium Bicarbonate) 10-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கரைத்துத் தடவலாம் கொப்புளம் உண்டாகிவிட்டால்:—

(5) கார்பாலிக் காவிட் (Acid Carbolie) டிராம் $\frac{1}{2}$
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 2

ஒன்று சேர்த்து, கொப்புளங்களை நன்றாகக் கழுவி விட்டு, பின்னர் கத்திரிக்கோலால் கொப்புளங்களை வெட்டி தோலை நீக்கி, அந்தப் புண்ணின்மேல்:—

பிம்மத் சப்ஸைட்ரஸ் (Bismuth Subnitras) இதைத் தூற்றி பஞ்சுவைத்துக் கட்டிவரலாம்.

கொப்புளம் வெடித்துப் புண்ணாகிவிட்டால்:—

(6) தேங்காயெண்ணெயும், சுண்ணாம்புத்தெளிவு நீரையும் சமமாய்க் கலந்து ஒரு துணியில் ஈனைத்து புண்ணின் மேல் போட்டு வரலாம்..

(7) கார்பாலிக் காவிட் (Acid Carbolie) டிராம் 1
தேங்காயெண்ணெய் (Coconut Oil) அவுன்ஸ் $1\frac{1}{2}$

ஒன்றுசேர்த்துத், துணியில்ஈனைத்துப்புண்ணின்மேல்போட்டுவரலாம்.

தூக்கத்தில் பயந்தெழுதல்—Parvo Nocturnus—Night Terrors

குழந்தைகள் நித்திரைசெய்யும்போது திடீரென்று வெருண்டெழுந்து பயத்துடன் சுற்றி சுற்றி பார்க்கும். இது குழந்தைகளுக்கு இரண்டாவது பல்முளைக்கும்போது சாதாரணமாய் ஏற்படுவதன்மே. இது ஒன்று விட்டொருநாள் ஏற்படும். சற்றுவிவரம் தெரிந்தகுழந்தைகள் ஊக்கத்தில் பயந்தெழும்.

குழந்தைகள் கனவு காண்பதினாலாவது, தன்னையறியாமல் மூத்திரம் பெய்துக்கொள்வதினாலாவது, பகல் முழுவதும் ஓயாமல் கடினமான விளையாட்டுகள் விளையாடுவதினாலாவது, ஊக்கத்தில் பயந்தெழுந்திருக்கலாம். மேலும், நரம்புபலயினமுள்ள குழந்தைகளுக்கும், மூக்கில் சதை வளர்ந்திருத்தல், மலசிக்கல், அஜீரணம் முதலிய கோளாறுகளுள்ள குழந்தைகளுக்கும் இது உண்டாகலாம் கிருமிகள் விசேஷித்திருப்பதினாலும் குழந்தைகள் ஊக்கத்தில் பயந்தெழும்.

சிகிச்சை

மலசிக்கலினால் பயந்தெழுந்தால்:—

(1) இலகுவிரோசனகாரிகளைக் கொடுத்து மலச்சிக்கலை நீக்கவேண்டியது. கிருமிகளினால் பயந்தெழுந்தால்:—

(2) கிருமிகளுக்குண்டான இகிச்சைகளைச் செய்து வரவேண்டியது.

அஜீரணத்தால் பயந்தெழுந்தால்.—

(3) பல்விஸ் ரூபார்ப் (Pulvis Rhubarb)	கிரான்ஸ்	9
சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb)	"	5

ஒன்று சேர்த்து 3-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஆகாரத்திற்குப் பின் ஒருபாகத்தைத் தேனில் கொடுத்து வரலாம்.

(பொது மருந்துகள்.)

(4) அமோனியம் புரோமைட் (Ammonium Bromide)	கிரான்ஸ்	15
வைனம் அன்டிமோனியாலிஸ் (Vinum Antimonialis)	துளி	15
சிரப் ஆரன்டி (Syrup Auranti)	அவுன்ஸ்	1
ஆக்குவா மெந்தா பிப் (Aqua Mentha Pip)	"	1

ஒன்றுசேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு இரவு படுக்கைக்குப்போகுமுன் ஒரு தேக்கரண்டிவீதம் கொடுத்து வரலாம்.

தூக்கத்தில் மூத்திரம் பெய்தல்—Enuresis Nocturna

இது குழந்தைகளுக்குச் சகஜமாக வேற்படக்கூடியதொன்று. குழந்தைகளுக்கு 3-வயதாரம்பத்திலிருந்தே மலமூத்திரத்தை யடக்கிக்கொள்ளும் தத்துவம் ஏற்பட்டுவிடுகிறது.

நரம்பு பலவீனமுள்ள குழந்தைகள் நித்திரையில் மூத்திரத்தைமுழுவதும், அல்லது அரைகுறையாய் நிறுத்த சக்தியற்றுப் போய்விடுகிறது. குழந்தைகள் இரவில் நித்திரையைவிட்டு எழுந்துபோய் மூத்திரம்பெய்வதற்குப்பயந்தோ, அல்லது களைவுகண்டு வெளியில்போய் மூத்திரம் பெய்வதாக கருதியோ, முற்றிலும் தன்னை யறியாமலோ மூத்திரம் பெய்து விடலாம். சில குழந்தைகளுக்கு இருமும்போதெல்லாம் மூத்திரம் கசிவதுமுண்டு. தன்னை யறியாமல் மூத்திரம்பெய்யும் செய்கையானது குழந்தைகளுக்குச் சாதாரணமாக மூன்று அல்லது நான்குவயதிலிருந்து பதினாறு, பதினாறுவயது வரையிலிருப்பதுண்டு.

அதிக பலவீனம், நிரிழிவு, வாதம், காக்கைவலிப்பு, மூளையதிர்ச்சி (Concussion of the Brain) சித்தப்பிரமை (Acromania) குண்டிக்காய் வீக்கம், நீர்தாரையில் சதை வளர்ந்திருத்தல், நீர்ப்பை வீக்கம் (Cystitis) அளவிற்குதிசமாய் தண்ணீர் குடிப்பது, அதிக புளிப்பான வஸ்துக்களைத்தின்பது, கிரைப்ப்ச்சிதிகரிப்பு முதலிய காரணங்களினால் குழந்தைகள் நித்திரையில் மூத்திரம் பெய்யலாம்.

சிகிச்சை

(1) பொர்ட்டாஷியம் புரோமைட் (Potassium Bromide)	கிரான்ஸ்	71
■ டிகுஞ்சர் பெல்லடோனா (Tincture Belladonnae)	டிராம்	5

* விஷமானது ஜாக்ரதையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

சிரப் சிம்பிள் (Syrup Simple)

ஆக்குவா புளோரிஸ் ஆரண்டி (Aqua Florias Auranti) அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து, 6-முதல் 10-வயதுக் குழந்தைகளுக்குச், சாயந்திரம் ஒரு தேக்காண்டி. வீதமும், இரவு படுக்கைக்குப் போகுமுன் ஒரு தேக்காண்டி வீதமும் கொடுத்து வரலாம்.

(2) ஆவிட் பென்சாயிக் (Acid Benzoic) கிரான்ஸ் 8

காம்பர் (Camphor) „ 4

■ எக்ஸ்ராக்ட் பெல்லடோனா (Extract Belladonnae) „ 1

ஒன்று சேர்த்து 4-மாத் திரையாகச் செய்துகொண்டு, 3-முதல் 6-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு இரவு படுக்கைக்குப் போகுமுன் ஒரு மாத் திரை வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

தூக்கமின்மை—Insomnia

தூக்கம் வராதிருப்பது மூளைகோளாறுகளி் லொன்றாகும். அப்பேர்ப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மயக்கம் தரும்படியான அபின்பேரீன்ற மருந்தும், அபின் சாராயம் கலந்த மருந்துகளும் ஒருபோதும் கொடுக்கக்கூடாது. இராக்காலங்களில் காப்பி தேயிலை பானங்களை கொடுத்தாலும் தூக்கம் வராது. மலச்சிக்கலினாலும் தூக்கம் வருவது கஷ்டமாகும். தலையை அதிகவுயரமாக வைத்திருந்தாலும் கிருமிகள் மிகுந்திருந்தாலும் தூக்கம் வராது.

குழந்தைகளுக்கு தூக்கம் வராவிட்டால் தாற்குட்படியான வெந்நீரில் ஸ்நானம் செய்வீத்துச் கூடகூட கொஞ்சம் பசும்பால் கொடுக்கலாம். ஹாட்வாட்டர் பாட்டிலி (Hot Water Bottle)ல் சுடுதண்ணீர்விட்டு பாதங்களில் வைத்து வரலாம். அதிகமான காற்றுப்படுப்படி விசிறியால் விசறலாம். வினக்கு வெளிச்சத்தால் தூக்கம் வராமலிருக்குமானால் வினக்கைநிறுத்தி விடலாம். தலையைச் சற்று தாழ்வாக வைக்கலாம். தடவித் கொடுத்தும் தாலாட்டியும் தூக்கச் செய்யலாம்;

தேனிக்கடி :—

குளவிக் கொட்டு வென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

தொங்கல் :—

குழந்தைகள் மேய ஆரம்பிக்கும்போது தனாயில் கிடப்பவைகளை எடுத்து தின்றுவிடும். மெல்லிய காகிதங்கள் வெற்றிலை முதலியவைகள் குடலில் தங்கிக்கொண்டு வயிற்றோட்டமேற்படும்; வயிறுபொருமி மடமட வென்ற சப்தத்துடன் வயிறு கழியும்; வயிற்றிவலியும் சற்று யிருக்கும். இது இப்படியே தங்கிவிடுமானால் அந்தவிடம் புண்பட்டு ஆபத்தை விளைவிக்கும்.

■ விஷமானது ஜாக்கிரதையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

சிகிச்சை -

ஆவரங்கொழுந்து ரூபாயெடை	1 வசம்பு	ரூபாயெடை	3
செம்மண்	1 ஒமம்	1	1½
வெள்ளாட்டுப்பிழுகை	1 வெந்தயம்	1	1½

முதல் 4-சரக்கையும் சட்டியில் போட்டு நெருப்புப்பற்ற வறுத்து பின் ஒமம் வெந்தயத்தையும்சேர்த்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீர்விட்டு3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் ½, 1-தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

தொண்டைப் புணைச்சல் :-

குத்திரும் லென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

தொண்டைப் புண்:-Cynanche—Sore Throat

இது சாதாரண தொண்டை வீக்கத்துடன் உண்டாகும் ஒரு வியாதி தொண்டை இருபுறமும் சிவந்து வீங்கி ஒன்றையும் விழுங்கிவிடாமல் செய்துவீடும். தொண்டைக்குள் கட்டிகள் போன்று இளம்பி யிருக்கும். தொண்டையில் வெளுரின மஞ்சள் நிறமான புள்ளிகள் காணப்படும். தொண்டைப்புண் ரோகத்தில் சுரம் 103, 104-டிகிரி திரோகோஷ்டணம் வரை யேற்படலாம். சில சமயங்களில் இது மாந்தரோகத்தை ஒத்ததாகவே இருக்கும்.

இவைகள் நுண்ணிய தொத்துவியாதி இருபுகளினால் யேற்படலாம். மிகுதியான குளிரினாலும், சுகாதாரக் குறைவான விடங்களிலும், சுற்றிலும் சாக்கடைகள் இருக்கும்படியான இடங்களிலும், வசிப்பதினாலும், இவ் வியாதி சம்பவிக்கலாம். இவ்வியாதியினால் குழந்தைகளுக்கு வாதம் வந்து சேருமாதலால் எச்சரிக்கையுடன் சிகிச்சை செய்யவேண்டிய தவசியமாகும்.

சிகிச்சை

(1) கோரோசனை	ரூபாயெடை 1	சுல்திரபேதி	ரூபாயெடை 1
கோஷ்டம்	1	அதிமதுரம்	1
ஏலம்	1	கிராம்பு	1
செண்பகப்பு	1	மாசிகாய்	1

ஒன்று சேர்த்து, மாசிப்பத்திரிச் சாற்றால் இரண்டுமணி நேரமும், கருந்தளசிச்சாற்றால் இரண்டுமணி நேரமும், வெட்டிவேர் கஷாயத்தில் இரண்டு மணிநேரமும், விலாமிச்சை வேர் கஷாயத்தால் இரண்டுமணி நேரமும் அரைத்த; குன்றிமணி யவ்வளவு பெரிய மாத்திரைகள் செய்து உலர்த்திக் கொண்டு, மாசிப்பத்திரி கஷாயத்தில் காலை மாலை ஒரு மாத்திரை வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) டிஞ்சா அக்கோனைட் (Tincture Aconite)	துளி	2
லைக்கர் அமோனியம் சிட்ரேட் (Liquor Ammonium Citrate)	டிராம்	1½

சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti)	1
ஆக்குவா டிஸ்டில் (Aqua Distilled)	அவுன்ஸ் 1½

ஒன்று சேர்த்து, தொண்டைப்புண் ஆரம்பத்தில் 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 3-மணி ரேத்திற்கொரு தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(3) பொட்டாஷியம் குளோரைஸ் (Potassium Chloras) கிரான்ஸ்	30
டெக்காக்டஷன் ஆல்தா (Decoction 'Althae)	அவுன்ஸ் 6

ஒன்றுசேர்த்து நான் ஒன்றுக்கு 5, 6-தடவை விழுங்கிவிடாமல் வாய் கொப்புளிக்கச் செய்து வரலாம்.

(4) ஐயோடின் (Iodine)	கிரான்ஸ் 3
பொட்டாஷியம் ஐயோடைட் (Potassium Iodide)	30
கிளிசரின் (Glycerine)	அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்த்துத் தொண்டைவீக்கம் அதிகமாயிருக்கும் சமயம் தொண்டைக்குள் பூசலாம்.

(5) ஆவரிட் டானிக் (Acid Tannic)	டிராம் 2
கிளிசரின் (Glycerine)	6

ஒன்று சேர்த்துத் தொண்டையில் புண்ணிருந்தால் புண்ணின்மேல் தடவி வரலாம்.

தொண்டைப்புற்று—Suppurative Tonsillitis

இதையும் தொண்டைப்புண் வியாதிதான் என்றுலும், தொண்டை அதிகமான புண்பட்ட நிலைமைக்கு இந்தப்பெயர் குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்தரோகத்திற்கும் மாந்தரோகத்திற்கும் அதிகமான வித்தியாசங்க ளிருப்பதில்லை.

தொண்டையின் இருபக்கங்களிலும், கொப்புளங்கள் உண்டாகி வெடித்து, சிழிப்பிடித்து மெல்லிய தொண்டையின் பாகங்களையும் தாக்கி, அதிகமான வலிவேதனை, தொண்டைக்கம்மல், தொண்டைக் கமரல், தலைவலி, முதுகுவலி, இடுப்பு வலி முதலியவைகளை யுண்டாக்கிவிடுகிறது. நாவில் மரவுபடிந்து, வாய் நிணநாற்றமா யிருக்கும்; காய்ச்சல் 104, 105-டிகிரி வரையிலுமிருக்கும்; இதற்குப்பால், கஞ்சி முதலிய ஜலரூபமான ஆகாரங்களைத்தான் கொடுக்கவேண்டும்.

சிகிச்சை

தொண்டைப்புண்ணுக் குண்டான சிகிச்சைகளையும் மாந்தப் பொது சிகிச்சைகளையும் செய்துவரலாம்.

நகைக்கு வீங்கி:—

அம்மைக்கட்டென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

நாக்குப்பூச்சி:—

இரைப்பூச்சி யென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

நாய்க் கடி—Dog Bites

சாதாரணமான நாய்கடிப்பதே ரோகத்தை யுண்டிபண்ணும் விஷத்தன்மை யுள்ளதாகும். அதிலும் வெறி நாய் கடித்தால் கொடிய தீங்கை விளைவிக்கும். நாய் கடித்தவர்களுக்கு சில ஆண்டுகளுக்குப்பின்னர், ஒருவித வெறியுண்டாகும். இதற்கு வெறிநாய் கடிரோகம் (Hydrophobia) என்று சொல்லப்படும். இதில் வாயிலிருந்து ஹரைத்தள்ளுதல், நாயைப் போன்று உறுமுதல், அடிக்கடி கக்கலேற்படல் முதலிய வெறிநாயின் குணங்களெல்லாமுண்டாகும். வெறியில்லாத நாய்கடித்தாலும் கெடுதல் உண்டாகாமலிருப்பதில்லை ஆதலால் நாய்கடித்தவுடன் கடிவாயிக் குமேல் கயிற்றால் இருக்கிக்கட்டிவிட்டு அப்பொழுதே சிகிச்சை செய்ய வேண்டுமென்பது மிகவும் அவசியமானதாகும். மேலும் உடனே வீரசனகாரிகளையும் கொடுக்கவேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) சுத்தமான கத்தியினால் கடிவாயைச் சற்றுப்பெருக்கி சுடுதண்ணீரும் கடியையும் சமனாகக் கலந்து கடிவாயைக் கழுவலாம்.
- (2) எருக்கம்பேரை எருக்கம்பால் விட்டரைத்து, 3-நாள்களுக்கு கடிவாயில் வைத்துக் கட்டி வரலாம்.
- (3) நாய் கடித்தவுடன் கார்பாலிக் ஆலிப்டை (Acid Carbolic) கடிவாயில் 2, 3-துளி விட்டு வேகச்செய்து, பின்னர் போரிக் காலிடை (Boric Acid) தூற்றி புண்ணை யாற்றிவரலாம்.

நித்திரையில் மூத்திரம் பெய்தல்:—

னக்கத்தில் மூத்திரம் பெய்தவென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

நீரடக்க முடியாதுபோதல்:—

னக்கத்தில் மூத்திரம் பெய்தவென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

நீரடைப்பு:—

கடுப்போடு நீரிதங்க வென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

நீர் கடுப்பு:—

கடுப்போடு நீரிதங்க வென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

நீர் கலங்கலா யிறங்குதல்—Bacilluria

இது குழந்தைகளுக்கு அதிகமாயேற்படக்கூடியதோர் வியாதியல்ல. இது விசேஷமாகப் பெண்குழந்தைகளுக்கே யதிகம்சம்பவிக்கலாம். குழந்தை கள்குகதேகியாக விருக்கும்போதே முன்னறி குறிகளின் நி இது உண்டா

கும். நீர் கலங்கலாயிறங்கும் இவ்வியாதி, தொத்துரோகக் கிருமிகள் மூத் திரப் பையில் (Bladder) போய்ச் சேருவதினாலேயே யுண்டாகலாம்.

மூத்திரத்தில் உப்பு சத்து அதிகரித்து, மூத்திரம் சற்று கருநிறமாகக் கலங்கி, நிண நூற்றத்துடனிறங்கும்; சில சமயம் சிறுநீருடன் சீழ் கலந்து அழுகிய மாமிச அணுக்கள்போன்று கலங்கலாபு மிறங்குவதுண்டு. இது மூத்திரப்பை வீக்கத்தினாலிருக்குமானால், மூத்திரம் அடிக்கடியும் வலியுடனு மிறங்கும். ஆரம்பத்திலேயே நீர்க்கலங்கல் வியாதியாக விருக்குமானால், நோயின் குறி தீவிரமாகப் பரவும்; காய்ச்சல் 103, 104- டிகிரிவரை ஏறும் சில சமயங்களில் சன்னி யேற்படுவது முண்டு. உட்பக்க அரையில் மிகுதியும் வலியுண்டாகும். பெண் குழந்தை களின் மலவாயிலுள்ள கிரைப்பூச்சிகள் நித்திரையின்போது, யோனி வழியாய் உட்சென்று நீர்ப்பையில்போய்ச் சேருவதினால் இந்த ரோகம் பெண் குழந்தைகளுக்கு அதிகமா யேற்படக் காரணமா யிருக்கிறது.

சிகிச்சை

(1)	ஆவாரம்பூ	ரூபாயெடை 1	செல்லிவற்றல்	ரூபாயெடை 1
	ஆவாரம்பேர்	1	மருதம்பட்டை	1
	ஆவாரம்பட்டை	1	நாவற்பட்டை	1
	கோரைக்கிழங்கு	1	கடலழிஞ்சுப்பட்டை	1
	கடுக்காய்	1	கட்டுக்கொடி	1
	தான்றிக்காய்	1	போஸ்தத்தக்காய்	1

ஒன்றுசேர்த்துத் தூள் செய்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் பேரட்டு 8-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் காலை மாலை $\frac{1}{2}$, 1-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) வெண்ணாவற்கொட்டை ரூபாயெடை 5, இதை ஆடுதீண்டாப்பாலை யிலுச் சாறுவிட்டு மைபோலரைத்துச் சுண்டக்காய்வவளவு பெரிய மாத்திரைகள் செய்து உலர்த்திக்கொண்டு ஆவாரம்பட்டை கஷாயத் திலாவது, செல்லிவற்றல் கஷாயத்திலாவது காலை மாலை ஒரு மாத் திரை வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(3)	ஆலிட் போரிக் (Acid Boric)	கிரான்ஸ்	■
	யூரோ டிரோபைன் (Uro Drophyn)	5	
	இன்பியூஷன் பக்கு (Infusion Buchu)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(4) பொட்டாஷியம் சிட்ரேட் (Potassium Citrate) கிரான்ஸ் 20

இதை 4-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற் கொருதரம் $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கரைத்துக் கொடுத்து வரலாம்.

நெஞ்சில் சுபம்சட்டி திட்டுமுட்டித்தல்:—

நெஞ்சுத்தடிம னென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

நெஞ்சுத்தடிமன்—Acute Bronchitis

நுரையீரல், சிறுகாற்றுக்குழல் இவைகளில் வீக்கம் கண்டு சளிபிடித்துக் கொள்வதினாலேயே நெஞ்சுத்தடிமன் யேற்படுகிறது. இது சாதாரண நாசித் தடுமணிலிருந்து வித்தியாசப்படுகிறது. நாசித்தடுமன் மூச்சு விடப்படும் நாளங்களில் உண்டாகும் கோளாறுகளில் ஏற்படுவதாகும். நெஞ்சுக்கு மேல் வலிண்டு கோழையிருப்பதாகத் தெரிந்தால் நெஞ்சுத்தடிமன் (Cold in the chest) என்று சொல்லுவர். சுவாச நாளங்களில் சளி சேர்ந்துக்கொள்ளுவதற்கு சிசுக்களின் தேகம் பிரகிருத்தி வாய்ந்ததா யிருப்பதினால், குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி சளிபிடித்துக் கொள்ளுகிறது.

குளிர்காற்று அதிகமாகத் தாக்குவதினாலும், ஈரத்தில் கடமாடுவதினாலும், சீதோஷண ஸ்திதி விகல்ப்படுவதினாலும், குழந்தைகளுக்குச் சரியான விதமாகத் துணிகள் போர்த்தாததினாலும், அதிகமான ஊசிச்சுவாசிப்பதினாலும், கக்கு இருமல்; அம்மை இவைகளாலும், தோஷ ரோகத்தினாலும் குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி தடிமன் பிடித்துக் கொள்ளுகின்றன.

நெஞ்சுத்தடிமன் சாதாரணமாக நாசியில் தண்ணீர்வடிவதே முதல் அறி குறியாகக்கொண்டு தலைவலி, காய்ச்சல், இருமல் முதலியவைகளும் உண்டாகும். நெஞ்சில் கட்டைபோட்டது போன்ற உணர்ச்சியும், சுவாசம் விடுவதற்குக் கஷ்டமேற்படும். சுவாசம் விடுப்போது ஊது சப்த முண்டாகும் ஆரம்பத்தில் வரட்சி இருமலாகவிரிந்து வரவா சளியும் பின் மஞ்சள் நிறமான கட்டிசளியும் வரும். நாடி தீவிரமாக விருக்கும். மூத்திரம் மஞ்சளாகத் தோன்றும். நாவு மாப்படிந்து நெற்றியிலும், கண்களிலும் வலியுண்டாகும். மற்றபடியாக காய்ச்சலுக் குண்டான குணங்களு மிருக்கும்.

நெஞ்சுத்தடிமனில் அசாதாரண குறிகளாவன:—உடம்பு வியர்த்துச் சர்ம மெல்லாம் சில்லிட்டிருந்தாலும், கண்ணமும் உதமும் வெளுத்து வாடி காணப்பட்டாலும், அரைக்குங் கீழ் குளிர்த்திருந்தாலும், குறுமூச்சு விடப்பட்டாலும், சுவாசிக்கும்போது மூக்கு அகண்டு சுருங்கினாலும், மயக்கம் உண்டானாலும், கவலைக்கிடமானதாகும். அன்றியும், தொண்டையின் சளி யடைத்து வெளியேற்ற முடியாமல் கொம்பிட்டாலும், திரேக உணர்ச்சி யற்றிருந்தாலும், ஒவ்வொரு சுவாசத்திற்கு பின்னும் வலிப்பும், மயக்கமும் கண்டாலும், முழுசம்பிக்கையற்றதாகும்.

சிகிக்கை

- (1) ஊதுவேளையிலே ரூபாயெடை 2 ஆடாதோடையிலே ரூபாயெடை 2
கண்டல்கத்திரிலே " 2 சிற்றாத்தை " 2

ஒன்று சேர்த்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் $\frac{1}{2}$, 1-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) கோரோசனை மாத்திரை; அப்ரகக் கோரோசனை மாத்திரை இவைகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

3) டார்டர் எமட்டிக் (Tartar Emetic)	கிரைன்ஸ்	1
வைனம் இப்பிக்காக் (Vinum Ipecac)	அவுன்ஸ்	$\frac{1}{2}$
சிரப் சிம்பின் (Syrup Simple)	,,	1
தண்ணீர்	,,	6

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு வார்தியுண்டாகு மட்டும் $\frac{1}{4}$ -மணி நேரத்திற் கொருமுறை 2-தேக்கரண்டியளவு கொடுத்து வார்தியானபின் 3-மணி நேரத்திற் கொருமுறை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(4) அமோனியம் கார்போனஸ் (Ammonium Carbonas) கிரைன்ஸ்	24
பொட்டாஷியம் பைகார்போனஸ் (Potassium bicar- bonas)	டிராம் 2
எக்ஸ்டிராக்ட் கினிசரிஸா லிக்ஞட் (Extract Glycyrrhiza Liquid)	,, 4
தண்ணீர்	அவுன்ஸ் 8

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத் திற் கொருமுறை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

இருமலதிக மிருந்தால் :—

(5) டிஞ்சர் காம்பர் (Tincture camphor)	துளி	18
வைனம் இப்பிக்காக் (Vinum Ipecac)	,,	18
பொட்டாஷியம் கார்போனேட் (Potassium Carbonate)	கிரைன்ஸ்	2
ஆக்குவா அனிஸி (Aqua Anisi)	டிராம்	■

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(6) டர்பென்டைன் (Turpentine)	டிராம்	1
இயூகலிப்டஸ் ஆயில் (Oil Eucalyptus)	,,	1

ஒன்று சேர்த்து வெளிப்பிரயோகமாக, நெஞ்சு தொண்டைக்குழி, நடு மூதுகு, இவைகளில் தேய்க்கலாம்.

(7) அன்டிபிளாஜெஸ்டைன் (Antiphlogistine) இதைத் துணியில் கன மாய்த் தடவி நடுமூதுகிலும், நெஞ்சின்பேரிலும் போடலாம்.

நெருப்புச் சுட்டப்படுண் :—

தீப்பட்ட புண்ணென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

நெல்வால் பூச்சி:—

கிரைப் பூச்சியென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

பல் முளைக்கும்போதுண்டாகும் கோளாறுகள்—Disorders in Dentition

இரத்தக் குறைவான வியாதிகளிலும், தோஷ வியாதிகளிலும், கிரந்தி ரோகங்களிலும் கஷ்டப்பட்ட குழந்தைகளுக்குப், பற்களின் வளர்ச்சி ஈனப்படுவது தவிர, பல் முளைக்கும் காலங்களில் தொந்தரவு உண்டாகலாம்.

கிரமாதீத ஆகாரங்களினாலும், அருசியான ஆகாரங்களினாலும், அளவுக் கதிகமான ஆகாரங்களினாலும், ஜீவதாது பொருள் குறைந்திருப்பதி னாலும், பல் முளைக்கும்போது தொந்தரவுக ளேற்படலாம் மேலும், தாய் பால் தவிர்த்த வயதுக்கிணங்க, தகுதியான ஆதாரங்களைக் கொடுக்காததினாலும், இந்தக் கோளாறுகள் உண்டாகின்றன.

அநேகமாகக் குழந்தைகளுக்குப் பல் முளைக்கும் காலங்களில் யாதொரு உபத்திரவமும் உண்டாவதில்லை ஒரு சிறு குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே பல் முளைக்கும்போது சிந்தில விகற்பங்கள் ஏற்படலாம்; நொஞ்சத்தடி மன் சர்வாங்க வலி, கால்களை முறுக்குவது, தூக்கத்தில் எழுந்து ஓடுவது, இருந்தாப்போலிருந்து சுரம் காய்வது திரோகம் மிகுதியும் சூடாயிருப்பது, பல்வீறுகள் வீக்கம், அளவுக்கதிகமான எச்சில் பெருக்கு, ஜீரண கருவிகள் பலயீனமும், அதனால் வயிற்றோட்டம் அல்லது, மலச்சிக்கலும், வலிப்புகளும், நரம்பு பிடித்தங்களும், வார்தி முதலிய யேதாவதொன்றோ அல்லது பல சேர்ந்தாகிவ மிருக்கும். சில குழந்தைகள் பல் முளைக்கும் கோளாறுகளினால் உயிரிழப்பது முண்டு பல் முளைக்கும்போதுண்டாகும் கோளாறுகளுக்குச் சொல்லிய தனிப்பட்ட சிகிச்சைகளைச் செய்யலாம்.

பல் முளைக்கும்போதுண்டாகும் இழுப்பு—Convulsions in Dentition

இதைப்பற்றி 88-வது பக்கம் விரிவாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

சிகிச்சை

- (1) சுவர்ணகோரோசனை மாத்திரை; கோரோசனை மாத்திரை இவைகளி லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.
- (2) அமோனியம் புரோமைட் (Ammonium Bromide) கிரைன்ஸ் 30
ஸ்பிரிட் ஈதர் நைட்ரோஸி (Spirit Aether Nitrosi) டிராம் 1
குளோரல் ஐட்ரஸ் (Chloral Hydras) கிரைன்ஸ் 24
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Aurandi) டிராம் 2
ஆக்குவா குளோரோபாரம் (Aqua Chloroform) அவன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து, ஒருமணி நேரத்திற்கொரு தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

பல் முளைக்கும்போதுண்டாகும் சகல வலிகளுக்கும்—Painful Dentition

சிகிச்சை

(1) காலோமல் (Calomel)	கிரான்	1½
எனோனியி (Enonymi)	"	1½
சாக்கரின் ஆல்பினம் (Saccharine Albinum)	"	1½

ஒன்று சேர்த்து, 1-வயதுக் குழந்தைகளுக்குச் சாயத்திரவேளைகளில் மட்டும் தேனில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) குளோரல் ஐட்ரஸ் (Chloral Hydras)	கிரான்ஸ்	■
பொட்டாஷியம் புரோமைட் (potassium Bromide)	"	6
ஆக்குவா லயரோவிராவி (Aqua Laurocerasi)	துளி	45
ஆக்குவா டிஸ்டில் (Aqua Distilled)	டிராம்	■

ஒன்றுசேர்த்து, ஒருவயதுக்குழந்தைகளுக்கு, நேரம் மட்டுப்படும் வரை, ஒருநாளக்கு மூன்றுவேளை ஒரு தேக்காண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

(3) ஐட்ராஜரி கம் கிரீட்டா (Hydrargeri Cum Creta)	கிரான்ஸ்	10
சோடியம் பைகார்போனேட் (Sodium Bicarbonate)	"	10
பொட்டாஷியம் புரோமைட் (potassium Bromide)	"	10

ஒன்று சேர்த்து 1½-முதல் 1-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு, 3-கிரான்ஸும்; 1-முதல் 1½-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 5-கிரான்ஸும்; 1½-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 8-கிரான்ஸும் இரவில் படுக்கைக்குப் போகும்போது தேனில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

(4) கொக்கோயின் ஐட்ரோ குளோரைட் (Cocain Hydro chloride)	கிரான்ஸ்	1½
டிஞ்சர் கோனி (Tincture Conii)	டிராம்	1
கிளிசரின் (Glycerine)	"	2

ஒன்று சேர்த்து பல்லீறில் தேய்த்து வந்தால், பல் முளைக்கும்போதுண்டாகும் பல்லீறு வீக்கம், வலி முதலியவைகளைப் போக்கி, பல்லீறுகளை மிருதுவாக்கி வலியின்றி பல் வெளிப்படும்படி செய்யும்.

பல் முளைக்கும்போதுண்டாகும் சளி—Coryza in Dentition

சில குழந்தைகளுக்குப் பல் முளைக்குபோது தண்டாகும் இதரக் கோளாறுகளைப்போன்றே சளிபும் பிடித்து உபத்திரவிக்கும். இலேசான இருமலிருக்கும்; மூக்கிலிருந்து சதா தண்ணீர் வடிந்துகொண்டேயிருக்கும்; சில சமயம் தும்மலேற்படும்.

சிகிச்சை

ஆமோனியம் கார்போனஸ் (Ammonium Car-
bonas)

கிரைன்ஸ் 12

வைனம் இப்பிக்காக் (Vinum Ipecac)

டிராம் 1½

கிளிசரின் (Glycerine)

,, 4

ஆக்குவா கருய் (Aqua Carui)

அவுன்ஸ் 1½

ஒன்று சேர்த்து நான் ஒன்றுக்கு 3-தடவை ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

பல்லரணை, பல்லீறில் இரத்தம் வடிதல்:—

ஈர்ப்புண் என்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

பல்வலி—Toothache—Odontalgia

பல்லீறு சிவந்து வீக்கி வலியாயிருக்கும்; பல்லுடன் பல் பட முடியாமல் மிகுந்த வேதனையுண்டாகும்; பல்வலியினால் தாடையும், காதோரமாகவும் வீக்கம் காணும்.

சிகிச்சை

(1) கற்பூரத்தை வலியுள்ளவிடத்தில் வைக்கலாம்.

(2) வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய்; கஷாயத் திரமாணிக்கக்கிருதம் இவைகளி
லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 5-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(3) காம்ப்ர் (camphor) டிராம் ½
பெப்பர்மின்ட் கிரிஸ்டல்ஸ் (peppermint crystals) ,, ½

ஒன்று சேர்த்து, அனலில் காட்ட உருகும்; அதை பஞ்சில் நனைத்து வலியுள்ள விடத்தில் வைக்கலாம்.

பற்சொத்தை—Odontiasis

பற்களைச் சூகசுமாய் வைத்துக்கொள்ளாத காரணத்தினாலேயே பல் வியாதிகளேற்படுகின்றன. தின்னும் ஆகாரம் பல்விடுக்குகளில் ஒட்டிக் கொண்டு, விஷயித்துக் கிருமிகளுண்டாகி, அந்தக் கிருமிகளின் விஷமுள்ள திராவம், பல்லின்மேலுள்ள பனபனப்பான வஸ்து (Enamel) வைக் கெடுத்துவிடுகிறது. பின்னர் அது பற்களைத் துளையிடவும் செய்து ஒட்டைகளை யுண்டாக்கிவிடுகிறது.

இந்தக் கிருமிகள் பல்லின் மத்தியிலுள்ள ஈரம்புகளையும், இரத்தக்குழல்களையும் தாக்கி குடையும், அப்போதுதான் பல்லில் வலியும், கூச்சமும் குடைவதைப்போன்ற கடுப்பு முண்டாகும்; குளிர்ந்த தண்ணீர் வாயில் பட்டவுடன், பற்கிருமிகள் பின்னும் நரம்புகளில் பிரவேசிப்பதால் சொல்லமுடியாத கூச்சமும், குடைச்சலு் மேற்படுகிறது.

சிகிச்சை

(1) 100-கண்டங்கத்திரிப் பழத்தை, கறுகிப்போகாமல், உயிக்காந்தலில் போட்டு வேகவைத்தெடுத்து, பாகலிலைச்சாறு விட்டு மைபோல வைத்து, 12-அவுன்ஸ் எல்லெண்ணெயில் கலக்கி, 3-நாள் கடுமையான வெய்யிலில் வைத்திருந்தெடுத்துப் பற்களில் பூசிவரலாம்.

(2) கிரியோசோட் (Creosote)	துளி	■
ஒலியம் கரியோபில்லம் (Oleum caryophyllum)	"	15
ஒலியம் கஜபுட்டி (Oleum Cajuputi)	"	38
டிஞ்சர் ஒபியம் (Tincture Opium)	"	38
குளோரோபாரம் (Chloroform)	"	5
ஆல்கோஹால் (Alcohol)	"	38

ஒன்று சேர்த்துப் பஞ்சில் நனைத்துச் சொத்தைப்பல்வின் மேல் வைத்திருக்கலாம்.

பற்பழு:—

பற்சொத்தை என்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

பாண்டு—Anaemia

இரத்தத்தில் சிவந்த இரத்தாணுக்கள் (Red Corpuscles) குறைந்து இந்த வியாதி யேற்படுகிறது. விசேஷமாக பாண்டு 12-வயது முதல் 20-வயது வரை இருக்கக்கூடியதோர் வியாதி. ஆண் குழந்தைகளேவிட பெண் குழந்தைகளுக்கு இந்நோய் அதிகமுண்டாகலாம். பெண் குழந்தைகள் சரியான வயதில் பக்குவமடையாமல் இந்த வியாதியால் பாதிக்கப்படுவார்களேயானால், அதைச் சூதகப்பாண்டு (Chlorosis) என்று சொல்லப்படும்.

பாண்டியென்ற இந்த இரத்தக்குறைவு ரோகம், விசேஷமாகத் திரந்த வெளி வியாபயங்கள் (Exercises) இல்லாததினாலும், ஆகாரத்தில் போதிய ஜீவசத்துப்பொருள் (Vitamines) கலந்திராததினாலும், கிரைப்பூச்சிக் எதிகரித்திருப்பதினாலும், கண்தோஷ நெரீய்களால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதினாலும், இந்தப் பாண்டுரோக மேற்படுகிறது. இது ஈயரோகத்திற்கும் வழிகாட்டியாக வந்தசேரலாம்.

இந்த இரத்தக் குறைவுரோகத்தில் சர்மம் வெளுத்திருக்கும்; நாக்கு, கண் உள்மடல்கள், பல்வீறுகள் இவைகள் வெளுத்திருக்கும்; பசிமந்தம், மலச்சிக்கல், தொண்டைப்புணைச்சல், வயிற்றோட்டம், கிறுகிறப்பு, குறுமூச்சு முதலியவைகளேற்படும்; இருதயத்தை துரிதமாயிருக்கும்; சப்தவேணுவை (Stethoscope) இருதயத்தின் பேரில் வைத்து உற்றுக்கேட்டால், இருதய நடையோடுகூட உரு - உருவென்ற சப்தம் கேட்கும்; கஷ்டமான வேலைகள் செய்தபின்னராயினும், வேகமாய்

நடந்த பின்னராயினும், மாடிப் படிகளிலேறி இறங்கியதனாலாயினும் திரேகம் விலவிலந்து, மயக்கமும் உண்டாகிவிடும். பொதுவாகப் பாண்டிரோக மூள்ளவர்கள் கஷீணித்துப்போய் ஒன்றும் செய்வதற்கு லாயக் கற்றவர்களாக விருப்பார்கள்.

சிகிச்சை

- (1) நாராயண மன்றே செந்தூரம்; திரிலோக செந்தூரம்; மன்றே செந்தூரம்; அயமெமுகு; அயக்கரந்த செந்தூரம்; ராஜசிந்தாதி லேகியம்; ராஜாங்க கொம்பரக்குத் தைலம்; குமரி சஞ்சீவித் தைலம் முதலியவைகளை உபயோகித்து வரலாம். செய்முறை 6-பாகம் பார்க்கவும்.

- (2) டிஞ்சர் பெர்ரி பெர்குளோரைட் ((Tincture Ferri Perchloride) துளி 15
 ■ லைக்கர் ஆர்சனிக்காலிஸ் (Liquor Arsenicalis) „ 2
 கிளிசரின் (Glycerine) „ 30
 தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து 12-முதல் 18-வயதுச் சிறுவர்களுக்கு நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஆகாரத்திற்கு பின்னர் 3, 3½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

மலம் கட்டியதோ டிருக்குமானால்:—

- (3) எக்ஸ்ட்ராக்ட் பெல்லடோனா வெர்டி (Extract Belladonnae Verdi) கிரான் 1
 வைனம் பெர்ரி (Vinum Ferri) அவுன்ஸ் 8
 கிளிசரின் (Glycerine) „ 1

ஒன்று சேர்த்து, 12-முதல் 13-வயதுச் சிறுவர்களுக்கு நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஆகாரத்திற்கு பின் 3, 3½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

தொண்டை புகைச்சலு மிருக்குமானால்:—

- (4) பொட்டாஷியம் பைகார்போனேட் (Potassium Bicarbonate) டிராம் 1
 பெர்ரி டார்ட்ரைட் (Ferri Tartarate) „ 1
 ஆல்கோஹால் (Alcohol 90 o/o) „ 2
 சிரப் சிம்பிள் (Syrup Simple) „ 4
 தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து 12-முதல் 18-வயதுச் சிறுவர்களுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை 3, 3½-தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

■ விஷமானது ஜாக்ரதையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

கிரைப்பூச்சியினு வேற்பட்டதாக விருந்தால்:—

- (5) பெர்ரி சல்பஸ் (Ferri Sulphus) கிரைன்ஸ் 12
 எக்ஸ்ட்ராக்ட் கிளிசரிசா விக்டுட் (Extract Glycyrrhizae
 Liquid) டிராம் 4
 டெக்ரக்ஷன் ஆலோஸ் கோ (Decoction Aloes Co) அவுன்ஸ் 8
 ஒன்று சேர்த்து 12-முதல் 18-வயதச் சிறுவர்களுக்கு நான் ஒன்றுக்கு
 3-வேளை 3, 8½-தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

வயிற்றோட்டத்துட னிருக்குமானால்:—

- (6) பெராட்டின் (Ferratin) கிரைன்ஸ் 4
 பல்விஸ் கிளிசரிசா (Pulvis Glycyrrhizae) ,, 45
 ஒன்று சேர்த்து 3-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு நான் ஒன்
 றுக்கு 3-வேளை ஆகாரத்திற்குப்பின் 12-முதல் 18-வயதச் சிறுவர்களுக்குக்
 கொடுத்து வரலாம்.

பாலெடுத்தல்:—

அடிக்கடி பாலெடுத்த வென்றத் தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

பால்குடியாமை:—

ஆகாரவெறுப்பு வென்றத் தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்

பித்தக்கோளாறுகள்—Biliousness

பித்தக்கோளாறுகள் கல்லீரல் (Liver) விசல்பத்தினுயேயே யுண்டாக
 லாம். கல்லீரல் வீக்கம் காணுவதாலோ, இதர கல்லீரல் கோளாறுகளி
 னாலோ, பித்தப்பையினுள்ள பித்தநீரானது வெளிப்பட்டுப் பித்த
 கோளாறுகளே யுண்டாக்குகின்றது. மேலும் கடினமான ஆகாரங்களி
 னால் பித்தநீர் வெளிப்பட்டுவிடுவதாலும் இது யேற்படலாம்.

பித்தநீர் அதிகரித்து உடலில் வியாபிக்குமேயானால், வாய் கசப்பு, ஆகார
 வெறுப்பு, கிறுகிறப்பு, தலைவலி, தலைமயக்கம், புத்திபேதமை, பிரண்ட
 பார்வை, அரோசிகம், வாந்தி, ஆகாரம் உட்கொண்டவுடன் வார்த்தியாதல்
 முதலியவைகளு மேற்படும். கண்கள்சிவந்து, உடல் மஞ்சளித்திருக்கும்
 வார்த்தியான வஸ்து மஞ்சள் நிறமாக வழுவழுப்பாக விருக்கும்.

சிகிச்சை

- (1) கெல்விவற்றல் ரூபாயெடை 3 ஏலம் ரூபாயெடை 3
 அதிமதுரம் ,, 3 வில்வவேர் ,, 3
 இஞ்சி ,, 3 சோகம் ,, 15

ஒன்று சேர்த்து ரூணித்துக் காலை மாலை 3-ரூபாயெடை அளவு பசு
 வெண்ணெயில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) மாதளம்பழச்சர்ப்பத்; ராஜவாதிச்ஞரணம்; ராஜவீல்வாதிஸெகியம்; மகா கூழ்பாண்டக்கிருதம்; கொடுத்துவரலாம். செய்முறை 6-பாகம் பார்க்கவும்.

(3) ஆலிட் ஹைட்ரோ ஐட்ரோகுளோரிக் டில் (Acid Nitro Hydrochloric Dil)	துளி	20
■ டிரூசர் நகஸ் வாமிகா (Tincture Nux vomica)	„	20
சிம்பிள் சிரப் (Syrup Simple)	டிராம்	1½
இன்பியூஷன் குவாஷியா (Infusion Quassiae)	அவுன்ஸ்	2

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ½-தேக்கரண்டியளவு கொஞ்சம் தண்ணீரில் கலந்து கொடுத்து வரலாம்.

புட்டாளம்மை:—

அம்மைக்கட் டென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

புலால் மேகம்:—

நீர் கலங்கலா யிறங்குதலென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

பூரான் கடி—Bites of Myriapoda (Genus Scolopendra)

பூரான் கடித்ததானால் உடம்பெல்லாம் நீண்ட தடிப்புகள் உண்டாகும்; தடிப்புகள் நீடித்திராமல் சிலமணி நேரங்களிலாவது, சில நாளையிலாவது மறைந்துபோகும்; பின்னர் அமாவாசை, பெளர்ணமி தினங்களில் தடிப்பு உண்டாகி, கொடிய கமச்சலைக் கொடுக்கும், செய்யான் கடித்ததானால், உடம்பில் தடிப்புகள் சுண்டும், வாய் வழியாக வெண்ணுரை தன்னியும், மயக்கமும், ஆபத்தைப் முண்டாக்கும்.

சிகிச்சை

- (1) குப்பைமேனி யிலையையும், உப்பையும் சமமாக வைத்து அரைத்துத் தடவலாம்.
- (2) புகையிலைக் கஷாயத்தைத் தடவலாம்.
- (3) லைக்கர் அமோனியா (Liquor Ammonia) டிராம்
ஒயின் (Wine) அல்லது தண்ணீர் அவுன்ஸ்

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயது குழந்தைகளுக்கு ½-மணி நேரத்திற் கொஞ்சரம் ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் உள்ளுக்கும் கொடுத்து மேலுக்கும் தடவலாம்.

பேதி யுண்டாக்க—To Make Purging

முன் பக்கங்களில் குழந்தைகளுக்கான “சுகபேதி” முறைகளைக் கூறினோம். ஆனால், குழந்தைகளுக்கு அவசர சமயங்களில் மலத்தை வெளியாக்கும் உபாயங்களை இதன் கீழ் கூறுகிறோம்.

■ விஷமானது ஜாக்ரதையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) காட்டாமணக் கிலேச்சாறு 2-தேக்கரண்டி கொடுக்கலாம்.
- (2) சிற்றாமணக்கெண்ணெய் தேக்கரண்டி ஒன்றும், முலைப்பால் தேக் கரண்டி இரண்டும், ஒன்று சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.
- (3) காலோமல் (Calomel) கிரைன்ஸ் ஒன்றை தேனில் குழைத்து, 1- முதல் 3-வயதக் குழந்தைகளுக்குக் கொடுத்து, அதன்மேல் ஒரு குன்றிமணி யளவு கோரோசினையை ஆரை அவுன்ஸ் வெற்றிலைச் சாற்றில் கரைத்துக் கொடுக்கலாம்.
- (4) துணி துவைக்கும் சோப்பை (Washing Soap) பெனிசல் மாதிரியாக நீளமாய் சீவி, ஆசனத்தில் கொஞ்சம் செலுத்தி யிருக்கலாம்.
- (5) இளவெநீரில் சோப்பைக் கரைத்து, ஆசன வாய்வழியாக நீரேற்றம் (Enema) செய்யலாம்.

பேதியை நிறுத்த—Stop Purging

குழந்தைகளுக்குச் சாதாரணமாய், மலம் கழிவதைவிட, மலம் அதிகமாக வும், அடிக்கடியும் எக்காரணத்தினாலாவது கழிதலைற்பட்டிருந்தால் உடனே கீழ்கண்ட மருந்து பிரயோகத்தினால் மலம் கழிவதை தடை செய்யலாம்.

சிகிச்சை

- | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|
| (1) மரமஞ்சள் | ருபாயெடை 3 | கிறாநாகப்பூ | ருபாயெடை 1 |
| கடுக்காய்ப்பூ | 3 | போஸ்தக்காய் | 1 |
| அதிவிடயம் | 3 | சடாமாஞ்சில் | 3 |

ஒன்று சேர்த்துத் தூள்செய்து 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 2, 3-மணிநேரம் ஊறியபின் வடிகட்டி 2, 3-தேக்கரண்டிவீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) ஓமத்திரீர் கொடுக்கலாம் செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

பேன்—Lice

பேன் ஒருவரிடமுள்ள வியாதியை ஒருவருக்குத் தொத்தும்படி செய்யக் கூடிய தொத்துரோகக் கிருமியினத்தில் சேர்ந்ததாகும். இரவில் நித்திரை செய்யும்போது, ஒருவரிடமிருந்து மற்றவர்களிடம் ஊர்ந்து சென்று வியாதியைப் பரப்புகிறது. விசேஷமாக விஷவாதசூரம் (Typhus Fever) பழஞ்சூரம் (Relapsing Fever) முதலிய விஷ மான தொத்து நோய்களை உண்டாக்கிவிடும்.

பேன் அதிகமானபின் அதன் உபத்திரவம் தாங்கமுடியாமலே ஜனங்கள் பேனை நாசம்செய்யக் கருதுகிறார்களே தவிர, பேனினால் உண்டாகும் கெடுதல்களை எண்ணி பேனை அழிப்பதற்காக ஒன்றும் பிரயத்தனப் படுவதில்லை. பேன் அதிகமான இரத்தத்தைக்குடித்தும், இரத்தத்தைக்

குடிக்கும்படியாக அடிக்கடி சர்மங்களை தன் விஷ அலகினால் குத்து வதினாலும், தலையில் பொடுகு, புண் முதலியவைகளு முண்டாகலாம். பேனை அழிக்க :—

- (1) பாதரசம் $\frac{1}{2}$ -ரூபாயெடை எடுத்து, ரூப்பைமேனிச் சாறுவிட்டு இரசம் தோன்றாதவரை அரைத்து, ரூப்பைமேனிச்சாற்றில் கலக்கி ஒரு குல்லாயின் உட்புறம் தடவி தலையில் கவிழ்த்துக்கொண்டிருக்க, 6-மணி நேரத்தில் பேன் செத்து விழுந்துவிடும்.
- (2) * அங்குவண்டம் ஐட்ரார்ஜரி அமோனியேட்டா (Unguentum Hydrargeri Ammoniatæ) இதைக் கொஞ்சமெடுத்து மயிர் கால் களில் தடவியிருந்து சாயந்திரம் சோப்பினால் (Soap) சுத்தமாக கழுவி விடவேண்டும்.

பொன்னி, பொன்னுக்கிவிங்கி :—

அம்மைக்கட்டுன்றத் தலைப்பிள்கீழ் பார்க்கவும்.

மச்சைமேசம் :—

நீர் கலங்கலர யிறங்குத லென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

மலச்சிக்கலின்றி வயிற்றுப்பிசம்—Flatulance Without Constipation

குழந்தைகளுக்கு மலச்சிக்க வில்லாதிருக்கும்போது கூட வயிறு பொருமி இருப்பதுண்டு. பால் குடிக்கும் குழந்தைகளுக்கென்றால், தாய் வாயு வுள்ள பதார்த்தங்களைத் தின்றிருக்கலாம். ஆகாரம் உட்கொள்ளும் குழந்தைகளாலால் குடவில் வாயு வதிகரித்ததினால் வயிறு பொருமி இரைச்சலிருக்கும்;

சிகிச்சை

- | | | | | | |
|-----|----------------|----------|---------------|----------|---------------|
| (1) | நுணுயிலை | ஒருபிடி | சுக்கு | ரூபாயெடை | $\frac{3}{4}$ |
| | வேப்பங்கொழுந்த | ” | மிளகு | ” | $\frac{3}{4}$ |
| | ஒமம் | ரூபாயெடை | $\frac{3}{4}$ | | |

முதலில் நுணுயிலையும், வேப்பங்கொழுந்தையும் சட்டியிவிட்டு வறுத்து சிவத்துவரும் சமயம் மற்றவைகளையும் போட்டு 6-அவுன்ஸ் தண்ணீர் விட்டு 1, 1½-அவுன்ஸாகச் சுண்டவைத்துக் கஷாயத்தில் $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் வீதம் 2, 3-தடவை கொடுக்கலாம்.

- (2) முருங்கையிலைச் சாற்றையும், உப்பையும், வசம்புக் கரியையும், ஒன்றாய் அரைத்துக் குழப்பி தொப்பினைச்சுற்றி பற்றுப்போடலாம்.

- | | | | |
|-----|--|---------|----|
| (3) | சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb) | இரைன்ஸ் | 8 |
| | ஸ்பிரிட் அமோனியம் அரோமாட்டிக் (Spirit Ammonium Aromatic) | தளி | 15 |
| | சிரப் சிம்பிள் (Syrup Simple) | ” | 40 |
| | ஆக்குவா அனிசி (Aqua Anisi) | அவுன்ஸ் | 1 |

* விஷமானது ஜாக்ரதையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

ஒன்றுசேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 3-மணி நேரத்திற் கொரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

- (4) மெக்னிஷியம் கார்போனேட் (Magnesium Carbonate) கிரைன்ஸ் 24
ஸ்பிரிட் அமோனியம் அரோமாட்டிக் (Spiri Aromatic) அரோமாட்டிக் 1
ஒலியம் அனிசி (Oleum Anisi) துளி 3
ஆக்குவர மெந்தாபிப் (Aqua Mentha pip) அவுன்ஸ் 1½

ஒன்றுசேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத்திற் கொரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வரலாம்.

மலச்சிக்கலும் வயிற்றுப்பிசமும்—Flatulence With Constipation

மலச்சிக்கலும் அத்துடன் வயிற்றுப்பொருமலு மிருக்குமானால், வயிறு ஊதி கல்போலிருக்கும்; குழந்தை சுவாசிக்கக் கஷ்டப்படும்.

சிகிச்சை

“மலச்சிக்கலின்றி வயிற்றுப்பிச” மென்ற தலைப்பின் கீழுள்ள மருந்துகளையும், மலம் சடுதியில் கழிய வேண்டுமானால், “பேதி யுண்டுபண்ண” வென்ற தலைப்பின் கீழுள்ள மருந்துகளையும் கொடுத்து வரலாம்.

- (1) கோரோசனை மாத்திரையை வெற்றிலைச்சாற்றில் கலந்து கொடுக்கலாம்.

- (2) பல்விஸ் ரீயை கோ (pulvis Rhei Co) கிரைன்ஸ் 3

இதை ஒரு அவுன்ஸ் சுடு தண்ணீரில் 1-முதல் 3-வயது குழந்தைகளுக்குக் கலந்து கொடுக்கலாம்.

குறிப்பு:—இம்மருந்து கொடுத்த 4-மணி நேரத்தில் மலம் கழிந்து சுக மேற்படாவிட்டால் மறுபடியும் கொடுக்கவும்.

- (3) காலோமல் (Calomel) கிரைன்ஸ் 2
சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb) ” 3
பல்விஸ் ரீயை ராடிக்ஸ் (pulvis Rhei Radix) ” 3
ஒலியம் அனிசி (Oleum Anisi) துளி 1

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரே தடவை யாகத் தேனில் கலந்துகொடுத்து மலம் வெளியானவுடன்:—

- பல்விஸ் ரீயை ராடிக்ஸ் (pulvis Rhei Radix) கிரைன்ஸ் 2
சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb) ” 6
ஒலியம் அனிசி (Oleum Anisi) துளி 1

ஒன்று சேர்த்து 6-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு 3-மணி நேரத்திற் கொரு தடவை ஒரு பாகத்தை தேனில் கலந்துக் கொடுத்து வரலாம்.

செய்முறை 6-ம் பக்கம் பார்க்கவும்.

மலச்சிக்கல்—Constipation

குழந்தைகளுக்கு ஆகார விகல்பத்தினால் அடிக்கடி மலச்சிக்க லேற்பட லாம். சிறுவயதிலிருந்தே, மாவு சம்பந்தப்பட்ட ஆகாரங்களையே அதிகமாய் உபயோகித்ததினாலேயாவது, பால் கொடுக்கும் தாய்மார் களின் ஆகாரக் கெடுதலா லாகிலும், அதிகமான உணவு, அதிக சொற்பமான உணவு, பக்குவப்படாத ஆகாரங்கள், அதிக கொழுப்புக் கலந்த ஆகாரம் இவைகளினாலேயாவது, சிறுகுடல், பெருங்குடல் வீக் கம், இரத்தக் குறைவு முதலிய கோளாறுகளினால் வாகிலும், மலச்சிக்க லுண்டாகலாம். மேலும் ஆகாரத்திற் கேற்ற தண்ணீர் குடியாததின லும், பசித்தாற்போதும், மேலும் மேலும் ஆகாரம் உட்கொள்ளுவதி னாலும், மலச்சிக்க லுண்டாகும்.

மலச்சிக்க லேற்பட்டால் காச்சல், தலைவலி, வயிற்று வலி, புளித்தேப்பம், நெஞ்செரிவு, ஆகாரவெறுப்பு, வயிற்றுப் பொருமல், அசதி முதலிய வைகளுண்டாகும். சில சமயங்களில் ஊக்கமின்மையும், வார்தியு மேற்படும்; நாவில் மாவு படிந்திருக்கும்.

சிகிச்சை

- (1) இரவில் படுக்கைக்குப் போகுமுன் ஒரு தேக்காண்டி சிற்றாமணக்கெண் ணையை நீடித்துக் கொடுத்து வரலாம்.
- (2) பேயன் வாகைழப்பழத்தைச் சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி சிற்றாமணக் கெண்ணெயில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு இரவு படுக்கைக்குப் போகு முன் ஒரு துண்டு வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

சிகிக்களுக்கு மலம் கட்டி யழுதால்:—

- (3) அநிமதுரம் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ வேப்பங்கொழுந்து ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ சர்க்கரை „ $\frac{1}{2}$ பசுநெய் „

ஒன்று சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து, $\frac{1}{2}$ -தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (4) மாக்னிஷியம் சல்பஸ் (Magnesium Sulphus) டிராம் 1
ஸ்பிரிட் ஈதர் ஐகட்ரோவரி (Spirit Aether Nitrosi) „ $\frac{1}{2}$
லைக்கர் மாக்னிஷியம் கார்போனஸ் (Liquor Magnesium Carbonas) அவுன்ஸ் 2
சிரப் டீலு (Syrup Tolu) டிராம் 2

ஒன்று சேர்த்து, 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 3-தடவை ஒரு தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

மலத்தை யடக்கச் சக்தியற்றுப் போதல்—Incontinence of Faecal

குழந்தைகளுக்கு மூன்றாண்டுமுடிய முன்னரே, மல மூத்திரத்தை யடக்கும் சக்தி ஏற்பட்டுவிடும். அதன் பின்னும் நித்திரையின்போதும், சாதாரண

சமயங்களிலும் மலம் தன்னை யறியாமலே கழியுமானால், அது நாரம்பு பலயினத்தாலிருக்கும்.

சிகிச்சை

- (1) ஒமத் தீநீர் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.
- (2) * டிஞ்சர் டீக்ஸ் வாயிகா (Tincture Nux Vomica) துளி 2
 ■ லைக்கர் ஆர்சனிக்கரலிஸ் (Liquor Arsenicalis) „ 3
 தண்ணீர் டிராம் 4

ஒன்று சேர்த்து, 3-முதல் 6-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஆகாரத்திற்குப் பின் ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (3) * டிஞ்சர் பெல்லடோனா (Tincture Belladonnae) துளி 15
 பொட்டாஷியம் புரோமைட் (Potassium Bromide) கிரான்ஸ் 9
 சிரப் சிம்பிள் (Syrup Simple) டிராம் 1
 தண்ணீர் „ 1

ஒன்று சேர்த்து வைத்துக்கொண்டு முதலில்:—

பல்விஸ் ரீயை கோ (Pulvis Rhei Co) கிரான்ஸ் ■

இதை 3-முதல் 6-வயதுக் குழந்தைகளுக்குத் தண்ணீரில் கரைத்துக் கொடுத்த ½-மணி நேரத்திற்குப்பின் மேல் செர்வீய மருத்தில் ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை கொடுத்து வரலாம்.

மார்க்ஸி:—

நெஞ்சத்தடிம னென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

மூக்கிலிருந்து இரத்தம் வடிதல்—Epistaxis

அடிபட்டதினாலும்; அதிகமான இருமல் உபத்திரவத்தினாலும், மூளை பலயினத்தினாலும், இரத்தம் நீற்றுப்போயிருப்பதினாலும், மூக்கின் நுண்ணிய சதைக்கோளங்கள் பலயினமடைந் திருப்பதினாலும், திடீரென்று மூக்கிலிருந்து இரத்தம்வடியவரம் அதிகமான இருமலினாலானால், இருமும்போதும் இரத்தம் வடியும். அடிக்கடி மூக்கிலிருந்து இரத்தம் வடியுமானால் மயக்கம், தலை பாரம் முதலியவைகளை மேற்படும்.

சிகிச்சை

- (1) காடியும் (Vinegar) தண்ணீரும் சமமாய்க் கலந்து துணியில் நனைத்து மூக்கின்மேல் போட்டு வைக்கலாம்.
- (2) ஆடாதோடையிலேச்சாறு அவுன்ஸ் 3½ நல்லவெல்லம் ரூபாயெடை ½ ஒன்றாய்க் கலந்து உன்னுக்கும் கொடுத்து, தலை உச்சியிலும் பற்றுப் போடலாம்.

■ விஷமானது; ஜாக்காதயாக உபயோகிக்க வேண்டும்.

இரத்தம் தடைபடாது வந்துகொண்டிருந்தால்:—

- | | | |
|--------------------|----------|---|
| (3) காடி (Vinegar) | டிபிராம் | 1 |
| தண்ணீர் | " | |
| சர்க்கரை | " | 1 |
- ஒன்று சேர்த்துக் குடிக்கக் கொடுக்கலாம்.

- (4) பழகாரத்தைத் தண்ணீரில் கரைத்துத் துணியில் நனைத்து, மூக்கின் பேரில் போட்டு வைக்கலாம்.

- (5) டானிக் ஆலிட் (Acid Tannic) டிபிராம் $\frac{1}{2}$ இதைத் தான்செய்து, பொடி மாதிரியாக உருஞ்சக் கொடுக்கலாம்.

- | | | |
|--|----------|---|
| (6) அலிட்டானிலிடம் (Acetanilidum) | கிரான்ஸ் | 1 |
| லைக்கர் அமாமெலிடிஸ் (Liquor Hamamelidis) | அவுன்ஸ் | |
- ஒன்று சேர்த்துத் துணியில்நனைத்து. மூக்கந்தண்டில் போட்டுவரலாம்.

மூக்கிலிருந்து நாற்றமான நீர் வடிதல்—Ozaera

கணை ரோகத்தினாலும், பீடித்த நாட்களாகத் தடிமன் பிடித்து, சளிவடிந்து கொண்டிருப்பதனாலும், மூக்கிலிருந்து வடியும் நீர் நாற்றமுள்ளதாக விருக்கும். மூக்கில் அசுமுகன் பிடித்திருக்கும்.

சிகிச்சை

பொட்டாஷியம் குளோரேட் (Potassium Chlorate)	கிரான்ஸ்	20
மாவு சர்க்கரை (Sugar)	அவுன்ஸ்	$\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து, பொடி மாதிரி உரிஞ்சலாம்.

மூக்கில் சதை வளர்தல்—Adenoids

உட்புற தொண்டைக்குமேல், அடிமூக்கிலுள்ள சதைக்கோளங்கள் வீக்கம் கண்டு நீண்டு வளர்ந்து, உட்புற நாகித்துளைகளை யடைத்துக்கொண்டு விடும். அதனால் சாதாரண தடிமன்போலவே, மூக்கில் சளி வடிந்து கொண்டிருக்கும்; சுவாசம் வாய் வழியாகவே வரும்.

மூக்கில் சதை வளர்ந்துள்ள ரோகஸ்தர்களுக்கு இரவில் நித்திரை செய்யும் போது, குரட்டைச் சப்தம் அதிகமாயிருக்கும், பேச்சின் தொனி சுத்தமாக விராமல், மூக்கடைத்துப் பேசுவதைப்போலிருக்கும். சுவாசம் தூர்நாற்ற மடிக்கும்; காதமந்தம், தொண்டையதிர்ச்சி, இருமல், அஜீரணம், இழுப்பு முதலியவை எழும்பும்; கெஞ்ச கூடுகட்டி யிருக்கும். இதற்கு ரண சிகிச்சை செய்வதே தகுதியான முறையாகும்.

சிகிச்சை

- | | | |
|--|----------|---|
| (1) ஐயோடம் (Iodum) | கிரான்ஸ் | 1 |
| பொட்டாஷியம் ஐயோடைட் (Potassium Iodide) | " | 6 |

மெந்தால் (Menthal)	”	1
கிளிசரின் (Glycerine)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்து வீக்கித் தெரியும் பாகங்களில் தடவி வரலாம்.

(2) சோடியம் பைகார்போனேட் (Sodium Bicarbonate)	கிரான்ஸ்	15
சோடியம் குளோரேட் (Sodium Chlorate)	”	15
ஆலிட் போரிக் (Acid Boric)	”	15
கிளிசரின் (Glycerine)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்து வைத்துக்கொண்டு நான் ஒன்றுக்கு 3, 4 தடவை 2-தேக்கரண்டி மருந்துடன் 4-தேக்கரண்டி சுடுதண்ணீர் சேர்த்து, மூக்கினால் இழுத்து வாய்வழியாகச் சீழே துப்பலாம்.

மூத்திரம் கலங்கலா யிறங்குதல்:—

நீர் கலங்கலா யிறங்குத லென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

மூத்திரம் முக்கிப் பெய்தல்:—

நீர்க்கடுப்பு யென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

வயிற்றுப்பிச்சம்:—

மலச்சிக்கலின்றி வயிற்றுப்பிச்சு மென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

வயிற்றுவலி—Colic

குழந்தைகளுக்கு அஜீரணத்தினாலாவது, ஆகா விகல்பத்தினாலாவது அடிக்கடி வயிற்றுவலி யேற்படலாம்.

சிகிச்சை

(1) வசம்பு	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ ஒழம்	ரூபாயெடை 1
கோஷ்டம்	” 1	

முதலில் வசம்பை ஒரு சட்டியில்போட்டு கருக வறுத்து, அத்துடன் கோஷ்டத்தையும், ஒமத்தையும் போட்டு ஒழம் பெரியும்போது 12-அவுன்ஸ் தண்ணீர்விட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் குய்ச்சிய கஷாயத்தில் $\frac{1}{2}$, 1-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுக்கலாம்.

(2) ஒமத் தீநீர்; கோரோசனை மாத்திரை கொடுத்து வரலாம். செய் முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(3) ஸ்பிரிட் ஈதர் கைட்ரோவி (Spirit Aether Nitrosi)	தூளி	12
டிஞ்சர் காம்ப்ர் கோ (Tincture Comphor Co)	”	10
ஆக்குவா கரூய் (Aqua Carui)	டிராம்	8

ஒன்று சேர்த்து, 1 முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 2-தடவை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

வாந்தி—Vomiting

சிறு குழந்தைகளுக்கு ஆகார வெறுப்பின் காரணமாக அடிக்கடி வாந்தி யுண்டாவதுண்டு. இரைக்குடல் சுருங்கி யிருப்பதனாலும் வாந்தி யுண்டாகலாம். குழந்தைகள் பிறந்த 10-தினங்களுக்குப் பின்தான் வாந்தி எடுக்கும் குணமுண்டாகும்.

சற்று வயது வந்த குழந்தைகளுக்கு பித்த உபரியினாலாவது உபக்குடல் (Appendix) விகல்பத்தினாலாவது அஜீரணத்தினாலாவது வாந்தி யுண்டாகலாம்.

சிகிச்சை

பால் குடிக்கும் குழந்தைகளுக்கானால், 275-வது பக்கம் “அடிக்கடி பால் எடுத்தல்” என்ற தலைப்பின்கீழுள்ள சிகிச்சைகளைச் செய்யவும்.

- (1) அதிவிடயம் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ திப்பிலி ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
மான்சொம்புத் தூள் ” $\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்துச் சூரணித்துக்கொண்டு, $\frac{1}{2}$ -ரூபாயெடை யளவு $\frac{1}{2}$ -தேக் கரண்டி தேனில் குழப்பிக் கொடுக்கலாம்.

- (2) மிளகு ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ கன்னுரிவேர்ப்பட்டை ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
வசம்பு ” $\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்து, 12-அவுன்ஸ் நீராகாரத்திற் கரைத்துக் கலக்கிக் கஷாயமிட்டு, $\frac{1}{2}$; 1-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுக்கலாம்.

- | | | |
|------------------------------------|---------|----|
| (3) கிரியோசோட் (Creosote) | தூளி | 1 |
| ஸ்பிரிட் ஜூனிபர் (Spirits Juniper) | ” | 1 |
| சிம்பிள் சிரப் (Syrup Simple) | ” | 80 |
| தண்ணீர் | அவுன்ஸ் | 1 |

ஒன்று சேர்த்து 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 4-மணி நேரத் திற் கொடுதரம் ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

வாந்தியும், வயிற்றோட்டமும்:—

221-ம் பக்கம் கழிச்சலும், வாந்தியு மென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

வாந்தியும், விக்கலும்—Vomiting With Hiccough

குழந்தைகளுக்கு வாந்தியுண்டாயிருக்கும்போதே விக்கலு மெற்படுவதுண்டு

சிகிச்சை

- (1) ஏலம் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ கிராம்பு ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
சீரகம் ” $\frac{1}{2}$ மயிலிறஞ்சாம்பல் ” $\frac{1}{2}$

முதலில் மூன்று சரக்கையும் வறுத்துச் சூரணித்துக்கொண்டு பின் மயி
லிறகுச் சரம்பலையும் சேர்த்து, அதில் $\frac{1}{2}$ -ரூபாயெ ட சூரணத்தைச் சேர்த்
துக் கால மால தேனில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) திப்பிலி ரூபாயெடை 1 ஏலம் ரூபாயெடை 1
பருத்திவிரைபருப்பு ,, 1 நெற்பொரி ,, 1

ஒன்று சேர்த்துச் சூரணித்துக்கொண்டு $\frac{1}{2}$ -ரூபாயெடை யளவாகக்
கால மால சமன் சர்க்கரை சேர்த்துக் கொடுத்து வரலாம்.

வாய்ப்புண்—Stomatitis

வாயின் மெல்லிய பாகங்கள் சிவந்து புண்பட்டு எரிச்சலுண்டாகும்;
நாவு, கன்னம், பல்லீறு, மேல்வாய் முதலியவைகள் சற்று வீங்கி
யிருக்கும்; எச்சில் பெருக்கு அதிகமா யிருக்கும்.

சிகிச்சை

- (1) மாசக்காயை முலைப்பாலி லுரைத்துத் தேனுடன் கலந்து தடவி வரலாம்.

- (2) பசு நெய்யில் கோரோசனையைக் கரைத்துத் தடவி வரலாம்.

- (3) நஷத்திரமாணிக்கக் கிருதம்; வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய்; தேற்றும்
கொட்டை மாத்திரை இவற்றிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய்
முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

- (4) ஆவிட் போரிக் (Acid Boric) அவுன்ஸ் 1
கிளிசரின் (Glycerine) ,, 2 $\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து கொதிக்கவைத்துக் கரைத்து புண்களில்
தடவி வரலாம்.

விக்கல்—Hiccough

குடல் வரட்சியினால் விக்கல் உண்டாகும். சற்று வளர்ந்த குழந்தை
களுக்கு ஆகார பேதத்தினாலும், ஜீரணியாத ஆகாரம் வயிற்றுள்
ளிருப்பதாலும் விக்கலுண்டாகலாம்.

சிகிச்சை

- (1) கடுகுரோகிணி ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ மயிலிறகுச்சரம்பல் ரூபாயெடை 1
திப்பிலி ,, $\frac{1}{4}$

முதலில் கடுகுரோகிணியையும் திப்பிலியையும் வறுத்துச் சூரணித்துக்
கொண்டு, பின்னர் மயிலிறகுச் சரம்பலைச் சேர்த்துக் கலந்து, $\frac{1}{2}$ ரூபாயெடை
யளவு எடுத்துத் தேனில் குழப்பிக் கொடுக்கலாம்.

- (2) (Aether) துளி 8
தண்ணீர் டிராம் 4

நாலாவதைந்தாவது

பாகங்கள்

FOURTH AND FIFTH PARTS

ஸ்திரீ பால சிகிச்சை

நான்காம் பாகம்

மாதர் ரோகங்களும், மருத்துவமும் DISEASES OF WOMEN AND TREATMENTS

அதி ஸ்தூல ரோகம்—Obesity

தீரேகத்தில் கொழுப்பு அதிகரிப்பதனாலேயே சரீரம் அளவுக் கதிகமாய் ஸ்தூலித்து விடுகிறது. இத்தையே ஸ்தூலரோகம், மேதோரோகம் என்றும் சொல்லுவர். அளவுக் கதிகமாகப் பெருத்திருப்பவர்களுக்குப் பிறக்கும் குழந்தைகளும் அவ்வாறே பெருத்திருக்கும். கருப் பையிலும் கொழுப்பு மிகுதிபட்டு விடுவதனால் கருப்பற்றதொழிபும் கருப்பற்றி னாலும் அகாலப்பிரசவ முண்டாகும்; அப்படிக்கின்றி கரு சம்பூரண மாய் வளர்ந்தாலும், பிரசவத்தில் மிகுதியும் கஷ்டமேற்படும்.

சிகிச்சை

- (1) நீராகாரம், அவுன்ஸ் 8 தேன் அவுன்ஸ் 1
ஒன்று சேர்த்துக் காலையில் வெறும் வயிற்றில் 41-நாள் கொடுத்து வரலாம்.
- (2) கடலைப்புளிப்பு அவுன்ஸ் 1 கொம்பாக்குதான் ரூபாயெடை 1/16
ஒன்று சேர்த்து, 20-நாள் காலையில் மட்டும் கொடுத்து வரலாம்.
- (3) எக்ஸ்ட்ராக்ட் புகி வாசிகுலோலி லிக்குட் (Extract Fuci
vasiculose Liquid) டிராம் 8
பொட்டாஷியம் ஐயோடைட் (Potassium Iodide) கிரைன்ஸ் 12
லைக்கர் தைராய்டி ரெவின்டிஸ் (Liquor Thyroidi
Recentis) துளி 18
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti) டிராம் 8
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 8

ஒன்று சேர்த்து, நாள் ஒன்றுக்கு 3-தடவை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

அரை கரப்பான்—Eczema of Vulva

தாரீர் சம்பந்தத்தினாலும், வெள்ளைப் பிரமேகத்தினாலும், கிரைப் பூச்சி கள் அதிகரிப்பினாலும், கடிதடம், யோனித்துவாரம் முதலிய மர்ம ஸ்தான பாகங்களில் திணவு கண்டு, வியர்க்குருபோல வாரம்பித்துப் புண்பட்டுவிடும்; புண்கள் சீழ்கொண்டு அதிகமான நமச்சலையும், எரிச்சலையும் உண்டுபண்ணும்.

சிகிச்சை

- (1) கருஞ்சேரகம் ரூபாயெடை 1 மஞ்சள் ரூபாயெடை 1
கஸ்தூரிமஞ்சள் ,, 1 கல்லுப்பு 1
தேங்காய்ப்பால் அவுன்ஸ் 12

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்துப்போட்டு இரும்பு சட்டியில் விட்டுக் காய்ச்சி வடித்துப் புண்ணின்மேல் பூசியிருந்து, சாயந்திரம் இலுப்பை அரப்பும், மாம்பட்டையும் சமமாய் வைத்து அதன்மேல் பூசியிருந்து 2 மணி நேரம் சென்ற பின் வெந்நீரால் கழுவி விட்டு மறுபடியும் எண்ணெயைத் தடவி வரலாம்.

- (2) பூவரசம்பட்டை எண்ணெய்; உலகோத்தம செந்தூரம் இவைகளை உபயோகித்த வரலாம். செய்முறை 6-பாகம் பார்க்கவும்.

- (3) இத்தியால் (Ichthyol) டிராம் 2
ஆயில் அமிக்டாலி டுல்விஸ் (Oil Amygdali Dulcis) ,, 1
ஆக்குவா கால்விஸ் (Aqua Calcis) ,, 4
ஆக்குவா ரோஸா (Aqua Rosae) ,, 1
கிளிசரின் (Glycerine) ,, 1

ஒன்று சேர்த்து ஒரு வெள்ளை துணியில் நனைத்துப் புண்ணின்மேல் போட்டு வரலாம்.

அஷ்டகுலை—Vaginitis

மாம் ஸ்தானங்களை அடிக்கடி கழுவி சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளாததினால், அழுக்குப் பற்றிக் காய்ந்து நடக்கும்போது உராய்வுபட்டாவது, வீஷக்கிருமிகளாலாவது, பிரமேக ரோகத்தினாலாவது, யோனித் துவாரம் சற்று வீக்கம் கண்டு எரிச்சலும், நமச்சலும் உண்டாகும்.

யோனித் துவாரம் வரட்சியாகவும், நெருப்பு அனல்போன்று மிருக்கும். கடிதடத்தின் பேரிலும், யோனித் துவாரத்துள்ளும், சிறிய வெள்ளைப் புள்ளிகள் சீழ் கோர்த்தத் காணப்படும். யோனித் துவாரம் சுருங்கி, அதிலிருந்து சீழ் போன்ற கசிவேற்படும். நீர்க்கடுப்பும், ஆசனவாய்க் கடுப்பும், மலச்சிக்கலு் மேற்படும்.

சிகிச்சை

- (1) மேகத்தெண்ணெய்; மகாரஜத பஸ்பம் இவைகளைக்கொடுத்து வரலாம்; செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.
- (2) ஐட்ரார் ஜரி பெர் குளோரைட் (Hydrargeri Perchloride) இனான்ஸ் 90
அமோனியம் குளோரைட் (Ammonium Chloride) ,, 90
மெத்திலின் புளு (Methylene Blue) ,, 1/60
தண்ணீர் அவுன்ஸ்

சம்போக இச்சைமிகுதியால்முரட்டுத்தனமாய்ப் புணர்வதனாலாவது, கருப்பையின்வாய் அடைபட்டுப் போவதனாலாவது; கருப்பையின் உட்புரத்தில்பொய் சதைவளர்ந்துபோவதனாலாவது; நரன்பட்டவயிற்றோட்டம், நரம்புக்கோளாறுகள், ஆகாரக்குறைவுடன் மிகுதியானவேலைசெய்வது அஜீரண ரோகங்கள் முதலியவைகளினாலாவது; இரத்தக் குழல்களில் மிகுதியும் இரத்தம்சேர்ந்து போவதனாலாவது; இரத்தகுலை ஏற்படலாம்.

கருப்பை, அடிவயிறு, இடுப்பு முதலியவைகள் பிரசவ சமயத்தில் வலிப்பதைப்போன்று, வலித்து, கட்டிகளாகவேனும், நீற்றுப்போயாயினும், வெண்மையாகவேனும், அளவுக்குக் குறைந்தேனும், கருக்குழி, மூத்திரதாரை, அடிவயிறு, நடுமுதகு முதலியவைகளின் வலியுடன் மயக்கமும் கண்டு சூதகம் வெளிப்படும்.

சிலருக்கு இடது கைபாரிசத்தில் தாங்கமுடியாத வலி வேதனை, தொடை எலும்புவலி, தலைவலி, கஷ்டசுவாசம் அடிவயிற்றில் குத்தவலி, முதலியவைகளோடு, கண்ணும் கழுத்தும், மர்ம ஸ்தானமும், ஸ்தனங்களும் விம்மி வலியாயுமிருக்கும். சிலருக்கு வயிற்றோட்ட மேற்படுவதுமுண்டு. இவ்வியாதியினால் கருப்பையில் சமுலேகளும்புண்ணுகளுமுண்டாகலாம்.

சிகிச்சை

(1) அஸ்திஸ்ராவ ரோகத்திற்குச் சொல்லிய 1-வது இலக்க மருந்தைக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) வெங்காயச்சாறு அவுன்ஸ் 12 இஞ்சிச்சாறு அவுன்ஸ் 12
சிறுமணக்கெண்ணெய், 24 குமட்டிக்காய்ச்சாறு ,, 12
பேராத்தைக்கொய்யம் ,, 12 புங்கம்பால் ,, 8

ஒன்று சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து, வீட்டுவிலக்கமாவதற்கு 3-நாள்களுக்கு முன்னிருந்து, காலையில் மட்டும் 1-அவுன்ஸ் எண்ணெயைக் கொஞ்சம் கடிதண்ணீரில் கலந்து, 3-நாள்களுக்குக் கொடுத்து வரலாம்.

(3) குமட்டிக்காய்க் குழாய்; ஸ்ரீ தேவி எண்ணெய்; கலிக்காதிப்புப்பு; ரசலிங்க மெழுகு முதலியவைகளைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(4) ஆவிட் பாஸ்பரிக் அிட் (Acid Phosphoric Dil)	டிராம்	1
* லைக்கா ஸ்டிரிக்னைன் (Liquor Strychnine)	துளி	20
ஸ்பிரிட் குளோரோபாரம் (Spirit Chloroform)	டிராம்	2
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti)	"	■
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	6

ஒன்று சேர்த்து, நான் ஒன்றுக்கு 3-தடவை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

* விஷமானது ஜகாரதையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

- (5) ■ எக்ஸ்டிராக்ட் ஓபியம் (Extract Opium) கிரைன்ஸ் 1 1/2
 ■ எக்ஸ்டிராக்ட் பெல்லடோர்னா (Extract Belladonnae) ,, 1 1/2
 கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine Sulphus) ,, 2 1/4

ஒன்று சேர்த்து, 24-மாத்திரைகளாகப் பிரித்து உருட்டிக்கொண்டு, 3-மணிநேரத்திற் கொரு மாத்திரை வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

இரத்தப் பெருக்கு—Menorrhagia.

இதைத் துவாலே, பெரும்பாடு; துதகப்பெருக்கு; இரத்தஸ்ராவம் | அஸ் நுக்தாய்; பிரதாய் என்று பலவிதமாய்ச் சொல்லப்படும். சுகதேகியான ஸ்திரீகளுக்கு 28-நாட்களுக்குக் கொருதரம் கிராமமாய் 4-முதல் 6-அவுன்ஸ் வரை சூதகம் வெளிப்படும். இரத்தப்பெருக்கு ரோகத்தில், 28-நாட்களுக்கு முன்னதாகவோ; அல்லது, நாட்கள் சென்றோ சூதகம் வெளிப்படும். அளவிலும் சூதகம் அதிகமாய்ச் சுழியும்.

கருப்பையினாலும் இரத்த மிகுதியினாலும்; அடிக்கடிக்கரு அழிவேற்படும் காரணத்தினாலும்; சீதோஷ்ண மாற்றம், மதுபானம் செய்தல், சரீரத்தில் இரத்தம் அதிகரித்திருந்தல் அளவுக்கதிகமான ஆகாரம் உட்கொள்ளல் முதலிய காரணங்களினாலும்; கருப்பை, சினைப்பாதை இவைகள் வீக்கம், கருப்பையின் உட்புற சவ்வு வீக்கம் கண்டு விடுதல், பிரசவத்தின்போது நஞ்சுப்பிடித்த மேற்படல், கருப்பையி் னேற்படும் கட்டி, அடிக்கடி சம்போகம் செய்தல் முதலிய கோளாறுகளினாலும்; குண்டிக்காய் வீக்கம், பீலிகை வியாதி, கருப்பையில் சளி சேருதல், மது மூத்திர ரோகம், நாளப்பட்ட வயிற்றோட்டம், இருதய வியாதி முதலிய புற அவயவங்களின் விகல்பத்தினாலும் இரத்தப்பெருக் கேற்படலாம்.

இரத்தப்பெருக்கு ரோகத்தில் தீண்டலாகும் நாட்கள் சமீபித்தும், சூதகம் வெளிப்படாது, திரேகத்திலோர்வித உணர்ச்சி யேற்பட்டு, இழுப்புக்கண்டு சூதகம் அதிகமான அளவாக பெருகியோடும். இதனால் சிலருக்கு சுரம் கண்டு, கைகால் குளிர்ந்து போவதுண்டு.

சிகிச்சை

- (1) நாவற்பட்டையை எருமை மோர்விட்டிடிடித்துப் பிழிந்தசாறு அவுன்ஸ் 2-ல் ஒரு ரூபாயெடை சந்தனத்தைக் கரைத்து 3-நாள் கொடுத்து வரலாம்.
- (2)
- | | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|------|
| அக்கரகாரம் | ரூபாயெடை 20 | குரோசானிஓமம் ரூபாயெடை | 20 |
| கோஷ்டம் | ” 20 | வெந்தயம் | ” 20 |
| அதிமதுரம் | ” 20 | வெள்ளைப்பூண்டு | ” 20 |
| திப்பிலி | ” 20 | ஓமம் | ” 20 |
| கிராம்பு | ” 20 | சீரகம் | ” 20 |
| பெருஞ்சீரகம் | ” 20 | அதிவிடயம் | ” 20 |
| சகஸ்திரபேதி | ” 20 | கொத்தமல்லி | ” 20 |

■ விஷமானது ஐக்கரதையாக உபயோகிக்க வேண்டும்.

பெருங்காயம்	ரூபாயெடை	20	மிளகு	ரூபாயெடை	20
சிற்றரத்தை	"	20	சக்கு	"	20
திப்பிலிமூலம்	"	20	இந்துப்பு	"	20
ஏலம்	"	20			

ஒன்று சேர்த்திடித்து 7-முறை புது சட்டியில் போட்டு வறுத்து, ரூணித்து வைத்துக்கொண்டு, ஆவாரப் பூவும், பட்டையும் சமமாய்ப் போட்டுக் காய்ச்சிய கஷாயம் அயுன்ஸ் 2 ல் திரிசடி பிரமாணம் ரூணத்தைக் கலக்கிக் கொடுத்து வரலாம்.

(3) காடியில் துணியை நனைத்து யோனிக்குள் வைத்தால் சூதகம் அதிகமாய் ஓடுவதை தடை செய்யும்.

(4) எக்ஸ்ட்ராக்ட் எர்காட் லிக்டுட் (Extract Ergot

Liquid)	டிராம்	2
டிஞ்சர் டிஜிடாலிஸ் (Tincture Digitalis)	துளி	24
ஆலிட் காலிக் (Acid Gallic)	டிராம்	1
எப்சம் சால்ட் (Epsom Salt)	"	3
ஆலிட் சல்பியூரிக் அிட் (Acid Sulphuric Dil)	"	1
தண்ணீர்	அயுன்ஸ்	6

ஒன்று சேர்த்து 6-மணி கோத்திற் கொருதாம் ஒரு அயுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

இரத்தவாத சூன்மம்—Amenorrhoea

இதை இரத்தக் சூன்மதலை; சூதகக்கட்டு; சூதகப்பீதம் என்று பலவிதமாய் சொல்லப்படும்; 28-நாட்களுக் கொருதாம் கிரமமாய் வெளியாக வேண்டிய சூதகம் இவ்வியாதியில் தடைப்பட்டுப்போகும்.

சருப்பையில் இயற்கையாகவே சூதகம் சுரக்காமல் போவதினாலாகிலும்; சருப்பையின் வாய் அடைபட்டுப்போ யிருப்பதினாலாகிலும்; முக்கியமாய் சூதகக்கட் டேற்படலாம் மேலும், சரீரப் பிரக்கிருதியின் காரணத்தினாலாகிலும்; இரத்தம் மிருதியும் வியர்த்தமாய்ப், போவதினாலாகிலும் நீடித்த வியாதிகளில் கஷ்டப்பட்டதினாலாகிலும்; அளவுக் கதிகமான சம்போகம் முதலியவைகளினாலாகிலும்; அதி ஸ்தூல ரோகம், சருப்பையில் துர்மாயிச வளர்ச்சி, சருப்பையில் கட்டி, புண்ணாக னேற்படுதல், முதலிய சில கோளாறுகளினாலாகிலும்; திண்டல் காலங்களில் குளிரில் நடமாடுதல், அதிக குளிர்ச்சியான பான்ங்களைக் குடித்தல் முதலிய செய்கைகளினாலும் இரத்தம் கட்டுப்பட்டு விடலாம்.

சூதகந்தரோகத்தில் சுரம், வாந்தி, தலைச்சுற்று, தலைவலி, புளித்தேப்பம், மலச்சிக்கல், அடிவயிறு, இடுப்பின் கீழ் பாகங்களில் குடைச்சலான வலி, நாடிக்கடை துரிதப்படுதல் இவைகளேற்படும். சூதகம் தடித்துக் கருத்துக் கழியும்; திரோகம் மெலிந்து யோனி, சருப்பை, நாசி

முதலியவைகள் நாவு உணர்ச்சியற் றிருக்கும்; சிலருக்குத் தீண்டல் சாயத் தண்ணீர் போலும், சிலருக்கு மஞ்சளாகவும், நீலநிறமாகவும், வெண்மையாகவும் சூதகம் கழிவதுண்டு. திரோகம் வெளுத்துச் சோம்பலேற்படும்; உடம்பாதியந்தமும் நச்சுவலி, பதவ்டம், இழுப்பு, லிக்கல், மயக்கம், மாடைப்பு, அகோரப்பசி, உடலெரிவு, வாய்க்சப்பு, நீர்க்கடுப்பு, சூளிநடுக்கம், இரைப்பு, இருமல் முதலிய கோளாறுகளில் சிலவேனும், பலவேனும் உண்டாகும்.

சிகிச்சை

(1) கொத்தமல்லி	ரூபாயெடை 8	வசம்பு	ரூபாயெடை 8
வெள்ளைப்பூண்டு	" 3	கொடிவேலி	" 3
ஓமம்	" 8	கோவ்டம்	" 3
செவ்வியம்	" 8	கடுக்காய்	" 11
வாய்விளங்கம்	" 8	தான்றிக்காய்	" 8
சுக்கு	" 8	நெல்லிவற்றல்	" 8
திப்பிலி	" 8	சிறுதேக்கு	" 8
மிளகு	" 8	சிவதைவேர்	" 8
திப்பிலிமூலம்	" 8	கழற்சிப்பருப்பு	" 8
சீரகம்	" 8	கடுகுரோகிணி	" 8
கருஞ்சீரகம்	" 8	பெருங்காயம்	" 8
வெட்பாலையரிசி	" 8	இந்துப்பு	" 8
அதிமதுரம்	" 8	அட்டுப்பு	" 8

ஒன்று சேர்த்து உலர்த்திச் சூரணித்துக்கொண்டு சிற்றாமணக்கெண் ணையும், பனைவெல்லமும் சமமாய் சேர்த்துப் போதுமானது விட்டு லேகி யம்போல் பிசைந்து வைத்துக்கொண்டு, காலை மாலை ஒரு கொட்டைப் பாக்குப் பிரமாணம் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்.)

(2) கும்மட்டிக்காய்ச்சாறு	இந்துப்பு	ரூபாயெடை 1½
அவுன்ஸ் 12	கருஞ்சீரகம்	" 1½
பெருங்காயம் ரூபாயெடை 1½	கடுகுரோகிணி	" 1½
வெங்காயம் "	வால்மிளகு	" 1½

முதலில் கும்மட்டிக்காய்ச் சாற்றை 6-அவுன்ஸாகச் சுண்ட வைத்துக் கொண்டு, இதர சரக்குகளையும் போட்டு, 6-மணி நேரம் அரைத்து வழிந்து வைத்துக்கொண்டு, தீண்டலானது முதல் 3-நாளைக்குக் காலையில் ஒரு குன்றி மணியவ்வளவு மருந்தை பனை வெல்லத்தில் வைத்துக் கொடுத்து வரலாம். பேதி அதிகமானால், மருந்தின் அளவை குறைத்துக் கொள்ளலாம்.

(3) ஏகாதசிச் செந்துரம்; கும்மட்டிக்காய்க் குழம்பு; ஸ்ரீ தேவீ எண்ணெய் இவைகளைக் கொடுத்து வரலாம். செய்யுறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(4) சோடா சாலிஸில்ஸ் (Soda Salicylas)	கிரைன்ஸ்	30
டிஞ்சர் ஜென்ஷன் கோ (Tincture Gentain Co)	துளி	45

* மஞ்சள் கக்ஸ் வாமிகா (Tincture Nux Vomica)	தனி	20
ஸ்பிரிட் குளோரோபாரம் (Spirit Chloroform)	,,	30
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	3

ஒன்றுசேர்த்து, காள் 1-க்கு 3-தரம் ஆகாரத்திற்குப் பின் 1-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

கரு அழிவு—Abortion

கருப்பையில் உண்டாயிருக்கும் கரு எக்காரணத்தினாலாவது, ஏழு மாதத் திற்கு முன் வெளிப்பட்டு விடுமானால், அகைக் கருக்கீழைவு; கரு அழிவு; காய் விழுதல்; கர்ப்பப்பாதம்; அழிக்கீழ்ப்பம்; கர்ப்பவிகீழ்த்; கர்ப்ப ஸ்ராவம் என்று சொல்லப்படும். ஏழு மாதத்திற்குப் பின் பிரசவீக்க வேண்டிய கிரம காலத்திற்கு முன் குழந்தை பிறந்து விடுமானால், அதற்கு அகாலப் பிரசவம் (Premature Birth) என்று சொல்லப்படும்.

கருவழிவு ஒருதரம் ஏற்படுமானால் பின்னர் கருப்பற்றும்போதெல்லாம் கரு வழி வேற்படும். சுகாதாரக்குறைவு, அகால உணவு, அகால நித்திரை, அதிகப் பசியுடனிருத்தல், உயரமாகத் தாவி எட்டுதல் அடி வயிற்றில் அடிபடுதல், மெத்தைப்படிக்களில் தட தடவென ஏறி இறங்குதல், பரங் களை முக்கித் தூக்குதல், நெடுந்தூரம் நடத்தல், குதிரை சவாரி, அதிக அதிர்ச்சியுடைய வாடகை பஸ்களில் நெடுந்தூரம் செல்லுதல், நடனமாடுதல், தையல் இயந்திரங்களில், படபடப்பாய் வேலை செய்வது, இடைக் கச்சை (ஒட்டியாணங்களை) இறுக்கக்கட்டிக்கொடுவது, ஜீரணிக்கக் கூடாத ஆகாரங்களைப்பிசிப்பது, கடும் விரேசனகாரிகளை எடுத்துக்கொள்ளுவது, மூளைக்கு அதிகவேலைகொடுப்பது, கர்ப்பகாலத்திலும் முரட்டுத்தனமாய் சம்போதம் செய்வது இவைபோன்ற கர்ப்பகாலத்தில் செய்யத்தகாத காரியங்களைச் செய்வதனாலும்; பிண்டத்தைக்கூற்றியிருக்கும்சுவ்வானது கருப்பையில் இலேசாகப் பிடித்திருப்பது, கருப்பையின் பக்கங்களில் சொழுப்பு, மிகுந்திருப்பது, கருப்பையின்வாய் ஆரம்பத்திலேயேவிரிந்து போதல் திரோகம் அதிகம் ஸ்தூலித்தல் முதலிய இயற்கைக்கு விரோதமான கோளாறுகளினாலாகிலும், மலச்சிக்கல், கிரைப்பூச்சி யதிகரிப்பு, சித்பேதி, பெரும்பாடு, நீடித்தபிரமேகரோகம், நீடித்த இதரவியாதிகள் முதலிய பல பிணியின் காரணமாகவும் கருவழி வேற்படலாம்.

கருவழிவுசகஜமாயேற்படுபவர்களுக்கு, கருவழிவுஉண்டாவதால்யாதொரு விதக் கொடுதலு மேற்படுவதில்லை; புதிதாகக் கருவழிவு ஏற்பட்டவர்களுக்கு இரத்தப்பெருக்கும் இதரக் கோளாறுகளும் நேரிடலாம்.

கருவழிவு ஏற்படுவதற்குமுன், திரோகத்தில் ஒருவித வியாதியின் உணர்ச்சியும், மிகுந்த பலவீனமு மேற்படும்; முதலின்மேல் பாகத்திலும், அடிவயிற்றிலும், ஒருவிதமான பிடிப்புப்போன்று யேற்படும்; இவைகளுடனும் கூட குதகம் இலேசாகக் களியும்.

* விஷமானது ஜூக்கரணையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

கருவழிவு ஏற்படும்போது, அடிவயிறு, அரை, முதலு முதலிய விடங்
களில் குத்துவலி கண்டு, வலியானது வரவர உக்கிரமாக உண்டாகி,
குதக கசிவதிக மேற்படும்.

பிண்டம் விழுவதற்குமுன், இடுப்பு வலி விட்டுவிட்டு மெதுவாகக் கண்டு
பின் பிரசவ வேதனைப்போன்ற கொரோவலியுண்டாகி, தண்ணீர் கசிவு
கண்டு பிண்டம் வெளிப்பட்டுவிடும்.

உப சிகிச்சைகள்

- (1) கருவழிவு உண்டாவதற்கான முதல் அறிகுறிகள் தோன்றும்போதே
ரோகியை நிம்மதியாகப் படுக்கவைத்து, இடுப்பு வலி கண்டால், இடுப்
பின் கீழ் சற்று உயரமான தலையணையை வைத்து, மல்லாக்காய் படுத்
திருக்கச் செய்யவேண்டியது. ஈரத்துணியை கடிதடத்தின்மேல் போட்டு
வைக்கலாம்; இடுப்பு வலி யதிகமிருந்தால், டிஞ்சர் ஓபியம் (Tincture
Opium) 20, 30-துளி தண்ணீர் அவுன்ஸ்-6 ஒன்று சேர்த்து, கொடுக்
கலாம்; குளிர்ந்த தண்ணீரில் ஸ்நானம் செய்துவைக்கலாம்; உஷ்ண
மான காப்பி தேயிலை பானங்களைக் கொடுக்கக்கூடாது.
- (2) இடுப்பு வலியும் அதிகரித்து, இரத்தப்பெருக்கு முண்டானால் ரோகியை
படுக்கவைத்து, அபினி 3-கிரைன்னை 5-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கரை
த்து, ஆசனத்தில் பீச்சாங்குழலா லடிக்கலாம்; 'வார்தி யில்லா நிருந்
தால், பொட்டாஷியம் நைட்ரஸ் (Potassium Nitrates) 10 கிரைன்னை
2-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கரைத்து, 2-மணி நேரத்திற் கொருதடவை
கொடுக்கலாம்; இரத்தப்பெருக் கதிகமாயிருந்தால், குளிர்ந்த தண்
னீரை யோனியில் அடிக்கலாம்; ஈரத்துணியை கடிதடத்தின்மேல்
போட்டு வைக்கலாம்; யோனிக் குள் ஐஸ் (Ice) கட்டியை வைத்திருக்
கலாம்; 5-அவுன்ஸ் குளிர்ந்த தண்ணீரில் இரண்டு தேக்கரண்டி காடி
யைக் கலந்து யோனிக் குள் பீச்சாங்குழலா லடிக்கலாம்; ஐஸ் தண்
னீரைக் குடிக்கக் கொடுக்கலாம்.

குறிப்பு:—இம்முறைகளால் பிண்டம் தங்காமல் வெளிப்பட்டுவிடும்போ
லிருந்தால் இச்சிகிச்சைகளைக் கைவிட்டு, பிண்டம் விழுந்தபின் பிரசவத்
திற்கு பின் செய்யவேண்டிய உபசரணையை செய்யவேண்டும்.

கருவழிவிற்குப் பொதுமருந்துகள்

(3) ஏலம்	ரூபாயெடை	1/2	அரிசித்திப்பிலி	ரூபாயெடை	1/8
தாளிசபத்திரி	"	1/2	பகமனேசுருக்	"	1/8
ஓமம்	"	1/2	பகமனேசுபேத்	"	1/8
கிராம்பு	"	1/2	பருப்புக்கீரைவிரை	"	1/8
இலவங்கப்பத்திரி	"	1/2	மூங்கிலுப்பு	"	1/8
கருவாப்பட்டை	"	1/2	சுக்கு	"	1/8
கிச்சிலிக்கிழங்கு	"	1/2	முலாம்பழவிரைபருப்பு	"	1/8
அக்ரகாரம்	"	1/2	ருமிமஸ்தகி	"	1/8

மருதம்பட்டை	”	$\frac{3}{4}$ சர்க்கரை	”	15
வெண்சந்தனம்	”	$\frac{3}{4}$ பசுபெய்	”	5

சர்க்குகளையெல்லாம் நன்றாய் சூரணித்துச் சர்க்கரைப் பாகுடன் நெய்
யும் சேர்த்துச் சூரணங்களைக் கொட்டி லேகியமாகக் கிண்டி கால மாலை
 $\frac{1}{2}$ -ரூபாயெடை அளவாகக் கொடுத்தி வரலாம்.

குறிப்பு:—கருவழி வேற்பட்டபின் இதைக் கொடுத்து வந்தால் கருப்பை
வலுவடைந்து, கருபற்றி பிண்டத்தை வளர்த்து கருவழிவைத் தடுக்கும்.
கீழ்கண்ட ஆக்கில மருந்துகளும் இதே குணத்தைச் செய்யும்.

(4) எக்ஸ்டிராக்ட் விபுருணி லிக்குட் (Extract Viburni Liquid)	டிராம்	1
எக்ஸ்டிராக்ட் பிவிடியா லிக்குட் (Extract Piscidia Liquid)	தளி	45
எக்ஸ்டிராக்ட் இலோனியாடிஸ் லிக்குட் (Extract Heloniadis Liquid)	”	45
ஆக்குவா குளோரோபாரம் (Aqua Chloroform)	அவுன்ஸ்	2

ஒன்று சேர்த்துக் கால மாலை ஒரு தேக்கரண்டிவீதம் ஒரு மாதம்
கொடுத்து வரலாம்.

கருவழிவு ஏற்பட்டதினாலுண்டாகும் வாதம்—

Paralysis caused by Abortion

இதைக் குணவலநாளாகவாதமென்று சொல்லுவர். கருப்பற்றிய மூன்றாம்
மாதத்தில் கருவழிவேற்பட்டு அதனால், பெரும்பாடு உண்டான ஸ்திரீ
களுக்கு இந்த வாதரோகம் தாக்குவதுண்டு.

அடிவயிற்றை இழுத்துப் பிடித்துக்கொண்டு கை கால்களைச் சரியானபடி
அசைக்கவொட்டாமல் பிடித்துக்கொள்ளும்; திரேகரதியந்தமும் அசதி
யும், புண்பேரன்ற வலியுமிருக்கும்; சூம் இலேசாகக் காயும்.

சிகிச்சை

(1) வெங்காரம்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	இந்துப்பு	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
பெருங்காயம்	” $\frac{1}{2}$	வசம்பு	” $\frac{1}{2}$
தேவதாரு	” $\frac{1}{2}$	கடுக்காய்	” $\frac{1}{2}$
சதகுப்பை	” $\frac{1}{2}$		

ஒன்று சேர்த்துத் தூள் செய்து எருக்கம் பாலால் மைபோலரைத்து
வலியுள்ள விடங்களில் பற்றுப் போடவும்.

(2) அப்ராக் கோரோசீன மாத்நிரை; ஸ்ரீ தேவி எண்ணெய்; வீரமெழுகு;
குமட்டிக்காய்க் குழம்பு; அகஸ்தியர் குழம்பு; வாதராசுச மாத்நிரை
இவைகளைக் கொடுத்து வரலாம். செய்யுறை 6-பாகம் பார்க்கவும்.

(3)	* ஸ்டிரிக்னைன் சல்பஸ் (Strychnine Sulphus)	கிரைன்ஸ்	1
	■ ஆவிரிட் ஆர்சனியோசம் (Acid Arseniosum)	,,	1
	■ எக்ஸ்டிராக்ட் பெல்லடோனா (Extract Belladonnae)	,,	5
	கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine Sulphus)	,,	40
	எஸ்டிராக்ட் டாராக்ஸாவி (Extract Taraxaci)	,,	20

ஒன்று சேர்த்து, 90-மாத்திரைகளாகப் பிரித்து உருட்டிக்கொண்டு, நாள் 1-க்கு 8 வேளை 1-மாத்திரை வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(4)	* லினிமென்ட் ஒபியம் (Liniment Opium)	அவுன்ஸ்	1
	லினிமென்ட் சொபோனிஸ் (Liniment Saponis)	,,	1

ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு, முதலில் வலி பிடிப்புள்ள பாகங்களைச் சுடு தண்ணீர் விட்டு நன்றாகப் பிடித்துவிட்டுக் கழுவியபின் பேல் பிரயோகமாக மட்டும் தடவி வரலாம்.

குறிப்பு:—இத்தைலம் விஷமுள்ளதாகையால், தேய்த்தவர்கள் கைகளை நன்றாகச் சுத்தஞ் செய்துகொள்ள வேண்டும்.

கருக்குழி வலி—Metritis

கரு உற்றிருக்கும்போதாவது; அல்லது, பிரசவத்திற்குப் பின்னாவது சில ருக்குக் கோர்ப்பை வலியுண்டாகலாம். இதை யோனி துலை என்று சொல்லப்படும். கருப்பையின் கழுத்துச் சுருங்கிக் கருப்பை உற்புற சவ்வு வீக்கம் கண்டு புண்பட்டு விடுவதனாலாவது; பிரசவத்திற்குப்பின் னாவது, கரு உற்றிருக்கும்போதாவது, ஈரத்தில் நடமாடுவதனாலாவது; கருப்பையில் சூதகம் கட்டிப்படுதல், வீப்புருதிகளேற்படல் முதலிய காரணங்களினாலாவது; முரட்டுத்தனமான சம்போகத்தினால் ஜன நேந்திரிய உட்புற அவயவங்கள் அதிர்ச்சி கண்டும், தேய்வு பட்டும் போவதினாலாவது கருக்குழியில் வலி ஏற்படலாம்.

முதல் முதல் குளிர்காச்சவேற்படும்; நாடி தீவிரமாக இழுத்து நடக்கும்; கருப்பையின்வலியும், கருப்பைபெரிதாகத்தெரிவதுபோன்றுமிருக்கும்; நாவரட்சி, வார்தி, அரோசிகம்,வயிற்றோட்டம் முதலியவைகளேற்படும் ஒருபுறம் சாய்ந்து படுத்திருப்பது ஆரோக்கியமாகத் தெரியும். எழுந்து உட்காரும் சமயம்வலியுதிகரிக்கும்; சிலசமயங்களில் சன்னிபாதசுரத்தி லுண்டாகும் குறிகளும், சூதக வயிற்று வலியில் ஏற்படும் குணங்களு மிருக்கும்; நாவுவரண்டு, அழுக்கு மஞ்சள் நிறமாகவிருக்கும்; சுரமிருந் தால் சுரத்தைத் தணிக்கும் மருந்துகளைப் பிரயோகம் செய்யவேண்டும்.

சிகிச்சை

(1)	நவாச்சாரம்	ரூபாயெடை 1	தண்ணீர்	அவுன்ஸ் 16
-----	------------	------------	---------	------------

ஒன்று சேர்த்துக் கரைத்துக்கொண்டு, ஒரு துணியில்நனைத்து, அடி வயிற்றில் போட்டுத் துணி காயாமல் கைவைத் தண்ணீரைவிட்டு வரலாம்.

■ விஷமானது ஜாக்ரதையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

(2) கருவேலம்பட்டைக் கஷாயத்தைக் பீச்சாக்குழலால் யோனிக்குள் அடித்து வரலாம்.

(3) லைக்கர் செடான்ஸ் (Liquor Sedans) துளி 90
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 8

ஒன்று சேர்த்து நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஆகாரத்திற்குபின் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(4) (Camphor) கிரான்ஸ் 45
ஆவியட் பேரிக் (Acid Boric) டிராம் 4
கிளிசரின் (Glycerine) அவுன்ஸ் 5

ஒன்றுசேர்த்து அரைத்துக்கொண்டு, பஞ்சில்லைத்துப் பஞ்சைஉருண்டையாகச்செய்து, ஒரு நீண்ட நூலில் கட்டி யோனிக்குள் வைத்திருக்கலாம்; இப்படியே தினந்தோறும் புதிதாகப் பஞ்சைவைக்கலாம்.

(5) எக்ஸ்டிராக்ட் பெல்லடோனா லிக்விட் (Extract Belladonnae Liquid) இதை அடிவயிற்றில் தடவி வரலாம்.

குறிப்பு:—4-ம் இலக்க மருந்தையும் உபயோகித்து 5-ம் இலக்கமருந்தையும் பூசி வரலாம்.

கருப்பை இறக்கம்—Prolapsus Uteri

கருப்பை தன் இயற்கை ஸ்தானத்தை விட்டு அகன்றுபோவதற்கு, கருப்பை இறக்கம் அண்டம் தள்ளுதல்; கர்ப்பப் பிரச்சம் என்றுசொல்லப்படும். (1) கருப்பை சற்று இடத்தைவிட்டுக் கன்றிருத்தல் (Relaxation) (2) யோனி பாதையின்மேல் தொங்கிக்கொண்டிருத்தல் (Prolapsus) (3) கடிதடத்திற்குமேல் வெளிப்பட்டு, விடபத்தினருகில் தொங்கிக் கொண்டிருத்தல் (Procidentia) ஆக மூன்றுவிதமாகக் கருப்பை தன் ஸ்தானத்தைவிட்டுக் கன்றிருக்கலாம்.

பிரசவித்ததற்குப் பின் சீக்கிரத்தில் எழுந்து நடமாடினதாலாவது; கருப்பையைப்பற்றி யிருக்கும், சவ்வின் பலயிைத்தினாலாவது, பிரசவத்திற்குப் பின் கருப்பை இயற்கைக் கதிகமாய் பெருத்துப் போவதினாலாவது, கருப்பை இறக்க மேற்படலாம். அதி சீக்கிரத்தில் பெண்கள் ருதுவாகி விடுவதினாலாவது, தாமதித்து ருதுவாவதினாலாவது, கர்ப்பாயசத்தில் இரத்தப்பெருக் கேற்பட்டதினாலாவது, அளவுக் கதிகமானபுணர்ச்சி, கீழேவிழுவதால் கருப்பையடிப்படுதல், குதித்தல், தாவுதல், பருவைமுக்கிதன்குதல் முதலிய காரணங்களினாலாவது, நீடித்த இருமல், ஓயாத வரந்தி, நான்பட்ட அஜீரணம், நான்பட்ட மலச்சிக்கல், மூலம் முதலிய ரோகத்தினாலாவது, சரீரதளர்ச்சியினாலாவது, கருப்பை இடம்விட்டு அகன்று போகலாம். பிரசவத்திற்குப் பின் உண்டாகும் கருப்பைஇறக்கத்திற்குச் சஸ்திரசிகிச்சையினுமடும்பயனடையலாம்.

■ விஷமானது வெளிப்பிரயோகமாக மட்டும் உபயோகிக்கவேண்டும்.

உபகரிண சிகிச்சை

- (1) ரோக ஸ்திரீயை மல்லாக்காய்ப் படுக்க வைத்து முழங்கால்களை வயிற்றோடணைத்துக்கொள்ளும்படிச் செய்து, பிரிஷ்டத்தின் (பிட்டம்) கீழ் உயரமாக ஒரு தலையணையை வைத்து, இடுப்பை உயரப்படுத்திப் பின்னர், கருப்பையின்மேல் சிற்றமணக்கெண்ணெயைத் தடவி, மெதுவாக யோனிக்குள் தள்ளி விடவேண்டும். அப்படி உன்செலுத் தியவுடன் படிசாரம் ரூபாயெடை 1-ம், தண்ணீர் அவுன்ஸ் 12-ம் சேர்த்துக் கரைத்த தண்ணீரில் கடற் பஞ்சையாவது (Sponge) மிருதுவான துணியையாவது ஈனத்து யோனிக்குள் செலுத்தி, வைக்கவேண்டும். தினந்தோறும் கடற்பஞ்சியைச் சுத்தம்செய்து படிசாரத்தண்ணீரில் ஈனத்து வைக்கலாம். இவ்வித சிகிச்சையால் பயனுண்டானால், ரோக ஸ்திரீயை ஒருபுறம் சாய்ந்து படுக்கும்படி செய்யலாம். இந்த நிலையில் வியாதி தீரும்வரை படுத்திருக்க வேண்டும்.
- (2) மேல்சொல்லிய சிகிச்சையால் பயனுண்டானபின்னும், கருப்பை இறங்கி விடாதபடி மெஞ்சி பாசரீஸ் (Menge Passeries) கீரங் பாசரீஸ் (Gehrung Passeries), ஹெவ்விட் பாசரீஸ் (Hawitt Passeries) முதலிய தடை வளையங்களை உபயோகித்து வரலாம்.

கருவிப்புருதி—Uterine Cancer

இதைக் கர்ப்பவிப்புருதி யென்றும் சொல்லப்படும். பரங்கிரோசம்; பிரமேக ரோகமுள்ள ஆடவர்களின் செயற்கையால் கருங்குழி, கர்ப்பப் புருதி முதலியவைகள் புண்பட்டு இந்த ரோகம் உண்டாகிறது.

ஆரம்பத்தி லதிகமான தலைவலி, வயிற்றுவலி, அரையின் கீழ் பாகங்களில் குத்துவலி முதலியவைகளும் கண்டு, சம்போகத்தில் அதிகமான இம்சையை புண்டுபண்ணும்; புணர்ச்சிக்குப் பிறகு வயிற்றுவலி புண்டாகும்; கடினமான வயிற்றுவலியுடன் சூதகம் கட்டிக்கட்டியாய் வெளிப்படும். சூதகம் வெளிப்பட்டவுடன் வயிற்றுவலி நின்றுவிடும்; சில சமயங்களில் சூதகத்துடன் சீழ் கலத்திருக்கும், யோனியிலிருந்து கசியும் தண்ணீரானது துர்நாற்றத்துட னிருக்கும். கடிதடம் யோனித் துவாரம் இவைகள் சிவந்து வீங்கி வலியா யிருக்கும்.

சிகிச்சை

- (1) ஒரு முற்றின தேங்காயைத் துளையிட்டு அதனுள் தூதுவேளைப்பழம் ரூபாயெடை 2-ம், எருக்கம்பால், கொடிக்கள்ளிப்பால் வகைக்கு தேக்காண்டி ஒன்றையும் விட்டு, ஆப்பால் வாயை முடி சாணியைக் களமாய் அப்பி, ஓடு கருகும்மட்டும் நெருப்பில் புரட்டியெடுத்து, ஒட்டை நீக்கி தேங்காயையும், மருத்தையும் அப்படியே அரைத்துக் கழற்சிக்காய்ப் பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்து வைத்துக்கொண்டு, தீண்டலானது முதல் 5-நாளைக்கு காலை மட்டும் கொடுத்து வரலாம்.

தறிப்பு—பேதியானால் குளிர்ந்த தண்ணீர் கொடுக்கவும் பசுமோர் சாதம் மட்டும் தான் கொடுக்க வேண்டும்.

(2) விழுதியெண்ணெய்; ஸ்ரீதேவியெண்ணெய் இவைகளைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(3) ஆலிட் சாலிசிலிக் (Acid Salicylic)	கிரான்ஸ்	6
சோடியம் சாலிசிலஸ் (Sodium Salicylas)	டிராம்	6
டிஞ்சர் யூகலிப்டஸ் (Tincture Eucalyptus)	"	6
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	6

ஒன்று சேர்த்துக் கருப்பைக்குள் பீச்சாக்குமூலால் நாள் ஒன்றுக்கு 3, 4, தடவை அடித்துச் சுத்தம் செய்து வரலாம்.

கர்ப்பசன்னி—Hysterical Fits

இருதய வியாதிக் கிருந்தாலொழிய கர்ப்பசன்னி அநேகமாய் ஏற்படுவ தில்லை. பிரசவ காலங்களின் சமீபத்தில் கர்ப்பசன்னி உண்டாகு மானால் பிரசவம் சீர்கேடாகவே முடியும்.

அதிபலயினத்தால் நரம்பு தளர்ச்சியடைந்து விடுவதினாலும்; நீடித்த வயிற் றோட்டம்; கீண்டநாள் தூக்கமின்றி யிருத்தல், சீலையை அழுத்தமாய்க் கட்டுதல், காற்றோட்டமில்லாத விடங்களில் வசித்தல், பெரும்பாடு, கோபம், பயம் முதலிய காரணங்களினால் இந்நோய் ஏற்படலாம்.

கர்ப்பசன்னி ஏறக்குறைய காக்கைவலியை ஒத்திருந்தாலும், வெகுவான வித்தியாச மிருக்கும்; கர்ப்பசன்னியில் நெஞ்செரிவும் புளித்தேப்ப முண்டாகும்; ஓயாமல் கொட்டாவி வரும்; முகம் வெளுத்திருக்கும்; பார்வை மரத்தப்படும்; காதில் ஓர்வித இரைச்சலேற்படும்; செய்கைகள் பயித்தியம் பிடித்ததைப்போல விரும்பும்.

சிகிச்சை

மூர்ச்சையா யிருக்கும்போது:—

- (1) குளிர்ந்த தண்ணீரை முகத்தி் லடிக்கலாம்.
- (2) கஸ்தூரியை முகாச் கொடுக்கலாம்.
- (3) அமோனியம் கார்போனசை (Ammonium Carbonas) முகாச் செய்யலாம்.
- (4) ஸ்ரீதேவியெண்ணெயைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.
- (5) குளோரல் ஐட்ரஸ் (Chloral Hydras) கிரான்ஸ் 15
பொட்டாஸியம் புரோமைட் (potassium Bromide) " 20
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti) டிராம் 1
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து 2-மணி நேரத்திற் கொருதாம் இப்படிச் கொடுத்து வரலாம்.

கிரமாதீதச் சூதகம்—Irregular Menses

இருபத்தெட்டு நாட்ளுக்குக் கொருமுறை வெளிப்படவேண்டிய சூதகம், குறித்த நாட்களுக்குமுன், 2, 3-தாம் கண்டு மறைந்து போவதையும், இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு தீண்டலாகாதிருப்பதையும், கிரமாதீத சூதகரோகம், ஒழுங்கின் சூதகரோகமென்று சொல்லப்படும்.

சுகாதாரக் குறைவான வாசம், சதா உட்கார்ந்து பொழுதுபோக்குதல், சரீர ஆரோக்கியக் குறைவு, ஜீவதாதுப் பொருளற்ற ஆகாரம் முதலியவைகளால் ஏற்படலாம்.

சிகிச்சை

- | | | |
|---|----------|----|
| (1) குமட்டிக்காய் குழம்பு; ஸ்ரீதேவீ எண்ணெய் இவற்றைக் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-பாகம் பார்க்கவும். | | |
| (2) கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine Sulphus) | கிரான்ஸ் | 6 |
| ஆவிரிட் சல்பியூரிக் அிட் (Acid Sulphuric Dil) | துளி | 12 |
| பெர்ரி சல்பஸ் (Ferri Sulphus) | கிரான்ஸ் | 6 |
| எப்சம் சால்ட் (Epsom Salt) | டிராம் | 4 |
| ஸ்பிரிட் மெந்தா பிப் (Spirit Mentha Pip) | துளி | 15 |
| தண்ணீர் | அவுன்ஸ் | ■ |

முதலில் கொய்னைன் சல்பைசை, சல்பியூரிக் அசிட்விடில் விட்டுக் கரைத்துக்கொண்டு ஸ்பிரிட் மெந்தாபிப் நீக்கலாக மற்றவைகளையும் சேர்த்து தண்ணீர் விட்டரைத்து வடிகட்டிக்கொண்டு, பின் ஸ்பிரிட் மெந்தா பிப்பை சேர்த்துக் கலந்து நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒருஅவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

குய்யத்தில்காணும் தினவு—Pruritis Vulva.

“கர்ப்ப ஸ்திரீகள் மர்மஸ்தான எரிவென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

சூதகக் கட்டி—Polypus Uteri

கிரமமாய் வெளிப்படவேண்டிய சூதகம் கொஞ்சமேனும் வெளிப்படாமல், அதிக வாயுவினால் கருப்பையில் தானே உருண்டு திரண்டு பெருத்துப் போவதற்கே சூதகக்கட்டி, இரத்தக்கட்டி, உதிரக்கட்டி, கர்ப்பபூலை, கந்தூலை, சூலமகோதாம், சோணிதக்கட்டி, சோரீக்கட்டி என்று சொல்லப்படும்.

சூதகக்கட்டி புள்ளவர்களுக்கு, கர்ப்பஸ்திரீக் குண்டான சகலகுறி குணங்களு மேற்படும். மேலும் போகத்தில் வெறுப்பு, பசி மந்தம், தேக வெறுப்பு, ஸ்தனம் விம்முதல், ஸ்தனத்தில் கருவளையம் (Areola) ஏற்

படுதல், வயிறு பெருத்தல், மார்துடிப்பு, வாந்தி, ஆயாசம், அரோசிகம், ஸ்தனங்களில் பால் சுரக்குதல், முதலிய கருப்பற்றியதைப்போலுள்ள குறிகளெல்லாம்தோன்றும். கருப்பையில் ஆரம்பத்திலேயே துடிப்பேற்படும்; பிரசவ வலிகண்டு இந்தக்கட்டிவெளிப்படும். சிலருக்கு அலுக்கத்தாலும்; ஆயுதத்தாலும் வெளிப்படுத்தலாம். இதைப்பற்றி 7-ம் பக்கம், “பொய் சுரப்பம், மெய்க் சுரப்ப” மென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

சிகிச்சை

(1) வெடியுப்பு	ருபாயெடை	1½	சீரகம்	ருபாயெடை	9
இந்தப்பு	”	1½	நவாச்சாரம்	”	9
கறியுப்பு	”	1½	சத்திச்சாரம்	”	9
கல்லுப்பு	”	1½	வாய்விளங்கம்	”	9
வளையலுப்பு	”	1½	வால்மிளகு	”	9
கடுக்காய்	”	1½	பெருங்காயம்	”	9
மிளகு	”	1½	கோஷ்டம்	”	9
கடுகுரோகிணி	”	1½	கருஞ்சீரகம்	”	9

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து, ஒரு முற்றிய தேங்காயைத் துளையிட்டு அதில் செலுத்தி, ஒருவாரம் வரையில் பூமியில் புதைத்து வைத்திருந்து எடுத்து, ஒட்டை நீக்கி தேங்காயையும் மருந்தையும் மைபோலரைத்துக் காலி மாலை கழற்சிக்காய் எனவு கொடுத்து வரலாம். (இச்சா பத்தியம்.)

(2) ஸ்ரீதேவியெண்ணெய்; குமட்டிக்காய் குழம்பு முதலியவை கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(3) எக்ஸ்ட்ராக்ட் எர்காட் லிக்விட் (Extract Ergot Liquid) துளி	45
* டிஞ்சர் நக்ஸ் வாமிகா (Tincture Nux Vomica)	” 30
* டிஞ்சர் டிஜிட்டாலிஸ் (Tincture Digitalis)	” 15
டிஞ்சர் கொய்னைன் (Tincture Quinine)	டிபாரம் 2½
ஆக்குவா குளோரோபாரம் (Aqua Chloroform)	” 2½
தண்ணீர்	அவுன்ஸ் 2½

ஒன்று சேர்த்து, நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று தடவை ஆகாரத்திற்குப் பின் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

குதகக் குறைவு—Menstrua Exilia

கிரமமாகத் தீண்டல் காலங்களில் 5, 6-அவுன்ஸ் வெளியாகவேண்டிய குதகமானது, கலங்கலாகவும், கருத்தும், தடித்தும், கொஞ்சமாகவும், திரோகரோகியக் குறைவினால் வெளிப்படுமானால், அதை குதகக் குறைவு, குதகச்சுருக்கம் என்று சொல்லப்படும்.

■ விஷமானது ஜாக்ராதையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

திண்டல் காலத்தில் யாதொரு உபத்திரவமுமின்றி சூதகம் கொஞ்சம் அளவில் பட்டால், அது திகை பிரக்கிருதியின் பயனாயிருக்கலாம். அதற்கு சிகிச்சை தேவையில்லை; திண்டல் சமயத்தில் உபாதைகளேற்பட்டால் "சூதகக் கட்டு" க்குச் சொல்லிய சிகிச்சைகளைச் செய்யவேண்டும்.

சூதக சந்திரி—Hysteria

அதிகமான நரம்பு பலவீனம்; கிராமமாக சரீரத்திலிருந்து கழிப்பவேண்டியது கெட்ட இரத்தம், நல்ல இரத்தத்துடன் சேர்ந்த விஷமித்துப் போதல்; இரத்தப்பெருக் கதிகமாகி, இருதயம், மூளை இவைகளைத் தாக்குதல், முதலிய காரணங்களினாலாவது; சூதக்கட்டு, பெரும்பாடு, பிரமேசம், நீடித்த வயிற்றோட்டம், முதலிய ரோகங்களினாலாவது; அடிக்கடி கருதரித்தல், நீடித்த நாட்களுக்கு பால் கொடுத்தல் முதலிய வழக்கங்களின் காரணமாகவாவது; நரம்புகளின் இயற்கைக்குணம் கெட்டு சந்திரோகமாக மாறி விடுகிறது.

சூதகச்சந்திரி, காக்கை வலிப்பைப் போலின்றி ஆரம்பத்திலேயே, நிதானத் துடனிருக்கும், ஓயாத சிரிப்போ, அழுக்கையோ வேற்படும், நரநர வென்ற பற்கடிப்பும், கைகளால் முறுக்கு விடுவதைப்போன்று திருப்புதலு மேற்பட்டு, ரோகி தலைமயிரைப்பற்றி இழுத்துக்கொள்ளுவான்; நாக்கையும், கையையும் கடித்துக்கொள்ளுவான்; சிலருக்கு இந்த வலிப்பு விட்டு விட்டு வரும், வலிப்புக் கண்டிருக்கும் சமயம், தலையை ஒருவர் அழுத்திக்கொண்டிருப்பது போலாகிலும், மார்பில் ஏதோ உருண்டையாக அடைத்துக்கொண்டிருப்பது போலாகிலும் தோன்றும, இடதுபுற அடிவயிற்றில் வலியும், இரைச்சலுமுண்டாகும், சன்னியின் கோளாறுகள் தானாகவே சமரச மடைந்தவுடன், கண்களில் நீர்வடியும், மூத்திரம் அதிக அளவில் தெளிந்து இறங்கும், இவையே இந்துக்கள் பேய் பிடித்ததென்றுக் கூறுவர்.

சிகிச்சை

இழுப்புக் கண்டிருக்கும் சமயம்:—

- (1) துணிப்புகை பிடிக்கலாம்.
- (2) நெஞ்சிலும், கிரகிலும் குளிர்ந்த தண்ணீரால் அடிக்கலாம்.
- (3) அமோனியம் கார்போனவை (Ammonium Carbonas) முகாச் செய்யலாம்.

இழுப்புவிட்டபின் இவரு வீரேசன காரிகளால் மலத்தைக் கழிக்கச் செய்து கீழ்க்கண்ட மருந்துகளைக் கொடுத்து வரலாம்.

- (4) ஸ்ரீதேவி எண்ணெய்; ஏகாதசிச் சென்னுரம் கொடுத்து வரலாம் செய் முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.
- (5) கொய்னைன் வெலிரியன் (Quinine valerian) கிரைன்ஸ் 24
சிங் வெலிரியன் (Zinc Valerian) " 24
பெர்ரிவெலிரியன் (Ferri Valerian) " 24

ஒன்று சேர்த்து 24-மாத்திரைகளாகப் பிரித்து உருட்டிக்கொண்டு, நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒரு மாத்திரை வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

குதகப்பாண்டு—Chlorosis

இவ்வியாதி சரம்த்தை வெளுக்கச்செய்து, மஞ்சள் அல்லது பச்சை நிற மாக்கி விடுவதால் ஆங்கிலத்தில் பச்சை வியாதி (Green Disease) என்று கூறுவர். குதகப் பாண்டிற்கும், பாண்டிற்கும் வித்தியாசமுண்டு. நிரண நரம்புகளின் பலவீனத்தால், இரத்தம் நீர்த்துச் குதகப்பாண்டு உண்டாகுகின்றது. சிறுகுட லுட்புறங்களில் நீடித்த வீக்கம்; சிறுகுடலை சுற்றி யிருக்கும் சவ்வின் வீக்கம்; மர்மஸ்தானம் அளவுக்கதிகமாய் பெருத்து விடுதல்; கருப்பை, சினைப்பானை இவைகளின் கோளாறுகள் முதலிய உருப்புகளின் விகல்பத்தினாலாகிலும்; ஆகாரத்தை ஜீவ சத்துப்பொருளாக மாற்றும் பிரக்கிருதி குறைவேற்படுவதினாலாகிலும்; அதிகமான காதல் நினைவுகள் நினைத்தல், அதிகமான நித்திரை முதலிய செய்கைகளினாலாகிலும்; குதகப்பாண் டேற்படலாம்.

குதகப்பாண்டு ரோகத்தில் திரேகம் உஷ்ணமற்று, உடல் சில்லிட்டிருக்கும், குதகம் தடைப்பட்டாவது, கண்டும் காணாமலுமாவ திருக்கும், சுவாசம் தளர்ந்திருக்கும், நாடி நடை ஸ்நீனித்திருக்கும், ஜீரண சக்தி யற்று ஆகார வெறுப்புண்டாகும், சீமைச் சுண்ணாம்பு, செங்கற்பொடி, சாம்பல், கரி இவைகளின் பேரில் இச்சைபுண்டாகும்; இரைப்பைப் புண்பட்டு இரத்த வார்தியும், வாய் நாற்றமு மேற்படும், முகம் ஊதி, கண் குழிவிழுந்து, கண்ணிரப்பைகள் வீங்கி, வெள்ளைவிழி வித்தியா சமாகக் காணப்படும். கண்ணைச் சுற்றிலும், கருவளையம் ஏற்பட்டு மிருக்கும்; உதடுகள் வெளுத்திருக்கும், கணுக்கால் வீக்கம் கண்டதைப்போல் பெருத்துத் தெரியும், கைகள் சுருக்கம் கண்டு, நகங்கள் மிருதுவாகி விடும், அடிக்கடி மார் துடிப்பும், அரையின் கீழ் பாகங்கள் வீக்கமு மேற்பட்டு, ஒரு குறித்த நேரத்தில் நடுக்கமும், தலைவலியுமுண்டாகும்.

முட்டை, பால், நெய், மாமிச சத்துக்கள் (Soup) முதலிய பலகாரியான ஆகாரங்களைக் கொடுப்பதாலும், கடல் ஸ்நானம், குளிர்ந்த நீர் ஸ்நானம், திறந்தவெளி வியாயமங்கள் (Exercises) முதலியவைகளைச் செய்வதினாலும் பயனுண்டாகும்.

சிகிச்சை

- (1) திரிபுவனச் செந்தூரம், சித்தாதி லேகியம், மகா வில்வாதி லேகியம், மண்ரோச் செந்தூரம், ராஜசிந்தாதி லேகியம், அகஸ்தியர் குழம்பு, ராஜ அமிர்த சஞ்சீவி லேகியம், அசுவகெந்திச் சூரணம், முதலியவைகளைக் கொடுத்து, குமரி சஞ்சீவித் தைலம், ராஜாங்கக் கொம்பர்குத் தைலம் முதலியவைகளால் ஸ்நானம் செய்து வரலாம். செய்முறை 6-பாகம் பார்க்கவும்.

(2) டிஞ்சர் பெர்ரி பெர்குளோரைட் (Tincture Ferri Perchloride)	டிடிராம்	2
ஸ்பிரிட் எதர் (Spirit Aether)	"	2
டிஞ்சர் குவாஷியா (Tincture Quassiae)	"	2
* டிஞ்சர் நகஸ் வாமிகா (Tincture Nux Vomica)	"	2

ஒன்றுசேர்த்து வைத்துக்கொண்டு காலை மாலை ஆகரத்திற்குப் பின் 2-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் ஒரு தேக்கராண்டி மருந்து சேர்த்துக் கொடுத்துவரலாம்.

திரளாத பெண்:—

திரளாத பெண்களைப் பூபிலிகளென்பர். மேலும், பரிபக்குவ மடையும் வயதில் ருதுவாகாததினால் தாமத ருது வென்றும் சோல்லப்படும். பெண்களுக்கு 16-வயதே ருதுவாகும் பருவமா யிருந்தாலும், நம் உஷ்ணப் பிரதேசத்தில் 10, 12-வயதில் ருதுவாகி விடுகிறார்கள். பெண்கள் 30-வயதுவரை ருதுவாகாம லிருப்பதை (1) போதிய வயதடைந்தும், வெளியுருப்புகளெல்லாம் தக்கவிதமாய் மாறுத லடைந்தும், ருதுவாகாதிருத்தல் (Emansio Mensium); (2) முதல் ருது கண்டு எக் காரணத்தினாலாவது மறு ருது காணாதிருத்தல் (Suppressio Mensium); (3) போதிய பருவமடைந்தும், சூதகம் சுரந்தும், சூதகம் வெளிப்பட முடியாமல் யோனிப்படலத்தில் (Hymen) துளைகளில்லா திருத்தல் (2-ம் பக்கம் பார்க்கவும்); அல்லது, கருப்பையி லுண்டாகும் கட்டி, புண் முதலியவைகளால், கருப்பையின் வாய் அடைப்பட்டு சூதகம் வெளிப்படா திருத்தல் (Retentio Mensium); ஈன 3-பிரிவாகப் பிரிக்கலாம். முதல் இரண்டையும் மருந்து பிரயோகத்தால் சொஸ்தம் செய்யலாம். ஏனையதை சஸ்திர சிகிச்சையினால் மட்டும் பயனுண்டாகச் செய்ய முடியும்.

பொதுவாகக் கருப்பையில் அளவுக்கதிகமான குளிர்ச்சியோ, உஷ்ணமோ அதிகரிப்பதினாலாகிலும், அடிக்கடி விழித்திருத்தல், சிறு வயதிலேயே கஷ்டமான உழைப்பு, சத்தில்லாத ஆகாரம், அநேக சமயங்களில் பசியுடனிருக்க நேருதல், இரத்தம் வார்தியாகவாவது, மூக்கினாலாவது வெளிப்பட்டு விழுதல் முதலிய காரணங்களினாலாவது; கூய ரோகம்; மலச்சிக்கல், நான்பட்ட வயிற்றோட்டம், சூதகப்பாண்டு முதலிய ரோகங்களினாலாவது; 30-வயது வரையில் ருதுவாகாம லிருக்கலாம். ருதுவாகாத பெண்களுக்கு, ஆடவரிடத்தில் வெறுப்பு, சோம்பலும் உண்டாகி உடல் பெருத்து மதத்திருக்கும்.

தக்க வயதடைந்தும் சூதகம் வெளிப்படாமல் அடிவயிற்று வலி, தலையில் ஏதோ நினைந்திருப்பதைப்போன்ற பாரம், மூக்கிலிருந்து அடிக்கடி இரத்தம் வடிதல், மார்துடிப்பு, குறுமூச்சு, முழங்காவில் வீக்கம், நெஞ்சுக்குழி வலி, முதலு, துடையின் உப்புறம் வலி முதலிய கோளாறுகளேற்பட்டால், இயற்கையாகச் சூதகம் வெளிப்பட்ட

* விஷமானது ஜாக்ரதையாக உபயோகிக்க வேண்டும்.

பிரயத்தனப்படுவதற்கு அடையாள மாகுமாதலால், இதன் கீழ் குறித் திருக்கும் சிகிச்சை முறைகள் பயனுடையதாக விருக்கும்.

பருவவயதையடைந்தும், ருதுவாகாததினால் திரேகபிரக்கிருதியில் யாதொரு மாறுதலும், கோளாறுகளு மேற்படாதிருப்பின், அவர் களுக்கு காரமான ருதுவர்த்தனக்காரிகளை (Emmenagogues) க் கொண்டு ருதுவாகச் செய்யப்பிரயத்தனப்படுவது, ஒரு பலனையும்ளிக் காமல் விபத்தையே உண்டு பண்ணலாம்.

வயதுவந்தும் ருதுவாகாமலிருக்கும் பெண்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே சிகிச்சை செய்யவேண்டும். இரத்த விருத்தியை தரும்படியான ஆகாரங் களைக் கொடுத்து, எப்போதும் திரேகத்தை விசேஷமாக, பாதங்களையும் அடிவயிற்றையும் உஷ்ணமாக வைத்திருக்கவேண்டும். தாங்கும்படி யான (50, 60-டிகிரி உஷ்ணமுள்ள) சுடுதண்ணீரில் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். ஒரு பெரிய தொட்டியில் சுடுதண்ணீரைவிட்டு அதில் தின மானம் 10, 15-மிமிஷநேரம் உட்காரச் செய்யலாம்.

சிகிச்சை

(1) ■ அகஸ்தியர் குழம்பு; அயச்செந்நூர்; அயக்காந்தசெந்நூர்; இவற் றைக் கொடுத்து இரத்த விருத்தி புண்டபண்ண பின்பு, 5-கிரான்ஸ் மூசாம்பரத்தைப் பாலில்லரைத்துக் காலே மாலே கொடுத்து வரலாம்.

(2) டிஞ்சர் பெர்ரி பெர் குளோரைட் (Tincture Ferri
Perchloride) துளி 15
டிஞ்சர் ஆலோஸ் (Tincture Aloes) " 15
† லைக்கர் ஸ்டிரிக்னைன் ஐட்ரோகுளோரைட் (Liquor
Strychnine Hydrochloride) துளி 8
ஸ்பிரிட் குளோரோபாரம் (Spirit Chloroform) " 30
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 3

ஒன்று சேர்த்து, நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுதடவை, ஆகாரத்திற்குப் பின் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் நீடித்தக் கொடுத்து வரலாம்.

குறிப்பு:—இதனால் வயிற்று வலி யேற்பட்டால் மருந்தை நிறுத்திக் கொள்ளவும்.

நிதம்பச் சூலை:—

அநேகமாக இவ்வியாதி பிள்ளைபெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே தாக்கக்கூடியதாக விருக்கிறது. இது கருப்பையின் வாயில் முளைப்போலுண்டாகி, பிதுங்கி, யோனிப்பாதைவரையில்வளர்ந்து சம்போகத்திற்குஇடைஞ்சலாகவிருக்கும், நடக்கும்போதும், உட்காருமபோதும் அம்முனையசைக் கப்படுவதால், தாங்கமுடியாத கூச்சமுண்டாகி, தன்னை யறியாமலே சிறுநீரிற்ஈங்கிவிடும், சதாகாலம், அம்முனையிலிருந்து, நீர் கசிந்துகொண்

■ செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

† விஷமானது ஜாக்கையாக உபயோகிக்கவும்.

டேயிருக்கும்; இடுப்பு, அரை, முள்ளந்தண்டு, இவைகளில் வலியுண்டாகும்; இதனால் திரோகமிளைத்து வெளுத்திருக்கும்.

சிகிச்சை

(1)	வெள்ளைப்பூண்டுரூபாயெடை	50	தில்பிலி	ரூபாயெடை	1 1/2
	இந்துப்பு	■	1/2	கொடிவேலி	” 1/2
	தேவதாரு	”	1/2	சிவதைவேர்	” 1/2
	நெல்லிவற்றல்	”	1/2	சிறுமணக்கெண்ணையுவுன்ஸ்	18
	தான்றிக்காய்	■	1/2	வெள்ளாட்டுப்பால்	” 48
	கடுகு	”	1/2	கொடிக்கள்ளிப்பால்	” 12

முதலில் வெள்ளைப்பூண்டை 10 டமிளர் தண்ணீரில் போட்டு, நாலி லொன்றாகக் சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தில் இதர சரக்குளையரைத்து, அந்தக்ஷாயத்தில்லக்கி, எண்ணெயையும், பால்சுவையும் சேர்த்துக்காய்ச்சி வடித்து, காலையில் மட்டும், ஒரு தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்)

(2) கலிங்காதி எண்ணெய்; கும்மட்டிக்காய் குழம்பு; ருத்திர சென்னரம் இவைகளைக் கொடுத்து வரலாம் செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

பாண்டு—Anaemia.

இரத்தத்திலுள்ள சிவந்த இரத்தாணுக்கள் குறைந்து, இரத்தம் நீற்றுப் போவதால் இந்த இரத்தக் குறைவுரோகம் சம்பவிக்கிறது. பாண்டு ரோகத்திற்கும், இதக்கப்பாண்டு ரோகத்திற்கும் வித்தியாசமுண்டு.

முகம், கண்ணிரைப்பைகள், நாக்கு, உதடு, பல்லீறுகள் இவைகள் நிறமாறி வெளுத்திருக்கும்; அரையின்கீழ் அவையவங்கள் வீக்கம் கண்டிருக்கும், நாடி நடை கூடினித்து மெலிந்து நடக்கும், பசிமந்தம் அசதி சோம்பல், மார்துடிப்பு, முதலியவைகளேற்படும், சரம்ம் வரண்டு, தோலுரிந்த தைப்போலிருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) திரிபுவன சென்னரம் அயக்கார்த சென்னரம் இவைகள் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(2)	கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine Sulphus)	டிராம்	1 1/2
	பெர்ரம் ரெட்டாக்டம் (Ferrum Redactum)	”	1
	■ எக்ஸ்டிராக்ட் நக்ஸ் வாமிசா (Extract Nux Vamica)	ஹைரைன்ஸ்	■
	* ஆலிட் ஆர்சனியோசம் (Acid Arseniosum)	”	1
	எக்ஸ்டிராக்ட் கலோசிந் கோ (Extract Colocynth Co)	”	10
	பொடோபிலின் (Podaphyllin)	”	■

ஒன்று சேர்த்து 60-மாத்திரைகளாகப் பிரித்து உருட்டிக்கொண்டு நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுதடவை ஆகாரத்திற்கு பின் ஒரு மாத்திரை வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

■ விஷமானது ஜாக்ரதையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

பெரும்பாட்டில் காணும் தாகம்—

பெரும்பாட்டைப்பற்றி 349-ம் பக்கம் இரத்தப்பெருக்கு என்ற தலைப்பின் கீழ் கூறப்பட்டிருக்கிறது, பெரும்பாடு ரோகத்தில் சூதகம் பிரவாக் மாகக் கழியுமானால், தாக்கமுடியாத நாவரச்சிபும், மூர்ச்சையுமேற்படும்.

சிகிச்சை

- (1) அத்திக்கொழுந்துருபாயெடை 3 அரகங்கொழுந்து ரூபாயெடை 3
ஆலகொழுந்து ,, 3 மாந்தளிர் ,, 3

ஒன்று சேர்த்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 3-அவுன்ஸாகச் சண்டக்காய்ச்சிய கஷாயத்தைக் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) மகாதாளிச பத்திரிச் சூரணம் கொடுக்கலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்த்தவும்.

- (3) ஆவீட் பாஸ்பரிக் டில் (Acid phosphoric Dil) டிராம் 2
பார்லி அரிசிக்கஞ்சிரீர் (Barley Water) அவுன்ஸ் 20
ஒன்று சேர்த்து, 2, 3-அவுன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

விகாரசூதகம்—Micarious Menstruation

மாதாந்திர தீண்டல் காலங்களில் கிரமமாக யோனிவழியாக வெளிப்பட வேண்டிய சூதகமானது, ரோகத்தினால், ராசியின் வழியாகவும் ஆசனத் தின்வழியாகவும், வாய், தொப்புள், காது முதலிய துளை புள்ள பாகங்களின் வழியாகவும் கழிந்து விடும். புண் புரையுள்ளோருக்கு அர்த்தப் புண்ணு-ள்ளவழியாகவும், சிலருக்குக் கண்வழியாகவும், சூதகம் வெளிப்படும். துளையீரல், மார்பு, வயிறு, கை, கால் முதலிய அவையவங்களில் இரத்தப் பெருக்கேற்பட்டுச், சமசீர்த்திலிருந்தும் சற்றுவிடக்கி வலியை யுண்டிபண்ணும். சிலருக்குச் சூதகமானது வெள்ளைப் பிரமேகத்தில் வெள்ளைப் பதார்த்தத்தைப்போல கிறமாறி அதிக அளவில் வடியும். இதையே விகார சூதக ரோக மென்று சொல்லப்படுகிறது.

விகார சூதக ரோகத்திற்கு ஆரம்பத்திலேயே சிகிச்சைகள் தேடாவிடில் தீவகே வினையலாம். உபசார்தியாக ஒருபெரிய தொட்டியில் சுடுதண்ணீரைவிட்டு நான்தோறும் கூலமாவே அதில்குறைந்தது 10, 15-நிமிஷ மாகிலும் உட்கார்ந்திருக்கச் செய்யவேண்டும். அவ்வாறே பாதங்களையும் வெந்நீரில் வைத்திருக்கவேண்டும். வியர்வை புண்டாகும்படியான தேகாப்பியாசங்கள் (Exercises) செய்யும்படியாக உத்தரவிடவேண்டும். திரேக புஷ்டியைத் தருமபடியான ஆகாரங்களையும், சூதகபந்தத் திற்குச் சொல்லிய அஷ்டதங்களையும் கொடுத்து வரலாம்.

சிகிச்சை

- (1) ஸ்ரீதேவி எண்ணெய் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்த்தவும்.

ஸ்திரீ பால சிகிச்சை

ஐந்தாம் பாகம்

கர்ப்ப; பிரசவ ரோகங்கள்

DISORDERS AND TREATMENTS IN PREGNANCY AND AFTER LABOUR

கர்ப்பச்சன்னி:—

358-வது பக்கம் பார்க்கவும்.

கர்ப்பவதிகள் அரைவலி:—

கர்ப்பவதிகள் முதுகுவலி யென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

கர்ப்பவதிகள் ஆகாரவெறுப்பு:—

கர்ப்பவதிகள் பசிமந்த மென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

கர்ப்பவதிகள் இடுப்புவலி:—

கர்ப்பவதிகள் முதுகுவலி யென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

கர்ப்பவதிகள் இரத்தபேதி—Dysentery in Pregnancy

இதைக் கர்ப்பக்கிராணி என்று சொல்லப்படும். திரேகம் காக்ஸையடை தல், அதிக பசியுடனிருத்தல், அதிக காரமான பதார்த்தங்களைப் புசித் தல், வெயிலிலிடைதல் முதலிய காரணங்களினால் இதயேற்படலாம்.

கர்ப்பக்கிராணி அநேகமாய் எல்லோருக்கு முண்டாவதில்லை. இது பிரசவத் திற்குப்பின் யேற்படுமானால், எந்த மருந்துக்கும் வசப்படாது. இதில் சாதாரண வயிற்றோட்டத் திற்குண்டான குணங்களே யிருக்குமானாலும், மலத்துடன் இரத்தம் அதிகமாய்க் கழியும். கர்ப்பக்கிராணி சிகிச்சை க்கு வசப்படாவிட்டால், கண்டிப்பாய் கருவழிவேரப்படும்.

சிகிச்சை

- (1) நிறுமணக்கெண்ணெய் எலுமிச்சம்பழச்சாறு தேக்கரண்டி 2
தேக்கரண்டி 8 சர்க்கரை ,, 1
ஒன்று சேர்த்துக் காலை நேரங்களில் மட்டும் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) சுக்கு ருபாயெடை 1 மாம்பருப்பு ருபாயெடை 1
தீப்பிலி ,, 1 கறிவேப்பிலையீர்க்கு ,, 1
சேகம் ,, 1 சுண்டைவற்றல் ,, 1
ஓமம் ,, 1 கருவேலக்கொழுந்து ,, 1
கழிற்சிப்பருப்பு ,, 1

ஒன்று சேர்த்து, இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூரணித்துக்கொண்டு காலை மாலை ஒரு திரிகடிபிரமாணம் தேனில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

- | | | |
|---------------------------------------|----------|---------------|
| (8) டோவர்ஸ் பவுடர் (Dover's powder) | டிபிராம் | $\frac{1}{2}$ |
| சோடியம் கார்போனேட் (Sodium Carbonate) | " | $\frac{1}{2}$ |

ஒன்று சேர்த்து, 6-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு காலை மாலை ஒரு பாகம் வீதம் தேனில் குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

கர்ப்பவதிகள் இரத்த வாந்தி—Puerperal Haematemesis

கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கு நாள்களம் மாதம் கடையில் இரத்த நாளங்கள் இரத்தப் பெருக் கதிகரிப்பதினால் இருமலும், சில சமயம் இருமிய பின் இரத்தமும் விழுவதுண்டு. அநேகமாக எல்லா கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கும் இது உண்டாவதில்லை.

பிரதமத்தில் ரோகஸ்திரீயை மல்லாக்காய்ப் படுக்க வைத்து, ஈரத் துணியை அடிவயிற்றில் போட்டு வைக்கலாம்.

சிகிச்சை

- (1) பசும்பரலுடன் ஜஸைக் கலந்து கொடுக்கலாம்.
- (2) மாதளம்பழச்சாறு அவுன்ஸ்- $\frac{1}{2}$, தேன் அவுன்ஸ்- $\frac{1}{2}$ ஒன்று சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.
- (3) ஆரஞ்சுப்பழச்சாறு 2, 3 அவுன்ஸ் கொடுக்கலாம்.
- (4) ஆவரிட் டானிக் (Acid Tannic) கிரான்ஸ் 20
கிளிசரின் (Glycerine) டிராம் $\frac{1}{2}$
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்துக் கொடுக்கலாம். தேவையானால் இதே அளவில் 2, 3-தடவை கொடுத்து வரலாம்.

கர்ப்பவதிகள் இருமல்—Cough in Pregnancy

கர்ப்பவதிகளுக்கு, ஐந்தா மாதத்திற்குமேல், இருதய இரத்த நாளங்களில் இரத்தப் பெருக்கேற்பட்டு அதினால், சுவாசாசனங்களில் உஷ்ணமுண்டாகி இருமலேற்படலாம் இக்காலங்களிலுண்டாகுமிருமலினால், இடுப்புக்குப் கீழ் பாகங்களில் வலி, இரத்தவாந்தி, கருப்பையிலிருந்து இரத்தக் கசிவு, கித்திராயின்மை, மயக்கம் முதலியவைகளு முண்டாகும்.

அதிகமான இருமலினால், சுவாச உருப்புகளும், கருப்பை முதலியவைகளும் அதிர்ச்சி காண்பதினாலும், கருப்பை சுருங்குவதாலும், அல்லது, மூத்திரப்பை : கருப்பையை அழுத்துவதாலும், கருவுக்குக் கெடுதல் நேரலாமாதலால் பிரதமத்திலேயே சிகிச்சை செய்யவேண்டும். ஆரம்பத்தில் சிற்றாணக்கெண்ணெய், நிவவாஸகக் கஷாயம், கிரகோரிஸ் பவுடர் (Gregoris powder) முதலிய இவகு விரோசனகாரிகளால் குடலை சுத்தி செய்யவேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) சுடவைத்த பசும் பாலில் மஞ்சள் தூள் போட்டுக் கொடுத்து வரலாம்.
- (2) இஞ்சிச்சாறு அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$ தேன் அவுன்ஸ்
மர்துளம்பழச்சாறு ,, $\frac{1}{2}$
ஒன்று சேர்த்துக் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.
- (3)

தாவேளேவேர் ரூபாயெடை	1	கோஷ்டம்	ரூபாயெடை	1
கண்டங்கத்திரிவேர்	,,	1	அதிமதுரம்	,,
வட்டத்திருப்பிவேர்	,,	1	சிற்றாத்தை	,,
நன்னூரிவேர்	,,	1	அக்காரம்	,,
கோரைக்கிழங்கு	,,	1	ஏலம்	,,
சக்கு	,,	1	கிராம்பு	,,
திப்பிலி	,,	1	சாதிக்காய்	,,
மிளகு	,,	1	சிறநாகப்பூ	,,
கடுக்காய்	,,	1	இந்துப்பு	,,
நெல்லிவற்றல்	,,	1	கூடைநீர்	,,
தான்றிக்காய்	,,	1	வெங்காயம்	,,
ஓமம்	,,	1	மாசிக்காய்	,,
கருஞ்சீரகம்	,,	1	தேற்றுவிரை	,,

ஒன்று சேர்த்திடித்துத் தூள்செய்து, ஒரு புது ஓட்டில் போட்டு 9-தரம் வறுத்துச் சூரணித்துக் காலை மாலை ஒரு திரிகடி பிரமாணம் பசு நெய்யிலாவது, தேனிலாவது குழப்பிக் கொடுத்து வரலாம்.

- (4)

டிஞ்சர் காம்பர் கோ (Tincture Camphor Co)	டிபாம்	1
ஆவியிட் சிட்ரிக் (Acid Citric)	கிரைன்ஸ்	20
கிளிசரின் (Glycerine)	டிபாம்	1

ஒன்று சேர்த்துக் காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

கர்ப்பவதிகள் இழுப்பு:—

இதைப்பற்றி “பிரசவ இழுப்பு” என்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

கர்ப்பவதிகள் எச்சில் பெருக்கு—Puerperal Ptyalism

கருப்பற்றிய முதல் மாதத்திலேயே, கருதரித்திருப்பதான அறிகுறியாக எச்சில் பெருக்கும், காலை வாந்தியுமுண்டாகும். எச்சில் பெருக்கி னால் அரோசிகமும், வாய் மழமழப்பு மேற்படும்; சிலருக்குப் பிரசவம் வரையில் எச்சல் பெருக்கிருப்பதுண்டு.

சிகிச்சை

- (1) வறுத்த காப்பிக்கொட்டையை மென்றுகொண் டிருக்கலாம்.
- (2) படிகாரத்தைக் கரைத்த தண்ணீரால் வாய்வரசிக் கொப்புளிக்கலாம்,

(8) டிஞ்சர் (Tincture Myrrh)

தண்ணீர்

துளி 15

அவுன்ஸ் 2

ஒன்று சேர்த்து வாய் உரசிக் கொப்புளிக்கலாம்

கர்ப்பவதிகள் கல்லடைப்பு—Calculi in Pregnancy

மூத்திரக் குண்டிக்காயில் (Kidney) கற்கள் சேர்ந்து, மூத்திரம் பெய்யும் போது மூத்திரத்தாறை எரிவும், வலியுமுண்டாகும். இடிப்பு, அடிவயிறு மூத்திரப்பை, அரை இவைகளில் தாங்கமுடியாதவலி யேற்படும் சில சமயம் மூத்திரத்துடன் இரத்தம் கலந்திருக்கும். மூத்திரம் வரும் சமயங்களில் கைகால் குளிர்த்துவிடும். மூத்திரம் பெய்ய உணர்ச்சியுண்டாகி, மூத்திரம் பாதி பெய்யும்போதே அடைத்துக் கொள்ளும்.

சிகிச்சை

- (1) மாதாளம்பழவிரையைப் பசும்பாலிலரைத்துக் கலக்கி காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.
- (2) சிகப்பு கெருஞ்சில் விரையை முலைப்பாலி லரைத்துக் கலக்கி காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.
- (8) பொட்டாஷியம் கார்போனேட் (Potassium Carbonate) டிராம் 1
ஆஸிட் சிட்ரிக் (Acid Citric) 7
ஆக்குவா டிஸ்டில் (Aqua Distilled) அவுன்ஸ் 10

ஒன்று சேர்த்து, என் ஒன்றுக்கு மூன்றுதடவை, 5-தேக்கரண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

கர்ப்பவதிகள் காலை வாந்தி—Morning Sickness

இதை மசக்கை ; மசக்கை வாந்தி என்று சொல்லுவர். கருதரித்த இரண்டாம் மாதத் துவக்கத்தில், கருதரித்திருப்பதை மெய்ப்பிக்க காலை வாந்தியும், அரோசிகமும், தலைச்சுற்றும், சோம்பலும் ஏற்பட்டு 2, 3-வாரங்களுக்குப் பின் தானாவே நின்றுவிடும். சிலருக்குப் பிரசவம் வரையி விருப்பதுண்டு. மசக்கை வாந்தி பித்திய மாதங்களிலேற்பட்டாலும், சாயந்திரங்களிலுண்டானாலும், கருப்பையின் இறக்கமே காரணமாயிருக்குமாதலால் சிகிச்சை செய்வது உத்தமமாகும்.

சிகிச்சை

- (6) காய்ச்சிய பசும்பால் அவுன்ஸ் 6 சுண்ணாம்பு தெளிவுநீர் அவுன்ஸ் 1
ஒன்று சேர்த்து, அங்கி விழித்தவுடன் வெறும் வயிற்றில் கொடுத்து வரலாம்.
- (2) ■ பாவனக் கடுக்காய்; இஞ்சி சர்பத்; முதலியவைகளை ஆகாரத்திற்குப் பின் கொடுத்து வரலாம்.

* செய்யுறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

- (3) பெப்சின் (Pepsin) கிரான்ஸ் 10
இன்பியூஷன் காரியோபில்லம் (Infusion Caryophillum) அவுன்ஸ் 1
ஒன்று சேர்த்துக் காலேநேரத்தில் மட்டும் கொடுத்து வரலாம்.
- (4) இங்குளுவின் (Ingluvin) கிரான்ஸ் 10
பசும்பால் அவுன்ஸ் 6
ஒன்று சேர்த்துக் காலையில் மட்டும் கொடுத்து வரலாம்.

கர்ப்பவதிகள் சால்லீக்சம் — Puerperal Oedema of Legs

கர்ப்பம் தரித்த ஏழுமாதங்களுக்குப் பின்னரே இந்தவியாதியுண்டாகலாம், வயிற்றுதுபெருத்து, அரையின் கீழ்பாகங்களுக்குச்செல்லும், இரத்தக் குழல்களை அழுத்தி, இரத்தவோட்டத்தை தடை செய்வதால், மர்ம ஸ்தான வெளிபாகம், தொடை, முழங்கால் முதலியவைகளில் வீக்க முண்டாகும். இந்த வீக்கங்கள் பிரசவத்திற்குப் பின் மறைந்துவிடுமா தலால் பொதுவாக யாதொரு சிகிச்சையும் செய்யத் தேவையில்லை.

முத்திரத்தில் அதிகப்படியான உப்புசேர்த்து, வீக்கங்களுண்டாகி யிருக்குமானாலும்; இந்த வீக்கத்துடன், நீரடைப்பு, அரையின் கீழ்பாகங்களைத் தவிர்த்து உடலில் இதரபாகங்களில் வீக்கம் காணுதல்; கண் தெரித்து விழுந்துபோவதைப் போன்றவலி, நெற்றிவலி, காதிரைச்சல், முதலியவைகளு மிருக்குமானாலும்; பிரசவத்தில் உபத்திரவமாவது; பிரசவத் திற்குப் பின் விபத்தாவது ஏற்படலாம். நீரடைப்பினால் வீக்கம் கண் டிருப்பதாகத் தெரியுமானால், “கர்ப்பவதிகள் நீரடைப்பு” என்ற தலைப் பின் கீழுள்ள சிகிச்சைகளைச் செய்யவும். முதலில் இலகு விரேசன காரிகளைக்கொடுத்து மல சுத்திச் செய்யவேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) காமியை வீக்கமுள்ள விடங்களில் தடவி வரலாம்.
- (2) நீர்முள்ளி ரூபாயெடை 100 கொவ்வையிலே ரூபாயெடை 100
ஆலஞ்சருகு ,, 100 வீழியிலே 100
காக்கணம் ,, 100

ஒன்று சேர்த்துத்துண்டித்து, 100-டம்ளர் தண்ணீர்விட்டு, 25-டம்ள ராகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தை, வீக்கமுள்ள விடங்களில் ஊற்றி பிடித்து விடலாம்.

- (3) சுரைத்தண்டு ரூபாயெடை 5 நாயுருவி ரூபாயெடை 5
நீர்முள்ளி ,, 5 பிராமி ,, 5
கையாந்தகரை ,, 5 கோரைக்கிழங்கு ,, 5
நீற்றுப்பூசணித்தண்டு, 5 சுக்கு ,, 1½

ஒன்றுசேர்த்து 48-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு, 6-அவுன்ஸாகச்சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் காலே மாலை 1½, 2-அவுன்ஸ்வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

- | | | |
|---|---------|---------------|
| (4) ஜின் சாராயம் (Gin) | அவுன்ஸ் | $\frac{1}{2}$ |
| தண்ணீர் | " | 1 |
| ஒன்று சேர்த்துக் காலே மாலை கொடுத்து வரலாம். | | |
| (5) கிரீம் ஆப் டார்டார் (Cream of Tartar) | அவுன்ஸ் | 1 |
| சர்க்கரை (Sugar) | " | $\frac{1}{2}$ |
| * எலுமிச்சம் பழத்தோல் கஷாயம் | " | 3 |

ஒன்றுசேர்த்து, நன்றாகக் குலுக்கிக்கொண்டு, 4-மணி நேரத்திற்கொரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- | | | |
|--|--------|---|
| (6) டிஞ்சர் பெர்ரி பெர்குளோரைட் (Tincture Ferri Perchloride) | டிராம் | 1 |
| † டிஞ்சர் ஒபியம் (Tincture Opium) | " | 1 |
| தண்ணீர் | " | 4 |

ஒன்றுசேர்த்து வீக்கமுள்ள வீடங்களில் மேல்பிரயோகமாகத்தடவலாம்.

கர்ப்பவதிகள் குரண்டல் வாதம்—Puerperal Cramps

கர்ப்பவதிகளுக்கு 4-வது மாதத்திற்குப்பின் கர்ப்பாசயம் பெருத்து வீடு வதால், அடிவயிற்று நரம்புகள் பிசுத்தப்பட்டு, அடிவயிறு முழங்கால், குதிகால்முதலியவைகளில் பலவிதமானவலியும், மறமறப்புமுண்டாகி சுண்டி இழுத்துப் பிடித்துக்கொள்ளும்; ஈரத்தில்கடமாடினால் இவ்வலியதிகரிக்கும். பிரசவமாகும்வரை இவ்வலி இருக்கத்தான்செய்யும். இவ்வியாதியில் கால்களை வெப்பமாக வைத்திருந்தாலும், கம்பனியினால் கால்களைப் பொதிந்து வைத்திருந்தாலும் உபத்திரவம் மட்டுப்படும்.

கிச்சை

- (1) இலுப்பை எண்ணெயை வலி பிடிப்புள்ள வீடங்களில் சூடுபிறக்கத் தேய்த்துவரலாம்.
- (2) டர்பென்டைன் (Turpentine); அல்லது, ஒலியம் கம்பர் (Oleum Camphor) இவற்றி லென்றால் வலி பிடிப்புள்ள வீடங்களில் சூடு பிறக்கத் தேய்த்துவரலாம்.

கர்ப்பவதிகள் குலை எரிவு:—

கர்ப்பவதிகள் நெஞ்செரிவென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

கர்ப்பவதிகள் கை காலெரிவு:—

கர்ப்பவதிகளுக்கு இதுசாதாரணமாக 5-ம்மாதத் தொடக்கமா யாரம்பிப்பதுண்டு; இதற்கு முதலில் இலகுவிரோசனகாரிகளைக் கொடுத்துமலசுத்தி

* 3 அவுன்ஸ் சுடுதண்ணீரில் ஒரு எலுமிச்சங்காயின் தோலை குறுவ அரிந்து போட்டு 3-மணி நேரம் ஊறவைத்து உபயோகிக்கவும்.

† லிஷமானது ஐக்கரையாக உபயோகிக்க வேண்டும்.

செய்யவேண்டும்; இரவு படுக்கைக்குப் போகுமுன் குறைந்தது கால்மணி நேரமாகிலும் சுடு தண்ணீரில் ஹைகால்களை வைத்திருக்கச் செய்தால் எரிவு மட்டுப்படுமென்றாலும்; இது பிரசவம் வரையில் நீடித்திருக்கும்.

சிகிச்சை

(1) சங்கன்வேர் ரூபாயெடை அரைக்கால், 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு || அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயம் அவுன்ஸ் 2-ல் கால் ரூபாயெடை பசுவெண்ணெய்யைக் கரைத்துக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) பல்வீஸ் ரூபார்ப் கோ (pulvis Rhubarb Co) டிராம் 1
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்துக் கொடுத்தால் 2, '3-தடவை பேதியாகி எரிச்சல் மட்டுப் படும்.

கர்ப்பவதிகள் சந்து வலி:—

கர்ப்பவதிகள் முதலு வலியென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

கர்ப்பவதிகள் சுரம்—Puerperal Fever

மலச்சிக்கல், குளிர் முதலிய காரணங்களினால் கர்ப்ப ஸ்திரீகளுக்கு எந்த மாதத்திலாவது சுரமுண்டாகலாம். சுரம் கடுமையாக அடிக்க வாரம் பித்தால் கருவழிவு யேற்படலாம். கொய்னைன் (Quinine) என்ற காச் சம்மூலங்கு ருதுவர்த்தனகாரி குணமுண்டாகையால், கருப்பற்றியிருக்கும் போது கொய்னைன் சேர்ந்த மருந்துகளைக் கொடுக்கக்கூடாது.

சிகிச்சை

(1) கிற்றமுட்டிவேர் ரூபாயெடை 1 சுக்கு ரூபாயெடை 1
பேராமுட்டிவேர் ,, 1 திப்பிலி ,, 1
சீந்தில்தண்டு ,, 1 நிலவேம்பு ,, 1

ஒன்றுசேர்த்து, 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் காலை மாலை 2-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) பிராந்தி (Brandy) அவுன்ஸ் 1
தண்ணீர் ,, 1

ஒன்று சேர்த்துக் கொடுத்து வரலாம்.

(3) டிஞ்சர் பெர்ரி பெர்குளோரைட் (Tincture Ferri perchloride) துளி 80
லைக்கர் ஆர்சனிக்காலிஸ் (Liquor Arsenicalis) ,,
சிரப் சிஞ்ஜிபர் (Syrup Zingiber) டிராம்
தண்ணீர் அவுன்ஸ்

ஒன்று சேர்த்து மலச்சிக்கலில்லாத சுரத்துக்கு, நாள் ஒன்றுக்கு 3-வேளைக் கொடுத்து வரலாம்.

■ விஷமானது ஜாக்ரதையாக உபயோகிக்கவேண்டும்.

மலச்சிக்கலினால் கா மேற்பட்டால்:—

- | | | |
|-----------------------------|----------|---|
| (4) காலோமல் (Calomel) | கிரான்ஸ் | 4 |
| சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb) | " | 4 |

ஒன்று சேர்த்து இரவில் படுக்கைக்குப் போகுமுன் வாயில் கொட்டி விழுங்கும்படிச் செய்யலாம்.

ஜலதோஷத்தால் காழுண்டா யிருந்தால்:—

- | | | |
|--|----------|----|
| (5) அமோனியம் கார்போனஸ் (Ammonium Carbonas) | கிரான்ஸ் | 10 |
| டிஞ்சர் செனிகா (Tincture Senegae) | துளி | 30 |
| டிஞ்சர் சின்கோனா கோ (Tincture Cinchonae Co) | " | 40 |
| டிஞ்சர் சில்லி (Tincture Scillae) | " | 10 |
| வைனம் இப்பிக்காக் (Vinum Ipecac) | " | 25 |
| ஸ்பிரிட் ஈதர் ஹைட்ரோவீ (Spirit Aether Nitrosi) | " | 50 |
| தண்ணீர் | அவுன்ஸ் | 5 |

ஒன்றுசேர்த்து 4-மணி நேரத்திற்கு 1-அவுன்ஸ்வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

கர்ப்பவதிகள் குதக ஒழுக்கு—Menstrual Discharge in Pregnancy

சுருதரித்த பின்னரும் சில ஸ்திரீகளுக்கு 3-ம் மாதத்திற்குமேல் குதக ஒழுக்குக் காண்பதுண்டு சிலருக்குப் பெரும்பாடுபோலு மேற்படும். இது இருதய பலயினம், இருமல், மூத்திரப்பைப் புண், மலக்குடல் வீக்கம் முதலிய கோளாறுகளினாலாவது; கர்ப்பாயச இரத்த காளங்களில் இரத்தப்பெருக் கதிகப்படுவதினாலாவது உண்டாகலாம்.

குதகப்பெருக்கு அதிக முண்டானால் சுருவழிவு யேற்படும். இந்த குதக ஒழுக்கினால் காவரட்சி, மயக்கம் முதலியவைக ளேற்படும்.

உப சிகிச்சைகள்

ரோக ஸ்திரீயை மல்லரக்காய்ப் படுக்க வைத்து, அடிவயிற்றிலும், கழுதத்திலும் ஈரத்துணியைப் போட்டுவைக்கலாம். குளிர்ச்சியான பானங்களை அதிகமாய்க் கொடுத்து வரலாம்.

சிகிச்சை

- | | | | |
|---------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| (1) அதிமதுரம் | ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$ | நன்னூரிவேர் | ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$ |
| செய்தனம் | " $\frac{1}{8}$ | வெள்ளிலோத்திரம் | " $\frac{1}{8}$ |
| | " $\frac{1}{8}$ | | " $\frac{1}{8}$ |

ஒன்று சேர்த்துப் பச்சரிசி சுழுவிய தண்ணீரில் அரைத்துக் கலக்கிக் கொடுத்து வரலாம். (பந்தியம்.)

- | | | | |
|---------------|------------------------|-----------|------------------------|
| (2) மாசக்காய் | ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$ | சந்தனம் | ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$ |
| அதிமதுரம் | " $\frac{1}{4}$ | பற்பாடகம் | " $\frac{1}{4}$ |

ஒன்று சேர்த்துப் பசும்பாலி லரைத்துக் கலக்கிக் கொடுத்து வரலாம்.

(8) லைக்கர் மார்பைன் பிமிசொனாடிஸ் (Liquor Morphine Bime conatis)	துளி	25
டிஞ்சர் டிஜிடாலிஸ் (Tincture Digitalis)	டிசராம்	1
டிஞ்சர் ஹாமமெலிடிஸ் (Tincture Hamamelidis)	துளி	50
டிஞ்சர் ஐட்ராஸ்டிஸ் (Tincture Hydrastis)	டிசராம்	1
கிளிசரின் (Glycerin)		1
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்து 4-மணி நேரத்திற்கு 1-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

கார்ப்பவதிகள் சூதக ஒழுக்கிலுண்டாகும் தாகம்:—

சிகிச்சை

(1) அரசவகொழுந்து ரூபாயெடை 2 மார்தளிர் ரூபாயெடை 2	
ஆலங்கொழுந்து ,, 2 அத்திக்கொழுந்து ,, 2	

ஒன்று சேர்த்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 6-அவுன்ஸ் ராகச் சுண்டக் காய்ச்சிய சஷாயத்தில் 1, 2-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

கார்ப்பவதிகள் தடிமண்:—

கார்ப்பவதிகள் ஜலதோஷமென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

கார்ப்பவதிகள் தலைவலி—Puerperal Cephalalgia

சூதநிர்த்த சில மாதர்களுக்குப் பின் சில ஸ்திரீகளுக்குத் தலைவலி யேற்படுவதுண்டு. சூதகம் தடைபட்டுப் போவதினால், மெல்லிய இரத்த நாளங்கள் அழிவக்கொண்டு விடுவதினாலாவது; மலச்சிக்கல், அஜீரணம், வெகுநேரம் பசியுடனிருத்தல், கடும் வெயில், மழை, பனி இவைகளின் காரணத்தினாலாவது; காப்பி, தேத்தண்ணீர் போன்ற உஷ்ண பானங்களை அருந்துவதினாலாவது இத் தலை நோயேற்படலாம்.

முகம் வெளுத்து சில்வென்றிருக்கும்; வெளிச்சம், சப்தம் இவைகளால் தலைவலி யதிகரிக்கும்; தலையிலும், பிடரியிலும் பாரமேற்றியதைப் போலிருக்கும்; பசி மந்தமுண்டாகும்.

சிகிச்சை

(1) மிளகை முலைப்பால்விட்டரைத்துக் கொதிக்க வைத்து பற்று போடலாம்.	
---	--

(2) அகிறகட்டை ரூபாயெடை 1/2 அபின் ரூபாயெடை 1/2	
சந்தனம் ,, 1/4 சுக்கு ,, 1/4	
கஸ்தூரிமஞ்சள் ,, 1/2 சாம்பிராணி ,, 1/2	

ஒன்று சேர்த்துத் தண்ணீர் விட்டரைத்துக் கொதிக்கவைத்துப் பற்று போடலாம்.

(8) பெனாசெட்டின் (phenacetin)	கிரான்ஸ்	5
காபீன் சிட்ரஸ் (Caffein Citras)	,,	8

ஒன்று சேர்த்து, எச்சில் கூட்டி விழுங்கி, கால்மணி நேரத்திற்குப் பின் சுடச்சுட காப்பிக் குடிக்கலாம்.

(4) கஜபுட் ஆயில் (Oil Cajuput); இயூகலிப்புடஸ் ஆயில் (Oil Eucalyptus); டர்பென்டைன் (Turpentine) முதலிய தைலங்களை வலியுள்ள விடங்களில் தடவலாம்.

கர்ப்பவதிகள் துவாலே:—

கர்ப்பவதிகள் குதக ஒழுக்கென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

கர்ப்பவதிகள் தூக்கமின்மை—Puerperal Insomnia

கர்ப்பிணிகளுக்குத் தூக்கமின்மை, முதல் மாதத்திலேயே ஆரம்பித்த பிரசவம் வரையிலிருக்கும். சிலருக்குக் கடைசி மாதங்களிலேற்படும்; மலச்சிக்கல், வெளிச்சம், சப்தம், இதர வியாதிக் கொளாறுகள் முதலியவைகளினால் தலைவலி யேற்படலாம்.

மலச்சிக்கலிருந்தால் இவ்ரு விரேசன்காரிகளால் மலசுத்தி செய்யவேண்டும். நித்திரையை யுண்டுபண்ணும் பொருட்டு அபிணையாவது, அபின் கலந்த இதர மருந்துகளையாவது கொடுக்கக்கூடாது. தேவிலை, காயி முதலிய உஷ்ண பாணங்களினாலும் தூக்கம் யேற்படாது.

படுக்கைக்குப் போருமுன், முகம், கழுத்து முதலியவைகளைச் சுடு தண்ணீரில் நனைத்துப் பிழிந்த துணியால் துவட்டிக்கொண்டு, திரேகாதியத்தமும் மெல்லிய துணியால் போர்த்திக் கொள்ளலாம்; இரவு ஆகாரத்தைக் குறைப்பதிலும்தான் தூக்கமுண்டாகும்.

கர்ப்பவதிகள் நீரடைப்பு—Puerperal Anuria

கருதரித்த உவது மாதத்திற்கு பின்னர் வயிறு அதிகமாய் பெருந்து, மூத்திர தாரையை அழுத்திக்கொண்டிருப்பதினால் இம்மாதங்களில் அநேகமாய் எல்லோருக்கும் நீரடைப்புண்டாகலாம். மூத்திரம் வரும் சமயங்களில் சோம்பலினாலாவது, இதரக் காரணங்களினாலாவது இக் காலங்களில் அடக்கிக்கொண்டிருந்துவிட்டால், மூத்திரப்பையின் சுவர வப் பிரக்கிருதிகெட்டு, மூத்திரத்தை வெளியாக்காம விருந்துவிடும்.

மூத்திரப்பையில் அதிகப்படியான நீர் சேர்ந்து, கருப்பையை நசுக்கு மாதலால், கெற்பத்திற்கே திவருண்டாகும் மேலும், நீரடைப்பு ஏற்படுவதினால், அறையின் கீழ் பாகங்கள் (371-ம் பக்கம் பார்க்கவும்) வீங்கி, பிரசவ சமயத்தில் கஷ்டத்தையும் வீபத்தையும் முண்டு பண்ணும்.

வெங்காத்திற்கு குதுவர்த்தனகாரிகுண மிருப்பதால், கர்ப்பஸ்திரீகளுக் குண்டாகும் நீரடைப்பு ரோகங்களில், நிதானமாகவே உபயோகிக்க வேண்டும்.

உப சிகிச்சை

அடிக்கடி வெந்நீரில் ஸ்நானம் செய்யலாம். ஒரு பெரிய தொட்டியில் சுடு தண்ணீர் விட்டு அதில் ½-மணி நேரம் உட்கார்ந்து ஆசன ஸ்நானம்

(Hip Bath) செய்துவரலாம். சுடுதண்ணீரில் ஸ்கானித்தவுடன், தேயிலைக்கஷாயம் (Tea), காப்பிக் கஷாயம், சுடுதண்ணீர், பேய்ப்புடோல் வேர்க்கஷாயம், பற்பாடகக் கஷாயம் இவற்றிலொன்றைச் சுடசுடவாகிலும்; பல்விஸ் இப்பிக்காக் கோ (Pulvis Ipecac Co) 10 கிரான்னை ஒருஅவுன்ஸ் தண்ணீரில் கரைத்துக் கொடுத்தாகிலும்; உடலாதிமந்தமும் போர்த்திக்கொண்டு சற்று நித்திரைசெய்யலாம். வியர்வைக்கண்டு நித்திரைத் தெளிந்தவுடன் நீர் சாதாரணமாக யிறங்கும்.

சிகிச்சை

(1)	சுக்கு	ரூபாயெடை	$\frac{1}{2}$	குழப்பாலைவேர்	ரூபாயெடை	$\frac{1}{2}$
	மிளகு	"	$\frac{1}{2}$	பேய்ப்புடோல்வேர்	"	$\frac{1}{2}$
	துப்பிலி	"	$\frac{1}{2}$	பொன்னாங்கானிவேர்	"	$\frac{1}{2}$
	கடுக்காய்	"	$\frac{1}{2}$	கண்டங்கத்திரிவேர்	"	$\frac{1}{2}$
	தான்றிக்காய்	"	$\frac{1}{2}$	கோவைவேர்	"	$\frac{1}{2}$
	ஏலம்	"	$\frac{1}{2}$	குழப்பாலைச்சாறு	அவுன்ஸ்	12
	கிராம்பு	"	$\frac{1}{2}$	பொன்னாங்கானிச்சாறு	"	12
	அதிமதுரம்	"	$\frac{1}{2}$	பேய்ப்புடோல்சாறு	"	12
	ஒமம்	"	$\frac{1}{2}$	கோவையிலைச்சாறு	"	12
	சிரகம்	"	$\frac{1}{2}$	அறுகேரச்சாறு	"	12
	சாதிக்காய்	"	$\frac{1}{2}$	கண்டங்கத்திரிச்சாறு	"	12
				பசுநெய்	"	12

பொடித்துப் போட்டு காய்ச்சி வடித்துக் காலை மாலை ஒரு தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

(2) கோழிமுட்டையின் வெண் கருவையுடன்; கடுக்காயையும் அரைத்து அடிவயிற்றில் பூசலாம்.

(3)	பொட்டர்ஷியம் நைட்ரேட் (Potassium Nitrate)	டிராம்	$\frac{1}{2}$
	ஸ்பிரிட் ஈதர் நைட்ரோஸி (Spirit Aether Nitrosi)	"	3
	டிஞ்சர் ஐயோஷியாமஸ் (Tincture Hyoscyamus)	"	2
	இன்பியூஷன் பக்கு (Infusion Buchu)	அவுன்ஸ்	6

ஒன்று சேர்த்து நான் ஒன்றுக்கு 3-தடவை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரலாம்.

மூத்திரக்கட்டுடன் மலக்கட்டு மிருந்தால்:—

(4)	எப்சம் சால்ட் (Epsom Salt)	அவுன்ஸ்	1
	பொட்டர்ஷியம் பைகார்போனேட் (Potassium Bicarbonate)	டிராம்	■
	பொட்டர்ஷியம் நைட்ரேட் (Potassium Nitrate)	"	$\frac{1}{2}$
	தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	6

இருதய இரத்த நாளங்களில் இரத்தம் அதிகமாகச் செல்லுவதினாலாகியும்; பயம், கோபம், ஆயாசம், பசி யெடுக்கும்போது உண்ணாதிருத்தல், பாரங்களைத் தூக்குதல் முதலிய செய்கைகளாலும் இருதயப் படபடப் பேற்படலாம்.

சிகிச்சை

- (1) டிஞ்சர் கலம்பா (Tincture Calumbae) டிராம் 1
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1.

ஒன்று சேர்த்து காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

- (2) டிஞ்சர் டிஜிடாலிஸ் (Tincture Digitalis) துளி 15
லைக்கர் பெர்ரி பெர்குளோரைட் (Liquor Ferri perchloride) ,, 15
ஆவீட் பாஸ்பரிக் அிட் (Acid Phosphoric Dil) ,, 15
சிரப் சிம்பிள் (Syrup Simple) டிராம் 1½
இன்பியூஷன் குவாஷியா (Infusion Quassiae) அவுன்ஸ் 1½

ஒன்று சேர்த்து, நாள் ஒன்றுக்கு முன்று தடவை ½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

கார்ப்புவதிகள் நெஞ்செரிவு—

கருதரித்திருக்கும்போது கருப்பை விரிவு கண்டு ஜீரணம் கருவிகளை நசுக்குவதால், ஆகாரம் இலகுவில் ஜீரணிக்காமல், இரைப்பையில் தங்கி புளித்துப் போவதினாலாவது; அதிகமான ஆகாரங்களை உட்கொள்ளுவதினாலாவது; கருதரித்த ஆரம்பத்திலேயே நெஞ்செரிவுண்டாகலாம்.

தொண்டை, அடிநாக்கு, நெஞ்சு முதலியவைகளில் எரிச்சலுண்டாகும்; அடிக்கடி வாயில் கரகரப்பான நீர் சுரந்து, புளித்தேப்பமுண்டாகும்; எப்பம்விடும் சமயம் எரிச்சலதிகமாயிருக்கும்; இதற்கு ஆகாரத்தை மட்டுப் படுத்தி வரவேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) நிலவேம்பு கஷாயம்; வேப்பம்பட்டைக் கஷாயம் இவைகளிலொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) லைக்கர் பொட்டாஷ் (Liquor Potassh) டிராம் ½
டிஞ்சர் ஜென்ஷன் கோ (Tincture Gentain Co) ,, ½
லைக்கர் மாக்னிஷியம் கார்போனஸ் (Liquor Magnesium Carbonas) ,, 1½
ஆக்குவா மெந்தாபிப் (Aqua Mentha pip) அவுன்ஸ் 7

ஒன்று சேர்த்து, 4-மணி நேரத்திற்கொரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

கர்ப்பவதிகள் பரி மந்தம்—

கருவுற்றிருக்கும் சமயம் வயிறு பெருத்து, வயிற்றுள் ஏதோ நிறைந்திருப்பதைப்போல் தெரிவதாலும்; அக்காலங்கள் மலச்சிக்கலு் மேற்படுவதாலும்; அதிக ஆகாரங்களை உட்கொள்ளுவதாலும்; கர்ப்பவதிகளுக்கு இயற்கையாயுள்ள பிரீதியினால் மன, சாம்பல் முதலியவற்றைத் தீன்பதிலும பரி மந்த மேற்படலாம். மலச்சிக்கலிருந்தால் அதற்கான சிகிச்சை செய்யவேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) மிளகுக் கஷாயம் நிலவேம்புக் கஷாயம், வேப்பம்பட்டைக் கஷாயம் முதலியவைகளி் லொன்றைக் கொடுத்து வரலாம்.
- (2) அல்லிக்கிழங்கு ரூபாயெடை 1 தாமரைப்பூ ரூபாயெடை 1 ஒன்று சேர்த்த பசும்பால்விட்டு மைபோலரைத்த ஒரு கொட்டைப் பாக்களவு காலி மாலி கொடுத்து வரலாம்.

(3) ஆவிட்டைட்ரோ ஐட்ரோ குளோரிக் அம் (Acid Nitro

Hydrochloric Dil)

ஒராம் 1

■ மஞ்சள் கக்ஸ் வாயிகா (Tincture Nux Vomica) ,, 1

சிரப் சிம்பிள் (Syrup Simple) ,, 1

இன்பியூஷன் கலம்பா (Infusion Calumbae) அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஆகாரத்திற்குப் பின் 1-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

கர்ப்பவதிகள் பயித்தியம்—Puerperal Mania

பித்த அதிகரிப்பினு லுண்டாகும் பயித்தியம் கர்ப்பமர யிருக்கும்போதும்; நரம்பு விகலபத்தா லேற்படும் பயித்தியம், பிரசவ சமயத்திலும்; பிரசவத்திற்குப் பின்னுமுண்டாகும். மூளைக் கோளாறுகளினு லேற்படும் பயித்தியம் சிசு உதயமாகும் சமயத்திலேற்படும் குழந்தைகளுக்கு நீடித்துப் பால் கொடுப்பதினால் நரம்புக் கோளாறுக ளேற்பட்டு பிரசவமான பின் பயித்திய முண்டாகலாம். பிரசவ பயித்திய ரோகம் பரம்பரையா யிருந்தாலொழிய எல்லோருக்கு முண்டாவதில்லை.

பித்த உபரியினு லுண்டாகும் பயித்தியம் விபத்துண்டுபண்ணக் கூடிய தல்ல. இதில் மூர்ச்சை, மனத் தடுமாற்றம்; அமைதியின்மை முதலியவைகளுண்டாகி பயித்தியத்தின் சேஷ்டைகளு மிருக்கும்.

மூளைக் கோளாறுகளினு லேற்படும் உன்மத்தம் பிரசவ வேதனைப்படும் போதேற்பட்டு முகம் வெளுத்து, நாடி நடை களைவித்துவிடும். வாவா வியாதி உக்ரமாகும்; நிதானமற்ற வார்த்தைக ளேற்பட்டு மலம் மூத்தி

* விஷமனைது ஜாக்ரதையாக உபயோகிக்க வேண்டும்.

ரம், பால் இவைகள் தடைப்பட்டுப் போம். சர்மம் வரண்டு கடினமாய்த்
தோன்றும்; பசி மந்தம், நித்திரையின்மை முதலியவைகளேற்படும்.

பொதுவாக; கஷ்டப் பிரசவம், பிரசவப் பெரும்பாடு, அழுக்கு அதிக
மாய் கழிதல், பயம், பலஹீனம், மஞ்சட் காமாலை, முன் குழந்தை
களுக்கு நீடித்த நாட்களாக பால் கொடுத்தல், இதற்கு முன் கொடிய
ரோகங்களால் பாதிக்கப்பட்டிருத்தல் முதலிய காரணங்களினால்
கர்ப்பகாலத்தில் பயித்தியம் உண்டாகின்றன.

பிரசவ சமயத்தில் பயித்தியம் உண்டாகி சிசு வெளிப்படாவிட்டால்
ஆபுத பிரயோகத்தால் சிசுவை வெளிப்படுத்தி விடவேண்டும். நரம்புக்
சோளாறுகளால் யேற்படும் பயித்தியம் சற்று சமன மடைந்ததும்
குழந்தைகளுக்கு முலைக் கொடுக்கலாம்; நரம்பட்ட பயித்திய ரோக
முன்னவர்கள் குழந்தைக்கு ஒருகாலும் பால் கொடுக்கக்கூடாது.

உப' சிகிச்சை

தனிமையான அறையில் படுக்கவைத்து தலையில் ஐஸ் (Ice) ஒற்றிடம்
கொடுக்கலாம்; இலகுவில் ஜீரணிக்கும் கஞ்சிகள், மாமிச சூப்புகள் (Soup)
சோடாத் தண்ணீர் (Soda Water) பிராந்தி (Brandy) முதலியவைகளைக்
கொடுத்து வரலாம்.

சிகிச்சை

(1) சல்போனல் (Sulphonal) கிரைன்ஸ் 20

இந்த அளவாக 6-மணி நேரத்திற் கொருதரம் கொடுத்து வரலாம்.
நீடித்த நாளாயிருந்துவரும் பைத்தியத்திற்கு:—

(2) குளோரல் ஐட்ரஸ் (Chloral Hydras) கிரைன்ஸ் 30
பொட்டாஷியம் புரோமைட் (Potassium Bromide) ,, 90
சிரப் மோரி (Syryp Mori) டிராம் 1
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து, நான் ஒன்றுக்கு மூன்று தடவை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம்
கொடுத்து வரலாம்.

நெடுநாள் பால் கொடுத்ததாலேற்பட்ட பயித்தியத்திற்கு:—

(3) எர்காட்டின் (Ergotine) கிரைன்ஸ் 8
■ எக்ஸ்ட்ராக்ட் நக்ஸ் வாமிகா (Extract Nux Vomica) ,, 1
பெர்ரி ரெடாக்டம் (Ferri Redactum) ,, 24
கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine Sulphus) ,, 16

ஒன்று சேர்த்து 8-மாத்திரைகளாகப் பிரித்து உருட்டிக்கொண்டு,
நான் ஒன்றுக்கு மூன்று தடவை ஒரு மாத்திரை வீதமும், இரவு படுக்கைப்
போகும்போது ஒரு மாத்திரை வீதமும் கொடுத்து வரலாம்.

* விஷமானது ஜாக்ராதையாக உபயோகிக்க வேண்டும்.

கர்ப்பவதிகள் பல் வலி—Puerperal Odontalgia

பல்வலி சிலருக்கு கருதரித்ததின் அறிகுறியாக விருக்கும்; கருதரித்த எந்த மாதத்திலுமிது யேற்படலாம். பல்வேரின் நரம்புக் கோளாறுகளினாலாவது; அஜீரண வியாதிகளினாலாவது பல்வலி புண்டாகும்.

சிகிச்சை

- (1) சுடுதண்ணீரில் படிசாரத்தைக் கரைத்தாவது, கருவேலம்பட்டை கஷாயத்தில் படிசாரத்தைக் கரைத்தாவது வாய் கொப்புளிக்கலாம்.
- (2) அபின் அரிசியெடை 1 கற்பூரம் அரிசியெடை 2 ஒன்றாய் அரைத்து வலியுள்ளவிடத்தில் வைக்கலாம்.
- (3) டிஞ்சர் ஓபியம் (Tincture Opium) துளி 5
ஸ்பிரிட் எதர் (Spirit Aether) ” 5
இது இரண்டையும் பஞ்சில்விட்டு வலியுள்ளவிடத்தில் வைத்திருக்கலாம்.
- (4) ஸ்பிரிட் குளோரோபாரத்தை (Spirit Chloroform) பஞ்சில் நனைத்து வலியுள்ளவிடத்தில் வைத்திருக்கலாம்.

கர்ப்பவதிகள் பீதி—Puerperal Hypochondriasis

பித்த உபரியினாலும்; நரம்புக் கோளாறுகளினாலும்; கர்ப்பினிக்கு பீதி புண்டாவதுண்டு. கரு தரித்திருக்கும்போது பயம், கோபம், சந்தோஷம், துக்கம் இவைகளினாலும்; பயங்கர கனவுகளினால் திடீரென்று பயந்தெழுவதாலும்; மூட்டுகள் அயர்வுற்று நரம்பு பலஹீனத்தை புண்டாக்கி கருவுக்கும் கெடுதலுண்டு பண்ணலாம்.

கர்ப்பவதிகளுக்கு குண்டாகும் பீதியினால்; நரம்பு பலஹீனமும், ஆயாசமும், அலுப்பும், தூக்கமின்மைபு முண்டாகும். இடது பக்கத்து மார்புக்கு அடியிலும், முதுகிலும் வலிபண்டாகும்; மனவருத்தம், சஞ்சலம், காரணமில்லாத அழுகை, தொண்டையில் ஏதோ ஒன்று உருளுவதைப்போன்ற உணர்ச்சி, நெஞ்சப் படபடப்பு, தலைவலி, நெஞ்செரிவு முதலிய கோளாறுகளு முண்டாகும்.

உப சிகிச்சை 3

மனவமைதியாக விருக்கச்செய்ய வேண்டியதே இதற்குண்டான சிகிச்சை இரவில் நித்திரையில் பயங்கர கனவுகள் தோன்றினால் கீழ்க்கண்ட நித்திரை மருந்துகளைக் (Hypnotics) கொடுத்து அயர்ந்த நித்திரை புண்டிபண்ணலாம்.

சிகிச்சை

- (1) ஐயோவின் ஐட்ரோ புரோமைட் (Hyosine Hydro Bromide) கிரான் 1/2
டிஞ்சர் ஆரண்டி (Tincture Auraniti) அவுன்ஸ் 1
ஆக்குவா டிஸ்டில் (Aqua Distilled) ” 3

ஒன்று சேர்த்து இரவு படுக்கைக்குப் போகுமுன் ஒரு தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) சல்போனல் (Sulphonal) கிரைன்ஸ் 20
சுடுகிற தேயிலைக் கஷாயம் (Tea) அவுன்ஸ் 2

ஒன்று சேர்த்து இரவு படுக்கைக்குப் போகுமுன் கொடுக்கலாம்.

கர்ப்பவதிகள் மஞ்சட் காமாலை—Puerperal Icterus

கர்ப்ப காலத்தில் கருப்பை பெருத்து விடுவதினால் மண்ணீரல் (Liver) பாதிக்கப்பட்டு, பித்தப்பைக்குச் செல்லும், பித்தநீரைத் தடைசெய்வதால் பித்தநீர் இரத்தத்துடன் கலந்து; கண் விழி, கண்ணிரப்பைகள், நக்கண், சர்மம் இவைகளை மஞ்சள் நிறமாக்கிவிடும். மூத்திரம் சிவந்து, தடித்து, அல்லது இரத்தம்போலாவதற்கும்; சர்மம் தோலுரிந்ததைப் போலிருக்கும்; தலைவலி, சூரம், வயிற்றோட்டம் இவைகளுண்டாகும்.

சிகிச்சை

- (1) வில்வ யிலைபுடன் பசு மூத்திரத்தை விட்டு இடித்துப் பிழிந்தசாறு அவுன்ஸ் 2, 3-வீதம் மூன்றுநாள் காலையிலும் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) சோடியம் பைகார்ப் (Sodium Bicarb) டிராம் 1
பல்விஸ் ரீயை ராடிக்ஸ் (pulvis Rhei Radix) ,, 3
பல்விஸ் சிஞ்சிபர் (pulvis Zingiber) ,, 1
பல்விஸ் கலம்பா (Pulvis Calumbae) ,, 1½
பல்விஸ் இப்பிகாக் கோ (Pulvis Ipecac Co) ,, ¼

ஒன்றுசேர்த்து, 18-பாகமாகப்பிரித்து மடித்துக்கொண்டு, 4-மணிநேரத் திற்கொருதரம் ஒருபாகத்தைச் சுடு தண்ணீரில் கலந்து கொடுத்து வரலாம்.

கர்ப்பவதிகள் மர்மஸ்தான எரிவு—Puerperal Pruritus Vulvae

மர்மஸ்தான எரிவுகர்ப்பவதிகளுக்கு மட்டுமின்றி, ஏனையோருக்குமுண்டாகலாம்; விசேஷமாக, மூத்திரரோகத்தாலும், வெள்ளைப்பிரமேகத்தாலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கே இது உண்டாவதுண்டு.

புருஷரிடமாகவுள்ள துரநீர் சம்பந்தப்படுவதாலும்; யோனியிலும், கடிதடத்திலு மிருந்தும் கசியும் ஒரு வழுவழுப்பான பதார்த்தம் உலர்ந்து நுடக்கும்போது தேய்வுபடுவதாலும்; கடிதடத்திலுள்ள மயிர் முனைகள் குத்துவதாலும்; கிரைப்பூச்சி, மலச்சிக்கல், ஜீரணக்கருவிகள் கோளாறு முதலியவைகளாலும்; மர்மஸ்தான எரிவு வுண்டாகலாம். கர்ப்பக்காலங்களில் யோனி, கடிதடம் இவைகள் தளர்ச்சி யடைந்திருப்பதினாலேயே அக்காலங்களிலேற்படுகின்றன.

கடிதடத்தில் கண்ணுக்குப்புலப்படாத சிறுமச்சல்களுண்டாகி, சொறியும் போதுதேய்வுபட்டுகிவந்து எரிச்சலுண்டாகும், பின்னர் அவைகள் வெளரின புண்களாக மாறி, கருப்பை வரையில் புண்ணாகச் செய்துவிடும்.

உப சிகிச்சை

முத்திரம் பெய்தவுடனும், செனகர்யப்படும்போதும், ஒரு தொட்டியில் சுடு தண்ணீர் விட்டு (Hibbath) $\frac{1}{4}$ -மணி நேரம் அதில் உட்கார்ந்து ஆசன ஸ்நானம் செய்து வரலாம்.

சிகிச்சை

- (1) புளியிலைக் கஷாயத்தால் மர்மஸ்தானங்களைக் கழுவியபின், சங்கங் கொழுந்தையும், மிளகையும் சமமாக வைத்தரைத்து பூசிவரலாம்.
- (2) அடிக்கடி புனையிலைக் கஷாயத்தால் மர்மஸ்தானங்களைக் கழுவியவரலாம்.
- (3) கார்பாலிக் காஸிட் (Carbolic Acid) அவுன்ஸ்
கிளிசரின் (Glycerine) "

ஒன்று சேர்த்து வைத்துக்கொண்டு தேவையானபோது 20-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 2-டிராம் மருந்தைக் கலந்து நான் ஒன்றுக்குப் பலமுறை வெளிப்பிரயோகமாக மர்மஸ்தானங்களை கழுவிய வரலாம்.

- (4) போரக்ஸ் (Borax) கிரான்ஸ் 45
அமோனியம் கார்போனேட் (Ammonium Carbonate), 45
கிளிசரின் (Glycerine) அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$
ஆஸிட் ஐட்ரோசினியாக் டில் (Acid Hydrocyanic Dil) டிராம் $1\frac{1}{2}$
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 8

ஒன்றுசேர்த்து வைத்துக்கொண்டு நான்ஒன்றுக்கு பலதடவை 1-டிராம் மருந்துக்கு 3-டிராம் தண்ணீர்சேர்த்து மேல்பிரயோகமாகத் தடவி வரலாம்.

- (5) காலோமல் (Calomel) டிராம் 1
பச்சரிசி மாவு (Starch) "

ஒன்று சேர்த்து 3-ம் இலக்க கழுவுநீரால் சுத்திசெய்த பின்னர் புண்ணின்மேல் தூற்றி வரலாம்.

கர்ப்பவதிகள் மலச்சிக்கல்—Constipation in Pregnancy

சாதாரணமாக கர்ப்பகாலத்தில் மலச்சிக்க லேற்படுவதுண்டு. கருக்கொண் டிருக்கும் சமயத்தில் வழக்கமாக மலச்சிக்க லேற்படுமானால் பிரசவ சம யங்களில் துன்பத்தை விளைவிக்கலாம். கடினமான மலச்சிக்கலேற்படு மானால் தலைவலி, நெஞ்செரிவு, வயிற்று வலி, தூக்கமின்மை, மயக்கம், மூலம், கருவழிவு முதலியவைகளு முற்படும்.

கருப்பை பெருத்து மலக்குடல்களை நசிக்கிக்கொண்டிருப்பதாலும்; குடல் சங் தியிர்கண்டுவிடுவதாலும்; மலம் வரும் சமயம் அடக்கிக்கொண் டிருந்து விடுவதாலும் கர்ப்பகாலத்தில் மலச்சிக்க லேற்படலாம்.

உபசிகிச்சை

காலையில் எழுந்தவுடன் ஒரு டயினர் குளிர்த்த தண்ணீரைக் குடிக்கலாம். ஒவ்வொரு ஆகாரங்களுக்குப் பின்னரும் கணிதபழங்களைபும் புசிக்கலாம் ஒரு

பெரிய தொட்டியில் சுடுதண்ணீர் விட்டு குறைந்தது 15-நிமிஷங்களாவது ஆசன ஸ்நானம் செய்து வரலாம். இவைகளினாலும், கீழ்க்கண்ட இலகுவிரோசன காரிகளாலும் பயனேற்படவில்லையானால், வாரத்திற் கிருமுறையாகிலும் ஆசனவழியே நீரேற்றம் (Enema) செய்யலாம். ஆசன வழியே நீரேற்றம் செய்வதாயிருந்தால் இதர விரோசனகாரிகளைக் கொடுக்கத் தேவையில்லை

சிகிச்சை

(1) நிலாவரைக் கஷாயம்; ரோஜாப்புக் கஷாயம்; நிலாவரைத் துனையல்; பாவனக் கடுங்காய்; முதலியவைகளைக் கொடுத்து வரலாம்.

(2) பல்விஸ் ரீயை கோ (pulvis Rhei Co) கிரைன்ஸ் 60
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 2

ஒன்று சேர்த்துக் காலையில் மட்டும் கொடுக்கலாம்.

(3) பல்விஸ் கிளிசரிசா கோ (pulvis Glycerrhizae Co) கிரைன்ஸ் 60
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 2

ஒன்று சேர்த்துக் காலையில் மட்டும் கொடுக்கலாம்.

கர்ப்பவதிகள் முகவலி—Faceache in Pregnancy

கர்ப்பவதிகளுக் கேற்படும் பல் வலியினால் முகவலி ஏற்படுகிறது. ஆதலால், பல்வலி யிருந்தால் “கர்ப்பவதிகள் பல் வலி” என்ற தலைப் பின் கீழுள்ள சிகிச்சைகளைச் செய்யலாம். காதோரமாகவும், தாடைகளிலும் வீக்கமிருந்தால் கீழ்க்கண்ட சிகிச்சையைச் செய்யலாம்.

சிகிச்சை

டிஞ்சர் பெர்ரி பெர்குளோரைட் (Tincture Ferri perchloride) டிராம் ½

டிஞ்சர் டிஜிடிவிஸ் (Tincture Digitalis) ” ½

ஒன்று - சேர்த்து மேல்பிரயோகமாக வலியுள்ள விடங்களில் தடவி வரலாம்.

கர்ப்பவதிகள் முதுகு வலி—Backache in Pregnancy

கர்ப்ப காலங்களில் கருப்பை பெருந்து பளுவேற்பட்டு விடுவதால் நரம்புகளைப் பிடித்திழுத்து, இடுப்பைச் சுற்றிலும், அடிமுதுகு, அரை, அரைச் சந்துகளிலும், வலியுண்டாகும். பகலைவிட இரவில்திக்மாயிருக்கும். இதற்கான தனிச் சிகிச்சைகளொன்றும் தேவையில்லை; ஆனாலும், கீழ்க்கண்ட உப சிகிச்சைகளைச் செய்து வரலாம்.

உப சிகிச்சை

வலியுள்ள விடங்களில் சுடுதண்ணீர் ஒற்றிடம் கொடுத்து, புங்கெண்ணெய் அல்லது சிற்றருணக்கெண்ணெயைத் தடவி வரலாம்.

■ செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

கர்ப்பவதிகள் முறைக்காச்சல்—Intermittent Fever in Pregnancy

சாதாரண சமயங்களைப்போலவே கருவுற்றிருக்கும் சமயத்திலும், முறை சரமேற்படுவதுண்டு. கரத்தின் உக்கரம் அதிகரிக்குமானால், கருவழி யுண்டாக யேதுவாகும். கர்ப்ப காவத்திலுண்டாகும் முறை சரத்துக்கு கொய்னைன் (Quinine) சேர்ந்த மருந்துகளைக் கொடுக்கக்கூடாது.

சிகிச்சை

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| (1) சீத்தில்தண்டு ரூபாயெடை 1½ | சிலவேம்பு ரூபாயெடை 1½ |
| சிறுமுட்டிவேர் „ 1½ | சுக்கு „ 1½ |
| பேராமுட்டிவேர் „ 1½ | திப்பிலி „ 1½ |

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டுக் கஷாயமிட்டுக் காலை மாலை 2 அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) பல்வில ரூபார்ப் கோ (Purvis Rhubarb Co) . டிராம் 1

இதைத் தண்ணீரில் கலக்கிக் கொடுத்து மலச்சுத்தியானவுடன்:—

இன்பியூஷன் சின்கோனா (Infusion Cinchonae) அவுன்ஸ் 1

இந்த அளவுப்படி நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளைக் கொடுத்து வரலாம்.

கர்ப்பவதிகள் முலையெரிவு—Puerperal Mastitis

கரு தரித்த இரண்டாமாதத் துவக்கத்தில், கர்ப்பாயசத்திற்கு செல்லும் இரத்தம் முலையிற் போய்ச் சேர்வதினாலேயும்; பால் சாக்கும் நாளங்கள் விரிவு காண்பதினாலேயும் முலை எரிவும், முலை வலிபு முண்டாகலாம்.

ஸ்தனமானது பெருத்து வீம்பியிருக்கும்; அழுத்தினால் முடிச்சுகள் காணப்படும்; முலைக்காம்பைச் சுற்றிலும், கருவட்ட (Areola) மேற்படும்; முலைக் காம்பை நசுக்கினால், குழிமுழப்பான ஒரு வஸ்து வெளிப்படும்; சிலருக்கு முலைக்காம்பு கருத்திருக்கும்.

முலைக்காம்பு எரிவால் கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு பசி மந்தம், நித்திரையின்மை, தலைவலி, முகவலி முதலியவை காணப்படும். ஸ்தனமானது வீம்பி வெடித்துப்போவதைப்போலிருக்கும்; இச் சமயத்தில் சிகிச்சைகளொன்றும் செய்யப்படாவிட்டால், பிரசவத்திற்குப் பின் முலைக்காம்பு வெடிப் புண்டாகும்.

உப சிகிச்சை

முதலில் இலகுவிரோசனகாரிகளால் மலசுத்தி செய்விக் வேண்டியது. ரவிக்கையைத் தளர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் குளிர்ந்த தண்ணீரில் துணியை ஈனத்து முலையின்மேல் போடலாம். தேயிலைக் கஷாயத் துடன் (Tea) கொஞ்சம் தண்ணீரும், படிக்காரத்தனும் சேர்த்துக்கழுவி வந்தால் பிரசவத்திற்குப் பின் முலைக்காம்பு வெடிப் பேற்படாது.

சிகிச்சை

- (1) வெள்ளறுகம் புல்லை பசும்பாவி ல்லர்த்துத் தடவி வரலாம்.
- (2) டிஞ்சர் ஹமா மெலிடீஸ் (Tincture Hamamelidis) டிராம் 1
 ஒலியம் ஒலிவா (Oleum Olivae) 1
 ஒன்று சேர்த்துத் தடவி வரலாம்.

கர்ப்பவதிகள் மூத்திரக்கட்டுப்பு:—

கர்ப்பவதிகள் நீர்கடுப்பென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்த்தவம்.

கர்ப்பவதிகள் மூத்திரக்கட்டு:—

கர்ப்பவதிகள் நீர்கட்டென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்த்தவம்.

கர்ப்பவதிகள் மூர்ச்சை—Puerperal Insanity

கருப்பையில் பிண்டம் அசைய ஆரம்பமாகும் காவமாகிய மூன்றா மாதக் கடைசியில், கருப்பையிலிருந்து மேலுக்கேறும் அதிக இரத்த ஓட்டத் தின் வேகத்தினாலாவது, அசுத்த இரத்தத்தி லிருந்தெழும் ஆவியினாலாவது, திடீரென வேற்படும் சந்தோஷம். கிலேசம் இவைகளின் காரணத்தினாலாவது இம் மூர்ச்சை சிலருக் கேற்படுவதுண்டு “ கர்ப்ப சன்னிக் ” குமிதற்கும் அதிக வித்தியாசங்க ளிருப்பதில்லை.

உப சிகிச்சை

மூர்ச்சைக்கண்டிருக்கும்போது ஆடைகளைத் தளர்த்தி குளிர்ந்த தண்ணீரை முகத்திலடிக்கலாம். அதிகமளவு காற்றற்ப்படும்படியாகச் செய்ய வேண்டியது. மூர்ச்சை தெளிந்தவுடன் இலகுவிரோசனகரிகளால் மல சுத்தி செய்வித்து, கீழ்கண்ட மருந்துகளைப் பிரயோகம் செய்யலாம்.

சிகிச்சை

(1)	சாலையிசிரி	ரூபாயெடை	சுக்கு	ரூபாயெடை
	சில்குஜாபருப்பு	6	பெருங்காயம்	6
	போஜிதான் மிஸ்ரி	6	ஆனிலிரை	6
	தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு	6	சர்க்கரை	24
	சிறுபூனை காலிவிரை	6	தேன்	24
	நாயுருவி விரை	6	பசுநெய்	6

ஞாணிக்க வேண்டியவற்றைச் ஞாணித்து, சர்க்கரையும் தேனையும் சேர்த்துப் பாகுபதம் செய்து, ஞாணங்களைக் கொட்டிக் கிண்டி, பின் நெய் சேர்த்து மிஸ்ரமித்து, காலை மாலை ஒரு கொட்டைப்பாக்குப் பிரமாணம் கொடுத்து வரலாம்.

- (2) டுபாய்சன் சல்பஸ் (Duboisine Sulphus) கிரான்ஸ் 1/50
 சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti) டிராம் 1
 ஆக்குவா சின்னமோனி (Aqua Cinnamoni) அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்துப் படுக்கைக்குப் போகுமுன் ஒரே தடவையாகக் கொடுத்து வரலாம்.

சர்ப்பவழிகள் மூலம்—Puerperal Haemorrhoids

சாதாரணக்காலங்களில் மூலம் இல்லாதவர்களுக்குகூட, கருதாரித்திருக்கும் சமயங்கள் மூலரோகமேற்படுவதுண்டு; ஆனால், ஒரு சிலருக்கே இது உண்டாகிறது.

கருப்பை பெருத்து வருவதால் திரிசுஸ்தான (Pelvic) பாகங்களில் அழுந்தல் ஏற்படுவதாலும், மலக்குடலில் இரத்தம் தடைபட்டு வீக்கம் காணுவதாலும்; அளவுக் கதிர்மான வயிற்றோட்டம், கடினமான மலச்சிக்கல் இவைகளேற்படுவதாலும் மூலம் சம்பவிக்கலாம்.

உப சிகிச்சை

வெளி மூலமுள்ள ரோகஸ்திரியை மல்லாய்க்காய் படுக்கவைத்து, மூலத்தை மெதுவாக உள்ளே தள்ளி, கரத்தணியை ஆசனவாயில் வைத்துக் கட்டலாம். உள்மூல முள்ளவர்கள் அடிக்கடி முக்கி மலம் கழிக்கச் செய்யாமல், ஆசனவழியே நீரேற்றம் செய்து மலத்தை இலகுவாய் வெளியேற்றவேண்டும்.

சிகிச்சை

- (1) அஷ்டமூல நாசலேகியம், கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

மூலத்தில் இரத்தம் கசிந்தால்:—

- (2) மாசிக்காய்த் தூள் ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$ அபின் ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$ இதைப் பசுவெண்ணெய்யில் குழப்பி, மூலத்தில் தடவி வரலாம். மூலத்தில் வலி, எரிவு, கடுப்பிருந்தால்:—

- (3) வெங்காயத்தைக் குறுவ நறுக்கி சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் வதக்கி வைத்துக் கட்டலாம்.

- (4) அக்குவண்டம் காலிக் கம் ஒபியம் (Unguentum Gallicum Opium) இதை இரத்தம் கசியும் மூலத்திற்கு தடவி வரலாம்.

- (5) கொக்கோயின் ஐட்ரோகுனோரேட் (Cocaine

Hydrochlorate)

சொலுஷன் அட்ரினாலின் குனோரைட் (Solution

of Adrenaline Chloride)

பிஸ்மத் சப்ளைட்ரேட் (Bismuth Subnitrate)

பெட்ரோலாட் (Petrolat)

கிரான்ஸ்

2½

டிபாம்

½

கிரான்ஸ்

10

அவுன்ஸ்

1

ஒன்று சேர்த்துக் களிம்பாகச் செய்துகொண்டு எல்லா மூலங்களுக்கும் மலம் கழித்த ஒவ்வொரு தாமும், இரவு படுக்கைக்குப் போகுமுன்னும், மல வாயிலை சுத்தம் செய்தபின் தடவி வரலாம்.

கர்ப்பவதிகள் மேல்முச்சு—Apnoea in Pregnancy

பிரசவகால சமீப மாதங்களில் சிசுவானது, பூரண வளர்ச்சியை யடைந்து, சுவாசாசயங்களில் மோதுவதாலும்; சுவாசக் கருவிகளை யழுத்திக் கொண்டிருப்பதாலும்; இக்காலங்களில் சாதாரணமாக மூச்சுத்திணர லுண்டாவது வழக்கம்.

அடிக்கடி மலமூத்திரம் கழிந்தால் மூச்சுமுட்டுதல் சற்று சாந்தமாகவிரும் கும்; மேலும் மட்டான ஆகாரம் உட்கொள்ளுவதே சிலாகியமாகும்.

சிகிச்சை

(1) 387-வது பக்கம் 1-வது இலக்க லேகியம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) டிஞ்சர் காம்ப்ர கோ (Tincture Camphor Co) துளி 40
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 2

ஒன்று சேர்த்து நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

கர்ப்பவதிகள் வயிற்றிறைச்சல்:—

“கர்ப்பவதிகள் இரத்தபேதி” யென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

கர்ப்பவதிகள் வயிற்றுப் பொருமல்—Flatulence In Pregnancy

தகுதியற்ற ஆகாரங்களினால் அஜீரணப்பட்டு, கரு தரித்திருக்கும் 5, 6-வது மாதங்களி லேற்படலாம்.

சிகிச்சை

(1) வெந்தயம் ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ ரூர்த்திலாவரை ரூபாயெடை 1
ஒமம் ” $\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் காலை மாலை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) இஞ்சி லேகியம் கொடுத்து வரலாம் செய்முறை 6-பாகம் பார்க்கவும்.

(3) ஆக்குவா குளோரோபாரம் (Aqua Chloroform)

இதை நாள் ஒன்று 3-வேளை ஆகாரத்திற்கு முன் $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

கர்ப்பவதிகள் வயிற்று வலி—Colic in Pregnancy

கருதரித்த 5-ம் மாதக் கடைசியில், இது சிலருக்கு ஆகார விகல்பத்தினால் ஏற்படுகிறது. வயிற்றை இழுத்துப் பிடித்துக்கொண்டுவலிக்கும்; வயிற் றில் வலி ஆழப்பித்து இடுப்பு, தொடை முதலியவைகளும் வலிக்கும்; நீர் சுருக் கேற்படும்; ஆசனயெரிவு முண்டாகும். மலச்சிக்க விரந்தால், இவ்வு விசேசனகாரிகளால் மலச்சுத்தி செய்விக்வேண்டியது.

சிகிச்சை

- (1) சுக்கு ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$ கொத்தமல்லி ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
மிளகு " $\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து 12-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு, 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயம் 2, 3-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) பவன ஓமம் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

- (3) மாக்னீஷியம் கார்போனேஸ் (Magnesium Carbonas) கிரைன்ஸ் 20
சிரப் சிஞ்சிபர் (Syrup Zingiber) டிராம் ■
ஸ்பிரிட் குளோரோபாரம் (Spirit chloroform) " $\frac{1}{2}$
ஆக்குவா அனிதி (Aqua Anethi) அவுன்ஸ் 2

ஒன்று சேர்த்து ஒருமணி நேரத்திற் கொருநாள் 1-தேக்கரண்டி யள வாகக் கொடுத்து வரலாம்.

குறிப்பு:—இதையே வயிற்றுப்பொரும விருத்தாலும் கொடுக்கலாம்.

கர்ப்பவதிகள் வயிற்றோட்டம்—Diarrhoea in Pregnancy

வயிற்றோட்டம்; அஜீரணத்தினாலும், ஆகார விகற்பத்தினாலும், அசுத்த மான தண்ணீரினாலும் யேற்படலாம்; ஆனால், மலச்சிக்கலிப்போல் வயிற்றோட்டம் அவ்வளவு சாதாரணமா யேற்படுவதில்லை. வயிற் றோட்ட மதிகரிக்குமானாலும், மலத்துடன் இரத்தம் கழியுமானாலும் பிண்டத்திற்கு கெடுதி சம்பவிக்க விடமுண்டாகும்.

வயிற்றோட்டமுண்டானால், வயிற்றுவலி, வாய்நாற்றம், வாந்தி, புளித் தேப்பம், ஆசனக்கடுப்பு முதலியவைகளு மேற்படும்.

சிகிச்சை

- (1) கொத்தமல்லி ரூபாயெடை 1 சீர்தில் தண்டு ரூபாயெடை 1
கோரைக்கிழங்கு " 1 அதிவிடயம் " 1
வெட்டிலேர் " 1 சிற்றமுட்டி " 1
குருவிலேர் " 1 பற்பாடகம் " 1
பெருமரத்துப்பட்டை,, 1 சிறுபூனைக்காஞ்சொறி " 1

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து, இரவிலேயே 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் ஊறிப்போட்டு, காலையில் 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயம் 3-அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

- (2) மாசிக்காய் ரூபாயெடை 3 நெல்லிவற்றல் ரூபாயெடை ■
கடுக்தாய் " 3 மாதாளம்பழத்தோல் " ■
தான்றிக்காய் " 3

ஒன்று சேர்த்துச் சூரணித்துக்கொண்டு, காலை மாலை திரிகடி பிரமாணம், தேனிலாவது, பசு நெய்யிலாவது கொடுத்து வரலாம்.

(3) லகு அகிசாரமாத் திரை; லகு கட்டுவாங்க மாத்திரை; ஜாதிரலாதிச் சூரணம் இவைகளைக் கொடுத்துவரலாம். செய்யுறை 6-ம்பாகம்பார்க்கவும்.

(4) பிஸ்மத் சப்நைட்ரஸ் (Bismuth Subnitras)	கிரைன்ஸ்	60
கிரீட்டா பிரிபரேட்டா (Creta Prepareta)	"	120
டிஞ்சர் காம்ப்ர லோ (Tincture camphor oo)	அவுன்ஸ்	1½
டிஞ்சர் கைனோ கோ (Tincture Kino oo)	டிராம்	2
பல்விஸ் அக்கேஷியா கம்மி (Pulvis Acacia Gummi)	கிரைன்ஸ்	60
ஆக்குவா சின்னமோனி (Aqua cinnamoni)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்துக் கலக்கிக்கொண்டு, 3-மணிநேரத்திற் கொருதரம் ½-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

கார்ப்பவதிகள் ஜலதோஷம்—Puerperal Catarrh Nasal

இது சாதாரணமாக எல்லோருக்கும் உண்டாகும் தடிமனைப் போன்றதாகும் இதற்கு சாதாரண தடிமனுக்குள்ள சிகிச்சைகளே செய்யலாம்.

கார்ப்பவதிகள் ஸ்தன மெரிவு:—

கார்ப்பவதிகள் முலை எரிவுமென்ற நிலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

பால்காம்பு இரணம்—Sore Nipple

குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுக்கும்போது முலைக்காம்பு வலிசெண்டு வெடித்து புண்ணாகிவிடுவதுண்டு. வெடிப்புகள் கண்டால் புண்ணாகி விடுமென்று தெரிந்து கொள்ளலாம்.

உப சிகிச்சை

முலைக்காம்பு புண்பட்டு விடலாமென்று தோன்றினால், மாற்றி மாற்றி ஐஸ் (Ice) ஒற்றிடம் கொடுக்கலாம். பிராந்தி (Brandy) ஓயின் (Wine) இவற்றுடன் கொஞ்சம் தண்ணீர்கலந்து. பலதடவை ஸ்தனத்தைக் கழுவிவரலாம். புண்பட்டுவிட்டால் கீழ்க்கண்ட சிகிச்சைகளைச் செய்து வரலாம்.

சிகிச்சை

(1) பொரித்த வெங்காயம் ரூபாயெடை ½ சாராயம் அவுன்ஸ் 1
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 3

ஒன்று சேர்த்துத் துணியில் நனைத்துப் புண்ணின் மேல் போட்டுவரலாம்.

(2) வெங்காயம் ரூபாயெடை ½ வாதுமளன்னெய் ரூபாயெடை 1
பால்காம்பிராணி " ½ கோழி முட்டை வெள்ளைக்கரு " ½
கோழி முட்டை மஞ்சள்கரு " ½

ஒன்று சேர்த்தரைத்துப் புண்ணில் தடவி வரலாம்.

(3) சிட்ரின் ஆய்ன்ட் மென்ட் (citrin Ointment)
இதைத் தடவி வரலாம்.

(4) ஆவர்ட் போரிக் (Acid Boric)	டி.ராம்	1
கிளிசரின் (Glycerine)	"	2½

ஒன்று சேர்த்துத் தடவி வரலாம்.

பால்காம்பு வீக்கம்—Mastitis—Mammary Abscess

இது முதல் பிரஸவ ஸ்திரீகளுக்குத்தான் குழந்தைகளுக்குப் பால்கொடுக்கும் முதல் இரண்டாவது மாதங்களில் ஏற்படுவதுண்டு. சிலருக்கு பிரசவித்த 4, 5-தினங்களிலேயே உண்டாகி விடுகிறது. முலையின் தடித்த சர்மத்தில் கிளம்பும் இக்கட்டிக்கு முலைக்கட்டி, முலைக்காம்பு வீக்கம், பால்காம்பு வீக்கம், மருவிப்புருதி, ஸ்தனவிப்புருதி, ஸ்தனஸ்தாபிதம், என்று சொல்லப்படும்.

பால்தாரைவிரிவு, அதிகமான பால் சுரப்பு, கீடித்தநாள் பால் கொடுப்பது, அதிகமான பால்சரப்பிருக்கும்போதே குழந்தைகளுக்குப் பால்மறக்கச் செய்தல், துர்பலயினம் முதலியவைகளினால் முலைக்கட்டியுண்டாகலாம்.

முலைக்கட்டி யுண்டாயிருக்கும் சமயம், ஸ்தனங்கள் சிவந்து விம்மல்கண்டு, குத்துவலியுண்டாகும். தோள்பட்டையை அசைக்கக்கூடாத விதமாய் வலியாயிருக்கும். நாடிநடை கஷ்டித்திருந்தாலும் பேதகமின்றியிருக்கும். சர்மம் வரண்டு நாவரச்சியும், தலைவலியும், தூக்கமின்மைபு முண்டாகும். சிலநாள் சென்றால், சுரமுண்டாகி இழுப்பும் காணும்.

சிகிச்சை

முலைக்கட்டியினால் சுரமும், இதரக் கோளாறுகளு முண்டானால்:—

(1) சிட்லிஜ் பவுடர் (Seidlitz Powder)	கிரான்ஸ்	45
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்து இந்த விதமாய் 2, 3-தடவை கொடுத்து வரலாம்.

(2) இன்பியூஷன் சிரட்டா (Infusion Chirattae)	அவுன்ஸ்	1
எப்சம் சாஸ்ட் (Epsom Salt)	டி.ராம்	1

ஒன்று சேர்த்து, சுரம் நின்றவுடன் பேதியாகக் கொடுக்கலாம்.

(3) அங்குவண்டம் பெல்லடோனா (Unguentum Bella donnae)	அவுன்ஸ்	1
அங்குவண்டம் ஐட்ரார்ஜரி (Unguentum Hydrargeri)	டி.ராம்	4
இக்ஸ்யால் (Ichthyol)	"	4
பிளம்பி சப்சிடேட் (Plumbi Subacetate)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்து வீக்கமுள்ளவிடத்தில் தடவி பஞ்சுவைத்துக் கட்டி வரலாம்.

குறிப்பு:—3-ம் இலக்க மருந்து கொடிய விஷமுள்ளதானகையால், அதை உபயோகிக்குங்கால் குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுக்கக் கூடாது.

பால்காம்பு வெடிப்பு—Mammary Fissure

பால்காம்பு வெடிப்பு விசேஷமாக பால்கன்க ளடைப்பட்டிருப்பதாலும், இரவிக்கை (கஞ்சகம்) யை அழுத்தக் கட்டியிருப்பதினாலும், முதல் பிரசவ ஸ்திரீகளுக்கு உண்டாவதுண்டு

கரு தரித்திருக்கும் சமயங்களில் முக்கியமாகப் பிரசவகால சமீபத்தில் தேயிலை (Tea) கஷாயத்துடன், பழகாரம் சேர்த்து முலைக்காம்பு களைக் கழுவி வந்தால், பிரசவத்திற்குப் பின் பால் காம்பு வெடிப்பு உண்டாவதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம்.

சிகிச்சை

டிஞ்சர் காட்டிக்கு (Tincture Catechu)

இதைத் தடவி வரலாம்.

பால் சுரம்—Milk Fever

பால் சுரம் பிரசவமான ஒரு வாரத்திற்குப் பின்தான் உண்டாகும். இதை ஜீராகம் மென்றும் சொல்லப்படும். முலை யணைப்பில், பால் சுரந்து சிறு மாறுதலை யுண்டாக்குவதாலும்; பால் கட்டிக்கொண்டு ஸ்தனம் விம்மி வலி யுண்டாவதாலும்; பால் குறைவாகவும் அழுக்குக் குறைவாகவும் வெளிப்படும்போது இந்தச் சுரம் ஏற்படுகிறது.

பால்காத்தில் திரேகோஷ்ணம் மிகுதிப்பட்டு; குளிர்நடுக்கமும், வியர்வை யு முண்டாகும் கடும்தகு, இடுப்பு, தலை முதலியவைகளில் வலியுண்டாகும். முலை சிறுசு சிறுசு வீக்கம் கண்டு குத்துவலி யுண்டாகும். மூத்திரம், அழுக்கு பால் இவைகள் தடைப்படும். கைவிரல்கள் நீலமாக மாறியிருக்கும். நாடி க்ஷீணித்தும், படபடப்பாகவு மிருக்கும்.

இலகுவில் ஜீரணிக்கும் ஆகாரங்களைக் குறைத்த அளவில் கொடுத்து வர வேண்டும். ஸ்தனத்தில் பால் கட்டிக்கொண்டிருந்தால் முலைக்குழலால் (Breast Pump) வெளிப்படுத்தலாம். வலியதிசுமா யிருந்தால் ஐஸ் ஒற்றிடம் (Ice) கொடுக்கலாம். ஒடுக்கலானை (Elaud o Cologne) துணியில் நனைத்து ஸ்தனத்தின் மேல் போடலாம். சுரமிருக்கும்போது குழந்தைக்குப் பால் கொடுக்கக்கூடாது.

சிகிச்சை

(1)	கொத்தமல்லி ரூபாயெடை	1	செந்தில்தண்டு ரூபாயெடை	1
கோரைக்கிழங்கு	"	1	சிறுமுட்டி	" 1
வெட்டிவேர்	"	1	பற்பாடகம்	" 1
குருவிவேர்	"	1	அதிவிடயம்	" 1
பெருமரத்துப்பட்டை	"	1	சிறுபூனைக்காஞ்சொறி	" 1

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து, 48-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 6-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் காலி மாலை 2, 3-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) செட்லிஜ் பவுடர் (Seidlitz Powder)	கிரான்ஸ்	40
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	2

ஒன்று சேர்த்து, நான் ஒன்றுக்கு 3-தரம் இந்த விதமாகக் கொடுத்து வரலாம்.

பிரசவ இழுப்பு—Puerperal Convulsions

தலையின் பிரதான பாகங்களில் அழற்சிக்கொண்டு விடுவதினாலாவது; சிரோகங்களால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததினாலாவது, மலக்குடல், மூத்திரப்பை விரிந்திருப்பதினாலாவது, புண்பட்டு விடுவதினாலாவது, கருப்பையின் வாய் அதிகமாய் விரிந்து போவதினாலாவது, சிசு உதயமாகி, யோனிப்பாதையில் அதிக நேரம் நின்றுபோவதினாலாவது, பிரசவ சமயத்திலும், பிரசவத்திற்கு பின்னும், அல்லது முன்னும்; சிலசமயம் கருதரித்த 6-மாதத்திற்கு பின்னாவது பிரசவ வலிப்பு காணுவதுண்டு.

இருந்தாப்போலிருந்து, கைகால்கள் இழுப்புக்காணும். தலைபாரம் தலையிலடிபட்டதைப்போன்ற உணர்ச்சி, தலைவலி, உச்சந்தலை எரிவு, முகம் கடுகடுப்பு, கண் சிவத்தல், கைத்திரிர், கிறுகிறுப்பு, காதிரைச்சல், இருதயத்தின்மீழ் வலி முதலிய கோளாறுகளேற்படும். நாடிநடை ஊர்ணித்திருக்கும். இழுப்புச் சரியாக ஆரம்பித்துவிட்டால் பிரக்ஞையற்றுப்போய்; முகம் கோணல் கோணலாக விழுக்கும்; வாயில் நுரைத்தளரும்; பற்கடிப்பேற்பட்டு முகம்வீங்கி, சுவாசம் நின்றுநின்று வரும். மல மூத்திரம் தன்னையறியாமல் கழியும்; திரோகம் சில்விட்டு வியர்வை புண்டாகும். இந்த இழுப்பு 5-நிமிஷங்களுக்குமேல் நீடிப்பதில்லை; 20-நிமிஷங்களுக்கு முன்னும் திரும்பி இழுப்புண்டாவதில்லை; இழுப்பு விட்டவுடன் ஊக்கத்திலிருந்து தெழுவுதல்போலிருக்கும்.

உப சிகிச்சை

இழுப்புக் கண்டவுடன் காற்று வீசும்படியாய் ஒரு இருண்ட அறையில் படுக்கவைக்கவேண்டும். சிரசும் பாதங்களும் உடலிவ்விருந்து உயரமாகி வைக்கவேண்டும். சிரசில் ஐஸ் (Ice) ஒற்றிடம் கொடுக்கலாம். சிசு வெளிப்படும் சமயம் இழுப்புக் கண்டவிட்டால், சிசுவை ஆபத்ததரல் வெளிப்படுத்த வேண்டும். மலச்சிக்கலிருந்தால் எனிமா கொடுத்து மலசுத்தி செய்ய வேண்டும்.

சிகிச்சை

இழுப்பிருக்கும் சமயம்:—

- (1) காடியைத் தண்ணீருடன் கலந்து தலையில் தடவலாம்.
- (2) குளோரல் ஹைட்ரேட்ஸ் (Chloral Hydras) கிரான்ஸ் 20
பொட்டாஷியம் புரோமைட் (Potassium Bromide) ,, 40
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து இந்த விதமாக 3-மணி நேரத்திற்கு கொருதரம் ஆசனத்தின் வழியாய் எனிமா (Enema) கொடுக்கலாம்.

இழுப்பு ஆரம்பிக்கும் சமயம்:—

(8) குளோரல் ஹட்ரஸ் (Chloral Hydras)	கிரைன்ஸ்	20
பொட்டாஷியம் புரோமைட் (potassium Bromide)	"	40
சிரப் ஆரண்டி (Syrup Auranti)	டிசராம்	1
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	1

ஒன்றுசேர்த்து 2-மணிநேரத்திற் கொருதரம் இந்தவீதம் கொடுக்கலாம்.

பிரசவ சன்னி—Puerperal Septicaemia

பிரசவ சமயங்களில், கருப்பை, யோனிப்பாகை இவைகளில் அஜாக்ரகையினால் ஏற்படும் புண்ணுகளில், விஷக்கிருமிகள் தொத்தி, இரத்தத்தை விஷமிக்கச்செய்து, சன்னியை புண்புண்ணுமானால், அதை பிரசவ சன்னி; பிரசவ சன்னி கிராம்; காயாகுவாதம் என்று சொல்லப்படும்.

பிரசவித்த இரண்டு மூன்று தினங்களுக்குப்பின், இருமலும் குளிர்காச்சலும் மேற்படும். அழுக்கு, மலம், மூத்திரம், பால்இவைகள் தடைப்படும். அடிவயிற்றில் வீக்கம்கண்டு, ஓயாதவயிற்று வலி ஏற்படும். காச்சல் மிகுதியான பின்வயிற்றுப்பொருமலும், வாந்தியும், கழிச்சலும் மேற்படும். நெஞ்சுவலியும், பெருமூச்சியும் ஏற்பட்டு, மயக்கமும் மூச்சுத் திணரலும் கண்டுமரணமுண்டாகும். பிரசவசன்னி 5, 7, 9, 18-நாட்களில் மரணத்தை புண்டாகும்; 18-நாட்களுக்கு மேற்சென்றால் விபத்தொன்று முண்டாவதில்லை.

சிகிச்சை

(1) நன்னூரிவேர் ரூபாயெடை	1½	கோஷ்டம்	ரூபாயெடை	1½
கூதுவேளைவேர்	1½	திப்பிலி	1½	1½
கொடிவேலைவேர்	1½	கருஞ்சிரகம்	1½	1½
இலாமிச்சைவேர்	1½	சதகுப்பை	1½	1½
சங்கன்வேர்	1½	செண்பகப்பு	1½	1½
முருங்கையீர்க்கு	1½	வெளுச்சிப்பிளின்	1½	1½
கோரைக்கிழங்கு	1½	அரிதாரம்	1½	1½
அதிமதுரம்	1½	வேப்பெண்ணெய்	அவுன்ஸ்	24

சரக்குகளையெல்லாம் ஒன்றுசேர்த்துப்பொடித்து, வேப்பெண்ணெயை நன்றாகக்கொதிக்கவைத்து அதில் போட்டிதக்கி, வடித்து; தலை, உடல்இவற்றில் தடவி, தவிடும், கருநொச்சி யிலையையும் போட்டு வறுத்து ஒற்றிடம் கொடுக்கலாம்.

(2) சேந்தில்தண்டு ரூபாயெடை	1	செவ்வியம்	ரூபாயெடை	1
கண்டங்கத்திரிவேர்	"	1	சுக்கு	"
ஆடாதோடைவேர்	"	1	மிளகு	"
கூதுவேளைவேர்	"	1	திப்பிலி	"
சீழ்க்காய்கெல்லி	"	1	சுடுக்காய்	"
சிறுதேக்கு	"	1		

ஒன்றுசேர்த்துப் பொடித்து 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்போட்டு 3-அவுன்ஸ் ஸாக்சு சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் 3-மணி நேரத்திற்கு ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து, மேல் கண்ட தைலத்தைத் தடவி வரலாம்.

(3) காலோமல் (Calomel)	கிரான்ஸ்	8
கொய்னைன் சல்பஸ் (Quinine Sulphus)	,,	16
டோவரஸ் பவுடர் (Dover's Powder)	,,	40
பல்விஸ் சிஞ்சிபரிஸ் (Pulvis Zingiberis)	,,	18

ஒன்றுசேர்த்து 8-பாகமாகப் பிரித்து மடித்துக்கொண்டு, 4-மணிக் கொடுத்தும் ஒரு பாகம் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(4) கொய்னைன் (Quinine)	கிரான்ஸ்	24
ஆலிட் ஐட்ரோ புகராமிக் அிட் (Acid Hydrobromic Dill)	டிராம்	■
பரிகோரிக் (Paregoric)	,,	■
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	■

ஒன்றுசேர்த்து நான் ஒன்றுக்கு 3-வேளை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

பிரசவத்தில் இழுப்பு—Tetanic Contraction During Labour

இதைப்பற்றி 394-ம் பக்கம் பிரசவ இழுப்பென்ற தலைப்பின் கீழ் கூறப் பட்டிருக்கிறது. விசேஷமாகப் பிரசவ சமயத்தில் இழுப்புண்டானால் கீழ்க்கண்ட சிகிச்சை செய்யலாம்.

சிகிச்சை

(1) டிஞ்சர் ஐயோடிமிட்டிஸ் (Tincture Iodinitis)	துளி	20
ஆல்கோஹால் (Alcohol)	,,	45

ஒன்று சேர்த்து வைத்துக்கொண்டு 1-மணி நேரத்திற்கு கொருதரம், ஒரு அவுன்ஸ் சுடுதண்ணீரில் 5-துளி மருந்தைக் கலந்துக் கொடுத்து வரலாம்.

பிரசவத்தில் நடுக்கம்—Shocking During Labour

சிலசமயங்களில் பிரசவமாகும்போது, நடுக்கங்கண்டு, சிசுவை வெளித் தள்ள முடியாத நிலைமை உண்டாகிவிடும்.

சிகிச்சை

(2) லைக்ஸ் மார்பைன் ஐட்ரோகுளோரைட் (Liquor Morphine Hydrochloride)	துளி	
ஸ்பிரிட் அமோனியம் பேட்டிட் (Spirit Amonium Fetid)	டிராம்	
ஆக்குவா காம்ப்ர் (Aqua Camphor)	அவுன்ஸ்	
ஒன்று சேர்த்து, ஒரே தடவையாகக் கொடுக்கலாம்.		

பிரசவத்திற்குப்பின் அடிவயிற்றுவலி—After Pains

இதையே சுண்ணேலி, மண்நந்தி நோய், எனப்படும். சுண்டுவலி இரண்டாவது பிரசவத்திலிருந்து ஆரம்பித்து, பின் எல்லா பிரசவங்களிலுமேற்படும்.

பிரசவத்திற்குப்பின், வெறுமையான கருப்பை தன் இயற்கை அளவிற்கு சுருங்குவதினாலேயே இந்த வலி யேற்படுகிறது. பிரசவ சமயங்களில் குளோரோபாரம் (Chloroform) அதிகம் முகர்ந்தவர்களுக்கு இவ்வலி அதிகமாயேற்படும். பிரசவமான இரண்டாமணி நேரத்திற்கெல்லாம் குழந்தைக்குப்பால் கொடுக்கப்படுமானால் இந்தவலி யுண்டாகாது.

இந்த வலி அடிவயிற்றை இழுத்துப் பிடித்துக்கொண்டு சகிக்கமுடியாமல் வலியையுண்டாகும். வலி சற்று விட்டு சில நிமிஷங்களில் திரும்ப உண்டாகும்.

சிகிச்சை

(1) சுக்கு	ரூபாயெடை 1	எலம்	ரூபாயெடை 1
மிளகு	,, 1	இலவங்கப்பத்திரி	,, 1
திப்பிலி	,, 1	இலவங்கப்பட்டை	,, 1

ஒன்று சேர்த்துச் சூரணித்துக்கொண்டு, ஒரு ரூபாயெடை சூரணத்தை பனைவெல்லத்துடனாவது, சமுரீர் தண்ணீரில் கலக்கியாவது 2-மணி நேரத்திற்கொருதரம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) மஞ்சர் ஒபியம் (Tincture Opium)	டிராம் 1½
ஸ்பிரிட் ஈதர் நைட்ரோஸி (Spirit Aether Nitrosi)	,, 1
ஆக்குவா காம்பர் (Aqua Camphor)	அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து, 4-மணி நேரத்திற்கொருதரம் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(3) லைக்கர் மார்பைன் ஐட்ரோகுளோரைட் (Liquor Morphine Hydrochloride)	தளர் 15
ஸ்பிரிட் குளோரோபாரம் (Spirit Chloroform)	,, 30
ஆக்குவா காம்பர் (Aqua Camphor)	அவுன்ஸ் 1½

ஒன்றுசேர்த்து, வலிவந்திருக்கும் சமயம் ஒரே தடவையாகக் கொடுக்கலாம்.

பிரசவத்திற்குப்பின் அற்பக்காச்சல்—Sympathetic Fever After Labour

பிரசவிக்கும்போது, இரைப்பை, ஈர்ல், இவைகளில் அழற்சி யுண்டாவதினாலும்; மனோவியாகூலம், அதிபலஹீனம், பத்திய விகல்பம், ஊக்கக் கேடு, அதிகக் குளிர் இவைகளினாலும்; பிரசவித்த 2, 3-நாட்களில் சூ முண்டாகலாம். இதை கீத காமென்றும் சொல்லுவர்.

சரம் குளிருடன் ஆரம்பித்து சடுத்தியில் மாறிவிடும்; சிலருக்கு முறை சரம் போல் குறித்த நேரத்தில் வந்தும், சிலருக்கு ஸ்திராமாக விருந்துவிடுவது முண்டு.

சிகிச்சை

(1) பலாதிரசாரக் கஷாயம் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(2) காலோமல் (Calomel) கிரான்ஸ் 1

இதைக் கொடுத்து, 1-மணி நேரத்திற்குப்பின் கிலாவரைக் கஷாயம் (Infusin Sennae) கொடுத்தால் மலமும் கழிந்து, சரமும் நீங்கும்.

பிரசவத்திற்குப்பின் ஆபத்தான மயக்கம்—Fatal Syncope After Labour

நிரோகத்தில் வட்டமிடும் (Circulation) இரத்தம் தடைப்படுவதினாலும் இந்தப் பிரசவ ழர்க்சை யுண்டாகிறது; அநேகமாக கஷ்டப் பிரசவத்தில் தான் இது அதிகம் காண்பதுண்டு.

பிரசவித்த ஒருமணி நேரத்திற்குள், நெஞ்சு வலியும், விலாப்பக்கம் சிறுவலியும் கண்டு, குமட்டலுண்டாகி சுவாசம் தடைப்பட்டுவிடும்; முகம் சருங்கி பயங்கரமாயிருக்கும்; நாடி நடை கஷிணித்தும், விட்டுவிட்டும் நடக்கும்; நாவை உன்றாக் கிழுத்துக்கொண்டு, பற்கிட்டி விபத்தை யுண்டாக்கும்.

சிகிச்சை

(1) வங்கேஸ்சா ரசநஸ்யம் சர்வேஸ்கா ரசநஸ்யம் இவைகளை யுபயோகித்து ழர்க்சையைத் தெளிவிக்கலாம்; ழர்க்சை தெளிந்தபின் வங்கபஸ்பம்; ஸ்ரீதேவி எண்ணெய் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும். மேலும், 387-ம் பக்கம் 1-வது இலக்க லேகியத்தையும் கொடுத்து வரலாம்.

(2) ழர்க்சையா யிருக்கும்போது அமோனியம் கார்போனஸ் (Ammonium carbonas) முகரக் கொடுக்கலாம்.

(3) பிராந்தி (Brandy) யுடன் கொஞ்சம் தண்ணீர் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

(4) ஸ்பிரிட் அமோனியம் அரோமாட்டிக் (Spirit Ammonium Aromatic) டிபராம் ½
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்த்து இந்தவிதமாய் 3-மணி நேரத்திற்கொருதரம் கொடுத்து வரலாம்.

பிரசவத்திற்குப்பின் இரத்தப் பெருக்கு—Flooding After Labour

பிரசவத்திற்கு முன்னாலேயேனும்; பிரசவ சமயத்திலேனும்; பிரசவித்த ஒன்றிரண்டு நிமிஷத்திலேனும் இரத்தப்பெருக் கேற்படுவதுண்டு. இதையே பிரசவப் பெரும்பாடு என்று கூறுவர். பிரசவித்த ஒரு மணி நேரம் வரையில் இரத்தப்பெருக் கண்டு கிரான்ஸ் 1-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

பிரசவித்தவுடன் நாடி நடை சற்று தளர்ந்திருந்து; சற்று நேரத்திற் கெல்லாம் படபடப்பாய் நடக்க வாரம்பித்தாலும்; பிரசவித்த ஸ்திரீ அலுத்துப் போயிருக்கும்போது நாடி தீவிரப்பட்டாலும்; இரத்தப் பெருக்கேற்படலாம்.

படிப்படியாகவாவது, இருந்தாற்போ விருந்தாவது, சூதகப் பெருக்குண்டாகும். இரத்தப்பெருக்கை அதிகப்பட விட்டால்; அதிக களைப்பும், மயக்கமு முண்டாகி, நாடி நடை கஷ்டணித்து, முகம் வெளுத்து, வியர்வை பெருகி, மேல்மூச்சுக் கண்டு சிசிச்சைக்கு வசப்படா தொளியும்.

உப சிகிச்சை

ரோகஸ்திரீயைத் தரைமட்டமாய் படுக்கவைத்து இடுப்பு கச்சையை இறுக்கிக் கட்டிவிடவேண்டும் ஐஸ் (Ice) தண்ணீரை யோனிக்குள் அடிக்கலாம்; குளிர்ந்த தண்ணீரில் துணியை நனைத்துக் கடிதடம், அடிவயிறு இவற்றில் போடலாம்; ஐஸ் கட்டியோ யோனிக்குள் செலுத்தி வைக்கலாம். இரத்தப்பெருக்கு நின்றவுடன் அடிவயிற்றில் தடவி பார்க்க கருப்பையில் கட்டிகள் தட்டுப்பட்டால், ஜாக்ரதையாகக் கையினால் அதை அப்புறப்படுத்த வேண்டும். இரத்தப் பெருக்குச் சமனப்பட்டதும், கருப்பையை சுடுதண்ணீரால் கழுவி, அடிவயிறு, முதுகு இவ்விடங்களில் சுடுதண்ணீர் ஒற்றிடம் கொடுக்கலாம்.

இரத்தப்பெருக்கு இருக்கும் சமயம் களைத்துப் போகாமலும், ஊக்கம் குன்றாமலு மிருக்க கொஞ்சம் பிராந்தி (Brandy) யுடன் தண்ணீர் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம். மாமிச சூப்புகள் (Soup) கொடுக்கலாம்.

சிகிச்சை

(1)	ஓமம்	ரூபாயெடை	1	வெங்காயம்	ரூபாயெடை	1
	மிளகு	"	1	வெந்தயம்	"	1
	சுக்கு	"	1	கடுக்காய்	"	1
	மாசிக்காய்	"	1	அதிமதரம்	"	1
				முற்றினபுளியிலைசாறு	அவுன்ஸ்	12

ஒன்று சேர்த்து, மேற்படி சாற்றால் அரைத்துக் கலக்கிக் நாய்ச்சி வடிக்கடி ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்து வரலாம்.

(2) பாலாதிசாரக் கஷ்டமும் கொடுத்து வரலாம். செய்யுறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(3) எக்ஸ்டிராக்ட் எர்கட் லிக்குட் (Extract Ergot Liquid) துளி 20
டிஞ்சர் ஓபியம் (Tincture Opium) " 5
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்த்து, இந்தவிதமாய் கலந்து நாள் ஒன்றுக்கு 3-தடவை கொடுத்து வரலாம்.

பிரசவத்திற்குப் பின் ஒற்றைத்தலைவலி-Hemicrania After Labour

பிரசவமான சிலநாட்களுக்குப் பின்னர் சிரசின் பின்புறம், நெற்றி, கன்னம், புருவம் முதலிய விடங்களில் வெடித்துப் பேரவதைப்போன்ற

குத்துவவி புண்டாகும் இதைக் கிருத்திராசிவாத மென்பர். இவ்வியாதி புள்ளவர்கள் குழந்தைக்குப் பால் கொடுக்கக்கூடாது.

சிகிச்சை

(1) இஞ்சிச்சாறு அவுன்ஸ் 48 நல்லெண்ணை அவுன்ஸ் 48
ஒன்று சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து ஸ்நானம் செய்து வரலாம்.

(2) எருக்கம்பேர் ரூபாயெடை 1 அரிதாரம் ரூபாயெடை 1
ஒன்று சேர்த்து எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் அரைத்து ஒரு மெல்லிய
துணியில் தடவி திரிபாகச்செய்து; உலர்த்தி கொளுத்தி புசையை முகா
வாம்.

(8) ராஜாங்கக் கொம்பாக்குத் தயிலத்தால் ஸ்நானம் செய்து வரலாம்.
செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(4) பியூட்டல் குளோரல் ஐட்ரஸ் (Butel Chloral
Hydros) கிரைன்ஸ் 40
டிஞ்சர் ஜெல்சமி (Tincture Gelesemii) துளி 40
கிளிசரின் (Glycérine) டிராம் 11
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 4

ஒன்று சேர்த்து, முதல் தடவை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து, பின்
2-மணி நேரத்திற் கொருதடவை அரை அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

தற்பு:—மறுநாளும் வலியிருந்தால் 6-மணி நேரத்திற் கொருதடவை
1/2 அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

பிரசவத்திற்குப் பின்காணும் வியர்கூரு சுரம்—Miliary Fever After Labour

பிரசவத்திற்குப்பின் ஸ்திரீகள், உஷ்ணமான பானங்களையும், காரமான
பதார்த்தங்களையும் உட்கொள்ளுவதினால், முகம், கழுத்து, முதுகு,
முதலிய விடங்களிலும், சிலருக்கு திரோகம் முழுவதிலும், தனைப்
போன்ற வியர்கூறுகளுடன் சுரம் காய்வதண்டு. இதைத் தீனைக் கூர்
மென்றும் சொல்லுவர் இச்சுரத்தில் அடிக்கடி வியர்வை புண்டாகும்.

சிகிச்சை

(1) பல்விஸ் அமைலி (pulvis Amyli) டிராம் 11
விக் ஜுஸைட் (Zinc Oxide) ” 11 1/2
பல்விஸ் காம்பர் (pulvis Camphor) ” 11 1/2
ஒன்று சேர்த்து மேல்பிரயோகமாக வியர்கூருகளில் தடவலாம்.

(2) மாக்னீஷியம் சல்பேட் (Magnesium Sulphate) டிராம் 1
ஒலியம் கஜபுட்டி (Oleum Cajuputi) துளி 1
சிரப் டூலு Syrup Tolu) டிராம் 2
லைக்ஸ் மாக்னீஷியம் கார்போனேட் (Liquor Magnesium
Carbonate) அவுன்ஸ் 3

ஒன்று சேர்த்து நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை, கொஞ்சம் தண்ணீரில் ஒரு தேக்கரண்டி மருந்து கலந்துக் கொடுத்து வரலாம்.

பிரசவத்திற்குப்பின் கால் வீக்கம்-Oedema of Legs After Labour

இரத்தம் கெட்டு மிகுந்த பலயீனமாயிருந்த ஸ்திரீகளுக்கே இது உண்டாகலாம்; முதல் பிரசவத்தில் கால்வீக்கம் கண்டால், பின் எல்லா பிரசவங்களிலும் வீக்கம் காணும்.

தொடையின் முன்பக்கத்திலிருந்து ஆரம்பமாகி, இடுப்பின் மேற்பாகங்களிலும், சில சமயம் உடல் முழுவதும் வீக்கமுண்டாவதுண்டு, சிலருக்கு ஒரு காலிலாகிலும், சிலருக்கு இரு கால்களிலுமாகிலும் முண்டாகும். இவ்வீக்கத்தினால், சுரம், குளிர் நடுக்கம், திரேகவாட்சி, தலைவலி முதலியவைகளுமிருக்கும்; நாடிநடை தீவிரமாகவிருக்கும்; உடம்பில் வலிகண்டு, வலியுள்ள விடங்களில் வீக்கம்கண்டு, பளபளப்பாக விருக்கும்; சில சமயம் அறையில் நெறி கட்டுவதுமுண்டு. காவில்மாவுபடித்து, முட்கள் முளைத்திருக்கும். இந்த வீக்கம் 15, 20-நாளையில் குணப்பட்டுப் போவதுமுண்டு; சிலருக்கு நீண்டநாளிருப்பதுண்டு.

சிகிச்சை

(1) காராயண மண்டோ செந்துரம்; திரிலோகச் செந்துரம்; துரிசு பஸ்பம்; அயமெழுகு, ராஜாமிர்த சஞ்சீவி லேகியம்; சிந்தாதி லேகியம்; திரிபுவன செந்துரம்; கரிசலாங்காணிச் சூரணம்; இவைகள் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(2) ஸ்பிரிட் ஜுனீபர் (Spirit Juniper)	துளி	45
காபீன் சிட்ரஸ் (Caffine Citras)	கிரான்ஸ்	3
டிஞ்சர் கரூபிஸ் இன்டிகா (Ticture Cannabis Indica)	துளி	1
ஸ்பிரிட் குளோரோபாரம் (Spirit Chloroform)	"	15
இன்பியூஷன் ஸ்கோபாரி (Infusion Scoparii)	அவுன்ஸ்	1

ஒன்று சேர்த்து நான் ஒன்றுக்கு 3-தடவை ஒரு அவுன்ஸ் தண்ணீரில் ½-அவுன்ஸ் மருந்து சேர்த்துக் கொடுத்து வரலாம்.

பிரசவத்திற்குப்பின் கைகால் எரிவு:—

சில ஸ்திரீகளுக்குப் பிரசவத்திற்குப் பின் கால் எரிச்சலுண்டாகும். இதை அழல்வாத மென்று கூறுவர்.

சிகிச்சை

(1) சுக்கு	ரூபாயெடை	1	கிராம்பு	ரூபாயெடை	1
மிளகு	"	1	அதிமதுரம்	"	1
திப்பிலி	"	1	ஏலம்	"	1
ஓமம்	"	1	கலியாணப்பூசணிவற்றல்,	"	1

■ கலியாண பூசணிக்காயைப் பிளந்து, விரையையும், சோற்றையும் போக்கி, துண்டித்து காயவைத்து.

ஒன்று சேர்த்துச் சூரணித்து, காலை மாலை ஒரு திரிகடிபிரமாணம் சூரணத்தில் வெண்பாவட்டைச் சூறு 2-துளியும், தேன் 4-துளியும் விட்டுக் கலந்து கொடுத்து வரலாம்.

(2) ஏலம்	ரூபாயெடை 1	செங்கழுநீர்க்கிழங்கு	ரூபாயெடை 1
அதிமதுரம்	" 1	கையாந்தரைச்சாறு	அவுன்ஸ் 12
கோஷ்டம்	" 1	பசும்பால்	" 12
செண்பகப்பூ	" 1	நல்லெண்ணெய்	" 12
வெட்டிவேர்	" 1		

ஒன்று சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து, தலையிலும் தடவி, கால்களிலும் தடவி வரலாம்.

(3) பொட்டாவியம் புரோமைட் (Potassium Bromide)	டிராம் 1
இன்பியூஷன் சார்ஜா (Infusion Sarsae)	அவுன்ஸ் 6

ஒன்று சேர்த்து, நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுதடவை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

பிரசவத்திற்குப்பின் நாவரட்சி—Thirst After Labour

பிரசவத்திற்குப்பின் குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுக்கும்போது, ஆகார வேறுபாட்டினால் தாகமும், நாவரட்சியும் காண்பதுண்டு.

சிகிச்சை

(1) மது தானியத்திலிருந்து சூரணம் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(2) ஆவூட் பாஸ் போரிக் அிட் (Acid phosphoric Dil)	டிராம் 2
பார்லி அரிசிச் சுஞ்சிரீர் (Barley Water)	அவுன்ஸ் 40

ஒன்று சேர்த்து, தாகமுண்டாகும் போதெல்லாம் 2, 3-அவுன்ஸ் கொடுத்து வரலாம்.

பிரசவத்திற்குப் பின் பயித்தியம்:—

இதைப் பிரசவப் பயித்திய மென்று சொல்லப்படும். இதைப் பற்றிய விவரம் 380-ம் பக்கம் “சர்ப்பவதிகன் பயித்தியம்” என்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

பிரசவத்திற்குப் பின் பிராணமோசமான மயக்கம்:—

பிரசவத்திற்கு பின் ஆபத்தான மயக்கமென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும். பிரசவத்திற்குப் பின் வயிறு பழுத்தல்:—

23-ம் பக்கம் “வயிறு பழுத்தல்” என்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

பிரசவத்திற்குப் பின் வயிற்றுப் பொருமல்—Flatulence After Labour

பிரசவத்திற்குப்பின் ஆகார விசல்பத்தினால் வயிற்றுப் பொருமலும் வயிற்றுவலியு முண்டாவதுண்டு.

சிகிச்சை

(1) பெருக்காயம்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	சடுக்காய்	ரூபாயெடை 2
சசம்பு	$\frac{3}{4}$	திப்பிலி	" 2 $\frac{1}{2}$

கொடிவேலிவேர்பட்டை	1	கோஷ்டம்	2½
சக்கு	1½	சிவதைவேர்	1
மூம்	1½		

ஒன்று சேர்த்து இவ்வறுப்பாய் வறுத்துச் சூரணித்துக்கொண்டு பசு நெய்யில் திரிகடி பிரமாணம் சேர்த்துக் குழப்பிச் கொடுக்கலாம். (பத்தியம்.)

(2) ராஜசுந்தாதி வேலியம்; மகாதானிசப்பத்திரிச் சூரணம் முதலியவைகள் கொடுத்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்சுவம்.

(3) பெரட்டாஷியம் கார்போனேட் (potassium carbonate) டிராம் 1
டிஞ்சர் ஜென்ஷன் கோ (Tincture Gentain co) 1
இன்பியூஷன் கலம்பா (Infusion calumbae) அவுன்ஸ் 5

ஒன்று சேர்த்து, 4-மணி கேரத்திற் கொருதரம் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

பிரசவிக்கக் கஷ்டப்பட்டால்—Difficult in Parturition

சம்பூரண பிரசவ நாட்களில், தகுதியானவிதமாய் இடுப்பு வலி கண்டு பணிக்குட முடைந்தும், சிரசு உதயமாகாம லாவது; அல்லது சிரசு உதயமாகி நீண்டநேரம் சிசு வெளிப்படாதிருந்தால் சிகிச்சை செய்ய வேண்டியது அவசியமாகும். பணிக்குட முடைந்த வெகு நேரத்திற் குப் பின்னும், சிரசு உதயமாகாமல் தாமதப்படுமபடித்தில், உதயமாகப்போகும் உருப்பு இன்னவென அறிந்துகொள்ள வேண்டும். சிரசு மாத்திரம் உதயமாவதுபோ லிருந்தால் கீழ் கண்ட சிகிச்சைகள் பயனுடையதாக விருக்கும். மற்ற விவரங்களுக்கு 16-ம் பக்கம், “தாமதப் பிரசவ” மென்ற தலைப்பின்கீழ் பார்க்கவும்.

சிகிச்சை

(1) நாய் மண்ணை ஓட்டை சூரணித்து, சிற்றமணக்கெண்ணெயில் குழப்பி உள்ளுக்கும் கொடுத்து அடிவயிற்றிலும் தடவலாம்.

(2) பசுவிலைச்சாறு அவுன்ஸ் 6-ம், நல்லெண்ணெய் அவுன்ஸ் 6-ம் ஒன்று சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

(3) சிவஞர்வேம்பை முலைப்பாலி லரைத்து அடிவயிற்றில் தடவலாம்.

(4) டார்டார் எமட்டிக் (Tartar Emetic) கிரான்ஸ் 10
தண்ணீர் அவுன்ஸ் 10

ஒன்று சேர்த்து 10-நிமிஷத்திற் கொருதரம் ஒரு தேக்கரண்டி யளவாகக் கொடுத்து வந்தால் வார்த்தியுண்டாகி, சிரசு உதயமாகும்.

பிரசவித்தபின் காணும் நீரடைப்பு—Anuria After Labour

பிரசவமான 8, 12-மணி நேரங்களுக்குள் மூத்திரம் கழிவவேண்டும். அதற்குள்ளாக மூத்திரம் கழிவதினால் தோஷமில்லை; ஆனால், மூத்திரம் கழிய வில்லையானால் சிகிச்சை செய்யவேண்டும். அது அநேகமாய் எல்லோருக்கும் ஏற்படுவதில்லை. கஷ்டப்பிரசவம், தாமதப் பிரசவம் இவைகளினால் பாணதையடைந்தவர்களுக்கு ஒரு சமயம் ஏற்படலாம். குறித்தநேரத்திற்குள் நீரிளக்கவிலையானால் சிலாகையினால் (Catheter) வெளிப்படுத்தலாம்.

சிகிச்சை

- (1) கர்ப்பவதிகள் நீரடைப்புக்குச் சொல்லிய மருந்துகளைக் கொடுத்து வரலாம்.
- (2) லைக்கர் பொட்டாஷ் (Liquor Potash) டிராம் 2
 பொட்டாஷியம் நைட்ரஸ் (Potassium Nitrates) „ 2
 டிஞ்சர் ஷல்லி (Tincture Scillae) „ 6
 ஸ்பிரிட் ஈதர் நைட்ரோசி (Spirit Aether Nitrosi) „ 8
 சுடுதண்ணீர் அவுன்ஸ் 6

ஒன்று சேர்த்து நான் ஒன்றுக்கு 3-தடவை ஒரு அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 2 தேக்கரண்டி மருந்து கலந்து கொடுத்து வரலாம்.

பிரசவித்தபின் காணும் மலச்சிக்கல்—Constipation After Labour

பிரசவித்த 4, 5-நாட்களுக்கு மலம் கழியாதிருப்பது ஒரு வகையில் நன்மையைத் தரக்கூடியதாகும்; 4, 5-நாட்களுக்குப்பின் மலம் தானாகவே கழியவில்லையானால் இலகு வீரேசன காரிகளால் மலம் கழியும்படியாகச் செய்யவேண்டும்; 4, 5-நாட்களுக்குப்பின் மலம் கழியவில்லையானால் தலைவலி, தலைபாரம், வயிற்றுவலி இவைகளுண்டாகும்.

சிகிச்சை

- (1) காயந்தரோஜா மொக்குளை நெய்யில் வறுத்துச் சூரணித்துக்கொண்டு, 1-ரூபாயெடை ரூரணத்துடன் சமன்சர்க்கரைச் சேர்த்துக்கொடுக்கலாம்.
- (2) நிலாவரை அல்லது சரக்கொன்றை இலையுடன், உப்பு, புளி, மிளகாய் பெருங்காயம் சேர்த்து, துகையலாகவரைத்து ஆகாரத்துடன் உட்கொள்ளலாம்.
- (3) மாக்னீஷியம் கார்போனேட் (Magnesium Carbonate) கிரைன்ஸ் 40
 பல்விஸ் ரீயை (Pulvis Rhei) „ 15
 பல்விஸ் சிஞ்சிபரிஸ் (pulvis Zingiberis) „ 6
 ஒன்று சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

பிரசவித்தபின் காணும் வயிற்றோட்டம்—Diarrhoea After Labour

பிரசவித்தபின் ஜீரண உருப்புடன் மிகுந்த பலவீன மடைந்திருக்கும்போது கடினமான ஆகாரங்களை உட்கொண்டதினால் இந்த வயிற்றோட்டமேற்படுகிறது; இந்த வயிற்றோட்டத்தில் குடல்களின் செய்கைகள் பேதப்படுமானால் அசாதாரணமாகவே முடியும்; ஆதலால், ஆரம்ப சிகிச்சை மிகவும் அத்தியாவசியமாகும்.

சிகிச்சை

- (1) காட்டாத் திப்பூ ரூபாயெடை 1 நாவற்பழக்கொட்டை ரூபாயெடை 1
 நெல்லிவற்றல் „ 1 மாம்பரும்பு „ 1
 கோரைக்கிழங்கு „ 1 விளாம்பட்டை „ 1
 வட்டத்திருப்பிவேர் „ 1 சுக்கு „ 1

ஈசுரமுலிவேர்	”	1	அதிவிடயம்	”	1
அதிமதுரம்	”	1	வெட்டரலையரிசி	”	1
வில்வப்பிஞ்சு	”	1			

ஒன்றுசேர்த்துச் சூரணித்து வைத்துக்கொண்டு, மாலை மாலை அரிசிகழு விய தண்ணீர் அவுன்ஸ் 2-ல் திரிகடி பிரமாணம் கலக்கிக்கொடுத்து வரலாம்.

(2) லகு அதிசார மாத்திரை; லகு கட்டுவாங்க மாத்திரை; ராஜவில்வாதி லேசியம்; அயச்செந்துரம்; ஜாத்பலாதிச் சூரணம் கொடுத்து வரலாம்; செய்முறை 6-பாகம் பார்க்கவும்.

(3) ஆலிட் சல்பியூரிக் டில் (Acid Sulphuric Dil)	டிராம்	1½
டிரூசர் ஓபியம் (Tincture Opium)	”	1
டிரூசர் சின்னமோனி (Tincture Cinnamoni)	”	1
சிரப் சிம்பின் (Syrup Simple)	”	1
ஆக்குவா காம்ப்ர் (Aqua Camphor)	அவுன்ஸ்	6

ஒன்று சேர்த்து, வயிற்றால்போகும் ஒவ்வொருதடவையும் ஒருஅவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

பிரசவித்தபின் மூன்றாம் மாதத்திலுண்டாகும் வயிற்றுப்புண்—

Intestinal Irritations After Labour

பிரசவித்த மூன்றாமாதத்தில் ஜீரணக் கருவிகள் புண்பட்டு, ஓயாத வயிற் றோட்டத்தையும், வயிற்றுவலியையு முண்டுபண்ணும். சிசுமயம் காச் சல், வாந்தி, தலைவலி முதலியவைகளு மேற்படும். இது சிகிச்சைக்கு வசப்படாவிட்டால் லிபத்தண்டாகலாம்.

சிகிச்சை

(1)	அதிவிடயம்	சூபாயெடை	தொத்தமல்லி	சூபாயெடை	8	
	செற்றமுட்டியேர்	”	3	வெட்டியேர்	”	3
	சந்தனம்	”	3	செந்தில்தண்டு	”	3
	பற்பாடகம்	”	3	பூனைபுழுக்கம்பேர்	”	3

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து, 48-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு 6-அவுன்ஸ் ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயத்தில் காலை மாலை 2, 3-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

(2) அயச்செந்துரம்; ராஜவில்வாதி லேசியம்; ஜாத்பலாதிச்சூரணம் கொடு த்து வரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(3) பிஸ்மத் சப்நைட்ரஸ் (Bismuth Subnitras)	கிரான்ஸ்	15
சோடா பைகார்ப் (Soda Bicarb)	”	30
டிரூசர் ஜென்ஷன் கோ (Tincture Gentain Co)	துளி	45
கம் அக்கேஷியா (Gum Acacia)	டிராம்	1
தண்ணீர்	அவுன்ஸ்	8

ஒன்று சேர்த்து, நான் ஒன்றுக்கு 3-தடவை ஆகாரத்திற்குப் பின் 1-அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரலாம்.

பிரசவித்தபின் வரும் சுவாசகாசம்—Asthma After Labour

இதைச் சுடர்காச மென்று சொல்லப்படும். அநேகமாக ஆயுரோகமுள்ள வர்களுக்கும், குடும்பத்தில் காசநோயுள்ளவர்களுக்கு மட்டுமிது உண்டாவதுண்டு.

இந்தக்காசவியாதியில் சுரம் 104, 105-டிகிரிவரை யிருக்கும். வியர்வையதிகம்காணும்; நாவாட்சி யுண்டாகும். கடினமான தலைவலியும், திரேகாதியந்த வலியுமுண்டாகும். வயிற்றுப்பொருமல், வயிற்றோட்டம், மயக்கம், மூச்சுத்திணரல் இவைகளேற்படும்.

சுடர் காசம் 5, 6, 3, 18-நாட்களில் விபத்தையுண்டாக்கு மென்றும் 18-நாட்கள் கழிந்தபின் செளகர்யமடையுமென்றும் தமிழ் வைத்திய சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன.

சிகிச்சை

(1) கோரோசனை	ரூபாயெடை 3	இலவங்கம்	ரூபாயெடை 3
கோரைக்கிழங்கு	3	செண்பகப்பு	3
கோஷ்டம்	3	மிளகு	3
கொத்தமல்லி	3	கொடிவேலி	3
அதிமதுரம்	3	பேரிச்சம்பழம்	3
ஏலம்	3	திராசைப்பழம்	3

ஒன்று சேர்த்து எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் மைபோலரைத்துக், கழற்சிக் காய் அவ்வளவு பெரியமாத்திரைகள் செய்துவைத்துக்கொண்டு, கால மரலை சுடுதண்ணீரில் ஒருமாத்திரை வீதம் 10-தினங்களுக்குக் கொடுத்து வரலாம். (பத்தியம்)

(2) வியாக்கிரியாதி ரசாயணம்; மகராஜத பஸ்பம்; உலகோத்தமச்செந் தூரம்; திரிவிக்கிரம ரசச்செந்தூரம்; வீரகுதகசிந்தாமணி; பவளபஸ்பம்; துரிசுபஸ்பம்; மகாதாளிசுப்பத்திரிச் சூரணம்; சுவர்ண கோரோசனை மாத்திரை; திரிலோகரக்ஷாமணி மாத்திரை; மகாதுதுளைக் கிருதம்; திப்பிலி ரசாயணம்; ராஜாங்கக் கொம்பரக்குத்தலைம் இவற்றை உபயோகித்துவரலாம். செய்முறை 6-ம் பாகம் பார்க்கவும்.

(3) அமோனியம் ஐயோடைட் (Ammonium Iodide)	டிராம்	2
எக்ஸ்டிராக்ட் கிரிண்டிலியா லிக்டு (Extract Grindilia Liquid)		
டிஞ்சர் லொபிலியா (Tincture Lobelia)	”	1 1/2
டிஞ்சர் பெல்லடோனா (Tincture Belladonnae)	”	1
சிரப் புருனி வெர்ஜினியா (Syrup Pruni Virginianae)	”	1
ஆக்குவா டிஸ்டில்டு (Aqua Distilled)	”	1
அவுன்ஸ்		4

ஒன்று சேர்த்து நாள் ஒன்றுக்கு 3-தடவை ஒரு அவுன்ஸ் தண்ணீரில் ஒரு தேக்கரண்டி மருந்து சேர்த்துக் கொடுத்து வரலாம்.

ஆறாம் பாகம்

SIXTH PART

ஸ்திரீ பால சிகிச்சை

ஆரூம் பாகம்

அவுஷத முறைகள்

PHARMACOPOEIA

(1) அகஸ்தியர் குழம்பு

சுத்திசெய்தரசம் ரூபாயெடை	$\frac{3}{4}$	கருஞ்சேரகம்	ரூபாயெடை	$\frac{3}{4}$
சுத்திசெய்த அரிதாரம்	,,	$\frac{3}{4}$	திப்பிலி	,,
சுத்திசெய்த மனோசிலை	,,	$\frac{3}{4}$	பெருங்காயம்	,,
சுத்திசெய்த கருநாவி	,,	$\frac{3}{4}$	இந்துப்பு	,,
சுத்திசெய்த வெங்காரம்	,,	$\frac{3}{4}$	† சுத்திசெய்த நேர்வாளம்	,,
கடுகுரோகினி	,,	$\frac{3}{4}$	காட்டாமணக்குப்பருப்பு	4

ஒன்று சேர்த்து 6-மணி நேரம் மைபோலரைத்து, பீங்கான் பாத்திரத்தில் வைத்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு பணவெடை (காலையில் மட்டும்.)

உபயோகம்:—குளிர்சூரம், பித்தசூரம்; வாதசூரம்; சன்னி; அண்டவாதம்; மூலவாயு; நீர்க்கடுப்பு; நீர்ச்சுருக்கு; கல்லடைப்பு; தேன் கொட்டல்; மகோதரம்; விஷம்; பித்தவெட்டை; இருமல்; அதிசாரம்; இரத்த மூலம்; வாதம்; பாண்டு; தாமத ருது; ருதகவாயு நீங்கும்.

அநுபானங்கள்

அண்டவாதத்திற்கு:—இஞ்சிச்சாறு

அதிசாரத்திற்கு:—சாதிக்காய்த் தூள்

இரத்தமூலத்திற்கு:—பசுவெய்

இருமலுக்கு:—கடுக்காய்த் தூள்

கல்லடைப்பிற்கு:—இளநீர் தண்ணீர்

குளிர்சூரத்திற்கு:—இஞ்சிச்சாறு

சன்னிக்கு:—இஞ்சிச்சாறு, வெள்ளைப்பூண்டுச்சாறு

சிலேத்பனசூரத்திற்கு:—திப்பிலி கஷாயம்

ருதகவாயுவிற்கு:—வெள்ளாட்டுத் தயிர்

தாமத ருதுவிற்கு:—செம்மறியாட்டுப் பால்

தேன் கொட்டலுக்கு:—வெங்காயச்சாறு

நீர்க்கடுப்புக்கு:—இளநீர் தண்ணீர்

† சுத்திமுறை 60-ம் பக்கம் பார்க்கவும்.

ரீர்சுருக்கு:—இளரீர் தண்ணீர்

பாண்டுக்கு:—பசும்பால்

பித்தசுரத்திற்கு:—கொத்தமல்லிக் கஷாயம்

பித்தத்திற்கு:—பசும்பால்

பித்தவெட்டைக்கு:—விலாமிச்சுவேர் கஷாயம்

மகோதரத்திற்கு:—அகத்தியிலைச்சாறு

மூலவாயுவிற்கு:—இஞ்சிச்சாறு

வாதசுரத்திற்கு:—நொச்சியிலைச்சாறு

வாதத்திற்கு:—தேங்காய்ப் பால்

வாயுவிற்கு:—சிற்றாமணக்கெண்ணெய்

விஷத்திற்கு:—வெற்றிலைச்சாறு

வெட்டைக்கு:—அகத்தியிலைச்சாறு

பத்தியம்:—இச்சா பத்தியம்.

(2) அசுவக் கெந்திச் சூரணம்.

இலவங்கம்	ரூபாயெடை 1	திப்பிலி	ரூபாயெடை 16
சிறுநாகப்பூ	"	1 சுக்கு	" 32
காசா ஏலம்	"	4 1 அழுக்குராக்கிழங்கு	" 64
சேரகம்	"	8 சீனாகற்கண்டுதூள்	" 50

கற்கண்டு நீங்கலாக மற்றவைகளை இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூரணித் துக் கொண்டு, பின் கற்கண்டுதூளைச் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—திரிகடிப்பிரமாணம். (கால மாலே)

உபயோகம்:—மேகம், சுவாசகாசம் 5, பாண்டு 5, குன்மம் 8, அஸ்தி சுரம் தீரும். இரத்தசுத்தியை யுண்டிபண்ணும்.

அநுபானம்:—பசும்பால் அல்லது பசுநெய்.

பத்தியம்:—இச்சா பத்தியம்.

(3) அண்டச் சுண்ணம்

ஒரு சோழிமுட்டைக்குச் சிறு துளையிட்டு, அதில் கொஞ்சம் குப்பை மேனிச்சாறு விட்டு, அந்த முட்டைக்குக் குப்பைமேனியிலையை அரைத்து 3-வரல் கனத்தில் கவசம் செய்து பின் சீலை மண் செய்து, 25-வாட்டியில் புட்டியிட்டு பஸ்பமரீகும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—6-கிரான்ஸ். (கால மாலே)

உபயோகம்:—அண்டரோகம் 4-ம் தீரும்.

அநுபானம்:—பசுநெய் அல்லது வெண்ணெய்.

பத்தியம்:—காப்பான் பதார்த்தம் நீங்கல் இச்சா பத்தியம்.

1 பசும்பாலில் வேகவைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும்.

(4) அண்டத் தைலம்

கோழிமுட்டையை அவித்து, அதன்மஞ்சள் கருவைமட்டும் ஒரு இரும் புச் சட்டியில் போட்டு வறுக்க எண்ணெய் கசியும்; அந்த எண்ணெயுடன் கோரோசனை, குங்குமப்பூ சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளவும்.

குழந்தைகள் அளவு:—5, 6-துளி நாக்கில் தடவலாம். உடம்பிலும் தடவலாம்.

உபயோகம்:—மாந்தம், இழுப்பு தீரும்.

பந்தியம்:—இச்சர பந்தியம்.

(5) அதிசார மாத்திரை

சாதிக்காய்	ரூபாயெடை 1	கிராம்பு	ரூபாயெடை 1
சாதிப்பத்திரி	,, 1	அபினி	,, 1
மாசிக்காய்	,, 1	வெந்தயம்	,, 1
கடுக்காய்ப்பூ	,, 1	சசகசா	,, 1
சேரகம்	,, 1	கோரோசனை	,, 1
அதிவிடயம்	,, 1		

ஒன்று சேர்த்து முலைப்பால் விட்டரைத்து, உளுந்தவ்வுளவு பெரிய மாத்திரைகள் செய்து உலர்த்திக் கொள்ளவும்.

அளவு.—பெரியவர்களுக்கு 2, குழந்தைகளுக்கு 1-மாத்திரை. (கால மாலை)

உபயோகம்:—அதிசாரம் 6; தேபேதி தீரும்.

அருபானம்:—தேன், முலைப்பால்.

(6) அப்ரகக் கோரோசனை மாத்திரை

* அப்ரகச்சென்னா	குங்குமப்பூ	ரூபாயெடை 1
ரூபாயெடை 1	ஏலம்	” 1
† ரச சென்னா	” 1	கிராம்பு
¶ சுத்திசெய்த ரச கற்	சாதிக்காய்	” 1
பூரம்	” 1	கோஷ்டம்
கோரோசனை	” 1	அக்காரம்
பச்சைக்கற்பூரம்	” 1	

ஒன்றுசேர்த்து, வெற்றிலைச் சாற்றால் 6-மணி நேரமும், சந்தனக் கஷாயத்தால் 6-மணி நேரமும், செண்பகப்பூக் கஷாயத்தால் 6-மணி நேரமும் அரைத்து, உளுந்து பெரிய மாத்திரைகள் செய்து உலர்த்திக் கொள்ளவும்.

* அப்ரகச் சென்னா 7-ம் இலக்கம் பார்க்கவும்.

† இரச சென்னாமென்ற நிலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும்.

¶ சுத்தி செய்யவேண்டும்.

அளவு:—பெரியவர்களுக்கு 1, சிறுவர்களுக்கு ½, குழந்தைகளுக்கு ¼
(கலை மாலை)

உபயோகம்:—சூரம் 64; கபரோகம் 96-ம் தீரும்.

அநுபானம்:—தேன், முலைப்பால்.

பத்தியம்:—இச்சா பத்தியம்.

(7) அப்ரகச் செந்தூரம்

பசுமூத் திரமும் வெள்ளாட்டுமூத் திரமும் சமன்வந்து; அதில் கிருஷ்ண அப்ரகத்தை 7-முறை காய்ச்சித் தோய்த்து, பொடித்து, தண்ணீரில்கரைத்து, சல்லடையில் வடிகட்டி யெடுத்த ஊள் ரூபாயெடை 3; இதை முள்ளங்கி, சாற்றால் 6-மணிநேரம் அரைத்து, பிள்ளை தட்டி, கலயத்திலிட்டு சீலைமண் செய்து 200-வாட்டியில் புடமிடவும்; இந்தவிதமாகவே, முள்ளங்கிச்சாறு, நாவற்பட்டைச்சாறு, ஆலம்பட்டைச்சாறு, அரசம்பட்டைச்சாறு, அத்திப்பட்டைச்சாறு, (இவைகளின் கஷாயமாவது) கொடிவேலிவேர் கஷாயம், எலுமிச்சம்பழச்சாறு, கவுதும்பைச்சாறு, கரந்தைச்சாறு, சிறு செருப்படைச்சாறு, கரிசலாங்காணிச்சாறு, முருங்கைப்பூச்சாறு, இவைகளின் சாற்றால் வலைக்கு மூன்று மூன்று மணிநேரமரைத்து, பத்துப் பத்து வீறகால் புடம்போட்டுக் கொச்சுச் செந்தூரமாகும்.

(8) அப்ரக பஸ்பம்

சுத்திசெய்த அப்ரகப்பொடியை குமிழம்பட்டை சாற்றால் 12-மணி நேரம் அரைத்து பிள்ளைதட்டி காயவைத்து, கலயத்திலிட்டு சீலைமண் செய்து 25-வாட்டியில் புடமிடவும். இப்படியே ஆலம்பாலால் அரைத்து இரண்டுபுடமும்; எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் அரைத்து ஒரு புடமும் போட பஸ்பமாகும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு பணவிலை (கலை மாலை)

உபயோகம்:—சூரம்-4, மேகம்-20, கிரிச்சரம்-4, பிரமேகம் 21, கிராணி-11, சன்னி-13, மேகவாயு, அஸ்திசரம், அஸ்திவெட்டை, கைகா லெரிவு, தீரும்.

அநுபானம்:—கெய், தேன், வெண்ணெய்.

(9) அயக்காந்த செந்தூரம்

§ அயப்பொடி ரூபாயெடை	§ விக்ம்	ரூபாயெடை	16
கார்த்தப்பொடி	8	ரசம்	1
கந்தகம்	16	வெங்கராம்	1

எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் 6-மணிநேரமும், பொற்றிலைக்கையாந்தகரைச் சாற்றால் 6-மணி நேரமுமரைத்து, சிறுபிள்ளைகளாகத் தட்டி கலயத்திலிட்டு சீலைமண் செய்து 50-எருவில் புடம்போட்டுக் கொச்சுச் செந்தூரமாகும்.

§ அரத்தால்வாலிய ஊள்.

|| சுத்தி செய்யவேண்டும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு பண்விடை (காலை மாலை)

உபயோகம்:—பாண்டு-5, கிராணி-11, பித்தம்-40, வாதம்-80, அக்கினி மந்தம், வாயு, குன்மம் தீரும், தாதுபுஷ்டியும் திரோக சிகப்புமுண்டாகும்.

அதுபாணம்:—தேன், நெய் வெண்ணெய்.

பந்தியம்:—சரப்பான் பதார்த்தம், புளி, புகையிலை, இச்சாபத்தியம்.

(10) அயச்செந்தூரம்

§ அரப்பொடி ரூபாயெடை-10, கெந்தகம் ரூபாயெடை-10, ஒன்று சேர்த்து, எலுமிச்சம்பழச்சாறுவிட்டு, 12-மணிநேரம் அரைத்து காயவைத்து ஒரு இரும்புச் சட்டியில் போட்டு 3-மணிநேரம் வறுக்க செந்தூரமாகும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—3, 4-பண்விடை (காலை மாலை)

உபயோகம்:—பாண்டு-5, காமாலை-13, சோகை-5, கிராணி-11, ரூலை-18, மேகம்-20, தீரும்.

அதுபாணம்:—தேன், பசுநெய்.

பந்தியம்:—இச்சாபத்தியம்.

(11) அயமெழுகு

■ சுத்திசெய்த அரப்பொடி ரூபாயெடை-8, இதை இன்புருச்சாறு-12 அவுன்ஸ் விட்டு வெயிலில் வைத்துக் காயவைத்து, பின் புளிப்பு மாதளைச் சாறு விட்டு, 12-மணிநேரம் அரைத்துக் காய்ந்த பின் தேன்விட்டு 3-மணி நேரம் மெழுகுபோலரைத்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு குன்றிமணி பெரிய உருண்டை (காலை மாலை)

உபயோகம்:—சோகை-9, பாண்டு-5, காமாலை-13, பித்தவெட்டை தீரும்.

அதுபாணம்:—பனைவெல்லம், பசுநெய்.

பந்தியம்:—புளி, புகையிலை, கருவாடு, மீன்.

(12) அஷ்டமூல நாசலேகியம்

கொழவேலித்தூள்	ரூபாயெடை 16	சுக்குத்தூள்	ரூபாயெடை 4
கருணைக்கிழங்குத்தூள்	„ 32	மிளகுத்தூள்	„ 2
வெல்லம்	„ 108		

கருணைக்கிழங்கை துண்டுகளாக்கி உலர்த்தி ரூரணித்துக் கொள்ளவும், பின் வெல்லத்தை பாகாக்கி, தூள்களைக் கொட்டிக் கிண்டிக்கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு கொட்டைப்பாக்களவு (காலை, மதியம், சாயந்திரம்.)

உபயோகம்:—மூலம்-21, தீரும்.

பந்தியம்:—காரமான பதார்த்தங்கள்.

§ அரத்தால் ராவியதூள். ■ சுத்திமூறை 270-ம் பக்கம் பார்க்கவும்.

(13) இரசச் செந்தூரம்

இரசம் ரூபாயெடை-3, கெந்தகம் ரூபாயெடை-3, இவைகளைச் சுத்தி செய்து சுருந்துளசிச் சாற்றால் 2-நாளரைத்து, காயவைத்து ஒரு கணமான கண்ணாடி சீசாவில் போட்டு, வாயைமூடி 7-நாளை மண்ணெய்து ஒருபெரிய சட்டியில் 6-விரட்டகடை மணல் கொட்டி அதன் மேல் சீசாவை வைத்து மணலால்மூடி தீபாக்கினியாயும், மலாக்கினியாயும், காடாக்கினியாயும் ஒவ்வொரு நாள் எரித்து எடுக்க செந்தூரமாகும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு குன்றிமணியெடை (காலை மாலை)

உபயோகம்:—சன்னி-13, வாதம்-30, சுரம்-64, குலை-18, தீரும்.

அநுபானம்:—கெய், வெல்லம்.

பத்தியம்:—புளி, புதைவிலை, போகம்.

(14) இராஜகேசரிச் சூரணம்

அதிமதுரம்	ரூபாயெடை	1	பேராததை	ரூபாயெடை	1
வலம்	"	1	மாசிக்காய்	"	1
கிராம்பு	"	1	வரல்மிளகு	"	1
சுக்கு	"	1	சாதிக்காய்	"	$\frac{1}{2}$
திப்பிலி	"	1	கஸ்தூரிமஞ்சள்	"	$\frac{1}{4}$
இலவங்கப்பட்டை	"	1			

ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியே சூரணித்து யெடைபோட்டெடுத்து ஒன்று சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—கால் ரூபாயெடை. (காலை, யதியம், மாலை.)

உபயோகம்:—காசம் 5, காயம் 4, சிலேப்பனம் 20, இருமல் தீரும்.

அநுபானம்:—தேன், வெற்றிலைச்சாறு.

(15) சுயப் பிளாஸ்திரி

ரசகந்தூரம்	ரூபாயெடை	$\frac{1}{2}$	முத்தவெள்ளை	ரூபாயெடை	1
சுயச்செந்தூரம்	"	6	நல்லெண்ணெய்	அவுன்ஸ்	10
மிருதாரசிங்கி	"	$\frac{1}{2}$			

ஒன்று சேர்த்துக் கருநிறம் வரும்வரை பதமாய்க் காய்ச்சி எடுத்துக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—இரணங்களுக்குத் துணியில் தடவிப் போடலாம்.

(16) உலகோத்தமச் செந்தூரம்

மனோசிலை	ரூபாயெடை	3	இலிங்கம்	ரூபாயெடை	3
வெள்ளைப்பரஷானம்	"	3	கார்தம்	"	3

■ கடையில் கிடைக்கும்.

அரிதாரம்	”	3	கந்தகம்
ரசகற்பூரம்	”	1	

இவற்றைச்சுத்திசெய்து குப்பைமேனிச்சாறு, வெற்றிலைச்சாறு, பருத்தி யிலைச்சாறு, வெள்ளெருக்கின்சாறு, துளசிச்சாறு, வேலிப்பருத்திச்சாறு, பொதேலைச்சாறு இவற்றால் தனித்தனியே ஒவ்வொருநாளும் அரைத்து, பில்லைத் தட்டி நிறுவில் காயவைத்து, வெற்றிலையை அரைத்துக் கவசம் செய்து, ஒரு பெரிய சட்டியில்வைத்து மேல் சட்டிமூடி சீலைண்ணெய்து, தீபாக்கினியால் ஒருநாள் எரிக்க மேல்சட்டியில் செந்துரம் பதங்கியிருக்கும்.

பெரியவர்கள் அளவு:— $\frac{1}{4}$ குன்றிமணி யெடை (காலை மாலை)

உபயோகம்:—குலை 18, சன்னி, 13, மேகம் 20, சுரம் 64, வாதம் 80, கிராணி 11, குன்மம் 8, கண்டமலை 18, அண்டரோகம் 4, வலிப்பு 5, பவுத்திரம் 15, காசம் 5, குஷ்டம் 18, கரப்பான், தேமல், கன்னப்புற்று, அரை யாப்பு தீரும்.

அநுபாஸம்:—நெய், வெண்ணெய், தேன்.

• பந்தியம்:—புளி, நல்லெண்ணெய், புனைகயிலை. (சுடும் பத்தியம்)

(17) ஏகாதசச்செந்தூரம்

சுத்திசெய்த இலிங்கம்	சுத்திசெய்தவீரம்	ரூபாயெடை 1½
ரூபாயெடை 3	காடிக்காரம்	"
இராசச்செந்தூரம்	"	காலேயரைக்கால்
" 8		

முதலில் லிங்கத்தையும், பின் செஞ்சூரத்தையும், பிறகு வீரத்தையும் அரைத்துச் சேர்த்து, கடைசியில் காடிக் காத்தைச் சேர்த்து அரைக்கவும், ஈரப்பட்டால் வெய்யிலில் வைக்கவும்.

பேரியவர்கள் அளவு:—1, 1½-கெல்விடை (காலை மாலை)

உபயோகம்:—குதகவாயு, குதகக்கட்டு, குதகசன்னி, சுரம்-64 சன்னி பாதசுரம் தீரும்.

அநுபானம்:—தேன்.

பத்தியம்:—புளி, புதைபிலை, கல்லெண்ணெய் கருவாடு.

(18) ஓமத்தீனிர்

இரண்டுவீசை ஒமத்தை மெல்லிய துணியில்முடித்து, ஒருபாத்திரத்தில் 4-படி தண்ணீர்விட்டு, அடியில் ஒமமுடிச்சி படாதபடி ஒரு தூவில் கட்டி தொங்கவிட்டு, தண்ணீர் சுண்டும்வரை எரிக்க, தண்ணீரில் தயிலம் மிதக்கும், அதைக் கோழியிறகால் சேகரித்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு தேக்கரண்டி (காலை மாலை)

உபயோகம்:—சகல வயிற்றோட்டம் அஜீரணம் தீரும்.

அதுபாஸம்:—தண்ணீர்.

(19) சுணத் தெண்ணை

கற்பூவன்ளிச்சாறு	அவுன்ஸ் 12	கருஞ்சேரகம்	ரூபாயெடை 1
புளியாரைச்சாறு	" 12	வெந்தயம்	" 1
கோவையிலைச்சாறு	" 12	கோஷ்டம்	" 1
வெங்காயச்சாறு	" 12	அக்ராரம்	" 1
கற்றாழைச்சாறு	" 12	மாசிக்காய்	" 1
கையாந்தகரைச்சாறு	" 12	கடுக்காய்பிஞ்சு	" 1
பொன்னாங்காணிச்சாறு	" 12	சாதிக்காய்	" 1
பசும்பால்	" 48	சாதிபத்திரி	" 1
சிற்றாமணக்கெண்ணை	" 48	வெண்ணப்பூண்டு	" 1
இலவங்கப்பட்டைரூபாயெடை	1	கோரோசனை	" 1
இலவங்கப்பத்திரி	" 1	குங்குமப்பூ	" 1
சேரகம்	" 1	சாதிக்காய்	" 1

சாறு, எண்ணை இவற்றை ஒன்று சேர்த்து, பின் கோரோசனை, குங்குமப்பூ, சாதிக்காய் நீக்கலாக மற்றசரக்குகளை பசும்பாலிலரைத்துக் கரைத்து ஒன்று சேர்த்து காய்ச்சி வடித்து பின் மூன்றையும் பொடித்துச்சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

அளவு:—பெரியவர்களுக்கு 1-அவுன்ஸ் (காலையில் மட்டும்)

உபயோகம்:—கணைச்சுரம், மாந்தம், உப்பிசம், சிரங்கு, இரணம், கர்ப்ப வெட்டை, பாண்டு, கீரிழிவு, விடாதருடு, கைகால் எரிவு தீரும்.

பந்தியம்:—இச்சாபத்தியம்.

(20) கணை நெய்

பழம்பாசிச்சாறு	அவுன்ஸ் 12	துளசிச்சாறு	அவுன்ஸ் 12
வல்லாரைச்சாறு	" 12	கீழ்க்காய்கெல்லிச்சாறு	" 12
பொன்னாங்காணிச்சாறு	" 12	தண்ணீர்விட்டான் கீழங்குசாறு	" 12
கோவையிலைச்சாறு	" 12	நெய்	" 2½
வில்வவேர்	ரூபாயெடை 10	சாதிக்காய்	ரூபாயெடை 2½
கிற்றமுட்டிவேர்	" 10	கங்கர் பஸ்பம்	" 2½
நன்னூரிவேர்	" 10	சாதிபத்திரி	" 2½
மருதம்பட்டை	" 10	அதிமதுரம்	" 2½
கருவேலம்பட்டை	" 10	திப்பிலி	" 2½
ஆடுதிண்ணாப்பாலக்காய்	" 10	சேரகம்	" 2½

எல்லாவற்றையும் ஒன்று சேர்த்து, காய்ச்சி வடித்துக்கொள்ளவும்.

அளவு:—1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 1, 2-தேக்கரண்டி.

உபயோகம்:—சகல கணைக்கும்.

பந்தியம்:—கரப்பான் பதார்த்தங்கள் நீக்கவும்.

(21) சுபாங்குச லேகியம்

துப்பிலி	சூபாயெடை 30	இலவங்கப்பட்டை	சூபாயெடை 3
மிளகு	" 15	கடுக்காய்	" 3
சுக்கு	" 15	தான்றிக்காய்	" 3
குரோசாணி ஓமம்	" 3	நெல்லிவற்றல்	" 3
சோம்பு	" 3	கிராம்பு	" 3
சீரகம்	" 1	எலம்	" 3
பேராத்தை	" 3	கொடிவேலி	" 3
சிற்பாத்தை	" 3	சர்க்கரை	" 32
தாளிசுபத்திரி	" 3	தேன்	போதுமானது
இலவங்கப்பட்டை	" 3		

தனித்தனியே இளவறுப்பாக வறுத்துச் சூரணித்து யெடை போட்டு ஒன்று சேர்த்து, தேன்விட்டு பிசரி லேகிய பதமாக்கிக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு :—ஒரு கொட்டைப்பாக்களவு (காலே மாலை)
உபயோகம் :—கபரோகம் 96-ம் தீரும்.

(22) கரப்பான் எண்ணை

பூவரசப்பட்டை	சூபாயெடை 30	கண்டங்கத்திரி	சூபாயெடை 30
செங்கத்தாரிப்பட்டை	" 30	நிலவாகை	" 30
பூதகரப்பான்	" 30		

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து 48-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு எட் டொன்றாய்க் காய்ச்சிய கஷாயம் அவுன்ஸ் 6-ம் ;

வெள்ளாட்டுப்பால்	அவுன்ஸ் 48	கார்போகரிசி	சூபாயெடை 1
சிற்பாணக்கெண்ணெய்,	48	வெள்ளைப்பூண்டு	" 1
மிளகு	சூபாயெடை 1	வசம்பு	" 1
கருஞ்சீரகம்	" 1	சதகுப்பை	" 1
வலம்புரிக்காய்	" 1	பறங்கிப்பட்டை	" 1

சர்க்குகளை வெள்ளாட்டுப்பாலில் அரைத்துக் கரைத்துக் காய்ச்சி வடித்துக்கொள்ளவும்.

அளவு :—1-முதல் 3 வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 2 தேக்கரண்டி (காலே யில் மட்டும்.)

உபயோகம் :—சகல கரப்பானுக்கும், புண்ணுக்கும்.

பந்தியம் :—கரப்பான் பதார்த்தம்.

(23) கரிசலாங்காணிச் சூரணம்

■ கரிசலாங்காணி	சூபாயெடை 3	தாளிசுபத்திரி	சூபாயெடை 3
■ மூக்குரெட்டை	" 3	கொத்தமல்லி	" 3

* நிழலில் காயவைத்துக் கொள்ளவும்.

சுக்கு	ரூபாயெடை	ஈ	எலம்	ரூபாயெடை	ஈ
மிளகு	"	ஈ	அகிமதுரம்	"	ஈ
திப்பிலி	"	ஈ	மரமஞ்சள்	"	ஈ
சேரகம்	"	ஈ	கடுக்காய்	"	ஈ
கருஞ்சேரகம்	"	ஈ	தான்றிக்காய்	"	ஈ
நெல்லிவற்றல்	"	ஈ			

தனித்தனியே ரூரணித்து யெடை போட்டுச் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

பேரியவர்கள் அளவு:—திரிகடிப் பிரமாணம் (காலை, மதியம், மாலை.)

உபயோகம் :—காமாலை, பாண்டு, இரத்தக் குறைவு தீரும்.

பத்தியம் :—புளி | இச்சாபத்தியம்.

(24) கரிசால எண்ணெய்

கரிசலாங்காணிச்சாறு அவுன்ஸ் 12 வெள்ளைப்பூண்டு ரூபாயெடை 3
சிறுமணக்கெண்ணெய் ,, 12

வெள்ளைப்பூண்டைப் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்துக் கொள்ளவும்.

பேரியவர்கள் அளவு :—ஒரு அவுன்ஸ் (காலையில் மட்டும்.)

உபயோகம் :—காமாலைத் தீரும்.

பத்தியம் :—புளி ; இச்சாபத்தியம்.

(25) கலிங்காதி யுப்பு

எருமைமோர்	அவுன்ஸ் 48	வெடியுப்பு	ரூபாயெடை 1
வரிகுமட்டிக்காய்ச்சாறு	" 48	இந்துப்பு	" 1
கறியுப்பு	ரூபாயெடை 24	வளையலுப்பு	" 1
சுக்கு	" 1	சவுட்டுப்பு	" 1
குரோசானியோமம்	" 1	பெருங்காயம்	" 2

ஒன்று சேர்த்துக் காய்ச்சி எடுத்துச் சூரணித்துக்கொள்ளவும்.

பேரியவர்கள் அளவு :—ஈ ரூபாயெடை.

உபயோகம் :—சூதக வயிற்றுவலி, குன்மம், வயிற்றுவலி, அஜீரணம், பொருமல், விக்கல் தீரும்.

அநுபானம் :—கீராகாரம்.

பத்தியம் :—இச்சாபத்தியம்.

(26) கல்நார் பஸ்பம்

ஒரு கலயத்தில் வெள்ளெருக்கம்பூவைத் தட்டிப்போட்டு அதில் கல்நார் துண்டுகளைவைத்து, அதன்மேல் பூவைப்போட்டு சீலைமண்ணெய்து 50 எருவில் புடம்போட வெட்டையாகும். அதை வெற்றிலைச்சாற்றால் 6-மணிநேரம்

அரைத்து பில்லைதட்டி கலயத்தில் போட்டு சீலைமண்ணெய்து, 50 - எருவில் புடம்போட செந்நாரமாகும்.

(27) கழிச்சல் மாத்திரை

அதிமதுரம்	ரூபாயெடை 1	கோரைக்கிழங்கு	ரூபாயெடை 1
அதிவிடயம்	” 1	கிராம்பு	” 1
அபின்	” 1	சீரகம்	” 1
கஞ்சா	” 1	வெந்தயம்	” 1
சாதிக்காய்	” 1	சிறுநாகப்பூ	” 1
சாதிபத்திரி	” 1	புளியாரை	” 1
ஏலம்	” 1	காட்டாத்திப்பூ	” 1
குரோசாணி ஒமம்	” 1	மாதாளம்பிஞ்சு	” 1
வாழைப்பூ	” 1		

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்து, பிட்டவியலாக அவித்து, நன்றாய் வெந்தபின் வாழைப்பூச்சாறுவிட்டு ஒருமணிகேரம் அரைத்து, மிளகு பெரிய மாத்திரைகளாகச்செய்து உலர்த்திக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு மாத்திரை. (கால மாலே)

உபயோகம்:—சகல கழிச்சலுக்கும்.

அதுபான்ம்:—மாவு சர்க்கரை.

(28) கஸ்தூரி மாத்திரை

கஸ்தூரி	ரூபாயெடை 1	சாதிக்காய்	ரூபாயெடை 2
குங்குமப்பூ	” 3	கோஷ்டம்	” 2
சுக்கு	” 4	அக்காரம்	” 2
கிராம்பு	” 2		

ஒன்று சேர்த்து முலைப்பால் விட்டரைத்து, உருந்தவ்வளவு பெரிய மாத்திரைகளாக உருட்டி உலர்த்திக் கொள்ளவும்.

அளவு:—குழந்தைகளுக்கு ஒரு மாத்திரை பெரியவர்களுக்கு 5, 6, மாத்திரை.

உபயோகம்:—மூர்த்தம், சுரம், சன்னி, வலிப்பு, கபரோகங்கள் தீரும்.

அதுபான்ம்:—முலைப்பால்.

(29) கிரந்தி எண்ணெய்

கோடகசாலை	ரூபாயெடை 5	விட்டுணுகிரந்தி	ரூபாயெடை 5
கற்பூரவள்ளி	” 5	கிரந்திராயகம்	” 5
கொன்றை	” 5	ஒரிலைத்தாமரை	” 5
கறிவேப்பிலை	” 1	பிரமி	” 5
செஞ்சந்தனம்	” 1	கோஷ்டம்	” 1

அதிமதூரம்	1	கோகம்	1
கருஞ்சேரகம்	1	ஓமம்	1
ஏலம்	1	கிராம்பு	1
சாதிக்காய்	1	மாசக்காய்	1
சாதிபத்திரி	1	சிற்றமணக்கெண்ணெய்	24
செம்பரத்தம்பூ	1		

ஒன்று சேர்த்துப் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு அவுன்ஸ் (காலையில் மட்டும்)

உபயோகம்:—கிரந்தி 9 - ம் தீரும்.

பந்தியம்:—புளி, நல்லெண்ணெய், கடுகு, புகையிலை, போகம்.

(30) குமட்டிக்காய்க் குழம்பு

வரிசுமட்டிக்காய்சாறு	அவுன்ஸ் 48	இந்துப்பு	ரூபாயெடை 3
இலைக்கள்ளிப்பால்	48	சுக்கு	3
கல்லுப்பு	ரூபாயெடை 24	திப்பிலி	3
வெடிப்புப்பு	3	பெருங்காயம்	3
வளையலுப்பு	3		

ஒன்று சேர்த்துக் காய்ச்சி மெழுகு பதத்தி லெடுத்துக்கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—3 - ரூபாயெடை (காலையில் மட்டும்)

உபயோகம்:—உதரரோகம், சூதகக்கட்டு, சூதகவலி தீரும்.

அறுபானம்:—பனைவெல்லம்.

பந்தியம்:—வாபுபதார்த்தங்கள். இச்சாபந்தியம்.

(31) குமரி சஞ்சிவித் துயிலம்

சோற்றுகற்றழைசாறு	அவுன்ஸ் 96	நெல்லிவற்றல்	ரூபாயெடை 2
நல்லெண்ணெய்	96	கோவட்டம்	2
பசும்பால்	96	சடாமாஞ்சில்	2
கடுகுரோகிணி	ரூபாயெடை 2	கோகம்	2
கஸ்தூரிமஞ்சள்	2	பூஞ்சாந்துப்பட்டை	2
சந்தனம்	2	ஏலம்	2
கிராம்பு	2	பச்சிலை	2
அதிமதூரம்	2	பூலாங்கிழங்கு	2
அக்ரகாரம்	2	இலவங்கப்பத்திரி	2
செவ்வல்லிக்கிழங்கு	2	இலவங்கப்பட்டை	2
சுக்கு	2	செண்பகப்பூ	2
யிளகு	2	ஆணைத்திப்பிலி	2
திப்பிலி	2	பெருஞ்சேரகம்	2
கடுக்காய்	2	மஞ்சிவட்டிக்கிழங்கு	2
தான்றிக்காய்	2	மஞ்சள்	2

ஒன்று சேர்த்துப் பசும்பாலா லரைத்துக் கரைத்துக் காய்ச்சிவடித்து 24-நாள் நெல்லுக்குள் வைத்திருந்து எடுத்துக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—மேகம்-20, சுரம்-64, பித்தம்-40, குன்மம்-8, பாண்டு-5, பித்த வரட்சி இவைகள் ஸ்நானம் செய்வதால் தீரும்.

(32) கொவ்வைக்காய் கோரோசனை மாத்திரை

கோரோசனை	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	கருஞ்சீரகம்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
ஒமம்	” $\frac{1}{2}$	திப்பிலி	” $\frac{1}{2}$
கிராம்பு	” $\frac{1}{2}$		

கோரோசனை நீக்கி இதர சரக்குகளைப் பொடித்து கொவ்வைக்காயுள் வைத்து, உமிக்காந்தலில் கறுகிப்போகாமல் வேகவைத் தெடுத்து, பின் கோரோசனையையும் சேர்த்து தண்ணீர்விட்டு மைபோலரைத்து மிளகு பிரமாணமாய் மாத்திரை செய்து உலர்த்திக்கொள்ளவும்.

அளவு:—குழந்தைகளுக்கு ஒரு மாத்திரை (காலை மாலை)

உபயோகம்:—சுரம், இராச்சுரம், முறைச்சுரம், சளி தீரும்.

அநுபானம்:—முறைக் காச்சலுக்கும், சளிக்கும் முலைப்பால், காச்சல் களுக்கு இஞ்சிச்சாறு; தேன்.

(33) கோரோசனை மாத்திரை

கோரோசனை	ரூபாயெடை 1	கிராம்பு	ரூபாயெடை 1
குங்குமப்பூ	” 1	கோஷ்டம்	” 1
கற்பூரம்	” 1	அக்ரகாரம்	” 1
பச்சைக்கற்பூரம்	” 1	* இரசபஸ்பம்	” 1
ஏலம்	” 1		

ஒன்று சேர்த்து சந்தனக் கஷாயத்தால் 6-மணி நேரம் அரைத்து உளுந்து பெரிய மாத்திரைகள் செய்துகொள்ளவும்.

அளவு:—6-முதல் 9-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஒரு மாத்திரை (காலை மாலை)

உபயோகம்:—குழந்தைகள் சுரம், ஜலதோஷம், மாந்தம் தீரும்.

அநுபானம்:—முலைப்பால்.

(34) சந்திரகாசத் தயிலம்

நல்லெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 48	அதிமதுரம்	ரூபாயெடை 3
பசும்பால்	” 48	மிளகு	” 3
சீரகம்	ரூபாயெடை 3	சண்பகமொட்டு	” 1

சரக்குகளை பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்துக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—ஸ்கானம் செய்ய இருமல், ஈளை, காசம் தீரும்.

■ மகாரசபஸ்பம் பார்க்கவும்.

(35) சர்வேசுர ரசநஸ்யம்

ரசம்	ரூபாயெடை 1	வெங்காரம்	ரூபாயெடை 1
கந்தகம்	„ 1	சுக்கு	„ 1
நாவி	„ 1	மினகு	„ 1
மனோசில	„ 1	திப்பிலி	„ 1

முதலில் ரசத்தையும் கந்தகத்தையும் ஒன்றித்தரைத்து, பின் மற்றவைகளையும் சேர்த்து அரைத்துக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—உளுந்தளவு நஸ்யமிட, சன்னி; மயக்கம் மண்டைகபம் தீரும்.

(36) சிங்கி பஸ்பம்

மான் கொம்பைத் துண்டுகளாக நறுக்கி, மூன்றுநாள் குப்பைபேனிச் சாற்றில் ஊறப்போட்டு, பின் குப்பைமேனி இலையை அரைத்துக் கண்மாய் கவசமிட்டு சீலை மண்செய்து 25-வரட்டியில் புடமிட பஸ்பமாகும். அத்துடன் சமன் பலனபஸ்பம் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவரீதள் அளவு:—ஒரு பணவிடை (கூலை மாலி)

உபயோகம்:—இருமல், காயம், காசம், வெட்டை தீரும்.

அறுபாளி:—கபரோகங்களுக்கு வெண்ணெய், நெய், வெட்டைக்கு நீராகாரம்.

(37) சிந்தாதி லேகியம்

புளித்தக்காடி	அவுன்ஸ் 96	புளியிலை	ரூபாயெடை 48
புளித்தமோர்	„ 96	இரும்புதுப்பு	„ 10
ஒன்று சேர்த்து, எட்டொன்றாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய			
கஷாயம்	அவுன்ஸ் 12	சுக்கு	ரூபாயெடை 3
எலுமிச்சம்பழச்சாறு	„ 6	திப்பிலி	„ 3
இஞ்சிச்சாறு	„ 6	மினகு	„ 3
தென்னம்பூச்சாறு	„ 6	கடுக்காய்	„ 3
கரிசலாங்காணிச்சாறு	„ 12	தான்றிக்காய்	„ 3
நெருஞ்சில்சாறு	„ 6	நெல்விவற்றல்	„ 3
கீழ்காய்நெல்விச்சாறு	„ 6	ஏலம்	„ 3
சிறுகிரைச்சாறு	„ 6	கிராம்பு	„ 3
சிறுசெருப்படைச்சாறு	„ 1	ஓமம்	„ 3
பசும்பால்	„ 24	கோவூட்டம்	„ 3
தேன்	„ 6	வால்மினகு	„ 3
நெய்	„ 6	தாளிசபத்திரி	„ 3
சடாமாஞ்சில்	ரூபாயெடை 3	யானைத்திப்பிலி	„ 3
சீரகம்	„ 3	இலவங்கப்பட்டை	„ 3
பனைவெல்லம்	„ 30		

சாற்றையும், பாலையும் ஒன்று சேர்த்து, பனைவெல்லத்தைக் கரைத்து பாகு பதமாக்கி, சரக்குகளைத் தனித்தனியே இளவறுப்பாய் வறுத்து சூரணித்து யெடைபோட்டுடுத்துக் கொட்டி நெய், தேன் சேர்த்துப்பதமாய்க் கிண்டிக்கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—கொட்டைப்பாக்குப் பிரமாணம் (காலைமாலே)

உபயோகம் :—பித்தவெட்டை, பாண்டு-5, கிராணி-11, சோகை-9, அக்கினிமந்தம், பொருமல், வாயு, மகோதரம், தீரும்.

பத்தியம் :—புளி, புகையிலை, போகம்.

(38) சுரபூபதி மாத்திரை

■ மனோசிலை ரூபாயெடை 1 ■ இலிங்கம் ரூபாயெடை 1
■ தாளகம் „ 1

ஒன்று சேர்த்து, கறிக்கரணை அல்லது காட்டுக் கரணைக்கிழங்கை குழிசெய்து அதற்குள் வைத்து மூடி சீலைமண்ணெய்து, உமிழ்ப்புடம் போட்டுடுத்து, வேலிப்பருத்திச்சாறு விட்டு 24-மணி நேரமரைத்து, உளுந்து பெரிய மாத்திரைகள் செய்து உலர்த்திக்கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு :—ஒரு மாத்திரை.

உபயோகம் :—சுரம்-64, வாதம்-80, கபரோசம்-96 ம் தீரும்.

அநுபாஹம் :—முலைப்பால்.

பத்தியம் :—உப்பு, புளி, நல்லெண்ணெய், புகையிலை.

(39) சுவர்ணகோரோசனை மாத்திரை

தங்கரேக்கு	ரூபாயெடை ½	கோரோசனை	ரூபாயெடை ½
† முத்து	„ ½	குங்குமப்பூ	„ ½
பவளபஸ்பம்	„ ½	ஏலம்	„ ½
இரசச்செந்தூரம்	„ ½	கிராம்பு	„ ½
பச்சைக்கற்பூரம்	„ ½	சாதிக்காய்	„ ½
■ இரசக்கற்பூரம்	„ ½	கோஷ்டம்	■ ½
அப்ரகச்செந்தூரம்	„ ½	அக்ரகாரம்	„ ½

ஒன்று சேர்த்து, வெற்றிலைச்சாறு, சந்தனக் கஷாயம், செண்பகப்பூ கஷாயம் இவற்றால் தனித்தனியே 9-மணி நேரம் அரைத்து, உளுந்து பெரிய மாத்திரையாகச் செய்து நிழலில் உலர்த்திக்கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு :—ஒரு மாத்திரை குழந்தைகளுக்கு ½-மாத்திரை (காலை மாலே.)

* சுத்தி செய்யவேண்டும்.

† ஒரு கலயத்தில் போட்டு சீலைமண்ணெய்து புடமிட்டு எடுத்துக் கொள்ளவும்.

உபயோகம் :—சரம்-64, சன்னி-13, காசம்-5, வலிப்பு-5, தீரும்.

அனுபானம் :—மூலைப்பால்.

(40) சுவரீண வெள்ளிபஸ்பம்

அரை ரூபாயெடை சரிகை வெள்ளியையும், ஒரு ரூபாயெடை சுருள் தங்கத்தையும் தனித்தனியே உருக்கி தகடு அடித்து, தனித்தனியே உப்பி லாங்கொடியிலையை அரைத்துக் கவசம் செய்து, பின் சீலைமண்செய்து 50-எருவில் புடமிட பஸ்பமாகும். இரண்டையும் ஒன்றாக மிஸ்ரமித்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு :—ஒரு குன்றிமணி யெடை.

உபயோகம் :—மேகம்-20, சரம்-64, அதிசாரம்-6, மாந்தம், நாது நஷ்டம் தீரும்.

அனுபானம் :—நெய், வெண்ணெய்.

(41) செளந்தரியக் கிருதம்

நன்னூரிவேர்	ரூபாயெடை ½	செம்பரத்தம்பூ	ரூபாயெடை ½
சுருஞ்சுராவேர்	” ½	செம்பரத்தையிலை	” ½
வட்டத்திருப்பிவேர்	” ½	செங்கத்தாரியிலை	” ½
ஆதண்டாவேர்	” ½	கிரந்திராயகம்யிலை	” ½
சிற்றமுட்டிவேர்	” ½	செஞ்சந்தனம்	” ½
சீதேவியார்வேர்	” ½	சீரகம்	” ½
ஆடாதோடையிலை	” ½	சுருஞ்சீரகம்	” ½
மலைதாங்கிவேர்	” ½	எலுமிச்சையிலை	” ½
அதிமதுரம்	” ½	வாலுமுனைவயிரி	” 1
திப்பிலி	” ½	கோஷ்டம்	” 1
சாதிக்காய்	” ½	கனிப்பாக்கு	” 1
வெளுச்சிப்பிசின்	” ½	சதகுப்பை	” 1
எலம்	” ½	செவ்வல்லி	” 1
கிராம்பு	” ½	கந்தாமரை	” 1
நெய்	அவுன்ஸ் 12		

வேர், இலை, சாக்குகளைத் தனித்தனியே குரணித்து வைத்துக் கொண்டு ; நெய்யைக்காய்ச்சி கொஞ்சம் வெங்காயம் சிவக்கும் பதத்தில் இறக்கி; இளஞ்குடாயிருக்கும்போது, வேர் குரணங்களைக் கொட்டிக்கிண்டி; பின் இலைச் குரணங்களையும், அதற்குப் பின் சாக்குச் குரணங்களையும் கொட்டிக் கிண்டி வடித்துக்கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு :—½, 1-தேக்கரண்டி (காலையில் மட்டும்.)

உபயோகம் :—சிலந்தி, கரப்பான், கணைச்சூடு, அரையாப்பு, கண்ட மாலை, தீரும்.

பந்தியை :—புளி, புகையிலை, நல்லெண்ணெய், கரப்புரன் பதார்த்தம்,

(42) தக்காளிக் கோரோசனை மாத்திரை

கோரோசனை	ரூபாயெடை	1/2	கிராம்பு	ரூபாயெடை	1/2
சுக்கு	"	1/2	அதிமதுரம்	"	1/2
மிளகு	"	1/2	அக்காரம்	"	1/2
திப்பிலி	"	1/2	கோஷ்டம்	"	1/2
கடுக்காய்	"	1/2	சாதிபத்திரி	"	1/2
தான்றிக்காய்	"	1/2	கன்னூரிவேர்	"	1/2
நெல்லிவற்றல்	"	1/2	சிறுகீரைவேர்	"	1/2
ஏலம்	"	1/2	பொன்னுக்காணிவேர்	"	1/2

ஒன்று சேர்த்து, மணித்தக்காளிச்சாறுவிட்டு, 6-மணி நேரம் அரைத்து இலந்தங்கொட்டைப் பெரிய மாத்திரைகள் செய்து உலர்த்திக் கொள்ளவும்.

அளவு:—குழந்தைகளுக்கு ஒரு மாத்திரை (காலை மாலை)

உபயோகம்:—அச்சம், சுரம், வயிற்றோட்டம் தீரும்.

அநுபாஸம்:—இஞ்சிச்சாறு முலைப்பால், தேன்.

(43) திப்பிலிரசாயனம்

திப்பிலி	ரூபாயெடை	20	இலவங்கப்பத்திரி	ரூபாயெடை	2
மிளகு	"	10	இலவங்கப்பட்டை	"	2
சுக்கு	"	20	கடுக்காய்	"	2
குரோசாணி ஒமம்	"	2	தான்றிக்காய்	"	2
சோம்பு	"	2	நெல்லிவற்றல்	"	2
சித்தரத்தை	"	2	கிராம்பு	"	2
பேரரத்தை	"	2	ஏலம்	"	2
தாளிசபத்திரி	"	2	கொடிவேலி	"	2
சீரகம்	"	2	சர்க்கரை	"	50
தேன்	போதுமானது.				

சாக்குகளை இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூரணித்து சர்க்கரையையும், தேனையும் சேர்த்துப் பிசைந்து கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—கொட்டைப்பாக்களவு (காலை மாலை)

உபயோகம்:—கபரோகம் 96-ம் வாதம் 80-ம் தீரும்.

(44) திரிபுவனச் செந்தூரம்

சுத்திசெய்த கந்தகம்	சுத்திசெய்த அரப்பொடி
ரூபாயெடை 10	ரூபாயெடை 10
சுத்திசெய்த கார்தம்	" 10

ஒன்று சேர்த்து, சோற்றுக் கற்றாழைச்சாற்றால் 12-மணிநேரம் அரைத்து, ஒரே பிஸ்யாகத்தட்டி; நன்றாய் வெய்யிலில் காயவைத்து ஒரு சட்டியில் வைத்து மேல்சட்டி மூடி வாயிக்குச் சீலைமண் செய்து, முதல் நாள்

தீபாக்கினியாய் எரித்து, பின் இரண்டு நாள் ஈடாக்கினியாக வெரித்து, 3-நாள் ஆறினபின் எடுத்து பார்க்க பில்லையின் அடியில் பூத்திருக்கும்; அதை சேகரித்துக் கொள்ளவும். இப்படியே கடைசியாக பூக்கிறவரையில் கற்றழைச் சாற்றால் அரைத்து அரைத்து மூன்று நாளொரித்து பின் அரைத்து வைத்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—1, ½-குன்றிமணியளவு (காலை மாலை)

உபயோகம்:—காமாலை, பாண்டு தீரும்.

அநுபாணம்:—கெய், தேன்.

பத்தியம்:—கடும்பத்தியம் ஆட்டுப்பாலும் சோறும் தான் ஆகும்.

(45) திரிலோகச் செந்தூரம்

சுத்திசெய்த கார்த்தம் சுத்திசெய்தமணிரோம் ரூபாயெடை 5

ரூபாயெடை 5 சுத்திசெய்த அரப்பொடி ,, 5

ஒன்று சேர்த்து, ஆவாரைச்சாறு, கரிசலாங்காணிச்சாறு, எலுமிச்சம் பழச்சாறு இவைகள் ஒவ்வொரு சாற்றிலும் தனித்தனியே 3-மணிரோம் அரைத்து, தனித்தனியே ஒவ்வொன்றிலும் 5-வாட்டியில் புடம்போட செந் தூரமாகும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு பணவீடை (காலை மாலை)

உபயோகம்:—பாண்டு, சோலை தீரும். இரத்தம் ஊறும்.

அநுபாணம்:—தேன், கெய், வெண்ணெய்.

பத்தியம்:—இச்சாபத்தியம்.

(46) திரிலோக ரக்ஷாமணி மாத்திரை

■ இலிங்கம் ரூபாயெடை 6 ■ கருகாவீ ரூபாயெடை 5

■ தாளகம் ,, ■ சுக்கு ,, 5

■ மனோசிலை ,, 6 மிளகு ,, 6

■ வெங்காரம் ,, 6 திப்பிலி ,, 5

ஒன்று சேர்த்து, இஞ்சிச்சாற்றால் 12-மணி ரோம் அரைத்து, குன்றி மணி பெரிய மாத்திரைகள் செய்து உலர்த்திக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒருமாத்திரை (காலை மாலை)

உபயோகம்:—ஈயம்-4, காசம்-5, ஈளை, மாந்தாரகாசம் சுரம் 64-ம் தீரும்.

அநுபாணம்:—இஞ்சிச்சாறு, முலைப்பால்.

பத்தியம்:—இச்சாபத்தியம்.

(47) திரிவிக்ரமரகச் செந்தூரம்

■ இரசம் ரூபாயெடை 5 ■ அரிதாரம் ரூபாயெடை 5

■ வெண்ணப்பரக்ஷணம் ,, 5

■ சுத்தி செய்யவேண்டும்.

ஒன்று சேர்த்து, கையாந்தகரை சாற்றால் 12-மணிகேரம் அரைத்து கிழலில் காயவைத்து, சனத்த கண்ணாடி சோவில் போட்டு வாயைமூடி சீலைமண் செய்து, ஒரு பெரிய சட்டியில் மணலைப் பரப்பி சோவை வைத்து அதை மணலால் மூடி, தீபாக்கினியாய் 12-மணிகேரம் எரித்து எடுத்து குரணித்துக்கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:— $\frac{1}{2}$ -குன்றிமணி யெடை (காலே மாலே)

உபயோகம்:—சன்னி-13, சுவாசகாசம்-5, காயம் 4-ம் தீரும்.

அதுபாணம்:—நொச்சிச்சாறு.

பந்தியம்:—கடும்பத்தியம்.

(48) துருசு பஸ்பம்

துருசு கட்டிகளை கவுதும்பைச்சாற்றில் ஊறவைத்து, நன்றாய் காயவைத்து பின் கவுதும்பைச் சாற்றால் 3-மணிகேரம் அரைத்துப் பில்லைட்டிக் காயவைத்து, மேற்படி இலையை அரைத்துக் கவசம்செய்து பின் 7-சீலைமண் செய்து, 25-வாட்டியில் புடமிட்டு எடுத்து கரு ஊமத்தைச்சாற்றால் 3-மணிகேரம் அரைத்து, மேற்படி யிலையை அரைத்துக் கவசம்செய்து முன்போல் புடமிடப்பமாக்கும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—1 $\frac{1}{2}$, 2-குன்றிமணியளவு.

உபயோகம்:—சன்னி-13, கரம்-64, குன்மம்-8, சோகை-5, பாண்டு-5, பித்தம்-40, காசம்-5, காமாலை-13, இரலைப்பு, மகோதரம், தோஷம் தீரும்.

அதுபாணம்:—நெய், வெண்ணெய், வெள்ளாட்டுப்பால்.

பந்தியம்:—இச்சாபத்தியம்.

(49) நகஷத்திர மாணிக்கக் கிருதம்

தேங்காய்ப்பால் அவுன்ஸ் 48 பொடுதலைச்சாறு அவுன்ஸ் 48
ஆற்றுத்தண்ணீர் ,, 300

முதலில் ஆற்றுத்தண்ணீரை மட்டும் எட்டொன்றாகச் சுண்டவைத்து, பின் ஒன்று சேர்த்து, எரித்து நெய்யை வடித்துக்கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—2, 3-தேக்கரண்டி (காலே மாலே)

உபயோகம்:—கருகாக்கு குலை; மேல்வாய்ப்புண்; உள்நாக்கை அரிக்கும் கிரந்தி; பல்லீரை யரிக்கும் கிரந்தி; நாக்கரிப்பு; நாக்குப்புண்; தீரும்.

(50) நாராயண மண்டூரச் செந்தூரம்

*அரப்பொடி	ரூபாயெடை	■ நவாச்சாரம்	ரூபாயெடை	3
*மண்டூரம்	,,	3	சங்கு	3
*காந்தம்	,,	3	கடல்நூரை	3
*கந்தகம்	,,	3	கலநார	3
*வெங்காரம்	,,	3		

■ சுத்தி செய்யவேண்டும்.

ஒன்று சேர்த்து, சேர்த்துக் கற்றுழைச்சாற்றால் 24-மணிகேரம் அரைத்து 24-மணிகேரம் கடும்வெயிலில் வைக்க செஞ்சூரமாகும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு பணலிடை (காலை மாலை)

உபயோகம்:—பாண்டு-5, சோடை-5, அக்கினிமாந்தம், வாயு, இரத்தக் குறைவு தீரும்.

அறுபானம்:—பசுநெய், வெண்ணெய், பசும்பால், முலைப்பால்.

பந்தியம்:—இச்சாபத்தியம்.

(51) பயிரவலடி (மாத்திரை)

கட்டினலிங்கம் ரூபாயெடை	1	அக்காரம்	ரூபாயெடை	1
*கருநாவி	1	சக்கு	1	1
சாதிபத்திரி	1	தீப்பிலி	1	1
சண்ணைவங்கப்பட்டை	1	கிராம்பு	1	1

ஒன்று சேர்த்து, வெற்றிலைச்சாறு, இஞ்சிச்சாறு இவற்றால் தனித்தனி 3-மணிகேரம் அரைத்து, குன்றிமணிப் பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்து உலர்த்திக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு மாத்திரை (காலை மாலை)

உபயோகம்:—இருமல், வாயு, அதிசாரம், குன்மம் தீரும்.

அறுபானம்:—முலைப்பால்.

பந்தியம்:—இச்சாபத்தியம்.

(52) பவளபஸ்பம்

பவளங்களைச் சுத்திசெய்து, தேன்கொடுக்கிலையை அரைத்துக்கவசம் செய்த பின் 7-சிலை மண்ணெய்து 25-வாட்டியில் புடமிட பஸ்பமாகும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—1 ரூபாயெடை (காலை மாலை)

உபயோகம்:—பித்தம்-40, ஷயம்-4, காசம்-5, இருமல், ரீர்கடுப்பு தீரும்.

அறுபானம்:—ரீர்கடுப்புக்கு ரோகாரம், மற்றவைகளுக்கு பசுநெய், பசு வெண்ணெய்.

பந்தியம்:—இச்சாபத்தியம்.

(53) பாலசஞ்சீவி மாத்திரை

கோரோசலை	ரூபாயெடை	3	கடுகுரோகினி	ரூபாயெடை	3
வெங்காரம்	1	சக்கு	1	3	3
† நேர்வாளம்	1	3	1	3	3

1 லிங்கக்கட்டு வென்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கவும். சுத்தி செய்ய வேண்டும். † சுத்திமுறை 60-ம் பக்கம் பார்க்கவும்.

ஒன்று சேர்த்து, முலைப்பாலால் 6-மணிநேரம் அரைத்து கடுகு பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்து உலர்த்திக் கொள்ளவும்.

குழந்தைகள் அளவு:—1, 2-மாத்திரைகள் (கால மால),

உபயோகம்:—சுரம், மாந்தம் தீரும்.

அதுபாள்:—முலைப்பால்.

(54) பால சுரகுடோரி மாத்திரை

கோரோசனை	ரூபாயெடை 3	கோஷ்டம்	ரூபாயெடை 1
பெருஞ்சீரகம்	" 1	இலப்பை அரப்பு	" 1
கருஞ்சீரகம்	" 1	சகஸ்திரபேதி	" 1
அதிமதுரம்	" 1	இந்தப்பு	" 1

ஒன்று சேர்த்துச் சோற்றுக் கற்றுகைச் சாற்றால் 6-மணிநேரமும் முலைப்பாலால் 6-மணி நேரமும் அரைத்து, உளுந்து பிரமாணம் மாத்திரைகளாகச் செய்து உலர்த்திக் கொள்ளவும்.

குழந்தைகள் அளவு:—1, 2, மாத்திரைகள் (கால மால)

உபயோகம்:—சகல சாங்களும் தீரும்.

அதுபாள்:—முலைப்பால்.

(55) பாலசுர விஷஹர மாத்திரை

கருவாப்பட்டை ரூபாயெடை 5 ■ ஆடுதீண்டரப்பால ரூபாயெடை 5

ஒன்று சேர்த்து எலுமிச்சம்பழச்சாறு விட்டு 6-மணிநேரம் அரைத்து கடுகு பிரமாணம் மாத்திரைகளாக உருட்டி உலர்த்திக் கொள்ளவும்.

குழந்தைகள் அளவு:—ஒரு மாத்திரை (கால மால)

உபயோகம்:—குழந்தைகள் சகல சுரமும், விஷமும் தீரும்.

அதுபாள்:—முலைப்பால்.

(56) பால சுரஹர மாத்திரை

குங்குமப்பூ	ரூபாயெடை 3	திப்பிலி	ரூபாயெடை 1½
கிராம்பு	" 1½	கடுக்காய்	" 1½
ஏலம்	" 1½	தான்றிக்காய்	" 1½
சாதிக்காய்	" 1½	கெல்லிவற்றல்	" 1½
சந்தனம்	" 1½	கடுகுரோகினி	" 1½
சுக்கு	" 1½	தேவதாரு	" 1½
மிளகு	" 1½		

ஒன்று சேர்த்து, எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் 6-மணி நேரமும், கண்டங் கத்திரிப்பழச்சாற்றால் 6-மணி நேரமும் அரைத்து, உளுந்து பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்து உலர்த்திக் கொள்ளவும்.

■ நிழலில் காயவைத்துக் கொள்ளவும்.

குழந்தைகள் அளவு:—ஒரு மாத்நிரை (கால மாலே)

உபயோகம்:—சரம், குளிர்சரம், சன்னிதீரும்.

அதுபாணம்:—முலைப்பால், தேன், இஞ்சிச்சாறு.

(57) பாலவிநோத சஞ்சீவி மாத்திரை

† நேர்வாளம்	ரூபாயெடை 3	சாதிக்காய்	ரூபாயெடை 3
பச்சைக்கற்பூரம்	” 3	கருவாப்பட்டை	” 3
சுக்கு	” 3		

ஒன்று சேர்த்துச் சோற்றுக் கற்றாழைச்சாற்றால் மைபோலரைத்து கடுகளவு மாத்திரைகள் செய்து உளர்த்திக் கொள்ளவும்.

குழந்தைகள் அளவு:—1, 2-மாத்திரைகள்.

உபயோகம்:—குழந்தைகள் சரம், மாந்தம் தீரும்.

அதுபாணம்:—முலைப்பால், இஞ்சிச்சாறு.

(58) பாலாதிசாரக் கஷாயம்

கொத்தமல்லி	ரூபாயெடை 1	சித்தில்தண்டு	ரூபாயெடை 1
கோரைக்கிழங்கு	” 1	சிற்றாழுட்டி	” 1
வெட்டிவேர்	” 1	பற்பாடகம்	” 1
குருவிவேர்	” 1	அதிவிடயம்	” 1
பெருமாத்திப்பட்டை	” 1	செறுபூனைக்காஞ்சொறி	” 1

ஒன்று சேர்த்திடித்து, இரவிலேயே 24-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டு காலையில் 3-அவுன்ஸாகச் சுண்டக் காய்ச்சிக் கொள்ளவும்.

பேரியவர்கள் அளவு:—2, 3, அவுன்ஸ்.

உபயோகம்:—சரம், பிரசவித்த பின் உண்டாகும் சரம், கர்ப்ப ஸ்திரீகள் சரம், பிரசவித்த பின் காணும் இரத்தப்பெருக்கு, குழந்தைகள் சரம், வயிற்றோட்டம் தீரும்.

(59) டாவன ஓயம்

24-ரூபாயெடை ஓமத்தை இளவறுப்பாய் வறுத்து, கசக்கி உமிழ்க்கி 24-மணிநேரம் புளித்தமோரில் ஊறவைத்திருந்து எடுத்து நன்றாய் உலர்த்தியபின் எலுமிச்சம்பழச்சாறு 16-அவுன்ஸும் இத்துப்பு ரூபாயெடை 10-ஒன்று சேர்த்துக் கரைத்து அதில் 2-கான் ஊறவைத்து உலர்த்திக் கொள்ளவும்.

பேரியவர்கள் அளவு:—1, 2-ரூபாயெடை (கால மாலே)

உபயோகம்:—வயிற்றிவலி அக்கினிமந்தம், வாயு, வயிற்றுப் பொரு மல் அஜீரணம், குன்மம் தீரும்.

† சுத்திமுறை 50-பக்கம் பார்க்கவும்.

(60) நெய்கொட்டான் பழத்தெண்ணெய்

■ நெய்கொட்டான்பழம்	வசம்பு	ரூபாயெடை	8
ரூபாயெடை 3	மயிலிறகு சாம்பல்		8
வெள்ளைப்பூண்டு	3	வேப்பெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 24

சரக்குகளைத் தண்ணீர் விட்டரைத்து, எண்ணெயில் கரைத்து எரித்து வடித்துக் கொள்ளவும்.

10, 12-வயதுச் சிறுவர்கள் அளவு—4, 6-தேக்கரண்டி (காலையில் மட்டும்)

உபயோகம்:—குமரகண்டன் வலிப்பு, காக்கை வலிப்பு தீரும்.

பந்தியம்:—இச்சாபத்தியம்.

குறிப்பு:—வலிப்பு வந்திருக்கும் சமயத்திலும் மற்ற சமயத்திலும் உடம்பில் தடவி வரலாம்.

(61) புளியாரைக் கிருதம்

புளியாரைச்சாறு	அவுன்ஸ் 6	மாசிக்காய்	ரூபாயெடை $\frac{1}{4}$
வள்ளிக்கிழங்குச்சாறு	3	அதிமதுரம்	■ $\frac{1}{4}$
பொன்னாக்காணிச்சாறு	3	வலம்	3
செவ்வில நீர்தண்ணீர்	12	சாதிக்காய்	■ $\frac{1}{8}$
பசும்பால்	30	சாதிபத்திரி	3
பசுரெய்	30	கற்கண்டுத் தூள்	1
		சீரகம்	3

முதலிய சாறு, நெய், இவற்றை ஒன்றுசேர்த்து சீரகம், மாசிக்காய் அதிமதுரம் இவற்றைப் பசும்பாலிலரைத்துக் கரைத்துக் கலந்து காய்ச்சி வடித்து, அதில் இதர சரக்குகளைச் சூரணித்து கலந்துக் கொள்ளவும்.

பேரியோடுகள் அளவு:—3, 4-தேக்கரண்டி (காலையிலே)

உபயோகம்:—பித்தவாயு, பித்தவெட்டை, பித்த எரிவு, பித்தமயக்கம், நீர் சுருக்கு, வார்தி, அரோசிகம் தீரும்.

பந்தியம்:—இச்சாபத்தியம்.

(62) பூவரசம்பட்டை எண்ணெய்

பூவரசம்பட்டை	ரூபாயெடை 30	வாய்விளங்கம்	ரூபாயெடை ■
பூதகரப்பாணப்பட்டை	30	அமுக்காக்கிழங்கு	3
செங்கத்தாரிப்பட்டை	30	கருஞ்சீரகம்	3
கண்டங்கத்திரி	30	கார்போச அரிசி	3
நிலவாசை	30	வசம்பு	■
பறங்கிப்பட்டை	■	சதகுப்பை	3
இலவங்கப்பட்டை	3	வெள்ளைப்பூண்டு	3
மிளகு	3	வலம்புரிக் காய்	3

■ பூந்திக்கொட்டை, புகளாக்கொட்டை எனப்படும்.

திப்பிலி	3	கோவைச்சாறு	அவுன்ஸ்	24
கடுகுரோகினி	3	பிநாறிகங்கன்சாறு	„	24
வெள்ளாட்டுப்பால்	48	சிற்றாமணக்கெண்ணெய்	„	48

பட்டைகளைப் பொடித்தும், சரக்குகளைப் பால் விட்டடைத்தும் எண்ணெயுடன்சேர்த்து, சாறுகளையும் விட்டுக் கலந்து காய்ச்சி வடித்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—6, 8-தேக்கரண்டி (காலையில் மட்டும்)

உபயோகம்:—கரப்பான், மேகப்படை, சொறி சிரங்கு, சர்மரோகங்கள் தீரும்.

பக்தியம்:—புளி, உப்பு, நல்லெண்ணை, கடுகு, கருவாடு, மீன், புதைவிலை போகம்.

(63) மகா கூழ்பாண்ட கிருதம்

பெரும்பூசணிக்காய்ச்சாறு	சாதிக்காய்	ரூபாயெடை
அவுன்ஸ் 48	சாதிப்பத்திரி	„ 1 1/2
செவ்வின நீர்தண்ணீர் „ 24	மாசிக்காய்	„ 1 1/2
சோற்றுக்கற்றழைசாறு „ 24	கடுக்காய்	„ 1 1/2
தென்னம்பூச்சாறு „ 24	தான்றிக்காய்	„ 1 1/2
தாழைவிழுத்ச்சாறு „ 24	கெல்லிவற்றல்	„ 1 1/2
பசும்பால் „ 48	வால்மிளகு	„ 1 1/2
பசுநெய் „ 48	சீரகம்	„ 1 1/2
குரோசானி ஓமம் ரூபாயெடை 1 1/2	ஏலம்	„ 1 1/2
கொத்தமல்லி „ 1 1/2	கற்கண்டுபொடி	„ 3
கடுக்காய்ப்பூ „ 1 1/2	காட்டாத்திப்பூ	„ 1 1/2

சரக்குகளைப் பசும்பாலால் அரைத்துக்கரைத்து எரித்து வடித்து கற்கண்டு பொடியைச் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—1/2, 3/4-அவுன்ஸ் கிருதத்தில் ஒரு கிரான்ஸ், அப்ரகச் செந்நாரம் கலந்து காலை மாலை கொடுக்கலாம்.

உபயோகம்:—மேகம்-20, பிரமேகம்-21, காமாலை-13, கிராணி-11 பித்தம்-40, உஷ்ணம், கைகாலெரிவு, நீர்கடுப்பு, அஸ்திராவெட்டை தீரும்.

பக்தியம்:—இச்சாபத்தியம்.

(64) மகா கூழ்பாண்ட லேகியம்

பெரும்பூசணிக்காய்ச்சாறு	தாளிசபத்திரி	ரூபாயெடை
அவுன்ஸ் 48	சீரகம்	„ 5
எலுமிச்சம்பழச்சாறு „ 12	கோஷ்டம்	„ 5
தாழைவிழுத்ச்சாறு „ 12	கொத்தமல்லி	„ 5
தென்னம்பூச்சாறு „ 12	மாசிக்காய்	„ 5
பசும்பால் „ 24	மிளகு	„ 5

நெய்	„	6	ஏலம்	„	5
தேன்	„	6	சாதிக்காய்	„	5
சர்க்கரை	ரூபாயெடை	20	சாதிபத்திரி	„	5
அதிமதுரம்	,	5			

முதலில் சாற்றையும், பாளையும் ஒன்றுசேர்த்து, சர்க்கரையைக் கொட்டி பாகுசெய்து, பின்னர் சூரணித்து தனித்தனியே எடை போட்டுக்கொண்டு சர்க்குச் சூரணங்களைக் கொட்டிக்கொண்டு, தேனையும், நெய்யையும் சேர்த்துப் பிசைந்து கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—1, 1½-ரூபாயெடை (கால மால)

உபயோகம்:—அஸ்திசுரம், அஸ்திவெட்டை, சோகை-1, காமாலை-13, பிரமியம்-21, நீர்க்குருக்கு, உஷ்ணரோகங்கள் தீரும்.

பத்தியம்:—புளி, புகையிலை, போசம்.

(65) மகா தாளிசப்பத்திரிச் சூரணம்

தாளிசபத்திரி ரூபாயெடை	15	திப்பிலி	ரூபாயெடை	1½	
ஏலம்	”	1½	கோஷ்டம்	”	1½
கிராம்பு	”	1½	அக்ரகாரம்	”	1½
சாதிக்காய்	”	1½	கடுக்காய்	”	1½
சாதிபத்திரி	”	1½	தான்றிக்காய்	”	1½
வால்மிளகு	”	1½	நெல்லிவற்றல்	”	1½
இலவங்கப்பட்டை	”	1½	சடாமாஞ்சில்	”	1½
வாய்விளங்கம்	”	1½	சோம்பு	”	1½
கொத்தமல்லி	”	1½	சர்க்கரை	”	80
சீரகம்	”	1½			

சர்க்கரை நீக்கி மற்றவைகளைத் தனித்தனியே இளவறுப்பாய்வறுத்துச் சூரணித்து, எடைப்போட்டுச்சேர்த்து, சர்க்கரையையும் கலந்துகொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—திரிகடிபிரமாணம் (கால மால)

உபயோகம்:—காசம், க்ஷயம், பித்தபாண்டு, பித்தவெட்டை, ஈளை, அஸ்திசுரம், அஸ்திவெட்டை, காவரட்சி, கைகாலெரிவு, கிராணி, விக்ஷல், பொருமல் தீரும்.

(66) மகா தூதுளைக் கிருதம்

தூதுளைச்சமூலம் ரூபாயெடை 100 நீர்முள்ளிவேர் ரூபாயெடை 50 கண்டங்கத்திரிச்சமூலம், 50

இவற்றை இடித்து 96-பயிண்ட் தண்ணீரில் போட்டு, 12-பயிண்டாகச் சுண்டவைத்த கஷாயம் அவுன்ஸ் 240-ல்.

பசும்பால்	அவுன்ஸ் 120	கிப்பிவி	ரூபாயெடை 11½
பசுநெய்	„ 120	மிளகு	„ 11½
தேன்	„ 12	கடுங்காய்	„ 11½
இஞ்சிச்சாறு	„ 32	தான்றிக்காய்	„ 11½
செவ்வல்லிக்கொடி		நெல்லிக்காய்	„ 11½
	ரூபாயெடை 3	கோவட்டம்	„ 11½
சிறுகாஞ்சொறிவேர்	„ 3	தாளிசப்பத்திரி	„ 11½
ஆடாதோடைவேர்	„ 3	சடாமாஞ்சில்	„ 8
கண்டக்கத்திரிவேர்	„ 6	அதிமதுரம்	„ 8
முசுமுசுக்கை	„ 6	சேரகம்	„ 8
நன்னூரிவேர்	„ 11½	தேற்றுவிரை	„ 8
சிறுநாகப்பூ	„ 1½	கற்கண்டு	„ 8
கொடிவேலிவேர்	„ 1½	சுக்கு	„ 11½

வேர்களையும், சரக்குகளையும் பால்விட்டரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து, தேனையும், கற்கண்டையும் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—½, ¾-தேக்கரண்டி (கால மாலு)

உபயோகம்:—சுளை, இருமல், சுவாசகாசம்-5, பொருமல், இரைப்புதிரும் பந்தியம்:—இச்சாபத்தியம்.

(67) மகா தூதுளைச் சூரணம்

*தூதுளைப்பழம் ரூபாயெடை	15	மிளகு	ரூபாயெடை	3
*கண்டக்கத்திரிப்பழம்,	15	சிறுநாத்தை	„	8
*சிவகரந்தைப்பழம்	„ 15	தாளிசப்பத்திரி	„	9
கோரோசனை	„ 3½			

முதலில், மிளகு, சிறுநாத்தை, தாளிசப்பத்திரி இவைகளை தனித்தனியே இளவறுப்பாய்வறுத்து, சூரணித்து, பழங்களையும் தனித்தனியே சூரணித்து யெடை போட்டு எடுத்து, பின் கோரோசனையையும் சேர்த்துக் கலந்து கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—திரிகடிப் பிரமாணம். (கால மாலு)

உபயோகம்:—கபரோகங்கள் தீரும்.

அதுபாணம்:—நெய்; சர்க்கரை.

(68) மகா ரஹத பஸ்பம்

அரிதாரத்தை எலுமிச்சம்பழச்சாறு விட்டு நன்றாய் அரைத்து துணியில் தடவி வெள்ளிதகட்டுக்குக் கவசம் செய்து, பின் சிலைமண்செய்து 25-வரட்டி யில் புடமிடவும். இவ்விதமாக கவசம் செய்து 14-புடமிட பஸ்பமாகும்.

■ உலர்த்திச் சூரணிக்கவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—4, 5-கிரைன்ஸ் (கால மாலே)

உபயோகம்:—மேகம், பிரமேகம், கிரிச்சரம், அஸ்திச்சரம் தீரும்.

அநுபானம்:—நெய் : வெண்ணெய்.

பத்தியம்:—இச்சா பத்தியம்.

(69) மகா ரசபஸ்பம்

ஒரு மண்சட்டியில் 8-ரூபாயெடை கந்தகத்தைப் போட்டு, காடாக்கினி யாய் எரிக்க கந்தகம் உருகும், அந்தச் சமயம் 21-ரூபாயெடை ரசத்தை விட்டுக் கிண்டிக்கொண்டிருந்தால் சுறுத்து ஊளாகிவிடும். பின் வேறு மண் சட்டியில் பாதிவரை செங்கற்பொடியைப் போட்டு, அதன்மேல் 8-ஆழர்க்கு கறியுப்பைக் கொட்டி பரப்பி, அதன்மேல் ரசக்கந்தியை வைத்து மேல் சட்டியால் மூடி, வாயிக்குச் சீலைமண்ணெய்து 12-மணி நேரம் காடாக்கினி யாய் எரிக்க மேல் சட்டியில் ரசம் பதங்கி பஸ்பமா யிருக்கும்.

பெரியவர்கள் அளவு:— $\frac{1}{2}$ -பணவிடை (கால மாலே)

உபயோகம்:—சுரம்-64, மரந்தம்-8, காசம்-5, சன்னி-18, நேத்திர ரோகம்-94, அதிசாரம்-6, மேகம்-20-ம் தீரும்.

அநுபானம்:—நெய், வெண்ணெய், மகா வல்லாரைக்கருதம்.

பத்தியம்:—கடும்பத்தியம்.

(70) மகா வல்லாரைக் கிருதம்

வல்லாரைச்சாறு	அவுன்ஸ் 48	கிராம்பு	ரூபாயெடை $1\frac{1}{2}$
பொடுதலைச்சாறு	„ 48	வால்மிளகு	„ $1\frac{1}{2}$
பொன்னாக்காணிச்சாறு	„ 48	சாதிக்காய்	„ $1\frac{1}{2}$
எலுமிச்சம்பழச்சாறு	„ 48	சாதிபத்திரி	„ $1\frac{1}{2}$
பசுநெய்	„ 96	மாசிக்காய்	„ $1\frac{1}{2}$
பசும்பால்	„ 96	கடுக்காய்ப்பூ	„ $1\frac{1}{2}$
அதிமதுரம்	ரூபாயெடை $1\frac{1}{2}$	கற்கண்டு	„ 12
ஏலம்	„ $1\frac{1}{2}$		

சர்க்கரைப் பாலால் அரைத்துக் கரைத்துக் கலந்து, எரித்து வடித்து நற்கண்டைச் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு ரூபாயெடை யளவு கிருதத்தில் $\frac{1}{2}$ -பண விடை ரசபஸ்பம் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

உபயோகம்:—மேகம்-20, கிரந்தி-9, பிரமேகம்-21, மேக சூலை, சொறி கிரங்கு, யோனிப்புற்று, நீர்க்கடுப்பு தீரும்.

பத்தியம்:—புளி, கல்லெண்ணெய், புகையிலை.

(71) மகா வில்வாதி லேதியம்

வில்வவேர்	ரூபாயெடை 75	சிற்றமுட்டிவேர்	ரூபாயெடை 1
நன்னூரிவேர்	„ 1	பேராமுட்டிவேர்	„ 1
விலாமிச்சைவேர்	„ 1	கொடிவேலிவேர்	„ 1
குட்டிவிளாவேர்	„ 1	முன்னைவேர்	„ 1
விளாவேர்	„ 1	பாதிரிவேர்	„ 1
வாசைவேர்	„ 1	முசுமுசுக்கைவேர்	„ 1
நிலவாகைவேர்	„ 1	தேற்றுவேர்	„ 1

இவற்றைப் பொடித்து 10-பயின்ட் தண்ணீரில் போட்டு, பத்தி
லென்றாகச் சுண்டக் காய்ச்சிய;

கஷாயம்	அவுன்ஸ் 20	சந்தனம்	ரூபாயெடை 1
இஞ்சிச்சாறு	„ 12	சகஸ்திரபேதி	„ 1
புளிப்புமாதளம்பழச்சாறு	„ 12	சிறுநாகப்பூ	„ 1
பசும்பால்	„ 12	செண்பகப்பூ	„ 1
தேன்	„ 6	வில்வப்பூ	„ 1
பசுநெய்	„ 6	இலுப்பைப்பூ	„ 1
ஏலம்	ரூபாயெடை 1	சடாமாஞ்சில்	„ 1
கிராப்பு	„ 1	வேப்பம்பருப்பு	„ 1
கொத்தமல்லி	„ 1	பருத்திப்பருப்பு	„ 1
கோவந்தம்	„ 1	கடுக்காய்	„ 1
சுக்கு	„ 1	தான்றிக்காய்	„ 1
திப்பிலி	„ 1	நெல்லிவற்றல்	„ 1
மிளகு	„ 1	தாளிசுபத்திரி	„ 1
அதிமதுரம்	„ 1	சிறுதேக்கு	„ 1
அசுரகாரம்	„ 1	வாளுளவையரிசி	„ 1
சீரகம்	„ 1	திராசைப்பழம்	„ 1
கருஞ்சீரகம்	„ 1	சர்க்கரை	„ 25
வாய்வீனங்கம்	„ 1	பேரிச்சம்பழம்	„ 1

முதல் சர்க்கரையைத் தனித்தனியே இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூர-
ணித்து எடை போட்டுக் கலந்து வைத்துக்கொண்டு; பால், கஷாயம், சாறு
இவைகளை ஒன்று சேர்த்து, அதில் சர்க்கரையைக் கலந்து பாருபதமாகி,
பின்னர் னுளக்கொட்டிக் கிண்டி, தேனையும், நெய்யையும் சேர்த்துப்
பிசைந்து கொள்ளவும்.

பேரியவர்கள் அளவு:—ஒரு கொட்டைப்பாக்குப் பிரமாணம் (காலை
மாலை)

உபயோகம்:—பாண்டு, விஷப்பாண்டு, கைகாலெரிவு, வீக்கம் கிராணி,
பொருமல், வயிற்றெரிச்சல், வாந்தி, ஆகாரவெறுப்பு பித்தரோகங்கள் திரும்.
பத்தியம்:—இச்சா பத்தியம்.

(72) மாதுளம்பழ சர்பத்

மாதுளம்பழச்சாறு அவுன்ஸ் 48 சர்க்கரை ரூபாயெடை 180
பன்னீர் „ 12

ஒன்று சேர்த்து, தேன் பதமாய்க் காய்ச்சிக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—தண்ணீருடன் கலந்து சாப்பிட பித்தசாந்தி யுண்டாகும்.

(73) மாந்த மாத்திரை

ஓமம்	ரூபாயெடை 1	வசம்பு	ரூபாயெடை 1
சுக்கு	„ 1	கொத்தமல்லி	„ 1
திப்பிலி	„ 1	குரோசாணி ஓமம்	„ 1
சேகம்	„ 1	சாரணேவேர்	„ 1
கருஞ்சேகம்	„ 1		

ஒன்று சேர்த்து, தண்ணீர் விட்டு 6-மணி நேரம் அரைத்து, பட்டாணி பயறு பிரமாணம் மாத்திரைகளாகச் செய்துக் கொள்ளவும்.

குழந்தைகள் அளவு:—1, 2-மாத்திரை (கால மால)

உபயோகம்:—மாந்தம் தீரும்.

அநுபானம்:—சுடுதண்ணீர்; முலைப்பால்.

(74) மிர்தார்சிங்கு பிளாஸ்திரி

10-ரூபாயெடை மிர்தார்சிங்கி ஊளை 40-அவுன்ஸ் சைதுன் எண்ணெய் (Oil Olive) 40-அவுன்ஸ் தண்ணீரும் கலந்ததில் கொட்டி அடுப்பேற்றி, சிறு தீயாக எரித்துக் கிண்டிக் கொண்டிருந்து, பதத்திற்கு வந்தவுடன் இறக்கிக் கொள்ளவும். தண்ணீர் பேரதாமலிருந்தால் ஆவித் தண்ணீர் (Distilled Water) சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—துணியில் தடவி வெட்டுக்காயங்களுக்கும், இரு பிளவை ஒன்றிக்கவும், கட்டிகளைக் கரைக்கவும் உபயோகிக்கலாம்

(75) முடக்கொத்தான் எண்ணெய்

முடக்கொத்தான்சாறு	கடுகுரோகிணி	ரூபாயெடை 8
அவுன்ஸ் 36	கொடிவேலிவேர்	„ 8
„ 36	வெள்ளைக்காகணம்பேர்	„ 8
„ 36	சிற்றசத்தை	„ 8
சுழற்சிப்பருப்பு ரூபாயெடை 3	சதகுப்பை	„ 3
தேவதாரு „ 3	† சுத்திசெய்த நேர்வாளம்	20
இந்துப்பு „ 3	வெள்ளைப்பூண்டு	„ 12
திப்பிலி „ 3	பெருங்காயம்	„ 8

■ இலைக்கள்ளி இலையை அனலில் வாட்டிப் பிழியவும்.

† சுத்திமுறை 60-ம் பக்கம் பார்க்கவும்.

ஒன்று சேர்த்து மைபோ லரைத்துக் கரைத்து, எரித்து வடித்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:— $\frac{1}{2}$ 1-அவுன்ஸ் (காலையில் மட்டும்.)

உபயோகம்:—சூடல்வாதம்; அண்டவாதம் தீரும்.

பத்தியம்:—உப்பு, புளி, புகையிலை, நல்லெண்ணெய்.

முட்டைத் தைலம்

அண்டத்தைல மென்றதுதான்.

(76) மேகத்தெண்ணெய்

கோவையிலைச்சாறு	அவுன்ஸ் 24	சாதிக்காய்	ரூபாயெடை 1
பொன்னாங்காணிச்சாறு	" 24	சாதிபத்திரி	" 1
வல்லாரைச்சாறு	" 24	மாசிக்காய்	" 1
சிறுசெருப்படைச்சாறு	" 24	கடுக்காய்ப்பூ	" 1
பெருநெருஞ்சில்சாறு	" 24	சிறுநாகப்பூ	" 1
சீந்தில்தண்டுச்சாறு	" 24	ஏலம்	" 1
அரசம்பட்டைச்சாறு	" 24	செண்பகப்பூ	" 1
சிறுமணக்கெண்ணெய்	" 32	காட்டாத்திப்பூ	" 1
நல்லெண்ணெய்	" 32	கொடிவேலிவேர்ப்பட்டை	" 1
குரோசானிஓம்	ரூபாயெடை 1	கற்கண்டுத் தூள்	" 1

சாற்றையும், எண்ணெயையும் ஒன்று சேர்த்துச் சரக்குகளைப் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து கற்கண்டைச் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—1, $\frac{1}{2}$ 1-அவுன்ஸ் வீதம் (41-நாள் காலையில் மட்டும்.)

உபயோகம்:—மேகம் 20; இரணம், கிரந்தி, லிங்கப்புற்று, யோனிப்புற்று, வெடிகுலை, மேகஹால், சொறி, கிரங்கு பிரமேகங்கள் தீரும்.

பத்தியம்:—இச்சா பத்தியம்.

ரச செந்தூரம்

இரசச் செந்தூரமென்றதின் கீழ் பார்த்தவும்.

(77) ரச மாத்திரை

சுத்திசெய்தரசம்	ரூபாயெடை 3	சுக்கு	ரூபாயெடை 3
சுத்திசெய்தகந்தகம்	" 3	† நேர்வானம்	" 9
சுத்திசெய்தவெங்குரம்	" 3		

முதலில் ரசத்தையும், கந்தகத்தையும் அரைத்துச் சேர்த்துக்கொண்டு, பின் மற்றவைகளைச் சேர்த்துத் தண்ணீர்விட்டு 6-மணி நேரம் அரைத்து கடுகுப் பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்து கொள்ளவும்.

† சுத்திமுறை 60-ம் பக்கம் பார்த்தவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—5, 10-மாத்திரை குழந்தைகளுக்கு 1, 2.

உபயோகம்:—ஊதுமார்தம், சூரம், வாதம், வாயு தீரும்.

அதுபாணம்:—சுடு தண்ணீர்.

(78) ரசலிங்க மெழுகு

*இரசதற்பூரம், *இலிங்கம், இவை இரண்டையும் சம அளவாகடுத்து முலைப்பாலால் 3-மணிநேரமும், எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் 3-மணி நேரமும், தேனினால் 3-மணி நேரமும் அரைத்து ஒரு இரும்புக் கரண்டியில் போட்டுக் கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழச்சாறு விட்டு அணலில் பிடிக்க உருகி மெழுகாகும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு பணவிலை.

உபயோகம்:—சூதகவலி, வயிற்றுவலி, வாயு தீரும்.

அதுபாணம்:—பனைவெல்லம்.

பந்தியம்:—இச்சா பந்தியம்.

ராஜ அப்ரக பஸ்பம்

அப்ரக பஸ்ப மென்றதைப் பார்க்கவும்.

(79) ராஜ அம்ஸபோடலி மாத்திரை

சங்கை துண்டுகளாக்கி ஒருகலயத்தின்போட்டு, குப்பைமேனிசார்விட்டு வாயைமூடி சீலைமண்செய்து, 50-வரட்டியில் புடமிட பஸ்பமாகும்.

அந்தசங்குபஸ்பம் ரூபாயெடை	■	சுத்திசெய்தநாவீ ரூபாயெடை	■
சுக்கு	"	3 சுத்திசெய்த கந்தகம்	"
மிளகு	"	3 சுத்திசெய்த ரசம்	"
திப்பிலி	"	3 பொரித்தவெங்காயம்	"

ஒன்றுசேர்த்து, எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் 6-மணிநேரம் அரைத்து குன்றி மணி யெடை யளவாக மாத்திரைகள் உருட்டி, உலர்த்திக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—1, 2-மாத்திரைகள்.

உபயோகம்:—கிராணி 11-ம் தீரும்.

அதுபாணம்:—மிளகுதூளும், நெய்யும் கலந்து.

(80) ராஜ ஏலாதிச் சூரணம்

ஏலம்	ரூபாயெடை	20	சிறுநாகப்பூ	ரூபாயெடை	1½
சுக்கு	"	10	மிளகு	"	½
கூகைநீறு	"	5	கிராம்பு	"	½
தாளிசபத்திரி	"	2½	சர்க்கரை	"	12

சாக்ரூளைத் தனித்தனியே சூரணித்து எடுத்து எடைபோட்டு ஒன்று சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

■ சுத்தி செய்ய வேண்டும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—திரிகடிப் பிரமாணம் (காலை மாலை)

உபயோகம்:—இரணம், மேக ஊறல், அரிகிரந்தி, பித்தம்-40, பெரும் பாடு வாதம்-80, எலும்புருக்கி, சொறி சிரங்கு தீரும்.

(81) ராஜாங்கக் கொம்பரக்குத் தைலம்

30-ரூபாயெடை கொம்பரக்கைப் பொடித்து, 32-படி தண்ணீரில் பேர்ட்டு சுண்டக்காய்ச்சிய கஷாயம். படி 4.

பசும்பால்	„ 5	பச்சிலை	ரூபாயெடை 1
தயிர் தண்ணீர்	„ 1	பூலாங்கிழங்கு	„ 1
புளித்தகாடி	„ 2	செவ்வல்லிக்கிழங்கு	„ 1
கோஷ்டம்	ரூபாயெடை 1	இலவங்கப்பத்திரி	„ 1
சடாமாஞ்சில்	„ 1	கஸ்தூரிமஞ்சள்	„ 1
இலவங்கப்பட்டை	„ 1	அகிமதுரம்	„ 1
சதைகுப்பை	„ 1	சீர்தனம்	„ 1
கடுகுரோகினி	„ 1	சீரகம்	„ 1
கிளியூரம்பட்டை	„ 1	கருஞ்சீரகம்	„ 1
பூஞ்சாந்துப்பட்டை	„ 1	ஏலம்	„ 1

சரக்குகளைப் பசும்பாலால் அரைத்துக்கரைத்துக் கலந்து எரித்து வடித்து, 20-நாள் நெல்லுக்குள் வைத்திருந்து உபயோகிக்கவும்.

உபயோகம்:—ஸ்நானம் செய்துவரா, சுரம்-64, காசம்-5, பாண்டு-5, ரூலை-18, பித்தவெட்டை, பித்தமயக்கம்; வாய் ஊறல், வெட்டை தீரும்.

ராஜசிந்தாதி லேகியம்

சிந்தாதி லேகிய மென்றதைப் பார்க்கவும்.

(82) ராஜமார்தாண்ட லேகியம்

சங்கம்வேர்	ரூபாயெடை 36	சுண்டங்கத்திரிவேர்	ரூபாயெடை 15
செவ்வியம்	„ 15	சிறுருட்டிவேர்	„ 1
கொடிவேலிவேர்	„ 8	சீந்தில்வேர்	„ 8
வில்வவேர்	„ 8	நிலப்பனைக்கிழங்கு	„ 8
திப்பிலிமூலம்	„ 8		

இதில் இடிக்கவேண்டியவற்றை இடித்து, 12-படி தண்ணீரில் பேர்ட்டு காய்ச்சிய:—

கஷாயம்	படி 1½	கோரைக்கிழங்கு	ரூபாயெடை 1
சர்க்கரை	ரூபாயெடை 36	சீரகம்	„ 1½
ஏலம்	„ 1	கருஞ்சீரகம்	„ 1½
கிராம்பு	„ 1	சிறுநாகப்பூ	„ 1½
பெருங்காயம்	„ 1	கூடைநீறு	„ 2

திப்பிலி	ரூபாயெடை 1	சுக்கு	ரூபாயெடை 1
திப்பிலிமூலம்	„ 1	மிளகு	„ 6
சாதிக்காய்	„ 1	தேன்	„ 12
சிறுதேக்கு	„ 1	நெய்	„ 12

கஷாயத்துடன் சர்க்கரையைக் கலந்து பாருபதமாக்கி பின் சரக்கு களைத் தனித்தனியே சூரணித்து எடை போட்டுக் கிண்டி, தேன், நெய் சேர்த்துப் பிசைத்துக் கொள்ளவும்.

பேரியவர்கள் அளவு.—கொட்டைப் பாக்களவு (சாலை மாலை)

உபயோகம்:—கபரோகம் 96; வாதம் 80; பித்தம் 40; குண்மம் 8; விக்கல் 5; பீனிகம் 18; சன்னி 13; சுரம் 6½; உப்பிசம்; அஜீரணம்; நெஞ் செரிவு; வாததி 5; தீரும்.

பத்தியம்:—இச்சர பத்தியம்.

(83) ராஜாமிர்த சஞ்சிவி லேகியம்

தாழைவிழுது	ரூபாயெடை 36	சிறுமுட்டி	ரூபாயெடை 36
வல்லாரை	„ 36	சிறுபுள்ளி	„ 36
கொடுப்பை	3, 86		

ஒன்று சேர்த்து இடித்து * 2)-மாக்கால் தண்ணீரில் போட்டு, எட்டி லொன்றாகச் சுண்டக் காய்ச்சி, அதில் 60-ரூபாயெடை இஞ்சியைத் தோல் நீங்கி அரைத்துக் கலக்கி, மறுபடி எரித்து ஒரு படியாக வற்ற வைத்த;

கஷாயம்	படி 1	திப்பிலி	ரூபாயெடை 1½
பசும்பரல்	„ 5	சிறுநாத்தை	„ 1½
இளநீர்தண்ணீர்	„ 5	சாதிபத்திரி	„ 1½
சர்க்கரை	ரூபாயெடை 48	தாவிசபத்திரி	„ 1½
கற்கண்டு	„ 48	அதிவிடயம்	„ 1½
கடுக்காய்	„ 1½	வில்வப்பூ	„ 12
தான்றிக்காய்	„ 1½	பறங்கிப்பட்டை	„ 12
நெல்லிவற்றல்	„ 1½	பேரிச்சம்பழம்	„ 3
எலம்	„ 1½	அன்னபேதி	„ 3
சிராம்பு	„ 1½	பெருங்காயம்	„ 1
சாதிக்காய்	„ 1½	திராணைப்பழம்	„ 3
சாதிப்பத்திரி	„ 1½	கடிகைரீறு	„ 3
வால்மிளகு	„ 1½	பச்சைக்கற்பூரம்	„ ½
கோஷ்டம்	„ 1½	கோரோசினை	„ ½
சேரகம்	„ 1½	கஸ்தூரி	„ ½

* 8-படி 1-மாக்கால். 48-அவுன்ஸ் 1-படி. 1 பசும்பாலில் வேகவைத் தெடுத்துக் கொள்ளவும்.

அக்ரகாரம்	ரூபாயெடை 1½	அபின்	ரூபாயெடை ½
செவதையேர்	, 1½	தேற்றுவிரா	, 8
ஒமம்	, 1½	சேந்தில் சர்க்கரை	, 24
நறுக்குமூலம்	, 1½	கெய்	, 24
சுக்கு	, 1½	குங்குமப்பூ	, ½
மிளகு	, 1½	தேன்	, 24

கடுக்காய் முதல் அதிவிடயம் வரையுள்ள சர்க்கரை இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூரணித்தும், இதர சர்க்கரை பசும்பாலி லரைத்துக்கொண்டும் - கஷாயம், பால், தண்ணீர் இவற்றுடன் சர்க்கரை, கற்கண்டு இவைகளைச் சேர்த்துப் பாருபதமாக்கி, சூரணங்கனையும்; பாவில் அரைத்து வைத்திருப்ப வைகளையும் கொட்டிக் கிண்டி, பின் கெய், தேன் சேர்த்துப் பிசைந்து கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—கொட்டைப்பாக்களவு. (கால மாலை)

உபயோகம்:—மேகம் 20; கிராணி 11, சோகை 9, பாண்டு 5, காமலை 18; அஸ்திசுரம், அஸ்தி காங்கை, சித்பேதி தீரும்.

பந்தியம்:—இச்சர பந்தியம்.

(84) ராஜஸிவ்வாதி லேகியம்

75-ரூபாயெடை தோல் கீக்கிய வில்வவேரை, பஞ்சுபோலிடித்து 16-பயின்ட் தண்ணீரில் பேரட்டு 4-பயின்டாக சுண்டக் காய்ச்சிய,

கஷாயம்	அவுன்ஸ் 80	சாதிக்காய்	ரூபாயெடை 1
சர்க்கரை	ரூபாயெடை 96	இலவங்கப்பட்டை	, 1
ஏலம்	, 2	மிளகு	, 8
கிராம்பு	, 2	திப்பிலி	, 8
தாளிசபத்திரி	, 2	செவ்வியம்	, 8
சுக்கு	, 2	தேன்	அவுன்ஸ் 5
செருகாகப்பூ	, 2	கெய்	, 1

கஷாயத்துடன் சர்க்கரை சேர்த்துப் பாருசெய்து, சர்க்கரைத் தனித் தனியே சூரணித்து எடை போட்டுக் கொட்டிக் கிண்டி தேன், கெய் சேர்த்து பிசைந்து கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—கொட்டைப்பாக்களவு (கால மாலை)

உபயோகம்:—ருன்மம்-8, காசம்-5, கிராணி-11, அதிசாரம்-6, சுரம்; 64, வார்தி-5, பித்தம்-40, வீக்கல்-5, இருமல், கெஞ்செரிவு, தேக எரிவு, நீர்க்கட்டு, விஷப்பாண்டு, உப்பிசம், மலச்சிக்கல் தீரும்.

பந்தியம்:—இச்சர பந்தியம்.

† பசும்பாலில் அரைத்துக் கொள்ளவும்.

(85) லகு அதிசார மாத்திரை

கருநாவி	ரூபாயெடை 1	அபினி	ரூபாயெடை 1
கஞ்சாவினா	„ 1	சாதிக்காய்	„ 1
அதிவிடயம்	„ 1	மாங்கொட்டைப்பருப்பு	„ 1

ஒன்று சேர்த்துச் சீந்தில் சாற்றால் 6-மணிநேரம் அரைத்து குன்றி மணிப்பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்து கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு மாத்திரை.

உபயோகம்:—அதிசாரம் 6-ம் தீரும்.

(86) லகுசுட்டுவாங்க மாத்திரை

கொடிக்குறிஞ்சா இலைத்தூள்	அபினி	ரூபாயெடை $\frac{1}{8}$
ரூபாயெடை $1\frac{1}{2}$	விளம்பிசின்	„ $6\frac{3}{4}$

ஒன்று சேர்த்து அரைத்து 50-மாத்திரைகளாகப் பங்கிட்டு உருட்டிக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு மாத்திரை.

உபயோகம்:—சீதபேதி, அதிசாரம், இருமல், கக்குவான் தீரும்.

(87) லகுக்கிராணி மாத்திரை

மாதாளம்பிஞ்சி	ரூபாயெடை 8	*கார்தம்	ரூபாயெடை 8
சாதிக்காய்	„ 3	*கல்மதம்	„ 8
சாதிபத்திரி	„ 3	*லிங்கம்	„ 8
கருவப்பிசின்	„ 3		

ஒன்றுசேர்த்து, அத்திப்பாலால் 6-மணிநேரம் அரைத்து குன்றிமணிப் பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்து கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—2, 8-மாத்திரை.

உபயோகம்:—கிராணி 11-ம் தீரும்.

அநுபாஸம்—வெல்லம்.

(88) லகுசங்குவடி

புளியிலை, புளியம்பட்டை, புளியம்பேர் இவைகளை எரித்து தண்ணீரில் கரைத்து எரித்து எடுத்த;

உப்பு	ரூபாயெடை 15	வெடியுப்பு	ரூபாயெடை 1
கல்லுப்பு	„ 3	சங்கு	„ 15
இந்துப்பு	„ 3	இரசபஸ்பம்	„ 3
சவுட்டுப்பு	„ 3	*கந்தகம்	„ 6
வளையலுப்பு	„ 3	*லிங்கம்	„ 15

* சுத்தி செய்யவேண்டும்.

முதலில் சங்கை எலுமிச்சம்பழச்சாறு விட்டு தாளாரும்வரை கொதிக்க வைத்து எடுத்த, எல்லாவற்றையும் ஒன்று சேர்த்து எலுமிச்சம்பழச்சாறு விட்டு 6-மணிநேரம் அரைத்து குன்றிமணியவ்வளவு பெரிய மாத்திரைகள் உருட்டிக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு மாத்திரை.

உபயோகம்:—கிராணி 11; குன்மம் 8; அக்கினிமந்தம்; அஜீரணம்; வாயு; உதரரோகம் தீரும்.

லகுதூதுளைச் குரணம்

மகா தூதுளைச்சூரண மென்றதைப் பார்க்கவும்.

(89) லிங்கக் சுட்டு

நத்தச்சூரியிலையை அரைத்து லிங்கத்திற்கு கவசமிட்டு சீலைமண் செய்து 25-வரட்டியில் புடமிடவும்.

(90) வங்கு பஸ்பம்

மனோசிலையை வெற்றிலைச்சாற்றால் அரைத்துச் சுத்திசெய்த வங்கு தாடுகளுக்கு கவசம் செய்து, பின் சீலைமண் செய்து 50-வரட்டியில் புடமிடவும். இப்படி புதிது புதிதாக கவசம் செய்து 82-புடமிட பஸ்பமாகும்.

பெரியவர்கள் அளவு.—3, 4-கிரைன்ஸ்.

உபயோகம்:—மூர்ச்சை, அபஸ்மரம், கபரோகம், அதிசாரம், கிராணி தீரும்.

அத்பானம்:—செய், வெண்ணெய்.

பத்தியம்:—இச்சாபத்தியம்.

(91) வங்கேகர ரச நஸ்யம்

ரசம்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$	அக்ராகாரம்	ரூபாயெடை $\frac{1}{2}$
மனோசிலை	"	$\frac{1}{2}$ வெண்ணைவி	" $\frac{1}{2}$
கந்தகம்	"	$\frac{1}{2}$ சுருகாவி	" $\frac{1}{2}$
சுக்கு	"	$\frac{1}{2}$ வெங்காரம்	" $\frac{1}{2}$
திப்பிலி	"	$\frac{1}{2}$ மிளகு	" $2\frac{1}{2}$

முதலில் கந்தகத்தையும், ரசத்தையும் ஒன்று சேர்த்துப் பின் கொஞ்சம் மிளகுத்துள் சேர்த்ததாற்று மற்ற சரக்குகளையும்போட்டு அரைக்க நீலகிரி முண்டாகும், அப்போது மீதியுள்ள மிளகுத்துளையும் சேர்த்து 12-மணி நேரம் அரைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—பாசிப்பயறு பிரமாணம் நஸ்யமிட சன்னி தோஷம், மண்டை சிலேப்பணம் தீரும்.

■ சுத்தி செய்யவேண்டும்.

(92) வஜ்ரவல்லி லேகியம்

சிற்றாத்தை	ரூபாயெடை 5	கண்டங்கத்திரி	ரூபாயெடை 24
திப்பிலி	" 5	சர்க்கரை	" 36
தாளிசப்பத்திரி	" 5	பசும்பால்	அவுன்ஸ் 12
அக்ராகாரம்	" 5	தேன்	" 12
		நெய்	" 12

சர்க்கரை இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூணித்துக்கொண்டு, பாலுடன் சர்க்கரையைச் சேர்த்து பாரு செய்து சூரணங்களைக் கொட்டிக் கிண்டி பின் நெய், தேன் சேர்த்து பிசைந்து கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—ஒரு கொட்டைப்பாக்களவு (காலை மாலை).

உபயோகம்:—இருமல், ஈளை, கபரோகங்கள் தீரும்.

(93) வாநராஷ்டிர எண்ணெய்

நல்லெண்ணெய்	அவுன்ஸ் 48	பொடுதலைகொழுந்து	ரூபாயெடை 12
சிற்றாமணக்கெண்ணெய்	48	முடக்கொத்தான்கொழுந்து	" 12
வேப்பெண்ணெய்	" 48	வெள்ளைப்பூண்டு	" 12
பசுநெய்	" 48	கருஞ்சீரகம்	" 3
வாதமடக்கிலைச்சாறு	" 48	திப்பிலி	" 8
பிரமியிலைச்சாறு	" 48	இந்தப்பு	" 8
கழற்சியிலைச்சாறு	" 48	பெருங்காயம்	" 1½
		கழற்சியுப்பு	" 4

சாற்றலரைத்துக் கலந்து, காய்ச்சி வடித்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—3, 4-தேக்கரண்டி. (காலை மாலை)

உபயோகம்:—குடல் ரோகங்கள், அண்டவாதம் தீரும்.

பந்தியம்:—இச்சாபத்தியம்.

(94) வாநராஷ்டிர மாத்திரை

ரசம்	ரூபாயெடை 3	அப்ராம்	ரூபாயெடை ■
கந்தகம்	" 3		

இவற்றைச் சுத்தி செய்து, வெள்ளைச்சாரணை சாற்றால் 12-மணி நேரமும்; கொடிவேர் கஷாயத்தால் 3-மணி நேரமும்; துளசிச்சாற்றால் 3-மணி நேரமும்; கடுக்காய் தானறிக்காய்; நெல்லிவற்றல் இவை சேர்ந்த கஷாயத்தால் 3-மணிக் நேரமும் அரைத்துப் பில்லைதட்டி, வெள்ளைச்சாரணையிலையை அரைத்துக் கனமாய் கவசம் செய்து, கவசம் கருகும்படி புடம்போட்டெடுத்து, கொடிவேலிக் கஷாயத்தால் 12-மணி நேரம் அரைத்து, குன்றி மணிப் பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்துக் கொள்ளவும்.

பேரியவர்கள் அளவு:—ஒரு மாத்திரை (காலை மாலை)

உபயோகம்:—சன்னி 18; வாதம் 80; தோஷம் தீரும்.

அதுபாணம்:—சுடுதண்ணீர், முலைப்பால்.

பத்யம்:—இச்சாபத்தியம்.

(95) வியாக்கிரியாதி ரசாயணம்

கருந்துளசிச்சாறு	அவுன்ஸ் 24	சுக்கு	ரூபாயெடை 1
கண்டங்கத்திரிச்சாறு	„ 12	மிளகு	„ 1
ஆடாதோடைச்சாறு	„ 36	திப்பிலி	„ 1
தேன்	„ 72	கடுக்காய்	„ 1
ஏலம்	ரூபாயெடை 1	தரன் திக்காய்	„ 1
கிராம்பு	„ 1	நெல்லிவற்றல்	„ 1
சாதிக்காய்	„ 1	சிற்றரத்தை	„ 1
சாதிபத்திரி	„ 1	போரத்தை	„ 1
இலவங்கப்பட்டை	„ 1	அதிமதுரம்	„ 1
தாளிசப்பத்திரி	„ 1		

சாக்குகளைத் தனித்தனியே இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூணித்து ஒன்று சேர்த்து நீர்சுண்டும்வரை காய்ச்சிக் கொள்ளவும்.

அளவு:—குழந்தைகளுக்கு $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ -தேக்காண்டி 4-மணி நேரத்திற்கொரு தரம்.

உபயோகம்:—கக்குவான்; கபரோகங்கள் தீரும்.

வில்வாதி லேகியம்

“~~மனா~~ வில்வாதி லேகியம்” “ராஜவில்வாதி லேகியம்” என்றவைகளைப் பார்க்கவும்

(96) விழுதி எண்ணெய்

விழுதிச்சாறு	அவுன்ஸ் 48	வசம்பு	ரூபாயெடை 1
சிற்றமுணக்கெண்ணெய்	„ 48	வெங்காயம்	„ 1
பசுமெய்	„ 48	கோஷ்டம்	„ 1
சுக்கு	ரூபாயெடை 1	இலவங்கம்	„ 1
மிளகு	„ 1	ஏலம்	„ 1
திப்பிலி	„ 1		

சாக்குகளைப் பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்துக் கொள்ளவும்.

பேரியவர்கள் அளவு:—1 $\frac{1}{2}$, 2-அவுன்ஸ் (காலை மாலை 3-நாள்களுக்கு)

உபயோகம்:—கர்ப்பவாயு; சூதவலி; கர்ப்பப்பிழை; கர்ப்பச்சூலை; கர்ப்பவ இசிவு தீரும்.

பத்யம்:—உப்பில்லாத பத்தியம்.

(97) வீரக்கட்டு

ரசமும், நாகமும் வகைக்கு ரூபாயெடை 15-சேர்த்தரைத்து பின் வெங்காரம், கந்தகம் வகைக்கு ரூபாயெடை 15-சேர்த்த முலைப்பால் விட்டரைத்து, வீரத்திற்கு கவசஞ் செய்து காயவைத்து அதன்மேல் கற்சுண்ணாம்பையும், உப்பையும் சமமாக எலுமிச்சம்பழச்சாறுவிட்டு அரைத்து துணியில் தடவி சிலைமண் செய்வதைப்போல் கவசத்தின் மேல் சுற்றி, 25-வாட்டியில் புடமிட வீரம் கட்டுப்படும்.

(98) வீரகுத சிந்தாமணி

மனோசிலை ரூபாயெடை 3 ரசம் ரூபாயெடை 12
இலிங்கம் 6 கந்தகம் 15

இவற்றைச் சுத்திசெய்து கரிசலாங்காணிச்சாறு, முருங்கைப்பூச்சாறு, பிச்சிப்பூச்சாறு, மாதாளம்பூச்சாறு இவைகளால் தனித்தனியே ஒருநாள் அரைத்து, காயவைத்துப் பொடித்து, கனத்த கண்ணாடி சோலில் போட்டு 7-சிலைமண் செய்து; ஒரு சட்டியில் மணல் பாப்பி சேரவை வைத்து சேர மறைய மணல் கொட்டி தீபாக்கினியாய் 6-மணி நேரமும் கமலாக்கினியாய் 6-மணி நேரமும்; காடாக்கினியாய் 6-மணி நேரமும் எரித்து ஆறவைத்து எடுத்துப் பார்க்க செந்திரமா யிருக்கும்.

பெரியவர்கள் ஐயு:—குன்றிமணி யெடை (காலே மாலை)

உபயோகமும், வுதுபானமும்

அஸ்திசுரத்திற்கு:—வெற்றிலைச்சாறு

இருமல், இளைப்புக்கு:—வில்வாதி லேகியம்.

உஷ்ணரோகங்களுக்கு:—தாமரைப்பூச்சாறு

கபாலகுஷ்டத்திற்கு:—குஷ்டத்திற்குண்டானது

காசத்திற்கு:—வில்வாதி லேகியம்

காமாலைக்கு:—வில்வாதி லேகியம்

குன்மத்திற்கு:—வில்வாதி லேகியம், பிரண்டைச் சூரணம்

குஷ்டத்திற்கு:—மெருகன்கிழங்கும் விளாவீர்க்கும் சேர்த்து, குழித்

தயில மிறக்கி அதில் ரசகர்ப்பூரமும், செந்திரமும் சேர்த்து.

சுரத்திற்கு:—தாமரைப்பூச்சாறு, வெற்றிலைச்சாறு.

சொறி சிரங்கிற்கு:—குஷ்டத்திற் குண்டானது

மாந்தத்திற்கு:—வில்வாதி லேகியம்

மூலத்திற்கு:—மருட்கிழங்குத் தூள் (20-நாள்)

மேகத்திற்கு } பறங்கிப்பட்டைச் சூரணம் (20-நாள்)
மேகாணத்திற்கு }

வாடிவுக்கு:—பிரண்டைச் சூரணம்

வீஷக்கடிக்கு:—குஷ்டத்திற் குண்டானது.

பத்தியம்:—புளி, உப்பு, நல்லெண்ணெய், கருவாடு, கடுகு.

(99) வீர மெழுகு

■ கட்டினவீரம் ரூபாயெடை 3 மிளகு ரூபாயெடை ■
சுக்கு ,, 6 திப்பிலி ,, 6

முதலில் வீரத்தை பிரமதண்டிச்சாறு விட்டு 12-மணி நேரம் அரைத்துப் பின் சாக்குத் தூன்களைச் சேர்த்துப் போதிய தேன் விட்டு 3-மணி நேரம் அரைத்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—உளுந்தவ்வுளவு.

உபயோகம்:—சன்னி 13, வாதம் 80, சூரம் 64, சூலை 18, மேகம் 20, குஷ்டம் 18, தீரும்.

அறுபானம்:—பனைவெல்லம்.

பத்தியம்:—புளி, புகையிலை.

(100) வெங்காய எண்ணெய்

வெங்காயம் ரூபாயெடை 3 சோற்றுக்கற்றழைச்சாறு அவுன்ஸ் 24
வெந்தயம் ,, 1½ சிற்றாமணக்கெண்ணெய் ,, 48

முதலில் வெங்காயத்தையும், வெந்தயத்தையும் அரைத்து 8-தடவை தண்ணீர் விட்டுக் கழுவி எடுத்து, பின் ஒன்று சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்துக் கொள்ளவும்.

அளவு:—குழந்தைகளுக்கு 2, 4-தேக்கரண்டி. (சூலையில் மட்டும்)

உபயோகம்:—கண்ணை 18, மூலக்குடு, தேகளரிவு, கைகாலெரிவு தீரும்.

பத்தியம்:—இச்சாபத்தியம்.

(101) வெந்தய எண்ணெய்

சோற்றுக்கற்றழை மடலை இரண்டாகப் பிளந்து அதனுள் 3-ரூபாயெடை வெந்தயத்தை வைத்து மூடி ஊவால் சுற்றி மூன்றுநாள் வைத்திருந்து எடுத்து, அந்த வெந்தயத்தைச் சோற்றுக் கற்றழைச்சாறு விட்டரைத்து 12-அவுன்ஸ் சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் கரைத்துக் காய்ச்சி வடித்து அதில்:—

மிளகு ரூபாயெடை 1½ ஏலம் ரூபாயெடை 1½
கசாசா ,, 1½ கற்கண்டு ,, 1½
சூரணித்துக் கவந்து கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—2-தேக்கரண்டி. குழந்தைகளுக்கு காலே மாலை நாக்கில் தாராளமாய்த் தடவலாம்.

■ வீரக்கட்டென்றதைப் பார்க்கவும்.

உபயோகம்:—கணை-18, தேக எரிவு, கைகாலெரிவு, உஷ்ண ரோகங்கள் திரும்.

பந்தியம்:—இச்சாபத்தியம்.

(102) வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய்

சிறுமணக்கெண்ணெய்	கண்டங்கத்திரிவேர்	ரூபாயெடை	2
அவுன்ஸ் 96	கண்ணூரிவேர்	"	2
கழற்சிவேர்	ரூபாயெடை	2	
வேம்பாடம்பட்டை	வேலிப்பருத்திவேர்	"	2
பெருமாத்துப்பட்டை	கிரந்திராயகம்	"	2
பூதகரப்பான்பட்டை	சுக்கு	"	2
செங்கத்தாரிப்பட்டை	திப்பிலி	"	2
	கடுக்காய்	"	2

இவற்றை எல்லாம் பசும்பால் விட்டரைத்தக் கலக்கி எரித்து வடித்துக்கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—3, 4-தேக்கரண்டி (காலை மாலை)

உபயோகம்:—வாய், நாக்கு, தொண்டை இவைகளிலுண்டாகும் புற்று; வாய் கிரந்தி; வாய் நாற்றம்; நாக்கு வெடிப்பு; உள்ளாக்கு வியாதிகள்; உதடு வெடிப்பு; பல்லீறு வியாதிகள் திரும்.

பந்தியம்:—இச்சாபத்தியம்.

(103) ஜாதிபலாதிச் சூரணம்

சாதிக்காய்	ரூபாயெடை	1	கடுக்காய்	ரூபாயெடை	1
ஏலம்	"	1	நெல்லவற்றல்	"	1
கிராம்பு	"	1	கொடிவேலிவேர்	"	1
இலவங்கப்பட்டை	"	1	வாய்விளக்கம்	"	1
இலவங்கப்பத்திரி	"	1	சிறுதேக்கு	"	1
சுக்கு	"	1	சோம்பு	"	1
திப்பிலி	"	1	எள்	"	1
மிளகு	"	1	சந்தனம்	"	1
தாளிசபத்திரி	"	1	கற்பூரம்	"	1

கற்பூரம் நீங்கலாக மற்ற சாக்குகளை இளவறுப்பாய் வறுத்துத் தனியே தனியே சூரணித்துப் பின் ஒன்று சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

பெரியவர்கள் அளவு:—திரிகடிப் பிரமாணம் (காலை, மதியம், மாலை)

உபயோகம்:—கிராணி-11, காசம்-5, வாதரோகம், கபரோகம் திரும்.

(104) ஸ்ரீ தேவி எண்ணெய்

வேலிப்பருத்திவேர்	சிவ்வைவேர்	ரூபாயெடை	2
ரூபாயெடை	சுதுரக்கள்ளிவேர்	"	24
வெள்ளைச்சாரணவேர்	திருகுக்கள்ளிவேர்	"	24
முடக்கொத்தான்வேர்	கொடிவேலிவேர்	"	12

இவைகளைப் பொடித்து 6-படி தண்ணீரில் போட்டு 3-படியாக சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயம் * அவுன்ஸ் 36.

கடுகு	ருபாயெடை 1½	நிலவேம்பு	ருபாயெடை 1½
செவ்வல்லிக்கொடி	" 1½	செவ்வியம்	" 1½
சுக்கு	" 1½	கடுக்காய்ப்பிஞ்சு	" 1½
மிளகு	" 1½	கடுக்காய்ப்பூ	" 1½
திப்பிலி	" 1½	ஆலை திப்பிலி	" 1½
திப்பிலிமூலம்	" 1½	ஒமம்	" 1½
கடுக்காய்	" 1½	வெள்ளைப்பூண்டு	" 1½
நெல்லிவற்றல்	" 1½	பெருங்காயம்	" 1½
தான்றிக்காய்	" 1½	இந்துப்பு	" 1½
கடுகுரோகினி	" 1½	காய்ச்சுவண்ணம்	" 1½
விழாவரிசி	" 1½	தேங்காய்ப்பால்	அவுன்ஸ் 48
கல்லெண்ணெய்	" 82		

சரக்குகளைத் தேங்காய்ப்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து 12-நாள் செல்லுக்குள் வைத்திருந்து உபயோகிக்கவும்.

பெரியவர்களை அளவு:—2, 3-தேக்கரண்டி. (காலையில் மட்டும்)

உபயோகம்:—சூதகசன்னி, சூதகவாயு, சூதகவலி, சூதகசூலை, சகல சூதகரோகங்களுக்கும்; மூர்ச்சை 3, வித்திரிதி 6, சூன்மம் 8, உன்மத்தம் 6 திரும்.

பத்தியம்:—கடும் ரோகங்களுக்கு உப்பில்லாப் பத்தியம்; சாதாரணமாக இச்சாபத்தியம்;

(105) சாதிவிங்கக் சுத்தி

சாதிவிங்கத்தை 3-நாள் சூப்பைமேனிக் சாற்றில் ஊறப்போட்டிருந்து பின்னலுமிச்சம்பழச்சேறுவிட்டு 3-மணிநேரம் அரைத்து எடுத்துக்கொள்ளவும்.

(106) ரசகற்பூர சுத்தி

ஒரு பாத்திரத்தில் வெற்றிலையையும், மிளகையும் அரைத்துத் தண்ணீர் அகிகமவிட்டுக் கலக்கிக்கொண்டு, ரசகற்பூரத்தை ஒருதுணியில் முடிந்து அந்த முடிச்சு பாத்திரத்தி் னடிபாகத்தில் படாதபடி கயிற்றால் கட்டித் தொத்தவிட்டு 3-மணிநேரம் பெருந்தீயாய் எரித்து எடுத்துக்கொள்ளவும்.

ஸ்திரீ பால சிகிச்சை

சம்பூரணம்.

அளவையும் நிறுவையும் WEIGHTS AND MEASURES

நிறுவைகள்

60 கிரான்ஸ்	= 1 டிராம்
8 டிராம்	= 1 அவுன்ஸ்
16 அவுன்ஸ்	= 1 பவுண்ட்

அளவைகள்

60 மினியம்	= 1 டிராம்
8 டிராம்	= 1 அவுன்ஸ்
20 அவுன்ஸ்	= 1 பவுண்ட்

பொது நிறுவைகள்

1 கெல் (முன்பின்)	1 கிரான்	40 குன்றிமணி	= 1 களஞ்சி
180 கிரான்ஸ்	= 1 தோலா	1½ விராகனிடை	= 1 ,,
1 தோலா	= 1 ரூபாளடை	2½ ,,	= 1 சவரன்
40 தோலா	= 1 பவுண்ட்	1½ களஞ்சி	= 1 ,,
8 பவுண்ட்	= 1 வீசை	6 ,,	= 1 வைத்திய [பலம்]
1 பவுண்ட்	= 1 ராத்தல்		
8 டிராம்	= 1 தோலா	3 ரூபாயெடை	= 1 ,,
1/5 முன்பின்) காலே		3¼ விராகனிடை	= 1 தோலா
வீசரூபாயெடை	= 1 டிராம்	12 களஞ்சி	= 1 பலம்
86 கிரான்ஸ்	= 1 விரானிடை		(வியாபாரம்)
32 குன்றிமணி	= 1 ,,	6 ரூபாயெடை	= 1 ,, பலம்
2 களஞ்சி	= 1 ரூபாளடை	1 ரூபாய்	= 180 கிரான்ஸ்
2½ தோலா	= 1 அவுன்ஸ்	½ ,,	= 90 ,,
1 டிராம்	= 1 விராகனிடை	¼ ,,	= 45 ,,
1½ அவுன்ஸ்	= 1 பலம்	⅛ ,,	= 22½ ,,
5 பலம்	= 1 சேர்	1 தாம்பிர	
5 சேர்	= 1 வீசை	½-அணு	= 100 ,,
24 தோலா	= 1 சேர் [எடை]	1 சதா நிக்கல்	
4 கெல்விடை	= 1 குன்றிமணி	2-அணு	= 90 ,,
4 குன்றிமணி	= 1 பணவிடை	1 நிக்கல் 1-அணு	= 60 ,,
12 பணவிடை	= 1 களஞ்சி	1 கொழும்புசதம்	= 48 ,,
8 ,,	= 1 விராகனி	1 தாம்பிரபைசா	= 24 ,,
		1 தங்கப்பவன் (சவரன்)	= 123 ,,

பொது அளவைகள்

1½ துளி (முன்பின்)	= 1 மினியம்	15, 20 அவுன்ஸ்	= 1 டிரமிளர்
60 மினியம்	= 1 தேக்கரண்டி	20 ,,	= 1 கொத்து
90 துளி	= 1 ,,		
1 தேக்கரண்டி	= 1 டிராம்	6 ,,	= 1 உழக்கு
4 தேக்கரண்டி	= 1 மேஜைகரண்	12 ,,	= ¼ படி
2 ,,	= 1 டிசர்ட்ஸ்பூன்	24 ,,	= ½ படி
8 ,,	= 1 அவுன்ஸ்	48 ,,	= 1 படி
2 அவுன்ஸ்	= 1 ஒயின்கிளாஸ்	96 ,,	= ½ குதுனி
7 அவுன்ஸ்	= 1 தேக்கோப்பை	192 ,,	= 2 நாழி

மருந்து பிரயோக அளவுகள் DOSES OF ADMINISTRATION

தமிழ் மருந்துகள்

(இந்த அளவை விசிறம் 6-ம் பாகத்திலுள்ள மருந்துகளுக்கு மட்டும்.)

பெரியவர்களுக்கு கொடுக்கும் அளவு	1	பாகமானால்
பிறந்தது முதல் 3-மாதம் வரை	1/16	பதிலுறில் ஒருபங்கு
4 மாதம் ,, 1 வருஷம் வரை	1/12	பன்னிரண்டில் ஒருபங்கு
1 வருஷ ,, 2 ,, ,,	1/8	அரைக்கால் பங்கு
2 ,, ,, 3 ,, ,,	1/6	ஆறில் ஒருபங்கு
3 ,, ,, 4 ,, ,,	1/4	கால்பங்கு
4 ,, ,, 7 ,, ,,	1/3	மூன்றில் ஒருபங்கு
7 ,, ,, 14 ,, ,,	1/2	அரைபங்கு
14 ,, ,, 20 ,, ,,	2/3	மூன்றிலிரண்டுபங்கு
21 ,, ,, 60 ,, ,,	1	முழுப்பங்கு

இங்கிலீஷ் கலவை மருந்து MIXTURES

1 முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு	1	தேக்கரண்டியானால்
1/2 ,, 1 ,, ,,	1/2	தேக்கரண்டி
3 ,, 6 ,, ,,	1 1/2	,,
6 ,, 9 ,, ,,	2	,,
9 ,, 12 ,, நிறுவர்களுக்கு	4	,,
12 ,, 15 ,, ,,	4	,,
15 ,, 18 ,, ,,	6	,,
18 ,, 21 ,, பாலயர்களுக்கு	8	,,

குறிப்பு:—ஆன் மருந்துகளுக்கும் இதே பிரகாரம் 1-முதல் 3-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 1 பாகம் கொல்லியிருந்தால் 3-முதல் 6-வயதுக் குழந்தைகளுக்கு 2-பாகமாக; இந்தவிதமே அதிகப்படுத்திக் கொள்ளவும்.

விஷய சூசிகை



விஷயம்	பக்கம்	விஷயம்	பக்கம்
அ		அம்மையில் அதிசாரம் காண்டல்	160
அ கஸ்தியர் குழம்பு	409	அம்மையில் இரத்தம் கக்குதல்	161
அக்கி	235	அம்மையில் கண்சிவந்து புண்பட்	
அசதி சுரம்	104	டிருத்தல்	162
அசுவகெந்திச் சூரணம்	410	அம்மையில் காச்சலிருந்தால்	"
அச்சரப் பொதுமருந்துகள்	267	அம்மையில் சந்தி உண்டாகுதல்	163
அச்சரமாந்த சுரம்	104	அம்மையில் சீதபேதி காணுதல்	164
அச்சர மாந்தம்	58	அம்மையில் சுரமதிகயிருத்தல்	165
அச்சரம்-வாய்க்கிராந்தி	265	அம்மையில் தாகம் காணுதல்	"
அடிக்கடி பரல் எடுத்தல்	275	அம்மையில் தொண்டைகம்முதல்	"
அடித்தள்ளுதல்	194	அம்மையில் கீர்த்தாரையில் இரத்தம்	
அடிபட்டதினால் இசிவு	83	கசிந்தால்	165
அடைமாந்தம்	58	அம்மையில் மலசலம்கட்டி வயிறு	
அண்டச்சுண்ணம்	410	பொருமுதல்	166
அண்டத்தயிலம்	411	அம்மையில் மூட்டுப்பிடிப்பேற்	
அண்டவீக்கம்	275	படுதல்	166
அதிகமான நாவரட்சி இருந்தால்	142	அம்மையில் வயிறுபொருமி மல	
அதிசாரமாத்திரை	411	சலம் கட்டுதல்	167
அதிசாரவயிற்றுப்பொருமல்	215	அம்மை ரோகத்திலேற்படும்	
அதிசாரம்	210	கோளாறுகள்	157
அதிஸ்னாலரோகம்	345	அம்மைரோகத்தால் கண்ணில் பூ	
அந்தகக் கணை	171	விழுதல்	167
அந்திபகிதோஷம்	92	அம்மை வராதிருக்க	"
அபானவெடிப்பு	278	அயக்காந்த செந்துரம்	412
அபினியாச்சந்திசுரம்	105	அயச்செந்துரம்	418
அப்ரகக்கோரோசனை மாத்திரை	411	அயமெழுரு	
அப்ரகச் செந்துரம்	412	அரண்கட்டுதல்	279
அப்ரக பஸ்பம்	"	அரைக்காப்பான்	235, 345
அமரம்	278	அர்த்தராத்திரி சுரம்	108
அம்மை-வைகுரி	153	அழிகர்ப்பதோஷம்	92
அம்மை அதிகப்பட்டாதிருக்க	158	அழுக்கச்சிரங்கு	236
அம்மை இறங்கியபின்	157	அழுக்கை	279
அம்மை உள்ளே இறங்காதிருக்க	158	அழுக்கு	25
அம்மைக்கட்டு	278	அள்ளுமாந்தம்	59
அம்மைக்காச்சலில்வரும் இசிவு	81	அறைவீட்டில் குழந்தைகளுக்கு	
அம்மைச் சுரம்	108	கழுத்துவீங்கி யழுதல்	281
அம்மைப் புண்ணுகள்	159	அற்பசுரம்	108
அம்மைப் பூரிக்க	160	அன்னபாதுகசுரம்	110
அம்மையாலுண்டாகும் கதகதப்பு	"	அஜீரணசுரம்	111
		அஜீரணத்தாலுண்டாகும் இசிவு	82

விஷயம்	பக்கம்	விஷயம்	பக்கம்
அஜீரணவயிற்றுப் பொருமல்	215		
அஜீரண மயிற்றோட்டம்	"	உட்சாரம்	117
அஷ்டகுலை	346	உண்ணாக்கு வளர்தல்	290
அஷ்டமூலநாச லேகியம்	418	உதிரக்காப்பான்	236
அஸ்திசுரம்	112	உப்புதரியம்மை	154
அஸ்திசுரனரோகத்தால் வரும்		உயியம்மை	"
இசிவு	83	உரம் வீழுதல்	290
அஸ்திஸ்ராவம்	347	உலகோத்தமச் செந்நாரம்	414
இ		உலோமார்தம்	60
ஆகாரவெறுப்பு	281	உள் அச்சாரம்	265
ஆசனவெறுப்பு	283	உள்நாக்கு வளர்தல்	291
ஆமக்கணை	171	உஷ்ணக் கழிச்சல்	220
ஆமக்கழிச்சல்	216	ஊ	
ஆமசுன்னி	53	ஊதுகரப்பான்	237
ஆமசுரம்	113	ஊதுகரமாலே	270
ஆமசிசுராசுரம்	114	ஊதுமார்த்தக்கணை	173
ஆரூத அம்மைப்புண்	168	ஊதுமார்தம்	61
ஆண் பெண் சிசுக்குறிகள்	10	ஊமைச்சிரங்கு	238
இ		எ	
இடுப்புபுலி	12	எண்ணைத்தொங்கல்	291
இரட்சசெந்நாரம்	414	எச்சிக்கணை	174
இரத்தக்கணை	172	எச்சிதோஷம்	98
இரத்தக்கழிச்சல்	216	எச்சிற்றழும்பு	289
இரத்தக்குறைவு	288	எளிக்கணை	176
இரத்தசுரம்	115	எளிகாப்பான்	289
இரத்தகுலை	347	எலிக்கடி	292
இரத்தப்பெருக்கு	349	எவ்விதச் சுரத்திலும் குடுதணிய	146
இரத்தவாதகுண்மம்	350	ஏ	
இரட்சுரம்	115	ஏகாதசச் செந்நாரம்	415
இராஜகேசரிச்சூரணம்	414	ஐ	
இருதயபலயினத்தா லுண்டாகும்		ஐமத்திரீர்	415
இசிவு	83	ஐயாதசனி	292
இருமல்	283	ஐயாதவார்தியும் வயிற்றோட்டம்	294
இரைப்பூச்சி	284	க	
இழுப்பு	80	கக்கிருமல்	294
இளநீர்க்கட்டுக்கணை	173	கக்குவான்	"
இன்புளுவென்ஸா	115	கடுகம்மை	154
ஈ		கடுப்போடுநீரிற்ங்கல்	297
ஈயப்பினாஸ்திரி	414	கடுமையான சளிசுரம்	118
ஈரல்பெருக்கம்	287	கட்டு	300
ஈர்ப்புண்	"		
ஈனே இருமல்	"		

விஷயம்	பக்கம்	விஷயம்	பக்கம்
கட்டுமார்த்தம்	64	கபாலியச்சரம்	266
கட்டி	298	கம்பளிப்பூச்சி	303
கணத்தெண்ணை	416	கரப்பான்-செவ்வாப்பு	233
கணை-கணம்	169	கரப்பான் எண்ணெய்	417
கணை ஆசனக்கடுப்பு	194	கரப்பான் பொது உட்பிரயோக	
கணை இரத்தபேதி	195	மருந்துகள்	259
கணை இருமல்	197	கரப்பான் பொது மேல்பூச்சு	
கணைக் கழிச்சல்	220	மருந்துகள்	261
கணைச்சுரம்	118	கரப்பான் பொது கழுவுநீர்	„
கணை சித்பேதி	198	கரப்பான் புண்ணிலுள்ள அதிகமான	
கணைச்சூடு	„	அசடை நீக்க	264
கணைநெய்	416	கரிசலாங்காணிச் சூரணம்	417
கணைமார்த்தம்	61	கரிசாலை எண்ணெய்	418
கணைமூலம்	199	கரு அழிவு	352
கணையில் இழுப்பு	202	கருக்கரப்பான்	242
கணையில் தொண்டைக்கம்மி சளி		கருக்கிரந்தி	51
அதிகரித்தல்	203	கருடக்கண் புகழிதோஷம்	93
கணையினால் ஆசன வெளித்		கருக்குழிவலி	355
தள்ளுதல்	204	கருப்பை அகப்புறமாறுதல்	26
கணையினால் இரத்தம்விழுதல்	„	கருப்பை இறக்கம்	356
கணையினால் நீர்ச்சுருக்கு	„	கருப்பையில் சிசு மரித்திருக்கும்	
கணையினால் பலவிதக்கழிச்சல்	„	குறிகள்	19
கணையினால் முக்கல், வயிற்றுக்		கரும்பனிச்சையம்மை	154
கடுப்பு	205	கருவழிவேறப்பட்டதா லுண்டாகும்	
கணையினால் வெள்ளைப்படுதல்	206	வாதம்	354
கணைரோகத்திலுண்டாகும்வலிப்பு	83	கருவிப்புருதி	357
கணைரோகத்தில் இருந்தாப்போ		கர்ப்பச்சண்ணி	358
லிருந்து தொண்டை கட்டி		கர்ப்பம்	6
விடுதல்	201	கர்ப்பவதிகள் ஆரைவலி	367
கணைரோகத்திற்குப் பொது		கர்ப்பவதிகள் ஆகாரவெறுப்பு	„
மருந்துகள்	190	கர்ப்பவதிகள் இடுப்புவலி	„
கணைரோகத்தினால் ஏற்படும்		கர்ப்பவதின இரத்தபேதி	„
வியாதிகள்	193	கர்ப்பவதிகள் இரத்தவாந்தி	368
கணைவயிற்றுப் பொருமல்	207	கர்ப்பவதிகள் இருமல்	„
கணைவாய்நாற்றம்	208	கர்ப்பவதிகள் இழுப்பு	369
கண் கட்டி	300	கர்ப்பவதிகள் எச்சல்பெருக்கு	„
கண் கழுவுநீர்	302, 315	கர்ப்பவதிகள் கல்லடைப்பு	370
கண்ணிமைவீக்கம்	301	கர்ப்பவதிகள் காலேவாந்தி	„
கண்ணில் அம்மைவராதிருக்க	168	கர்ப்பவதிகள் கால்வீக்கம்	371
கண்ணோய்	301	கர்ப்பவதிகள் சூரணடல்வாதம்	372
கபசுரம்	119	கர்ப்பவதிகள் சூலை எரிவு	„
கபவாதசுரம்	„	கர்ப்பவதிகள் கைகாலெரிவு	„
கபாங்குசு லேகியம்	417	கர்ப்பவதிகள் சந்துவலி	373
கபாலக்கரப்பான்	240	கர்ப்பவதிகள் சுரம்	„

விஷயம்	பக்கம்	விஷயம்	பக்கம்
கர்ப்பவதிகள் ரூதக ஒழுக்கு	374	கன்னக்கட்டு	304
கர்ப்பவதிகள் ரூதக ஒழுக்கில்		கஷ்டப்பிரசவம்	17
உண்டாகும் தாகம்	375	கஸ்தூரிமாதிரை	419
கர்ப்பவதிகள் தடிமன்	"	கா	
கர்ப்பவதிகள் தலைவலி	"	காக்கைவலிப்பு	84
கர்ப்பவதிகள் துவாலை	376	காச்சல்-கரம்	103
கர்ப்பவதிகள் க்கமின்மை	"	காச்சல்கட்டி	304
கர்ப்பவதிகள் நீரடைப்பு	"	காணபகிதோவம்	93
கர்ப்பவதிகள் நீர்கடுப்பு	378	காநில் ஈ புகுதல்	304
கர்ப்பவதிகள் நீர்கட்டு	"	காநில் சீழ்வடிதல்	"
கர்ப்பவதிகள் நெஞ்சுத்துடிப்பு	"	காதுக்குத்து	305
கர்ப்பவதிகள் நெஞ்செரிவு	379	காதுவலி	"
கர்ப்பவதிகள் பசிமந்தம்	380	காமாலை	269
கர்ப்பவதிகள் பயித்தியம்	"	காமாலைப் பொது மருந்துகள்	271
கர்ப்பவதிகள் பல்வலி	382	கால்கடுவன்	242
கர்ப்பவதிகள் பீதி	"	கால்கரப்பான்	243
கர்ப்பவதிகள் மஞ்சட்காமாலை	383		
கர்ப்பவதிகள் மர்மஸ்தான எரிவு	"	கி	
கர்ப்பவதிகள் மலச்சிக்கல்	384	கிரந்தி	51
கர்ப்பவதிகள் முகவலி	385	கிரந்தியெண்ணெய்	419
கர்ப்பவதிகள் முதுகுவலி	"	கிரமாதிதச்சூதகம்	359
கர்ப்பவதிகள் முலை எரிவு	386	கிரமாதிதப்பிரசவம்	18
கர்ப்பவதிகள் முறைக்காச்சல்	"	கிருமி	306
கர்ப்பவதிகள் மூத்திரக்கடுப்பு	387	கிருமிகளால் ஏற்படும் வலிப்புகள்	86
கர்ப்பவதிகள் மூத்திரக்கட்டு	"		
கர்ப்பவதிகள் மூர்ச்சை	"	கிரைப்பூச்சி	306
கர்ப்பவதிகள் மூலம்	388	கிரைப்பூச்சி அதிகரிப்பினால்	
கர்ப்பவதிகள் மேல்மூச்சு	389	ஆசனவாய் புண்ணும் நமச்ச	
கர்ப்பவதிகள் வயிற்றிறைச்சல்	"	லும் மேற்பட்டால்	307
கர்ப்பவதிகள் வயிற்றுப்பொருமல்	"	கிரைப்பூச்சி அதிகரிப்பினால் இரத்	
கர்ப்பவதிகள் வயிற்றுவலி	"	தக் குறைவேற்பட்டிருந்தால்	307
கர்ப்பவதிகள் வயிற்றோட்டம்	390	கு	
கர்ப்பவதிகள் ஜலதோவம்	391	குக்கல்நோய்	308
கர்ப்பவதிகள் ஸ்தனமெரிவு	"	குடல்வரதரோகம்	"
கலின்கா கியப்பு	418	குடல்விப்புருகி	"
கல்நார்பஸ்பம்	"	குடல்விருத்திரோகம்	309
கல்லுதரியம்மை	155	குடந்தினை	"
கழிச்சலுமிருமலும்	221	குடற்படுவன்	"
கழிச்சலும் வாரந்தியும்	"	குடற்புற்று	"
கழிச்சல்	222	குண்டியச்சாம்	266
கழிச்சல் மாதிரை	419	குதிரைவலிப்பு	309
கழிமார்தம்	65	குத்திருமல்	309
கழுவுதலும், குளிப்பாட்டலும்	35	குமரக்கண்டன்வலிப்பு	86
கழுவுநீர்	248		

விஷயம்	பக்கம்	விஷயம்	பக்கம்
கும்பட்டிக்காய் குழம்பு	420	சி	
கும்பரிசுஞ்சிவத் தயிலம்	"	சிகிச்சைகள்	20
கும்பரியச்சரம்	266	சிக்கிபஸ்பம்	422
கும்பயத்தில் காணும் தினவு	359	சிக்கிமாந்தக்கணை	176
குழந்தைகள் பால் குடிக்கா		செக்கண்ணேய்	312
விட்டால்	310	செச்சம் ரக்ஷணை முறைகள்	29
குழந்தைக்கட்டி	"	செவைப்பற்றி சிலகுறிப்புகள்	85
குளவிக் கொட்டு	"	சித்திவிபரம் சன்னிசரம்	128
குளிர்சிரங்கு	"	சிந்தாதிலேகியம்	422
குளிர்சரம்	119	சிலந்தி	312
குளிர்தோஷம்	94	சிலேத்பனக்கணை	177
கூ		சிலேதம் மாந்தம்	65
கூகைக்கட்டு	311	சிறுசிரங்கு	245
கூகைவீக்கம்	"	சிறுநீர்க்கட்டு	312
கூ		சி	
கெந்தாளிதோஷம்	94	செதக்கணை	178
கோ		செதச்சரம்	128
கொதிப்புக்கணை	176	செத்பேதி	223
கொவ்வைக்காய், கோரோசனை		செழ்ண்ணேய்	312
மாத்திரை	421	கூ	
கொள்ளம்மை	155	சுகபேதி	312
கொள்ளிக்கரப்பான்	243	சுகபேதி மருந்துகள்	313
கோ		சுரக்கட்டி	314
கோடைக்கட்டி	317	சுரக்கழிச்சல்	228
கோணித்தட்டம்மை	155	சுரங்களுக்குப் பொதுமருந்துகள்	148
கோரமாந்தச்சன்னி	54	சுரத்திலுண்டாகும் இருமலை	
கோராமசன்னி	"	நிறுத்த	149
கோரோசனை மாத்திரை	421	சுரத்திலுண்டாகும் காவரட்டியும்	
கூ		தாகத்தையும் தணிக்க	150
சந்திரகாசத்தை யிலம்	421	சுரத்திலுண்டாகும் வயிற்றுப்	
சந்திரபாதசரம்	122	பொருமலை கீக்க	151
சர்வேசுர சசன்ஸ்யம்	422	சுரத்திலுண்டாகும் ஜலதோஷத்	
சலக்கழிச்சல்	222	தையும் இருமலையும் நிறுத்த	152
சலமரந்தம்	65	சுரபூபதிமாத்திரை	423
சளி	311, 312	சுரமாந்தம்	67
சன்னைக்கடுப்புச்சரம்	125	சுரமதணிந்தபின் கதகதப்பையும்,	
சன்னிகள்	53	களைப்பையும், ஆகாரவெறுப்	
சன்னிபாதசுரத்திலுண்டாகும்		பையும் மாற்ற	15
கழிச்சல்	223	சுவர்ணகோரோசனை மாத்திரை	423
சன்னிக்குப் பொதுமருந்துகள்	56	சுவர்ண வெள்ளிபஸ்பம்	42
சா		சுவர்ணமடங்கிபிதக்கும் குழந்தைகள்	31
சாதிவிகச்சுத்தி	450	சுழிக்கணை	178
சாமச்சரம்	127	சுழிமாந்தம்	68
சாம்பல் மண்தின்றால்	312		

விஷயம்	பக்கம்	விஷயம்	பக்கம்
		திரிலோகரக்ஷாமணி மாத்திரை	426
குடுகுத்துதல்	315	திரிவித்ரம் ரசச் சொந்தரம்	"
குதகக்கட்டி	359	திற்றந்தவெளி வியாயமம்	39
குதகக்குறைவு	360		
குதகச்சன்னி	361	தீப்பட்டபுண்	316
குதகப்பாண்டு	362	து	
குதகம்		துரிசுபலம்	427
குலைக்கணை	180	துலைமார்தம்	70
குலைக்கரப்பான்	246	து	
குலையச்சரம்	267	து	
செ		துக்கத்தில் பயந்தெழுதல்	317
செங்கண்பகிதோஷம்	95	துக்கத்தில் மூத்திரம்பெய்தல்	318
செங்கரப்பான்	247	துக்கமின்மை	319
செங்கிரந்தி	52	துக்கம்	38
செந்தி	247	துங்குபகிதோஷம்	95
செரியாமர்தம்	69	தெ	
செவ்வரப்புக்கட்டி	316	தெற்கத்திக்கணை	180
சொ		தெ	
சொறிகரப்பான்	247	தேமல்	249
சொறிரிங்கு	"	தேரைதோஷம்	96
சொ		தேனீக்கடி	319
சோதியச்சரம்	267	தொ	
செள		தொங்கல்	319
சௌந்தரியக்கிருதம்	424	தொண்டைப்புலகச்சல்	320
த		தொண்டைப்புண்	"
தக்காளிக்கோரோசனை மாத்திரை	425	தொண்டைப்புற்று	321
தடிமன்	316	தொ	
தருணச்சரம்	128	தோஷக்கழிச்சல்	224
தலைமார்தம்	70	தோஷத்தினாலுண்டாகும்வலிப்பு	88
தவனாயம்மை	155	தோஷத்தில் நாவரட்சியா	
தனிச்சரம்	128	யிருந்தால்	102
தா		தோஷத்தில் வயிற்றோட்டத்தை	
தாடைச்சிரங்கு	248	கிறுத்த	103
தாந்திரிகசன்னி	55	தோஷப் பொதுமருந்துகள்	100
தாமதப்பிரசவம்	16	தோஷம்-சீர்த்தட்டு	91
தாய்பாலற்ற குழந்தைகள்	12	ந	
தானப்பூச்சி	316	நகைக்குவீங்கி	321
தி		நஞ்சுப்பிடித்தம்	21
திப்பிலிரசாயனம்	425	நமட்டுச்சிரங்கு	249
திரளாத பெண்	363	நகைத்திர மாணிக்கக் கிருதம்	427
திரிபுவனச் சொந்தரம்	425	நா	
திரிலோகச் சொந்தரம்	426	நாக்குப்பூச்சி	322
		நாய்க்கடி	"

விஷயம்	பக்கம்	விஷயம்	பக்கம்
நாய்க்கணை	181	பங்முளைக்கும்போதுண்டாகும்	
நாய்முள்	250	கோளாறுகள்	326
நாய்முள் தோஷம்	97	பல்முளைக்கும்போதுண்டாகும்	
நாராயண மன்றோச்செந்நூரம்	427	சகலவலிகளுக்கும்	327
நான்பட்டக் கழிச்சல்	225	பல்முளைக்கும்போதுண்டாகும்சளி,,	
நீ		பல்லாணை, பல்லீறில் இரத்தம்	
நிதம்பச்சுலை	364	வடிதல்	328
நித்திரையில் மூத்திரம் பெய்தல்	322	பல்வலி	"
நிமோனியாச்சூரம்	128	பவள பஸ்பம்	428
நீ		பழஞ்சூரம்	130
நீரடக்கமுடியாதுபோதல்	322	பறவைதோஷம்	33
நீரடைப்பு	"	பறசொத்தை	328
நீராமக்கணை	181	பற்பல பாலர்ரோகங்கள்	275
நீர்கடுப்பு	322	பற்புழு	329
நீர்கலங்கலாயிறங்குதல்	"	பனைமுகரியம்மை	155
நீர்க்கணை	182	பணிதோஷம்	98
நீர்க்கணைமாந்தம்	71	பா	
நீர்க்கழிச்சல்	225	பாசிப்பயற்றம்மை	156
நீர்க்குழுவானம்மை	155	பாண்டு	329, 365
நீர்ப்பணிதோஷம்	97	பாலசூரப்பான்	250
நீர்மரந்தக்கணை	182	பாலசஞ்சீவி மாத்திரை	428
நீர்மாந்தம்	71	பாலசூரகுடோரி மாத்திரை	429
நீலியச்சூரம்	267	பாலசூரவிஷஹர மாத்திரை	"
நெ		பாலசூரஹர மாத்திரை	"
நெஞ்சில் கபம்கட்டி திட்டுமுட்		பாலம்மை	156
டடித்தல்	324	பாலர்ரோகங்களும் பரிகாரங்	
நெஞ்சுத்தடிமண்	"	களும்	49
நெய்கொட்டான் பழத்தெண்		பாலவிநோதசஞ்சீவி மாத்திரை	430
ணைய்	431	பாலாதிசாரக் கஷாயம்	"
நெருப்புச்சுட்டபுண்	325	பாலெடுத்தல்	331
நெல்வால்பூச்சி	326	பால்காம்பு ரணம்	391
ப		பால்காம்பு வீக்கம்	392
பச்சிலைச்சாறுபோல் கழிதல்	225	பால்காம்பு வெடிப்பு	393
படர்தாமரை	250	பால்சூரிகளைப்பற்றிசிலவார்த்தை	41
பயத்தினாலுண்டாகும் வலிப்பு	88	பால்குடியாமை	331
பயிரவவடி மாத்திரை	428	பால்சூரக்கச்செய்தல்	27
பலவிதமாய்க் கழிதல்	226	பால்சூரம்	393
பல்முளைக்கும்போதுண்டாகும்		பால்போற்கழிதல்	227
இழுப்பு	88	பால்மறக்கச்செய்தபின் குழந்தை	
பல்முளைக்கும்போதுண்டாகும்		களின் ஆகாரம்	45
கழிச்சல்	236	பால்மறக்கச்செய்தல்	44
பல்முளைக்கும்போதுண்டாகும்		பால்மரந்தம்	72
சூரம்	128	பால்வற்றச்செய்தல்	28
		பாவன ஓமம்	430

விஷயம்	பக்கம்	விஷயம்	பக்கம்
பி		பிரசவித்தபின் மூன்றாமாதத்தில்	
பிண்டோற்பத்தி	7	உண்டாகும் வயிற்றுப்புண்	405
பித்தக்கோளாறுகள்	331	பிரசவித்தபின் வரும் சவாச	
பித்தக்களை	182	காசம்	406
பித்தச்சரம்	132	பிரசவித்தஸ்திரீகளின் பராமரிப்பு	19
பித்தமாந்தம்	73	பிறந்த குழந்தை	29
பிரசவ இழுப்பு	394	பிரமேகக் கசிவு	347
பிரசவகாலங்களில் கவனிக்க		பிரளிக்களை	183
வேண்டியவைகள்	13	பிராஞ்சோநிமோனியா	184
பிரசவகாலங்கள்	11	பிறக்களை	183
பிரசவசமயங்கள்	12	பு	
பிரசவசன்னி	395	புடைக்கரப்பான்	252
பிரசவத்தில் இழுப்பு	396	புட்டாளம்மை	332
பிரசவத்தில் நடுக்கம்	„	புருஷதோஷம்	98
பிரசவத்திற்குப்பின் அடிவயிற்று		புலால்மேகம்	382
வலி	397	புளிமார்தம்	73
பிரசவத்திற்குப்பின் அற்பக்காச்சல்,		புளியாணைக்கிருதம்	431
பிரசவத்திற்குப்பின் ஆபத்தான		பூ	
மயக்கம்	898	பூதக்கரப்பான்	252
பிரசவத்திற்குப்பின் இரத்தப்		பூதசரம்	184
பெருக்கு	„	பூரான்கடி	332
பிரசவத்திற்குப்பின் ஒற்றைத்		பூவரசம்பட்டை எண்ணெய்	431
தலைவலி	399	பே	
பிரசவத்திற்குப்பின் காணும்,		பெருஞ்சிரங்கு	252
வியர்கூறு சரம்	400	பெரும்பாடு பாட்டில் காணும்	
பிரசவத்திற்குப்பின் கால்வீக்கம்	401	தாகம்	366
பிரசவத்திற்குப்பின்கைகாலெரிவு		பே	
பிரசவத்திற்குப்பின் சேதசரம்	397	பேதியக்கரமார்தம்	73
பிரசவத்திற்குப்பின் நாவாட்சி	402	பேதியுண்டாக்க	332
பிரசவத்திற்குப்பின் பயித்தியம்	„	பேதியை நிறுத்த	333
பிரசவத்திற்குப்பின் பிராண		பேய்சொறி	255
மோசமான மயக்கம்	„	பேய்மார்தம்	73
பிரசவத்திற்குப்பின் வயிர்பழுத்தல்,		பேராமக்களை	184
பிரசவத்திற்குப்பின் வயிற்றுப்		பேன்	333
பொருமல்	„	பொ	
பிரசவம்	15	பொய் கர்ப்பம் மெய் கர்ப்பம்	7
பிரசவ வகைகள்	11	பொரிக்கரப்பான்	257
பிரசவிக் கஷ்டப்பட்டால்	403	பொருமற்கழிச்சல்	227
பிரசவித்தவுடன் செய்ய		பொன்னி பொன்னுக்கு வீக்கி	334
வேண்டியவைகள்	18	போ	
பிரசவித்தபின் காணும் நீரடைப்பு	403	போர்மார்தம்	73
பிரசவித்தபின் காணும் மலகிக்கல்	404	ம	
பிரசவித்தபின் காணும் வயிற்		மகாக்களை	184
ரோட்டம்	„	மகா கூழ்பாண்ட கிருதம்	432

விஷயம்	பக்கம்	விஷயம்	பக்கம்
மகா கூழ்பாண்ட லேகியம்	432	முட்டைத் தயிலம்	438
மகா தாளிசுப்பத்திரிச் சூரணம்	433	முதல்நான் முலையில் பால்	32
மகா தூதுளக்கிருதம்	„	முயல் வலிப்பு	90
மகா தூதுளச்சூரணம்	434	முறைச்சுரம்	139
மகா ரஜதபஸ்பம்	„	மு	
மகா ரஸபஸ்பம்	435	முக்கிலிருந்து இரத்தம்வடிதல்	337
மகா வல்லாரைக்கிருதம்	„	முக்கிலிருந்து நாரற்றமான நீர்	
மகா வில்வாதி லேகியம்	436	வடிதல்	338
மச்சைமேகம்	334	முக்கில் சதைவளர்தல்	„
மஞ்சட் காமாலை	270	முத்திரம் கலங்கலாய் யிறங்கு	
மண்டைக்கடுவன்	257	தல்	339
மண்டைக்கரப்பான்	„	முத்திரம் முக்கிப்பெய்தல்	„
மந்தாரக்கணை	185	முலக்கணை	186
மலச்சிக்கலின் விவரிப்பிசும்	334	மே	
மலச்சிக்கலும் விவரிப்பிசும்	335	மேகத்தெண்ணெய்	438
மலச்சிக்கல்	336	மோ	
மலடிகள் மாந்தம்	75	மொழுக்கம்மை	156
மலத்தை யடக்க சக்தியற்று		யா	
போதல்	336	யானைச்சிரங்கு	257
மறுமுள்	169		
மா			
மாங்கிஷச் சுரம்	134	ரச கற்பூரசத்தி	450
மாதுளம்பழச்சர்பத்	437	ரச செத்தாரம்	438
மாந்தக்கணைச்சுரம்	135	ரசமாதிரை	„
மாந்தக்கழிச்சல்	228	ரசலிங்கமெழுது	489
மாந்தசன்னி	55	ரா	
மாந்தச்சுரம்	137	ராஜ அபரக பஸ்பம்	„
மாந்தத்தில் மலம்கட்டியிருந்தால்	77	ராஜ அம்ஸபோடலி மாத்திரை	„
மாந்தத்தில் வாய்ப்புண் உண்டா		ராஜ ஏலாதிச்சூரணம்	„
யிருந்தால்	80	ராஜசிந்தாதி லேகியம்	440
மாந்தப் பொதுமருந்துகள்	77	ராஜமார்தாண்ட லேகியம்	„
மாந்தமாத்திரை	437	ராஜவில்வாதி லேகியம்	442
மாந்தம்	57	ராஜாங்கக் கொம்பரக்குத்	
மாந்தவலிப்பு	89	தைலம்	440
மாரசளி	337	ராஜாயிர்த சஞ்சிவிலேகியம்	441
மி		ல	
மிர்தார்சிக்கியிளாஸ்திரி	437	லகு அதிசார மாத்திரை	443
மு		லகுகட்டுவாங்க மாத்திரை	„
முக்குக்கணை	185	லகுக்கிராணி மாத்திரை	„
முருமாந்தம்	75	லகுசங்குவடி	„
முடக்கொத்தான் எண்ணெய்	437	லகுதுதுளச் சூரணம்	444
முட்டுத்தோஷம்	99	லி	
முட்டை உடைத்ததைப்போற்		லிங்கக்கட்டு	„
கழிதல்	229		

விஷயம்	பக்கம்	விஷயம்	பக்கம்
வ		வினக்கொளிக்கண் பகழி	
வங்கபஸ்பம்	444	தோஷம்	99
வங்கேசுர ரசநஸ்யம்	"	விஷச்சனிச் சுரம்	148
வயிறு பழுத்தல்	23	விஷச்சனிச் சுரம்	"
வயிற்றுப்பிசம்	339	விஷமாந்தக்கணை	189
வயிற்றுவலி	"	விஷவாதக்கரப்பாண்	258
வயிற்றுவலியுடன் வயிற்			
ரோட்டம்	229	விக்கக்கணை	189
வயிற்றோட்டம்	208	விக்கமாந்தம்	77
வரகுதரியம்மை	156	விக்குக்கரப்பாண்	259
வாட்காமாலை	271	வீரக்கட்டு	447
வாட்சிக்கரப்பான்	257	வீரகுதிரந்தாமணி	"
வறக்கணை	187	வீரமெழுரு	448
வஜ்ரவல்லி லேகியம்	445	வே	
வஸ்திரம் போர்த்துதல்	37	வெங்கண் பணிதோஷம்	99
வா		வெங்காய எண்ணெய்	448
வாதக்கணை	189	வெட்டுக்காயம்	342
வாதசிலேத்பணச்சுரம்	143	வெந்தய அம்மை	156
வாதபித்தச்சுரம்	"	வெந்தய எண்ணெய்	448
வாதமாந்தம்	76	வெப்புக்கழிச்சல்	232
வாதராசுச எண்ணெய்	445	வெணிப்பிரயோகமாக சுத்திசெய்ய	
வாதராசுச மாத்திரை	"	கார்பாலிக் லேஷன்	236
வார்தி	340	வே	
வார்தியும், வயிற்றோட்டமும்	"	வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய்	449
வார்தியும், விக்கலும்	"	வேறுபட்டவயிற்றுகத் தருந்த	
வாய்புண்	341	ஆகாரமுறைகள்	40
வான்மாந்தம்	76	வேனல் கொப்புளம்	342
வி		ஜ	
விகாரகுதகம்	266	ஜலதோஷம்	
விக்கல்	341	ஜனநேந்திரிய உட்புற அவைய	"
விச்சிலுப்பை யம்மை	156	வங்கன்	3
விச்சழி வலிப்பு	91	ஜனநேந்திரிய புற அவையவங்	
விடபக்கிழிவு	27	கள்	1
விடாக்கழிச்சல்	231	ஜன்னிக்கட்டு	342
விடாச்சுரம்	143	ஜா	
விபரீதப்பிரசவம்	18	ஜாதிபலாதிச்சூரணம்	449
விப்புருதி	342	ஸ்	
வியாக்கரியாதி ரசாயணம்	446	ஸ்திரீதோஷம்	100
வில்வாதி லேகியம்	"	ஸ்ரீ	
விழுதி எண்ணெய்	"	ஸ்ரீதேவி எண்ணெய்	449
விழுவிதினுண்டாகும் வலிப்பு	91	முற்றுப்பெற்றன.	

கண்ணுசாமியம் (என்னும்)

வைத்திய சேகரம்

[விலை ரூபாய் 3.]

ஆயுர்வேத அபிவிருத்தியையும், ஜீவகாருண்ணியத்தையும் முன்னிட்டு வெளியிட்ட "சிகிச்சாரத்நீபம்" என்னும் வைத்திய ஊலின் ஆசிரியராகிய வைத்திய வித்வன்மணி சி. கண்ணுசாமி பிள்ளையவர்கள் தமது பெயர் உலகில் எக்காலத்தும் நிலைபெறுமாறு பாமரகசியமாக தான் கையாண்டு வந்த பல அரிய பெரிய பாகங்களை யெல்லாம் சூர்ணம், மாத்திரை, லேகியம், எண்ணெய், தைலம், கிருதம், பற்பம், செஞ்சாரம், ஆக்கிராணம் முதலியவைகளை ஆங்காங்கு கைபாகம், செய்பாசம், சித்திரவிளக்கம் முதலியவற்றால் எளிதில் உணரும்படி எழுதியுள்ளார். இத்தகைய ஊல் ஒவ்வொரு வைத்தியர்களுக்கும் மிக்க உதவியாக இருக்குமென்பது சத்தியம்.

பதார்த்தகுண விளக்கம்

முதல் பாகம் (மூல வர்க்கம்) விலை ரூ. 8-0-0

இரண்டாம் பாகம் (தாது, ஜீவ வர்க்கம்) விலை ரூ. 3-8-0

வைத்திய வித்வன்மணி சி. கண்ணுசாமிப் பிள்ளை அவர்கள் இயற்றியது. முதல் பாகம் : 705-பக்கங்களும், இரண்டாம் பாகம் : 304-பக்கங்களும் கொண்டது.

இந்நூல் சித்த வைத்தியத்திற்குரிய மூலிகைகளே யன்றி தென்னாட்டு மருத்துவர்கள் கையாண்டுவரும் சில யூனானி ஆங்கிலச் சரக்குகளும் பதார்த்தகுண சிந்தாமணியில் கூறப்படாத பல மூலிகை சரக்குகளும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நூல் உயிர்மெய் யெழுத்து வரிசையில் ஒவ்வொரு சரக்கின் பெயரும், அதற்குரிய செய்யுளும், பின்னர் அதன் உரையும், அதன்கீழ் அச்சரக்கின் செய்கையும், உபயோகிக்கும் முறையும், மற்றும் வைத்தியர்க்குரிய பல அரும் பெரும் முறைகளையும் கூறியுள்ளார்.

இங்கிலீஷ் தமிழ்

வைத்திய சிகரமணி

[விலை ரூபாய் 5.]

இப்புத்தகம் இங்கிலீஷ் படித்தவர்களுக்கும், தமிழ் மாத்திரம் வாசித்தவர்களுக்கும் ஆக இரு வகுப்பாருக்கும் உபயோகப்பட வேண்டுமென்று ஒவ்வொரு முறையும் இங்கிலீஷில் ஒரு பக்கத்திலும், அதற்கு நேர் பக்கத்தில் தமிழிலுமாக கைமுறைகள் ஒவ்வொன்றையும் எந்த வைத்தியர்கள் கையாண்டிருந்த உண்மையானதென்று வெளியிட்டிருந்தனரோ, அவரவர்கள் பெயரை அந்தந்த முறைகளின் கீழேயே சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்நூல் ஆங்கில வைத்தியத்தொழில் கற்றுக்கொள்ள விரும்பும் மாணவர்களுக்கும், கம்பவுண்டர்களுக்கும் மிகவும் அவசியமானது.

கிடைக்குமிடம்:—

B. இரத்தின நாயகர் ஸன்ஸ்,
நெ. 57, வெங்கட்டராமய்யர் தெருவு, சென்னை-1.

வைத்திய வித்வன்மணி

சி. கண்ணுசாமி பிள்ளை அவர்கள் இயற்றிய

சிகிச்சாரத்நதீபம்

என்னும் வைத்திய நூல்

[வாலையந்திரப் பட்டங்களுடன் விலை ரூபாய் 5.]

சென்னைமாநகரின் கண் “விடோபா” அவிழ்தசாலையை ஸ்தாபித்தவரும், “கண்ணுசாமியம்” என்னும் வைத்தியசேகரத்தின் நூலாசிரியருமான தீமான் கண்ணுசாமி பிள்ளையவர்கள் தெந்நாடுமுதல் வடநாடு வரையிலும் அனுசரித்துவரும் அரிய பெரியபாகங்களையும், யூனனி வைத்தியமுறைகளையும், பெரும்பொருள் செலவிட்டு முடித்து பயன்பெற்றவைகளாயுள்ள பாகங்களையெல்லாம் ஒருங்கு தொகுத்து ஒவ்வொருவரும் எளிதிலுணரும் வண்ணம் தேகபஞ்சபூதம், நாடி, ரோகநிதானம், செய்பாகவிளக்கம், கியாமும், சூர்ணம், மாததிரை, மெழுகு, லேகியம், கிருதம், செந்தூரம், பற்பம், தீநீர், திராவகம், ஆசவம், அரிவட்டம் பத்தியம். இன்னும் பல பாகங்களையும் இலம்பகங்களாக வரைந்துள்ளார். இந்நூல் சில வருடங்களுக்குமுன் செலவாய்விட்டதை கடிதவிலையேற்றத்தினால் உடனே அச்சிடக்கூடாமையாக இருந்தது. ஆயினும் பலர்வேண்டித் தவக்கிணக்கி இந்நூலில் விடுபட்டுள்ள சிறிது எடை பாகங்களையும் சில செய்பாக திருத்தங்களையும் றெடி ஆசிரியர் மூலமாக திருத்தி உயர்தரமான கிளேஸ் கடிதத்தில் அச்சிட்டு இருக்கின்றோம், இந்நூல் வைத்தியத்தொழிலை கற்றவரும்பும் மாணவர்களுக்கும் வைத்தியர்களுக்கும் மற்ற ஏனையோருக்கும் பெரும் கன்மையைத் தரத்தக்க தென்பது எவரும் அறிந்த உண்மை.

சிகிச்சாரத்நதீபம் இரண்டாம் பாகமாகிய

வைத்திய சிந்தாமணி

[விலை ரூபாய் 4.]

இந்த “வைத்தியசிந்தாமணி” என்னும் நூலானது பூர்வாசிரியர்களில் ஒருவராகிய யுகிமாமுனி என்பவரால் கூறப்பட்டது. இதனில் ரோகநிதானங்களை ஏறக்குறைய கூறியிருப்பதினால் இதனை ஆதரவாகக்கொண்டு வசன சாலியமாக எழுதினதுமல்லாமல், சிலவிடங்களில் சமயத்திற் கேற்றவாறு மற்றும் சில கிரந்தங்களினின்று சிலது சேர்க்கப்பட்டும் ஒவ்வொரு ரோகங்களின் இறுதியில் ஆங்கிலேய மருத்துவத்தில் கூறப்பட்டுள்ள ரோக நிதான விஷயங்களை மதார்தரமாகவும் அமைத்து, காலதேச வர்த்தமானங்களுக்குத் தக்கவாறு சிசிச்சைகளையும் கூட்டி அநேக அருமைவாய்ந்த முறைகளுடன் எழுதப்பெற்றிருக்கின்றது.

கவனிப்பு:—எங்களிடம் கிடைக்கக்கூடிய தமிழ் புஸ்தகங்கள் அடங்கிய கிரய ஜாபிதா தேவையுள்ளவர்கள் தங்கள் விவசயத்தைத் தெரிவித்தால் இவ்வரசு அனுப்பப்படும்.

கிடைக்கும்மிடம்:—

B. இரத்தின நாயகர் ஸன்ஸ்,
நெ. 57, வெங்கடராமையர் தெருவு, சென்னை-1.

